

### < EU諸国(低汚染国・中程度汚染国)のサーベイランスデータ > 2004年

検査対象牛: All risk bovine animals (Fallen stock, bovine animals with clinical signs at AM and emergency slaughter)

\* カナダ: On Farm 3-D cattle, Abattoir 3-D cattle, Deadstock.(3-D; Downer, Disease, Distressed)

\* 日本: 死亡牛、病畜と殺牛

国名	検査頭数	陽性率(高リスク牛)	サーベイランスの内訳			(参考)	
		Positive rates(%) (Positives/Number of tests)	Fallen stock	Bovine animals with clinical signs at AM	Emergency slaughter	Testing on healthy slaughtered bovine animals Positive rates(%) (Positives/Number of tests)	Testing on bovine animals culled in the frame of BSE eradication Positive rates(%) (Positives/Number of tests)
<b>低汚染国 (2004年の年間発生率が増加、発生数が日本と類似)</b>							
ポーランド <sup>1)</sup>	33,708	0.008900% (3/33,708)	2	0	1	0.001788%(8/447,332)	0%(0/65)
チェコ <sup>1)</sup>	69,458	0.007199% (5/69,458)	3	0	2	0.001537%(2/130,124)	0%(0/1,135)
スロバキア <sup>1)</sup>	19,258	0.010385% (2/19,258)	0	0	2	0.007867%(5/63,553)	0%(0/127)
<b>中程度汚染国 (日本が実施する少し以前から迅速試験によるスクリーニングを開始。発生率は低下してきている)</b>							
フランス <sup>1)</sup>	266,123	0.010897% (29/266,123)	0	0	29	0.000648%(17/2,624,634)	0%(0/919)
ドイツ <sup>1)</sup>	236,492	0.010994% (26/236,492)	3	0	23	0.001483%(34/2,292,714)	0.152440%(2/1,312)
(参考)カナダ	52,817	0.003787%(2/52,817) <sup>2)</sup>	2(ダウナー牛)			0%(0/141) <sup>3)</sup>	0%(0/12) <sup>3)</sup>
(参考)日本	106,405	0.002819%(3/106,405) <sup>4)</sup>	2	1	0	0.000158%(2/1,264,727) <sup>5)</sup>	0%(0/82) <sup>4)</sup>

1) E.C. REPORT ON THE MONITORING AND TESTING OF RUMINANTS FOR THE PRESENCE OF TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (TSE) IN THE EU IN 2004

2) 2004年6月～2005年6月21日データ; 食品健康影響評価に係る資料(7月8日提出資料)

3) カナダ諮問参考資料29

4) 2004年度データ; 食品健康影響評価に係る資料(7月8日提出資料)

5) 米国諮問参考資料17