

（案）

## 農薬評価書

# ジノテフラン

（第 2 版）

2007 年 1 月 15 日

食品安全委員会農薬専門調査会

## 目次

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ・ 目次                                     | 1  |
| ・ 審議の経緯                                  | 4  |
| ・ 食品安全委員会委員名簿                            | 4  |
| ・ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿                   | 5  |
| ・ 要約                                     | 6  |
| 評価対象農薬の概要                                | 7  |
| 1. 用途                                    | 7  |
| 2. 有効成分の一般名                              | 7  |
| 3. 化学名                                   | 7  |
| 4. 分子式                                   | 7  |
| 5. 分子量                                   | 7  |
| 6. 構造式                                   | 7  |
| 7. 開発の経緯                                 | 7  |
| 試験結果概要                                   | 8  |
| 1. ラットにおける動物体内運命試験                       | 8  |
| (1) 吸収排泄・血中濃度・体内分布試験                     | 8  |
| (2) 排泄・胆汁排泄試験                            | 10 |
| (3) <i>in vitro</i> 代謝試験                 | 10 |
| 2. 植物体内運命試験                              | 11 |
| (1) 水稻                                   | 11 |
| (2) 水稻                                   | 11 |
| (3) ナス                                   | 12 |
| (4) キャベツ                                 | 13 |
| (5) きゅうり                                 | 14 |
| (6) インゲン                                 | 14 |
| (7) イチゴ                                  | 15 |
| (8) かぶ                                   | 16 |
| (9) みかん                                  | 16 |
| (10) なし                                  | 16 |
| (11) りんご                                 | 17 |
| (12) 代謝物 DN のきゅうり及びインゲンにおける植物体内運命試験      | 17 |
| (13) 代謝物 UF のきゅうりにおける植物体内運命試験            | 17 |
| (14) 代謝物 MNG のきゅうりにおける植物体内運命試験           | 18 |
| (15) 代謝物 PHP 及び 446-DO のきゅうりにおける植物体内運命試験 | 18 |
| 3. 土壌中運命試験                               | 18 |
| (1) 好氣的土壌中運命試験                           | 18 |

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| (2)  | 好氣的湛水土壤中運命試験                          | 19 |
| (3)  | 嫌氣的土壤中運命試験                            | 19 |
| (4)  | DN の土壤中運命試験                           | 19 |
| (5)  | UF の土壤中運命試験                           | 19 |
| (6)  | MNG の土壤中運命試験                          | 20 |
| (7)  | NG の土壤中運命試験                           | 20 |
| (8)  | 土壤吸着試験                                | 20 |
| (9)  | 土壤カラムリーチング試験                          | 20 |
| (10) | エイジドリリーチング試験                          | 21 |
| (11) | DN、UF 及び MNG の土壤カラムリーチング試験            | 21 |
| (12) | 鉛直浸透試験(水田圃場)                          | 21 |
| (13) | 鉛直浸透試験(畑圃場)                           | 22 |
| (14) | 土壤表面光分解試験                             | 22 |
| 4.   | 加水分解試験                                | 23 |
| (1)  | 原体                                    | 23 |
| (2)  | 原体(強アルカリ性を含む)                         | 23 |
| (3)  | DN リン酸塩                               | 23 |
| (4)  | MNG                                   | 23 |
| (5)  | BCDN 及び DN-2-OH の水中安定性試験              | 24 |
| 5.   | 水中運命試験                                | 24 |
| (1)  | 水中光分解試験(精製水及び河川水)                     | 24 |
| (2)  | DN リン酸塩の水中光分解試験                       | 24 |
| (3)  | MNG の水中光分解試験                          | 24 |
| 6.   | その他の光分解試験                             | 24 |
| (1)  | 薄膜光分解試験                               | 24 |
| (2)  | 水中光分解試験(田面水、蒸留水)                      | 25 |
| (3)  | DN 光分解試験(薄膜、田面水)                      | 25 |
| (4)  | UF 光分解試験(薄膜、田面水)                      | 26 |
| (5)  | MNG 光分解試験(薄膜、田面水)                     | 26 |
| (6)  | PHP、446-DO、BCDN 及び DN-3-OH 光分解試験(蒸留水) | 27 |
| 7.   | 土壤残留試験                                | 27 |
| 8.   | 作物残留試験                                | 27 |
| 9.   | 乳汁への移行試験                              | 28 |
| 10.  | 一般薬理試験                                | 28 |
| 11.  | 急性毒性試験                                | 30 |
| (1)  | 急性毒性試験                                | 30 |
| (2)  | 急性神経毒性試験(ラット)                         | 31 |
| 12.  | 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性                    | 31 |
| 13.  | 亜急性毒性試験                               | 32 |
| (1)  | 90 日間亜急性毒性試験(ラット)                     | 32 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| (2) 90日間亜急性毒性試験(マウス)      | 32 |
| (3) 90日間亜急性毒性試験(イヌ)       | 33 |
| (4) 90日間亜急性神経毒性試験(ラット)    | 34 |
| 14. 慢性毒性試験及び発がん性試験        | 34 |
| (1) 1年間慢性毒性試験(イヌ)         | 34 |
| (2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット) | 35 |
| (3) 18ヶ月間発がん性試験(マウス)      | 36 |
| 15. 生殖発生毒性試験              | 37 |
| (1) 2世代繁殖試験(ラット)          | 37 |
| (2) 2世代繁殖試験(追加:ラット)       | 38 |
| (3) 発生毒性試験(ラット)           | 39 |
| (4) 発生毒性試験(ウサギ)           | 39 |
| 16. 遺伝毒性試験                | 39 |
| 総合評価                      | 43 |
| ・ 別紙1:代謝物/分解物略称           | 48 |
| 別紙2:検査値等略称                | 49 |
| ・ 別紙3:作物残留試験成績            | 50 |
| 別紙4:推定摂取量                 | 56 |
| ・ 参照                      | 58 |

< 審議の経緯 >

第1版関係

- 2002年4月24日 初回農薬登録
- 2004年4月26日 農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請の連絡及び基準値の設定依頼について（16 消安第 894 号、適用拡大：大豆、大根、メロン等）
- 2004年4月28日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第 0428001 号）同接受（参照 1～115、117）
- 2004年5月13日 食品安全委員会第 44 回会合（要請事項説明）（参照 118）
- 2004年5月19日 農薬専門調査会第 11 回会合（参照 119）
- 2004年11月30日 追加資料提出（参照 116）
- 2005年1月12日 農薬専門調査会第 23 回会合（参照 120）
- 2005年5月12日 食品安全委員会第 94 回会合（報告）
- 2005年5月12日より2005年6月8日 国民からの意見聴取
- 2005年6月15日 農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告
- 2005年6月16日 食品健康影響評価の結果の通知について（参照 121）
- 2006年7月28日 残留農薬基準告示（参照 122）
- 2006年8月28日 適用拡大登録

第2版関係

- 2006年8月21日 農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請の連絡及び基準値の設定依頼について（18 消安第 5882 号、適用拡大：チンゲンサイ、ほうれん草、あんず等）
- 2006年9月4日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第 0428001 号）同接受（参照 124～126）
- 2006年9月7日 食品安全委員会第 158 回会合（要請事項説明）（参照 127）
- 2006年12月6日 農薬専門調査会総合評価第一部会第7回会合（参照 128）
- 2007年1月15日 農薬専門調査会幹事会第9回会合（参照 129）

< 食品安全委員会委員名簿 >

| （2006年6月30日まで） | （2006年12月20日まで） | （2006年12月21日から） |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 寺田雅昭（委員長）      | 寺田雅昭（委員長）       | 見上 彪（委員長）       |
| 寺尾允男（委員長代理）    | 見上 彪（委員長代理）     | 小泉直子            |
| 小泉直子           | 小泉直子            | 長尾 拓            |
| 坂本元子           | 長尾 拓            | 野村一正            |
| 中村靖彦           | 野村一正            | 畑江敬子            |
| 本間清一           | 畑江敬子            | 本間清一            |
| 見上 彪           | 本間清一            |                 |

< 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿 >

( 2006 年 3 月 31 日まで )

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| 鈴木勝士 ( 座長 )   | 高木篤也  | 林 真               |
| 廣瀬雅雄 ( 座長代理 ) | 武田明治  | 平塚 明              |
| 石井康雄          | 津田修治* | 吉田 緑              |
| 江馬 眞          | 津田洋幸  | * : 2005 年 10 月 ~ |
| 太田敏博          | 出川雅邦  |                   |
| 小澤正吾          | 長尾哲二  |                   |

( 2006 年 4 月 1 日から )

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| 鈴木勝士 ( 座長 )   | 三枝順三 |      |
| 廣瀬雅雄 ( 座長代理 ) | 佐々木有 | 根岸友恵 |
| 赤池昭紀          | 高木篤也 | 林 真  |
| 石井康雄          | 玉井郁巳 | 平塚 明 |
| 泉 啓介          | 田村廣人 | 藤本成明 |
| 上路雅子          | 津田修治 | 細川正清 |
| 臼井健二          | 津田洋幸 | 松本清司 |
| 江馬 眞          | 出川雅邦 | 柳井徳磨 |
| 大澤貫寿          | 長尾哲二 | 山崎浩史 |
| 太田敏博          | 中澤憲一 | 山手丈至 |
| 大谷 浩          | 納屋聖人 | 與語靖洋 |
| 小澤正吾          | 成瀬一郎 | 吉田 緑 |
| 小林裕子          | 布柴達男 | 若栗 忍 |

## 要 約

殺虫剤である「ジノテフラン」(IUPAC: (RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン)について、食品健康影響評価を実施した。

評価に供した試験成績は動物体内運命(ラット)、植物体内運命(水稻、ナス、キャベツ、きゅうり、インゲン、イチゴ、かぶ、みかん、なし及びりんご)、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性(ラット、マウス及びウサギ)、亜急性毒性(ラット、マウス及びイヌ)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性(ラット)、発がん性(マウス)、2世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、遺伝毒性試験等である。

本剤には発がん性、繁殖への影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

各試験の無毒性量の最小値がイヌを用いた1年間慢性毒性試験の22mg/kg 体重/日であったので、これを根拠として、安全係数100で除した0.22mg/kg 体重/日を一日摂取許容量(ADI)と設定した。

## ・評価対象農薬の概要

### 1. 用途

殺虫剤

### 2. 有効成分の一般名

和名：ジノテフラン

英名：dinotefuran (ISO 名)

### 3. 化学名

IUPAC

和名：(*RS*)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン

英名：(*RS*)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine

CAS (No.248583-16-1)


和名：*N*-メチル-*N*'-ニトロ-*N*"-[(テトラヒドロ-3-フラニル)メチル]グアニジン

英名：*N*-methyl-*N*'-nitro-*N*"-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine

### 4. 分子式 $C_7H_{14}N_4O_3$

### 5. 分子量 202.21

### 6. 構造式



### 7. 開発の経緯

ジノテフランは 1993 年に三井化学株式会社により発見されたテトラヒドロフリルメチル基を有する殺虫剤である。ニコチン性アセチルコリンレセプターに対する結合親和性は低いにもかかわらず、電気生理学的にはアゴニスト作用を示す特長を有する。我が国では 2002 年 4 月 24 日に稲、野菜、果実等を対象に初めて登録された。海外では米国、韓国で登録が取得されている。(参照 1～113)

2005 年 8 月及び 12 月に三井化学株式会社(以下「申請者」とする。)より農薬取締法に基づき、チンゲンサイ、ほうれん草、あんず等への適用拡大登録申請がなされ、参照 124～125 の資料が提出されている。

## ・試験結果概要

各種運命試験（ .1～3 及び 5、6 ）には、ジノテフランのテトラヒドロフラン環 4 位の炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの（Tf- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン）及びグアニジンの炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの（Gu- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン）を用いた。また、代謝物 DN、UF 及び MNG についてはグアニジンの炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの（ $^{14}\text{C}$ -DN、 $^{14}\text{C}$ -UF 及び  $^{14}\text{C}$ -MNG）を用いた。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合はジノテフランに換算した。代謝物/分解物等略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示した。

### 1 . ラットにおける動物体内運命試験

本試験で用いた試験設計概要は表 1 に示されている。

表 1 ラットにおける動物体内運命試験設計概要

| 標識体               | Tf- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン及び Gu- $^{14}\text{C}$ -ジノテフランの等量混合物 |      |       |                 |      | Tf 又は<br>Gu- $^{14}\text{C}$ -<br>ジノテフラン |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 試験区分              |                                                                 |      |       |                 |      |                                          |
| 投与方法              | 静脈内注射                                                           | 強制経口 |       |                 |      |                                          |
| 投与回数              | 単回                                                              | 単回   | 15 日間 | 7 日間<br>( 標識体 ) | 単回   | 単回                                       |
| 用量                | 低用量                                                             | 低用量  | 低用量   | 低用量             | 高用量  | 中用量                                      |
| 投与量<br>(mg/kg 体重) | 50                                                              | 50   | 50    | 50              | 1000 | 200                                      |

1～14 日目は非標識+15 日目は標識体

、 50 又は 1000 mg/kg 体重/日

#### ( 1 ) 吸収排泄・血中濃度・体内分布試験

ジノテフランの SD ラット（一群雌雄各 5～9 匹）を用いた動物体内運命試験（吸収排泄・血中濃度・体内分布）が実施された。

単回投与群（ 50、1000 ）では投与後 24 時間で、尿中に投与量の 84～99% が排泄され、投与後 168 時間で、尿中に投与量の 88～100%、糞中に 1～2.4% が排出された。反復投与群（ 50、1000 ）では尿中に投与量の 90～98%、糞中に 2～3% 排出された。

血中放射能の最高濃度（ $C_{\max}$ ）は、低用量単回投与群（ 50 ）で 0.3～0.5 時間後（ $T_{\max}$ ）に 41～46  $\mu\text{g/g}$ 、高用量単回投与群（ 1000 ）で 2 時間後（ $T_{\max}$ ）に 471～566  $\mu\text{g/g}$  であった。半減期（ $T_{1/2}$ ）は、低用量で 4～8 時間、高用量で 14～15 時間であった。反復投与（ 50、1000 ）の 2 試験区分間で、血中濃度に顕著な差異は認められなかった。

ジノテフランの低用量（ 50 ）及び高用量投与群（ 1000 ）の主な組織中の残留放射能は表 2 に示してある。脂肪組織には、極めて僅かに分布した。

ほとんどの組織において放射能濃度は血漿中濃度以下であったが、腸管、腎、胃、膀胱及び胃内容物では血漿中濃度を上回っていた。また、脳や脂肪の濃度は低かった。

表 2 主な組織中の残留放射能（ $\mu\text{g/g}$ ）

|             |   | 血漿中最高濃度到達時                                                                                | 投与 168 時間後         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 低<br>用<br>量 | 雄 | 腎(79.4)、胃(67.3)、膀胱(45.8)、血漿(40.6)、肝(36.3)、<br>全血(34.8)、腸管(34.3)、皮膚(33.9)、肺(32.9)、胸腺(32.6) | 全ての組織で<br>0.052 以下 |
|             | 雌 | 胃(171)、腎(72.4)、腸管(47.5)、血漿(41.4)、肝(37.6)、<br>全血(35.0)、肺(34.5)、下垂体(32.6)、胸腺(32.6)、子宮(33.5) | 全ての組織で<br>0.021 以下 |
| 高<br>用<br>量 | 雄 | 胃(3850)、胃内容物(3540)、腎(470)、腸管(423)、膀胱(368)、<br>血漿(287)、全血(261)、前立腺(253)、副腎(252)、肝(244)     | 全ての組織で<br>0.692 以下 |
|             | 雌 | 胃内容物(3630)、胃(3340)、膀胱(998)、腸管(867)、腎(673)、<br>血漿(492)、全血(450)、副腎(438)、肝(436)、下垂体(400)     | 全ての組織で<br>0.703 以下 |

低用量：投与 0.5 時間後（ $T_{\max}$ ）、高用量：投与 1.5 時間後（ $T_{\max}$  付近）

低用量( )及び高用量( )で単回経口投与し、胆管挿管した SD ラット（一群雌雄各 3 匹）を用いた動物体内運命試験（吸収・排泄）が実施された。

48 時間後、低用量、高用量ともに胆汁中への排泄は、投与放射能（TAR）の 0.6～0.9% であり、その分布は、尿への排泄が 85～95%、糞への排泄が 1.1～1.3%であった。消化管吸収率は 99%であり、ほとんどの放射能が消化管から吸収されと考えられた。

低用量単回経口投与( )し、妊娠 18 日の SD ラット（一群雌 9 匹）を用いた胎盤移行試験が実施された。母動物と胎児ともに、全血試料の放射能濃度に差が認められず、ほとんどの組織で投与 0.5 時間後に最高濃度となり、以後速やかに減衰した。胎児への移行量は、投与後 0.5 時間で 0.13%TAR であった。

低用量単回経口投与( )し、出産後 15 日の SD ラット（一群雌 9 匹）を用いた乳汁移行試験が実施された。投与放射能は速やかに吸収され、乳汁での濃度は血漿中の濃度とほぼ同様に推移した。

低用量( )及び高用量( )で単回経口投与し、SD ラット（一群雌雄各 4 匹）を用いた全身オートラジオグラフィが実施された。定量的な組織内分布試験の結果と同様に、消化管からの速やかな吸収、全身への分布及び腎臓を経由した速やかな膀胱への排泄を示し、中枢神経系における分布は極めて少なかった。

尿中に排出された放射能の大部分はジノテフランで、74～93%TAR であり、代謝物としては 446-CO、446-DO 及び PHP-Ac が合わせて 1～3%TAR、PHP、UF-DM 及び 446-OH+COOH が合わせて 0.8～3%TAR 認められ、その他の物質はいずれも 0.5%TAR 以下であった。糞中に排出された放射能のうちジノテフランは 0.3～3%TAR であり、代謝物としては MNG 及び 446-DO-Ac が投与量に対して 0.005 未満～0.4%TAR、PHP、UF-DM 及び 446-OH+COOH が合わせて 0.01～0.3%TAR、446-CO、446-DO 及び PHP-Ac が合わせて 0.03～0.3%TAR 認められ、その他の物質はいずれも 0.1%TAR 以下

であった。

肝で認められた放射能（投与 1.5 時間後）の中で、最も多く認められたものはジノテフランであり、0.005%未満～1%TAR で最大であり、その他の物質はいずれも 0.2%TAR 以下であった。

腸管で認められた放射能（投与 1.5 時間後）の中で、最も多く認められたものは UF-DM、446-OH+COOH、446-CO、446-DO 及び PHP-Ac を含み、投与量の 0.005%未満～1%TAR であった。その他の物質はいずれも 0.2%TAR 以下であった。

胆汁中で認められた（低用量単回経口投与・投与 6 時間後まで）放射能の大部分はジノテフランで、0.46～0.52%TAR が検出された。その他、PHP 及び MNG 等が検出されたが 0.1% TAR 以下であった。

乳汁中で認められた（低用量単回経口投与・投与 1.5 時間後まで）放射能の大部分はジノテフランで、0.61% TAR が検出された。その他の物質はいずれも検出限界以下であった。

ジノテフランのラットにおける代謝経路は、脱ニトロ化、テトラヒドロフラン環の酸化的開裂、分子内環化、加水分解、グアニジン部及びテトラヒドロフラン環の開裂、脱メチル化又はニトロ基の還元が推測された。一部の代謝物は抱合化されと考えられた。（参照 2）

## （2）排泄・胆汁排泄試験

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを 200 mg/kg 体重の用量で単回強制経口投与（ ）し、SD ラット（一群雄各 1 匹）を用いた排泄試験が実施された。

大部分は尿を通じて排泄され、投与 120 時間後までに 93%TAR 以上が尿中に排泄された。糞への排泄は 5% TAR で、標識位置による差は認められなかった。

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを 200 mg/kg 体重の用量で単回強制経口投与（ ）し、胆管挿管した SD ラット（一群雄各 3 匹）を用いた胆汁排泄試験が実施された。

投与 48 時間後までの胆汁への排泄は、0.6～0.8%TAR であり、排泄における胆汁経路の関与は僅かと考えられた。（参照 3）

## （3）*in vitro* 代謝試験

Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフラン、主要代謝物 DN、UF 及び MNG の <sup>14</sup>C 標識体 0.1 及び 1 ppm にラット肝ミクロゾーム S-9 分画を加えて *in vitro* 代謝試験が実施された。

ジノテフランは 24 時間後の各用量で 92%以上回収され、代謝物の同定は出来なかった。また、主要代謝物については、分解はほとんど認められなかったか、あるいは緩やかであり、投与 24 時間後の各用量で供試化合物の残存率は DN で 99.1～100%、UF で 89.8～92.4%、MNG で 93.7～93.9%であった。代謝物の同定は MNG のみで可能であり、NG 及び MG が添加量の 2～3%程度検出された。（参照 4）

## 2. 植物体内運命試験

### (1) 水稻

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン及び Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの等量混合物を、水稻(品種:日本晴)の出穂5又は20日後に400g ai/haを1回散布又は土壌処理し、出穂20日後(5日後、処理群のみ採取)及び出穂67日後(収穫期)に検体を採取し、イネにおける植物体内運命試験が実施された。

出穂5日後での土壌処理群の収穫期(62日後)における放射能分布は、放射能処理量に対してもみに1.6%、わらに21%、根部に3%及び土壌で73%が検出され、出穂20日後の散布処理群の収穫期(47日後)における放射能分布は、もみに11%、わらに58%、根部に0.3%及び土壌で5%が検出された。なお、試料中の代謝物の構成は処理日や処理方法による差は認められなかった。

土壌処理区の試料中の放射能残留量は、もみで0.35~0.40 mg/kg、玄米で0.05~0.06mg/kg、わらで1.3~1.8 mg/kgであった。玄米中の放射能の化学形態として、ジノテフランが0.014~0.015 mg/kg[残存放射能量(TRR)の26.2~26.3%] UF、DN、PHP及び446-DOが各0.001~0.005 mg/kg(2.26~8.57%TRR)、MNG、UF、PHP及び446-DOの抱合体が合わせて0.008~0.009 mg/kg(14.8~15.8%TRR)検出された。わら中の残留放射能はジノテフラン換算で1.35~1.82 mg/kgであり、そのうちジノテフラン(0.70~0.97 mg/kg)及びUF(0.18~0.22 mg/kg)等が検出された。

散布処理区の試料中の放射能残留量は、もみで5.1~5.8 mg/kg、玄米で0.34~0.61 mg/kg、わらで7.6~8.1 mg/kgであった。可食部(玄米)中の放射能の化学形態については、ジノテフランが0.18~0.20 mg/kg(33.4~53.6%TRR)、UFが0.05~0.11 mg/kg(14.1~17.2%TRR)、MNG、UF、PHP及び446-DOの抱合体が合わせて0.030~0.104 mg/kg(8.93~17.0%TRR)、DN、PHP及び446-DOが各0.011~0.043 mg/kg(3.31~7.05%TRR)検出された。わら中の放射能として、ジノテフラン(4.0~5.6 mg/kg)、UF(0.72~1.2 mg/kg)等が検出された。その他として、二酸化炭素など揮発性の成分が生成していると考えられた。(参照5)

### (2) 水稻

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを用いて水稻(品種:コシヒカリ)の4葉期に50 µg aiを葉面処理し、6、9及び21日後に検体を採取、100 µg aiを田面水処理し、5、14及び21日後に検体を採取し水稻の植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理21日後の放射能分布は、処理葉で63~73%TAR、その他の地上部で13~20%TAR、根部で0.4~1.2%TARであった。また、放射能回収率の低下から二酸化炭素などの揮発性成分の生成が考えられた。処理21日後の処理葉における放射能量は、ジノテフランが26.2~35.3%TRR、DNが16.1~19.4%TRR、UFが13.5~16.0%TRR、MG、DN-2-OH及びBCDNが6%TRR以下検出された。

田面水処理では、処理21日後の放射能分布は、地上部で35~45% TAR、根部で3~4% TAR、土壌で45~57% TARであった。地上部における放射能量はジノテフランが

32.0～34.5%TRR、DN が 22.3%TRR、UF が 14.5～19.0%TRR、MG、DN-2-OH 及び BCDN が 5%TRR 以下検出された。

水稻におけるジノテフランの主要代謝経路は、ニトロ基の脱離による DN の生成、テトラヒドロフラン環の水酸化と開環による DN-OH 及び 446-DO の生成、分子内環化による BCDN 及び PHP の生成、ニトロイミノ基の加水分解による UF の生成、グアニジンとテトラヒドロフラン部の開裂による MNG の生成であり、代謝物(UF、PHP あるいは 446-DO)の糖抱合体の生成、さらに代謝を受け二酸化炭素及びその他の揮発性成分にまで分解されると考えられた。(参照 6)

### (3) ナス

ナス(品種:千両2号)を用いて、植物体内運命試験が実施された。本試験で用いた、試験設計概要は表 3 に示されている。

表 3 ナスにおける植物体内運命試験の試験設計概要

| 標識体                         | Tf- <sup>14</sup> C-ジノテフラン又は Gu- <sup>14</sup> C-ジノテフラン |        |           |        | Tf 及び<br>Gu- <sup>14</sup> C-<br>ジノテフラン<br>の等量混合物 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------|
| 試験区分                        |                                                         |        |           |        |                                                   |
| 処理方法                        | 葉面処理                                                    | 土壌処理   | 葉面処理      | 植穴処理   | 可食部処理                                             |
| 処理時の<br>植物体<br>ステージ         | 4 葉期                                                    | 2～3 葉期 | 3 葉期      | 2～3 葉期 | 結実期                                               |
| 処理部位                        | 3 葉                                                     | 土壌     | 2 葉及び 3 葉 | 土壌     | 未熟果実                                              |
| 検体採取日                       | 6、9、15                                                  | 3、9、15 | 0～15      | 21     | 15                                                |
| 投与量<br>( $\mu\text{g ai}$ ) | 50                                                      | 50     | 150       | 100    | 50                                                |

(葉面処理) (土壌処理 1) (揮発性成分の捕集) (土壌処理 2) 及び (可食部処理) の条件で放射活性を測定した。

葉面処理( )では、処理 15 日後の放射能分布は、処理葉で 87～91% TAR、その他の地上部で 0.6～1.7% TAR、根部で 0.1～0.2% TAR であった。処理葉の放射能量として、ジノテフランが 19.3～19.6 mg/kg (36.9～49.7%TRR)、DN が 5.3～9.8 mg/kg (13.5～18.8%TRR)、UF が 2.9～4.3 mg/kg(7.3～8.3%TRR)、BCDN が 2.7～4.8 mg/kg(6.9～9.2%TRR)、MG、PHP 及び 446-DO が 3.4 mg/kg 以下検出された。

土壌処理 1( )では、処理 15 日後、処理放射能の約 60%が植物に吸収され、その放射能分布は、地上部で処理量の 58%、根部で 1.3% TAR、土壌で 33～35% TAR であった。地上部でジノテフランが 1.09～1.48 mg/kg (25.0～29.6%TRR)、DN が 1.43～1.46 mg/kg (28.6～33.4%TRR)、UF が 0.67～0.79 mg/kg(13.4～18.1%TRR)、MG、PHP、

MNG、446-DO 及び BCDN が 0.5 mg/kg 以下検出された。

揮発性成分の捕集( )では、処理 15 日後における放射能回収率は 99%TAR、二酸化炭素が 0.2 ~ 0.6%TAR、その他の揮発性成分が 0.01%TAR 以下検出された。

可食部処理( )では、処理 15 日後の可食部における放射能回収率は 92%TAR であり、ジノテフランが 0.69 mg/kg ( 87.3%TRR )、UF が 0.03 mg/kg ( 3.4%TRR )、DN が 0.02 mg/kg(2.9%TRR)検出され、PHP、BCDN、446-DO、MNG 及び MG が 0.01 mg/kg 以下検出された。

土壌処理 2( )では、処理 21 日後、処理量の約 40%が植物体に吸収され、その放射能分布は、果実部で 1.3 ~ 1.6% TAR、地上部で 36.6 ~ 36.8%TAR、根部で 1.5 ~ 1.6%TAR、土壌で 47.5 ~ 47.6%TAR であった。可食部での放射能として、ジノテフランが 0.95 ~ 1.26 mg/kg ( 55.4 ~ 63.5%TRR )、MNG が 0.08 mg/kg ( 4.5%TRR )、446-DO ( グルコース抱合体を含む ) が 0.04 ~ 0.07 mg/kg(2.39 ~ 3.51%TRR)、PHP が 0.05 mg/kg(1.8 ~ 2.8%TRR)、UF 及び DN が 0.02 mg/kg 以下検出された。

ジノテフランのナスにおける主たる代謝経路は、ニトロ基の脱離による DN の生成、ニトロイミノ基の加水分解による UF の生成、テトラヒドロフラン環の酸化による DN-2-OH や 446-DO の生成、それに引き続く分子内の閉環による BCDN や PHP の生成、テトラヒドロフラン環とグアニジン基の開裂による MNG の生成、メチル基の脱離による FNG の生成、さらに糖抱合体及び二酸化炭素の生成が起これと考えられた。( 参照 7 )

#### ( 4 ) キャベツ

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン及び Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの等量混合物を用いて、キャベツ ( 品種 : シキドリ ) に 50 µg ai を 4 ~ 5 葉期の葉面に塗布し、処理 5、11 及び 19 日後に検体を採取 ( 葉面処理 )、2 ~ 3 葉期の栽培土壌に土壌散布し、処理 11、28 及び 43 日後に検体を採取 ( 土壌処理 ) し、キャベツにおける植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理 19 日後の放射能分布は、処理葉で 81% TAR、その他の地上部で 1%TAR、根部で 0.1%TAR であり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理葉での放射能として、ジノテフランが 16.4 mg/kg ( 29.8%TRR )、PHP が 5.3 mg/kg ( 9.6%TRR )、BCDN が 5.6 mg/kg(10.2%TRR)、DN が 4.3 mg/kg(7.9%TRR)、UF、DN-3-OH 及び DN-2-OH が 3 mg/kg 以下検出された。

土壌処理では、処理 43 日後、処理放射能の 40%が植物体に吸収され、その放射能分布は、地上部で 38% TAR、根部で 1%TAR、土壌で 39%TAR であり、地上部では、ジノテフランが 0.38 mg/kg ( 24.0%TRR )、MNG が 0.42 mg/kg ( 26.5%TRR )、DN が 0.19 mg/kg ( 11.9%TRR )、UF が 0.11 mg/kg ( 7.26%TRR )、PHP、BCDN 及び DN-3-OH が 0.1 mg/kg 以下検出された。なお、地上部の代謝物として最も多かった MNG は、葉面散布では検出されていないことから土壌中で生成したものが吸収されたと考えられた。( 参照 8 )

**(5) きゅうり**

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを用いてきゅうり(品種:サガミハンシロ)に、50 µg ai を3~4葉期の葉面に塗布し、処理3、9及び15日後に検体を採取(葉面処理) 50 µg ai を3~4葉期に栽培土壌に土壌散布し、処理6、10、15及び20日後に検体を採取(土壌処理) 20 µg ai を結実期の未熟果実に塗布し、処理3及び7日後に検体を採取(果実処理)して、きゅうりにおける植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理9日後の放射能分布は、処理葉で81~92% TAR、地上部で3~6%TAR、根部で0.3~0.5%TARであり、処理葉での放射能として、ジノテフランが15.1~30.1mg/kg(59.9~67.4%TRR) DN が3.4~4.0mg/kg(9.0~13.7%TRR)、抱合体を含むUFが合わせて1.9~3.0 mg/kg(6.7~7.6%TRR)、PHP、446-DO及びBCDNが1.4mg/kg以下検出された。

土壌処理では、処理20日後の放射能分布は、地上部で28~36% TAR、根部で0.2~0.6%TAR、土壌で57~68% TARであり、地上部での放射能として、ジノテフランが0.61~0.85mg/kg(37.3~55.6%TRR) DN が0.16~0.29mg/kg(10.4~17.7%TRR)、抱合体を含むUFが合わせて0.19mg/kg(11.8~12.4%TRR) 446-DO(抱合体を含む)が0.12~0.17mg/kg(7.1~11.1%TRR) 検出された。

果実処理では、処理7日後の果実部における放射能は、処理量の93~95%であり、果実での放射能として、ジノテフランが0.1~0.5mg/kg(91%TRR) 検出され、ほとんど代謝されなかった。(参照9)

**(6) インゲン**

インゲン(品種:グリーントップ)を用いて、植物体内運命試験が実施された。本試験で用いた、試験設計概要は表4に示されている。

表4 インゲンにおける植物体内運命試験の試験設計概要

| 標識体                 | Tf及び<br>Gu- <sup>14</sup> C-<br>ジノテフラン<br>の等量混合物 | Tf又はGu- <sup>14</sup> C-ジノテフラン |       |       |               |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|---------------|
|                     |                                                  |                                |       |       |               |
| 試験区分                |                                                  |                                |       |       |               |
| 処理方法                | 葉面処理                                             | 土壌処理                           | 葉面処理  | 可食部処理 | 茎部注入処理        |
| 処理時の<br>植物体<br>ステージ | 4葉期                                              | 2~3葉期                          | 3葉期   | 結実期   | 結実期           |
| 処理部位                | 第3葉                                              | 土壌                             | 第2葉   | 未熟果実  | 実に近い<br>茎部2箇所 |
| 検体採取日               | 10、20、27                                         | 22、40、55                       | 11日まで | 11、25 | 11、25         |

|                      |    |    |    |   |    |
|----------------------|----|----|----|---|----|
| 投与量<br>( $\mu$ g ai) | 50 | 50 | 50 | 5 | 10 |
|----------------------|----|----|----|---|----|

（葉面処理）（土壌処理）（揮発性成分の捕集）（果実処理）及び（茎部注入処理）の条件で放射活性を測定した。

葉面処理（ ）では、処理 27 日後の各検体における放射能分布は、豆で 0.2% TAR、さやで 1%TAR、葉で 83%TAR、葉の脇葉で 0.3%TAR、その他の地上部で 0.8%TAR、根部で 0.3%TAR、土壌で 0.5%TAR であり、処理葉での放射能として、ジノテフロンが 15.1mg/kg(21.2%TRR) DN が 7.9mg/kg(11.1% TRR)、抱合体を含む PHP が 8.0mg/kg (11.3% TRR) 検出され、446-DO、UF 等が 6mg/kg 以下検出された。

土壌処理（ ）では、処理 55 日後の各検体における放射能分布は、豆で 0.3% TAR、さやで 1%TAR、地上部で 13～23%TAR、根部で 1%TAR、土壌で 75～77%TAR であり、地上部での放射能として、ジノテフロンが 0.04～0.09mg/kg (2.7～8.3%TRR) 抱合体を含む PHP が 0.18～0.33mg/kg(16.1～20.6% TRR) MNG が 0.30mg/kg(18.4%TRR ; Gu-標識体のみ) 446-DO、MG 及び DN が 0.30mg/kg 以下検出された。

揮発性成分の捕集（ ）では、処理 11 日後における放射能回収率は 90～95%、二酸化炭素が 0.1～0.2%、その他の揮発性成分が 0.04～0.2%検出された。

可食部処理（ ）では、処理 25 日後の放射能分布は、豆で 5～7% TAR、さやで 60.6～72.2%TAR であり、可食部での放射能として、ジノテフロンが 0.97～1.1mg/kg (67.4～79.1%TRR) PHP 等が 0.1mg/kg 以下検出された。

茎部注入処理（ ）では、処理 25 日後の放射能分布は、豆で 3～10% TAR、さやで 32～44% TAR であり、可食部での放射能として、ジノテフロンが 0.48～1.16mg/kg(68.6～73.6%TRR) PHP が 0.04～0.11mg/kg(6.1～7.1%TRR) UF 及び FNG 等が 0.06mg/kg 以下検出された。（参照 10）

## （7）イチゴ

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフロン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフロンをイチゴ(品種：トヨノカ)に、50  $\mu$ g ai を苗の葉面に塗布し、処理 8、20 及び 29 日後に検体を採取（葉面処理）20  $\mu$ g ai を結実期の未熟果実に塗布し、処理 8 及び 14 日後に検体を採取（可食部処理）して、イチゴにおける植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理 29 日後の放射能分布は、果実部で 0.7～1% TAR、処理葉で 84～86%TAR、その他の地上部で 1%TAR、根部で 0.04～0.1%TAR、土壌から 0.2～0.3%TAR であり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理 29 日後の処理葉での放射能として、ジノテフロンが 20.2～24.2 mg/kg(42.4～45.7%TRR) UF、BCDN、DN 及び MG 等が 4 mg/kg 以下検出された。

可食部処理では、処理 14 日後の果実部における放射能の回収率は、処理量の 95～98% であり、果実での放射能として、ジノテフロンが 1.1～1.7 mg/kg (89.0%TRR) UF 及び DN 等が 0.1 mg/kg 以下検出された。（参照 11）

## (8) かぶ

かぶ(品種:耐病ひかり)に、Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又はGu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを50 µg aiを4~5葉期の葉面に塗布し、処理10、14及び20日後に検体を採取(葉面処理)

Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの50 µg aiを2~3葉期のかぶ栽培土壌に土壌処理し、処理6、10、15及び30日後に検体を採取(土壌処理)し、かぶにおける植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理20日後の放射能分布は、主根部で2~3% TAR、処理葉で81~86%TAR、その他の地上部で1~2%TAR、細根部で0.1%TAR、土壌で0.3~0.4%TARであり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理20日後の処理葉での放射能として、ジノテフランが1.62~1.78 mg/kg (12.2~12.8%TRR) DNが3.22~3.36 mg/kg (23.1~25.3%TRR) PHP及びその抱合体、446-DO及びその抱合体並びにUFが1.3 mg/kg以下検出された。主根部で検出された放射能は0.02 mg/kgでその大部分がDNであった。

土壌処理では、処理30日後の放射能分布は、主根部で2% TAR、地上部で49% TAR、細根部で0.6% TAR、土壌で41% TARであり、主根部での放射能として、ジノテフランが0.02 mg/kg (35.8%TRR) DNが0.02 mg/kg (35.3%TRR) UFが0.005 mg/kg以下検出された。地上部の主要代謝物はDNで1.83 mg/kg (30.9%TRR)であった。(参照12)

## (9) みかん

みかん(品種:青島)に、Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン及びGu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの等量混合物の50 µg aiを苗の葉面に塗布し、処理14、37及び60日後に検体を採取(葉面処理)

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又はGu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの20 µg aiを結実期の未熟果実に塗布し、処理3、6、12及び16週後に検体を採取(可食部処理)し、みかんにおける植物体内運命試験が実施された。

葉面処理では、処理60日後の放射能分布は、処理葉で84% TAR、周辺葉で0.6% TARであり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理60日後における処理葉での放射能として、ジノテフランが10.6 mg/kg (23.4%TRR) MNG、抱合体を含むPHP、抱合体を含む446-DO及びDN等が4.2 mg/kg以下検出された。

可食部処理では、処理16週後の放射能分布は、果実部で87% TAR、周辺葉で3~5%TARであり、果実での放射能としては、ジノテフランが0.05~0.07 mg/kg (43.6~44.3%) MNG、抱合体を含む446-DO及びFNG等が0.01 mg/kg以下検出された。(参照13)

## (10) なし

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又はGu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを用いて結実期のなし(品種:幸水)に、20 µgを未熟果実に塗布し、処理4、9及び12週後に検体を採取し、なしにおける植物体内運命試験が実施された。

12 週後の放射能分布は、リンス部で 9～15% TAR、果皮で 34～36%TAR、果肉で 34～36%TAR であり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理 12 週後の果実部での放射能として、ジノテフランが 0.03 mg/kg (23.1～32.3%TRR)、抱合体を含む PHP が 0.01～0.02 mg/kg (12.0～13.9%TRR)、MNG が 0.01 mg/kg (10.3%TRR)、抱合体を含む 446-DO、UF 及び DN 等が 0.01 mg/kg 以下検出された。(参照 14)

### (11) りんご

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを用いてりんご（品種：王林）に、50 µg を葉面処理し、処理 20、30 及び 55 日後に検体を採取し、りんごにおける植物体内運命試験が実施された。

処理 55 日後の放射能分布は、処理葉で 83～84% TAR、周辺葉で 1%TAR であり、その他に二酸化炭素等の揮発性成分の生成が考えられた。処理 55 日後の処理葉での放射能として、ジノテフランが 11.1～21.0 mg/kg (27.9～30.8%TRR)、抱合体を含む PHP が 0.89～4.9 mg/kg (2.2～7.2%TRR)、抱合体を含む 446-DO が 7.7～9.4 mg/kg (11.4～23.6%TRR)、その他 UF が 2.4～3.6 mg/kg (3.6～9.0%TRR)、DN が 3.7～5.4 mg/kg (8.0～9.4%TRR) 検出された。(参照 15)

### (12) 代謝物 DN のきゅうり及びインゲンにおける植物体内運命試験

きゅうり（品種：サガミハンシロ）及びインゲン（品種：グリーントップ）に、50 µg の <sup>14</sup>C-DN を土壌、葉面、茎部注入（きゅうりのみ）し、処理 14～21 日後に検体を採取し、代謝物 DN の各植物体での植物体内運命試験が実施された。

各処理における放射能回収率は 82～95%であり、二酸化炭素などの揮発性成分が生成していると考えられた。検出物の多くは DN であり、土壌処理した DN はほとんど植物に吸収されず、また葉面塗布や茎部注入では DN は大半が処理部位にとどまった。代謝物については微量で同定には至らなかった。処理後 14 日のきゅうり及び 21 日のインゲンにおける DN の残存率は 89.5～96.9%TRR であり、DN の植物体での代謝は緩慢であるものと考えられた。(参照 16)

### (13) 代謝物 UF のきゅうりにおける植物体内運命試験

きゅうり（品種：サガミハンシロ）に、50 µg の <sup>14</sup>C-UF を葉面処理し、最長 22 日後に検体を採取し、代謝物 UF のきゅうりにおける植物体内運命試験が実施された。

放射能回収率は 78%であり、揮発性成分として二酸化炭素が投与量の 1%TAR 生成していた。残留放射能について分析したところ UF が 13.2 mg/kg (33.1%TRR)、UF-DM 及び UF の抱合体が 21.0 mg/kg (52%TRR) 検出された。

UF はメチル基の脱離などの代謝を受けるものと考えられた。(参照 17)

#### （14）代謝物 MNG のきゅうりにおける植物体内運命試験

きゅうり（品種：サガミハンシロ）に、50  $\mu$ g の  $^{14}\text{C}$ -MNG を栽培土壌に処理し、3 週後に検体を採取し、代謝物 MNG のきゅうりにおける植物体内運命試験が実施された。

放射能回収率は 89%であり、地上部で 29%TAR、根部で 0.3%TAR が検出された。残留放射能について分析したところ、代謝物として MNG が 0.98 mg/kg（65.5%TRR）、MG が 0.33 mg/kg（21.9%TRR）及び NG が 0.04 mg/kg（2.83%TRR）検出された。MNG はニトロ基及びメチル基の脱離などの代謝を受けるものと考えられた。（参照 18）

#### （15）代謝物 PHP 及び 446-DO のきゅうりにおける植物体内運命試験

インゲン（品種：グリーントップ）に、50  $\mu$ g の代謝物 PHP 及び 446-DO を葉面処理し、処理葉を 2 週後に採取し、PHP 及び 446-DO の代謝物の同定試験が実施された。

PHP の代謝物として 446-DO、DN-2-OH 及び BCDN が検出され、446-DO の代謝物として PHP、MG、DN-2-OH 及び BCDN が検出された。（参照 19）

### 3．土壌中運命試験

#### （1）好氣的土壌中運命試験

Tf- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン又は Gu- $^{14}\text{C}$ -ジノテフランを、2 種類の埴壌土（茨城、高知）及び軽埴土（大阪）に乾土当たり 1  $\mu$ g/g の濃度で混和し、好氣的条件下、25℃、インキュベーション時間は茨城畑土壌及び高知畑土壌については 16 週間、大阪畑土壌については 20 週間として、ジノテフランの土壌中運命試験が実施された。

ジノテフランの半減期は埴壌土で 5～6 週、軽埴土で 10～11 週であった。埴壌土及び軽埴土の抽出部において試験開始 16 週後に、ジノテフランが 12.3～39.8%TAR、NG が 8.8～17.1%TAR、MNG が 11.7～15.0%TAR、UF（FNG を含む）が 0.26～0.60%TAR 検出された。試験開始後 16 週の時点で、茨城土壌及び高知土壌で Tf- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン処理で 56～62%TAR、Gu- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン処理で 26～28%TAR の二酸化炭素が検出された。茨城土壌の 16 週後の抽出残渣は、18.6～22.6% TAR であり、50～60%TRR がフルボ酸、フミン酸及びフミンの土壌有機物に取り込まれた。これら抽出残渣放射能(RRR)の 33.4～49.2%が塩酸で抽出され、ジノテフランが 7.1～9.1%RRR、未同定分解物の UK1、NG、MNG 及び UF+FNG がそれぞれ 9.2～11.4、8.6、4.0、0.05%未満～1.5%RRR 検出された。

また、滅菌埴壌土を用いてジノテフランの分解試験を行ったところ、ほとんど分解が進まなかったため、ジノテフランの好氣的条件での土壌分解には微生物が関与しているものと考えられた。

ジノテフランの好氣的土壌における分解経路は、テトラヒドロフラン部とグアニジン部の開裂による MNG の生成、MNG のメチル基の脱離による NG の生成及びニトロイミノ基の加水分解による UF の生成等であり、これらの分解物はさらなる分解を受けて二酸化炭素まで分解されるものと考えられた。（参照 20）

## （２）好氣的湛水土壌中運命試験

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを、軽埴土（青森） 砂質壤土（千葉）及び壤土（三重）に乾土当たり 0.4 µg/g の濃度で混和し、好氣的条件下、25、16 週間インキュベーションし、ジノテフランの好氣的湛水土壌中運命試験が実施された。

ジノテフランの半減期は各土壌で 4～5 週間であった。全試験土壌において、抽出部の放射エネルギーは経時的に減少し、これに伴い抽出残渣中の放射エネルギーは増加して 16 週間後には 50.2～66.7%TAR が抽出残渣に移行した。

16 週間後の抽出放射能分布は、ジノテフランが 3.8～7.7%TAR、主要分解物として DN が 12.7～25.7%TAR、UF が 1.0～1.8%TAR、二酸化炭素が 6.2～11.1%TAR（三重土壌以外）検出された。16 週間後の軽埴土壌における抽出残渣中の放射能については 83.1～75.8%TAR が塩酸で抽出され、その大半が DN であった。腐植に約 20%TAR が取り込まれていた。

また、滅菌砂質壤土中ではジノテフランはほとんど分解が進まなかったため、ジノテフランの好氣的条件下での土壌分解には微生物が関与しているものと考えられる。

ジノテフランの好氣的湛水土壌における分解経路は、脱ニトロ化、ニトロイミノ基の加水分解等であり、これらの分解物はさらなる分解を受けて二酸化炭素まで分解されるものと考えられた。（参照 21）

## （３）嫌氣的土壌中運命試験

Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを、埴土（茨城）に乾土当たり 0.4 µg/g の濃度で混和し、26 週間インキュベーションして、ジノテフランの嫌氣的土壌における土壌中運命試験が行われた。

ジノテフランの半減期は約 9 週間であった。放射エネルギーは抽出残渣に徐々に移行し、26 週間後に 49.3%TAR が抽出残渣に移行した。二酸化炭素への分解は同時点で 1.2%TAR であった。また、26 週間後には、ジノテフランが 17.8%TAR、主要分解物として DN が 27.3%TAR、UF が 4.2%TAR 検出された。16 週間後の試料の抽出残渣に 43.2% TAR が存在し、その塩酸抽出液中に残渣中放射能の 81%が検出され、そのほとんどが DN であった。

ジノテフランの嫌氣的土壌における分解経路は、脱ニトロ化、ニトロイミノ基の加水分解等であるものと考えられた。（参照 22）

## （４）DN の土壌中運命試験

<sup>14</sup>C-DN の好氣的土壌及び好氣的湛水土壌での土壌中運命試験を行ったところ、半減期は好氣的土壌では 16 週間以上、好氣的湛水土壌では約 6 週間であった。各試料中の主要成分は DN であり、微量代謝物は同定できなかった。二酸化炭素は 16 週間後に好氣的土壌で 6%TAR、好氣的湛水土壌で 15%TAR 検出された。（参照 23）

## （５）UF の土壌中運命試験

<sup>14</sup>C-UF の好氣的土壌及び好氣的湛水土壌での土壌中運命試験を行ったところ、半減期

は好氣的土壤で約 7 日、好氣的湛水土壤では推定 16 週であった。好氣的湛水土壤を用いた土壤中運命試験では処理 15 週後に UF（処理量の 53.0%）及び UF-DM（2.1% TAR）が検出された。二酸化炭素は 4 週後に好氣的土壤で 71% TAR、処理 15 週後に好氣的湛水土壤で 26% TAR 検出された。（参照 24）

#### （ 6 ） MNG の土壤中運命試験

$^{14}\text{C}$ -MNG の好氣的土壤及び嫌氣的土壤での土壤中運命試験を行ったところ、半減期は好氣的土壤で約 11 週、嫌氣的土壤で約 3 週であった。各試料中の主要成分は好氣的土壤では処理 16 週後に NG（処理量の 16.8%）及び MNG（36.2% TAR）、嫌氣的土壤では処理 12 週後に、MNG（4.9% TAR）及び MG（0.08% TAR）であった。二酸化炭素は処理 16 週後に好氣的土壤で 27.4% TAR、処理 12 週後に嫌氣的土壤で 47.7% TAR 検出された。（参照 25）

#### （ 7 ） NG の土壤中運命試験

$^{14}\text{C}$ -NG の好氣的土壤及び嫌氣的土壤での土壤中運命試験を行ったところ、半減期は好氣的土壤で約 3 日、嫌氣的土壤で約 8 日であった。各試料中の主要成分として、好氣的土壤では処理 20 日後に NG（処理量の 0.7%）、嫌氣的土壤では処理 42 日後に NG（1.31% TAR）が認められた。二酸化炭素は、処理 20 日後に好氣的土壤で 74.1% TAR、処理 42 日後に嫌氣的土壤で 41.0% TAR 検出された。（参照 26）

#### （ 8 ） 土壤吸着試験

ジノテフラン（4 種類の国内土壤使用）、DN（7 種類の外国土壤使用）及び MNG（5 種類の外国土壤使用）の土壤吸着試験が行われた。有機炭素含量を基にした吸着係数  $K_{\text{F}^{\text{adsoc}}}$  はジノテフランで 23.3～33.6、DN で 58～2502 であった。MNG の  $K_{\text{F}^{\text{adsoc}}}$  は 8～31 であり、 $K_{\text{F}^{\text{desoc}}}$  が 12～28 であることから、MNG の吸着は可逆的であると考えられた。（参照 27～29）

#### （ 9 ） 土壤カラムリーチング試験

Tf- $^{14}\text{C}$ -ジノテフラン又は Gu- $^{14}\text{C}$ -ジノテフランを用いて、2 種類の埴壤土（茨城、高知）及び砂質壤土（千葉）に乾土当たり 5.9  $\mu\text{g/g}$  の濃度で添加した後、土壤層を 30 cm としてカラムに充填した土壤に灌水液（0.01 M 塩化カルシウム水溶液）を 4 日間連続流下して、ジノテフランの土壤カラムリーチング試験が実施された。

放射能回収率は 96～99% であり、57～77% TAR が溶出液から検出された。溶出液中及び土壤層中の主成分はジノテフランであり、各土壤で溶出液から処理量の 56～58、66～73、61～74% TAR が、土壤層中で 36、20～25、19～33% TAR が、溶出液及び中び土壤層中から、NG 及び MNG と推定される分解物が僅かに検出された。（参照 30）

### (10) エイジドリーチング試験

好気的条件下では、水分を最大溶水量の60%に調整し26で2週間インキュベーションした埴壤土(茨城)に、好氣的湛水条件下では、蒸留水を加え水深を4cmに調整した後、26で5週間インキュベーションした埴壤土(三重)に、Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又はGu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを、乾土当たり0.4mg/kgの濃度で混和した後、30日間インキュベーションした。これらのエイジングした土壌を当該土壌で作成した30cmの土壌カラムの上に載せて灌水液(0.01M塩化カルシウム水溶液)を4日間連続流下して、ジノテフランのエイジドリーチング試験が実施された。

好気的条件下でのインキュベーション後の放射能回収率は59~87%であり、ジノテフラン、MNG、NG及び抽出残渣が42~44、22、7及び11~14% TAR 検出された。好氣的湛水条件下でのインキュベーション後の放射能回収率は91~95%であり、ジノテフラン、DN及び抽出残渣が60~62、11~12及び19~20%TAR 検出された。

土壌カラムリーチングでの放射能回収率は、好気的条件下で54~87%で、溶出液から17~40% TAR が、好氣的湛水条件下の放射能回収率は94~107%で、溶出液から30~32% TAR が検出された。好気的条件下の溶出液中で、ジノテフランが15~17%TAR、MNG が18%TAR及びNGが6%TAR、土壌層中で、ジノテフランが21~26%TAR、MNGが6%TAR及びNGが3%TAR 検出された。好氣的湛水条件下の溶出液中で、ジノテフランが27~28%TAR、土壌層中で、ジノテフランが32~38%TAR、DNが15~19%TAR 検出された。なお、DNはその殆どが土壌層の0~5cm層で検出された。(参照31)

### (11) DN、UF 及び MNG の土壌カラムリーチング試験

<sup>14</sup>C-DN、<sup>14</sup>C-UF 及び <sup>14</sup>C-MNG を、埴壤土(茨城: DN、UF 及び MNG) 及び砂質埴壤土(千葉: DN) に乾土当たり各々4.6、4.7 及び 2.8 µg/g の濃度で添加した後、土壌層を30cmとしたカラムに充填した各々の土壌に灌水液(0.01M塩化カルシウム水溶液)を4日間連続流下して、分解物DN、UF 及び MNG の土壌カラムリーチング試験が実施された。

DN は処理量の98~100%が土壌層から検出され、その殆どが0~5cmから検出され、溶出液からは検出されなかった。土壌層中の主成分はDNで72~89%TAR 検出された。

UF は処理量の85%が溶出液中から検出され、溶出液中及び土壌層中の主成分はUFで、溶出液中から83%TAR、土壌層中から9%TAR が検出された。

MNG は処理量の76%が溶出液中から検出され、溶出液中及び土壌層中の主成分はMNGで、溶出液中から73%TAR、土壌層中から13%TAR が検出された。(参照32)

### (12) 鉛直浸透試験(水田圃場)

ジノテフランの1%粒剤を10a当たり4kgの割合(4µg/cm<sup>2</sup>×400g ai/ha)で水田(火山灰軽埴土: 茨城)に全面施用し、田面水、0~10cmの表層土及び深度1mまでの土を採土管で採取し、ジノテフラン粒剤の鉛直浸透試験が実施された。

田面水でのジノテフラン濃度は処理直後0.5µg/ml検出されたが、処理28日後で0.002

μg/ml に減少した。分解物 MNG、UF 及び DN は処理 14 日後にいずれも最高濃度に達し、0.002 μg/ml、0.006 μg/ml 及び 0.004 μg/ml 検出されたが、処理 28 日後には全ての分解物が検出限界以下となった。分解物 BCDN、DN-3-OH 及び MG は、いずれも試験期間中で検出限界以下であった。

土壌層 0~10cm でのジノテフラン濃度は処理 1 日後に 0.048 μg/g 検出され、処理 14 日後に最高値の 0.110 μg/g が検出され、処理 133 日後で 0.009 μg/g に減少した。分解物 DN は処理 49~161 日後まで 0.02 μg/g 検出され、10cm より下層においては、ともに検出限界以下であった。ジノテフランの推定半減期は 8 日、ジノテフラン及び分解物（MNG、UF 及び DN）を合算した場合の推定半減期は 9 日であった。分解物 BCDN、DN-3-OH 及び MG は、処理 7 日後の土壌中 0~30cm において検出限界以下であった。（参照 33）

### （13）鉛直浸透試験（畑圃場）

ジノテフラン粒剤または水溶剤を 600 g ai/ha で畑（火山灰壤土：茨城）に全面施用し、深度 1 m までの土及び土壌層 90~100 cm の土壌から遠心分離により土壌水を採取し、ジノテフランの鉛直浸透試験が実施された。

ジノテフランは土壌層 0~10 cm の処理直後において粒剤処理区及び水溶剤処理区でそれぞれ 1.12 及び 1.39 μg/g、処理 124 日後に 0.052 及び 0.024 μg/g と経時的に減少した。試験期間中の到達深度における最高濃度は粒剤処理区において土壌層 40~50 cm で 0.006 μg/g（124 日後）、水溶剤処理区において土壌層 30~40 cm で 0.007 μg/g（77 日後）検出された。

DN は全ての土壌層において検出限界以下であった。UF は処理直後の土壌層 0~10 cm で 0.02 μg/g 検出された。MNG は土壌層 0~10 cm の処理直後において粒剤処理区、水溶剤処理区でそれぞれ 0.06 及び 0.09 μg/g、処理 124 日後に 0.02 及び 0.01 μg/g と経時的に減少した。また、試験期間中での最高濃度は処理 33 日後に粒剤処理区において土壌層 10~20 cm で 0.09 μg/g、水溶剤処理区において土壌層 10~20 cm で 0.08 μg/g 検出された。NG は粒剤処理区及び水溶剤処理区ともに処理 77 日後に初めて検出され、粒剤処理区において土壌層 30~40 cm で 0.02 μg/g 検出された。0~100 cm の土壌層において、ジノテフランの半減期は粒剤処理区で 29 日、水溶剤処理区で 12 日であった。ジノテフラン及び分解物（MNG、UF、DN 及び NG）を合算した場合の半減期は、粒剤処理区で 58 日、水溶剤処理区で 13 日であった。

土壌層 90~100cm の土壌水中のジノテフラン及び分解物（MNG、UF 及び DN）は試験期間中において検出限界以下であった。（参照 34）

### （14）土壌表面光分解試験

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランを、乾土当たり 50 μg/g の濃度（600 g ai/ha に相当）で土壌表面に処理し、26、30 日間メタルハライド光照射 [8.10 W/m<sup>2</sup>（測定波長：315~400 nm）] し、ジノテフランの土壌表面光分解試験が実施された。

試験開始 30 日後に、ジノテフランは明条件で 64.6~69.8%TAR、暗条件で 93.0%TAR 検出された。推定半減期は、47~56 日、90%減衰期間は 172~202 日であった。分解物として、MNG、DN、BCDN、DN-3-OH、FNG、UF 及び PHP が検出されたが、いずれも 2%TAR 以下であった。揮発性成分は処理量の 14.5~16.0%であった。(参照 35)

#### 4. 加水分解試験

##### (1) 原体

ジノテフランを pH4.0(フタル酸緩衝液)、7.0(リン酸緩衝液)及び 9.0(ホウ酸緩衝液)の滅菌緩衝液に 5 mg/L となるように加え、遮光下、25 又は 40 で 60 日後までインキュベーションし、ジノテフランの水中加水分解試験が実施された。

25 における各 pH の緩衝液でジノテフランはほとんど分解されなかった。40 における pH9.0 の緩衝液でのみ若干の分解が認められ、処理 60 日後の残存率は 78.3%TAR であった。UF を測定したところ、処理 60 日後で 0.07mg/L 検出された。40 条件下での推定半減期は、pH4.0 及び 7.0 で 1 年以上、pH9.0 では 170 日であると考えられた。(参照 36)

##### (2) 原体(強アルカリ性を含む)

ジノテフランを pH4.0(クエン酸緩衝液)、7.0(リン酸緩衝液)、9.0(テトラホウ酸緩衝液)、11.0 及び 13.0(グリシン緩衝液)の滅菌緩衝液に 2.02mg/L となるように加え、遮光下、50 で 170 時間インキュベーションし、ジノテフランの強アルカリ性を含む水中加水分解試験が実施された。

pH4.0、7.0 及び 9.0 の各緩衝液では、ほとんど分解されず、推定半減期は 1 年以上と考えられた。pH11.0 の緩衝液での推定半減期は 45 時間、pH13.0 の緩衝液での推定半減期は 4.2 時間と考えられた。分解物として UF が検出された。(参照 37)

##### (3) DN リン酸塩

<sup>14</sup>C-DN リン酸塩を pH4.0(フタル酸緩衝液)、7.0(イミダゾール緩衝液)及び 9.0(ホウ酸緩衝液)の滅菌緩衝液に 0.9mg/L となるように加え、遮光下、50 で 5 日間インキュベーションし、DN リン酸塩の加水分解試験が実施された。

いずれの緩衝液でもほとんど分解されず、推定半減期は 1 年以上と考えられ、DN リン酸塩は加水分解に安定と考えられた。(参照 38)

##### (4) MNG

<sup>14</sup>C-MNG を pH9.0 の滅菌ホウ酸緩衝液に 0.4mg/L となるように加え、遮光下、50、63 及び 75 で 38 日間インキュベーションし、MNG の水中加水分解試験が実施された。

pH4.0、7.0 における推定半減期は 1 年以上、pH9.0 における室温相当に外挿された半減期は 1050 日と考えられた。(参照 39)

## (5) BCDN 及び DN-2-OH の水中安定性試験

BCDN 及び DN-2-OH の 100mg/L 緩衝溶液 (pH1、3、4、7 及び 9) を調製し、室温で BCDN は 11 日間、DN-2-OH は 4 日間放置し、BCDN 及び DN-2-OH の水中安定試験が実施された。

BCDN と DN-2-OH は pH3 ~ 9 の範囲において水溶液中で平衡関係にあり、pH1 ~ 4 の範囲で BCDN の異性体が生成し、特に pH1 で生成量が多かったことから、pH1 では BCDN、DN-2-OH 及び BCDN の異性体の 3 化合物間で平衡関係にあると考えられた。(参照 40)

## 5. 水中運命試験

### (1) 水中光分解試験(精製水及び河川水)

ジノテフロンを滅菌精製水及び河川水に濃度 5mg/L となるよう加え、25℃、7 日間、キセノン光照射[290 nm 以下の波長を除去、400 ~ 416 W/m<sup>2</sup>(測定波長: 300 ~ 800 nm)]し、ジノテフロンの水中光分解試験が実施された。

推定半減期は、滅菌精製水中、自然水中でいずれも 3.8 時間であった。暗所対照群ではほとんど分解は生じなかった。光分解生成物としては、DN、UF、MG、BCDN 及び DN-3-OH が検出された。(参照 41)

### (2) DN リン酸塩の水中光分解試験

<sup>14</sup>C-DN リン酸塩を pH5.0 (クエン酸緩衝液)、7.0 (リン酸緩衝液) 及び 9.0 (ホウ酸緩衝液) の各緩衝液に 0.95mg/L となるよう加え、25℃、15.1 日間、キセノン光を連続照射[290 nm 以下の波長を除去、28 W/m<sup>2</sup>(測定波長: 300 ~ 400 nm)]し、DN リン酸塩の水中光分解試験が実施された。

pH5.0 の緩衝液以外は、光照射に安定であった。pH5.0 における半減期は、23.8 日間であった。(参照 42)

### (3) MNG の水中光分解試験

<sup>14</sup>C-MNG を pH7.0 のリン酸緩衝液に 1.7mg/L となるよう加え、25℃、15.1 日間、キセノン光を連続照射[290 nm 以下の波長を除去、28 W/m<sup>2</sup>(測定波長: 300 ~ 400 nm)]し、MNG の水中光分解試験が実施された。

MNG は光照射下で経時的に減衰し、半減期は 1.2 日であった。処理 6.8 日後にグアニジンが 50.6% TAR、N-メチル尿素が 19.5% TAR 検出された。(参照 43)

## 6. その他の光分解試験

### (1) 薄膜光分解試験

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフロン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフロンを、アセトン溶液に 20 µg 加え、均一な薄膜を形成し、25℃、168 時間メタルハライド光照射[8.10 W/m<sup>2</sup>(測定波長: 315 ~ 400 nm)]し、ジノテフロンの薄膜光分解試験、25℃、96 時間メタルハライド光照

射 [ 13.1W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 315 ~ 400 nm ) ] し、揮発性成分の捕集試験がそれぞれ実施された。

薄膜光分解試験でのジノテフランの半減期は 40 ~ 43 時間であり、暗条件下ではほとんど減衰しなかった。主要分解物は、PHP、MG、DN-2-OH 及び BCDN であった。

揮発性成分の捕集試験では、96 時間後に二酸化炭素が 0.4 ~ 1%、その他の揮発性成分が 0.4 ~ 4% 検出された。

ジノテフランは、薄膜上で光により、ニトロ基の脱離、テトラヒドロフラン環の酸化、分子内環化、グアニジン部とテトラヒドロフラン部の開裂及びニトロイミノ基の加水分解等を受け、さらに二酸化炭素及びその他の揮発性成分にまで分解されと考えられた。

( 参照 44 )

## ( 2 ) 水中光分解試験 ( 田面水、蒸留水 )

Tf-<sup>14</sup>C-ジノテフラン又は Gu-<sup>14</sup>C-ジノテフランの 2mg/L 水溶液(濾過滅菌田面水)を用いて、25℃、15 日間メタルハライド光照射 [ 13.10W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 315 ~ 400 nm ) ] し、ジノテフランの田面水中光分解試験、25℃、16 時間キセノン光照射 [ 600W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 300 ~ 800 nm ) ] し、揮発性成分を捕集するためのトラップを設置した田面水中光分解試験 ( 揮発性成分捕集試験 )、25℃、16 日間メタルハライド光照射 [ 13.1W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 315 ~ 400 nm ) ] し、蒸留水中光分解試験がそれぞれ実施された。

ジノテフランの半減期はメタルハライド光照射した田面水中光分解試験で 5 日、キセノン光照射した田面水中光分解試験で 3 ~ 4 時間 ( 東京、春の屋外条件で 1 日 )、蒸留水中光分解試験で 5 ~ 6 日であった。主要分解物は、田面水中光分解試験で MG、DN-2-OH、DN-3-OH、BCDN 及び DN であり、蒸留水中光分解試験で MG、DN-2-OH 及び BCDN であった。

ジノテフランは、水中において光により、ニトロ基の脱離、テトラヒドロフラン環の酸化、分子内環化、グアニジン部とテトラヒドロフラン部の開裂、ニトロイミノ基の加水分解及びメチル基の脱離を受け、さらに二酸化炭素及びその他の揮発性成分にまで分解されと考えられた。( 参照 45 )

## ( 3 ) DN 光分解試験(薄膜、田面水)

<sup>14</sup>C-DN を用いて、DN の薄膜光分解試験及び水中光分解試験が実施された。

<sup>14</sup>C-DN 20 µg をメタノール水溶液としてシャーレ上に広げて均一な薄膜を形成し、25℃で 21 日間メタルハライド光照射 [ 8.10W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 315 ~ 400 nm ) ] し、DN の薄膜光分解試験が実施されたところ、DN の半減期は約 11 日であり、暗条件においては、ほとんど分解されなかった。主要分解物として DN-2-OH、DN-CO 及び MG が検出された。

<sup>14</sup>C-DN の 2 µg/mL 水溶液 ( 濾過滅菌田面水 ) を、25℃で 16 日間キセノンランプ光照射 [ 250 ~ 765W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 300 ~ 800 nm ) ] し、DN の水中光分解試験が実施さ

れたところ、DNの推定半減期は約47日(東京、春の屋外条件で300日以上)であった。主成分はDNであり、主要分解物としてMG及びDN-COが検出された。また、二酸化炭素及びその他の揮発性成分が僅かに検出された。

DNの光による主要分解経路は、テトラヒドロフラン環の酸化、分子内環化及びグアニジン部とテトラヒドロフラン部の開裂を受け、さらに二酸化炭素やその他の揮発性成分にまで分解されると考えられた。(参照46)

#### (4) UF 光分解試験(薄膜、田面水)

$^{14}\text{C}$ -UFを用いて、UFの薄膜光分解試験及び水中光分解試験が実施された。

$^{14}\text{C}$ -UF 20  $\mu\text{g}$  をアセトン溶液としてシャーレ上に広げて均一な薄膜を形成し、25℃で10日間メタルハライド光照射[8.10W/m<sup>2</sup>(測定波長:315~400 nm)]し、揮発性成分を捕集するためのトラップを接続してUFの薄膜光分解試験が実施されたところ、処理10日後に処理放射能の16%がトラップとの接続部から検出された。主成分がUFであったことから、UFは揮発性を有すると考えられる。UFの処理10日後の残存量は68%であった。主要分解物としてUF-CO及びUF-DMが検出された。また、二酸化炭素及びその他の揮発性成分が僅かに検出された。

$^{14}\text{C}$ -UFの2  $\mu\text{g/L}$  水溶液(濾過滅菌田面水)を、25℃で16日間キセノンランプ光照射[250~765W/m<sup>2</sup>(測定波長:300~800 nm)]し、UFの水中光分解試験が実施されたところ、UFの推定半減期は約18日(東京、春の屋外条件で100日以上)であった。主成分はUFであり、主要分解物としてUF-DM及びBCUFが検出された。また、二酸化炭素及びその他の揮発性成分の生成が僅かに検出された。

UFの光による主要分解経路は、テトラヒドロフラン環の酸化、分子内環化及びメチル基の脱離を受け、さらに二酸化炭素やその他の揮発性成分にまで分解されると考えられた。(参照47)

#### (5) MNG 光分解試験(薄膜、田面水)

$^{14}\text{C}$ -MNGを用いて、MNGの薄膜光分解試験及び水中光分解試験が実施された。

$^{14}\text{C}$ -MNGを、メタノール溶液として20  $\mu\text{g}$  をシャーレ上に広げて均一な薄膜を形成し、25℃で21日間メタルハライド光照射[8.10W/m<sup>2</sup>(測定波長:315~400 nm)]し、MNGの薄膜光分解試験が実施されたところ、MNGの推定半減期は約42日であった。主要分解物としてMGが検出された。また、二酸化炭素及びその他の揮発性成分が僅かに検出された。

$^{14}\text{C}$ -MNGの2mg/L水溶液(濾過滅菌田面水)を、25℃で24時間キセノンランプ光照射[250~765W/m<sup>2</sup>(測定波長:300~800 nm)]し、MNGの水中光分解試験が実施されたところ、MNGの推定半減期は約5時間(東京、春の屋外条件で約1日)であった。主要分解物としてMGが検出された。また、二酸化炭素及びその他の揮発性成分の生成が僅かに検出された。

MNGの光による主要分解経路は、ニトロ基及びメチル基の脱離を受け、さらに二酸

化炭素やその他の揮発性成分にまで分解されと考えられた。(参照 48)

## ( 6 ) PHP、446-DO、BCDN 及び DN-3-OH 光分解試験（蒸留水）

各化合物の 10mg/L 水溶液を用いて、PHP、446-DO、BCDN 及び DN-3-OH の水中光分解試験が実施された。

PHP 及び 446-DO 水溶液を、25℃ で 5 時間キセノン光照射 [ 250 ~ 765W/m<sup>2</sup> ( 測定波長 : 300 ~ 800 nm ) ] し、PHP 及び 446-DO の水中光分解試験が実施されたところ、PHP の主要分解物として DN-2-OH、BCUF 及び DN-CO が、446-DO の主要分解物として DN-2-OH が検出された。

BCDN 及び DN-3-OH 水溶液を、16 時間、中心波長 290 ~ 320nm の光を照射し、水中光分解試験が実施されたところ、BCDN の分解物として DN-CO が、DN-3-OH の分解物として MG が検出された。(参照 49)

## 7 . 土壌残留試験

火山灰壤土（茨城） 火山灰軽埴土（茨城） 沖積砂質埴土（高知）及び沖積埴壤土（高知）を用いてジノテフラン及び分解物（MNG、UF 及び DN）を分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）が水田状態及び畑状態で実施された。その結果は表 5 に示されている。ジノテフランの推定半減期は 2 ~ 24 日、分解物との合計で 2 ~ 120 日以上であった。(参照 50)

表 5 土壌残留試験成績（推定半減期）

| 試験                | 土壌     | 濃度                            | 推定半減期  |                            |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|
|                   |        |                               | ジノテフラン | ジノテフラン + 分解物 <sup>1)</sup> |
| 容器内試験<br>( 水田状態 ) | 火山灰壤土  | 純品<br>0.4 mg/kg               | 6 日    | 120 日以上                    |
|                   | 沖積砂質埴土 |                               | 5 日    | 120 日以上                    |
| 容器内試験<br>( 畑地状態 ) | 火山灰軽埴土 | 純品<br>0.6 mg/kg               | 7 日    | 45 日                       |
|                   | 沖積埴壤土  |                               | 7 日    | 44 日                       |
| 圃場試験<br>( 水田状態 )  | 火山灰壤土  | 1 <sup>G</sup> g ai/箱         | 2 日    | 2 日                        |
|                   | 沖積砂質埴土 | 400 <sup>G</sup> g ai/ha × 2  | 8 日    | 120 日以上                    |
| 圃場試験<br>( 畑地状態 )  | 火山灰軽埴土 | 1000 <sup>G</sup> g ai/ha     | 24 日   | 38 日                       |
|                   | 沖積埴壤土  | 600 <sup>SP</sup> g ai/ha × 2 | 14 日   | 22 日                       |

注) 1): 分解物合計 : MNG、UF 及び DN の合計

・ G : 粒剤、SP : 水溶剤

## 8 . 作物残留試験

水稻、果樹及び野菜を用いてジノテフラン及び代謝物 MNG、UF 及び DN を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。その結果は別紙 2 に示されており、ジノテフランの最大残留値は、200g ai/ha で 2 回散布し、最終散布後 7 日目に収穫した茶（荒茶）の 19.7

mg/kg であったが、14 日目、21 日目にはそれぞれ 5.10 mg/kg、1.64 mg/kg と減衰した。代謝物 MNG、UF 及び DN はそれぞれ最大 0.17mg/kg（ウメ）、0.32 mg/kg（ウメ）、0.22 mg/kg（稲わら）であった。（参照 51～53）

上記の作物残留試験に基づき、ジノテフラン（親化合物のみ）を暴露評価対象化合物として国内で登録されている農産物から摂取される推定摂取量が表 6 に示されている（別紙 4 参照）。なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用方法からジノテフランが最大の残留を示す使用条件で、今回申請された作物（かぶ類（根、葉）、チンゲンサイ、しゅんぎく、にんじん、ほうれん草、さやえんどう、あんず）を含む全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないと仮定の下に行った。

表 6 食品中より摂取されるジノテフランの推定摂取量

|                 | 国民平均<br>(体重:53.3 kg) | 小児(1～6 歳)<br>(体重:15.8 kg) | 妊婦<br>(体重:55.6 kg) | 高齢者(65 歳以上)<br>(体重:54.2 kg) |
|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 摂取量<br>(μg/人/日) | 475                  | 246                       | 408                | 538                         |

## 9．乳汁への移行試験

ホルスタイン種の泌乳牛（一群各 2 頭）を用いて、ジノテフラン（3、12 及び 48 mg/頭/日）の 7 日間連続経口投与による乳汁移行試験が実施された。

投与開始 1 日後から最終投与 7 日後まで、搾乳した試料からジノテフラン、代謝物 MNG、UF 及び DN は検出されなかった。（参照 54,55）

## 10．一般薬理試験

マウス、ラット、ウサギ、イヌ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表 7 に示されている。（参照 56）

表 7 一般薬理試験

| 試験の種類 | 動物種  | 動物数<br>匹/群 | 投与量<br>mg/kg 体重 | 無作用量<br>mg/kg 体重                   | 作用量<br>mg/kg 体重 | 結果の概要                                                                                                                                              |
|-------|------|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中枢神経  | 一般状態 | マウス        | 雌雄<br>5         | 0, 550, 850,<br>300, 2000,<br>2600 | 550<br><br>850  | 2600mg/kg 投与群で雌雄それぞれ 4 及び 3 例が死亡。2000mg/kg 以上投与群で振戦、痙攣、皮膚蒼白、腹這い姿勢、外刺激に対する反応低下、発声及び眼瞼下垂、1300mg/kg 以上投与群で立毛、体温低下、850mg/kg 以上投与群で自発運動低下及び群居性低下が認められた。 |

|        |                         |                                                |      |                                                                                   |                       |                        |                                                              |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | 自発運動量                   | マウス                                            | 雄 10 | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 1300                  | 2000                   | 2000 mg/kg 体重で顕著な自発運動量の低下が認められた。                             |
|        | 睡眠増強作用                  | マウス                                            | 雄 10 | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 2000                  | >2000                  | 影響なし                                                         |
|        | 痙攣誘発作用<br>(電撃痙攣)        | マウス                                            | 雄 10 | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 2000                  | >2000                  | 2000 mg/kg 体重投与群で死亡例の増加傾向が認められたが、有意ではなかった。                   |
|        | 鎮痛作用<br>(酢酸 writhing 法) | マウス                                            | 雄 10 | 0, 550, 850, 1300, 2000                                                           | 550                   | 850                    | 850 mg/kg 体重以上投与群で用量相関的に writhing 回数が減少した。                   |
|        | 体温                      | ラット                                            | 雄 6  | 0, 550, 850, 1300, 2000                                                           | 550                   | 850                    | 850 mg/kg 体重以上投与群で体温の低下が認められた。2000 mg/kg 体重投与群で2例死亡。         |
|        | 脳波                      | ウサギ                                            | 雄 3  | 0, 10, 30, 100                                                                    | 100                   | >100                   | 影響なし                                                         |
| 呼吸・循環器 | 呼吸数・血圧、血流量、心拍数、心電図      | イヌ                                             | 雄 3  | 0, 10, 30, 100                                                                    | 100                   | >100                   | 影響なし                                                         |
| 自律神経   | 瞳孔径                     | ラット                                            | 雄 5  | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 850                   | 1300                   | 1300 mg/kg 体重以上投与群で縮瞳が認められた。                                 |
|        | 摘出輸精管収縮<br>(マグヌス管)      | ラット<br><i>in vitro</i>                         | 雄 3  | 0, 10 <sup>-6</sup> , 10 <sup>-5</sup> , 10 <sup>-4</sup> , 10 <sup>-3</sup> g/ml | 10 <sup>-4</sup> g/ml | 10 <sup>-3</sup> g/ml  | 10 <sup>-3</sup> g/ml で電気刺激による筋収縮増大が認められた。                   |
| 消化器    | 炭末輸送能                   | マウス                                            | 雄 10 | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 2000                  | >2000                  | 影響なし                                                         |
|        | 摘出回腸<br>(マグヌス管)         | ラット<br><i>in vitro</i><br>(Krebs-Henseleite 液) | 雄 4  | 0, 10 <sup>-6</sup> , 10 <sup>-5</sup> , 10 <sup>-4</sup> , 10 <sup>-3</sup> g/ml | 10 <sup>-4</sup> g/ml | 10 <sup>-3</sup> g/ml  | 10 <sup>-3</sup> g/ml でヒスタミン収縮を抑制したが、アセチルコリン、バリウム収縮に対して影響なし。 |
| 骨格筋    | 懸垂時間<br>(Courvoisier 法) | マウス                                            | 雄 10 | 0, 850, 1300, 2000                                                                | 2000                  | >2000                  | 影響なし                                                         |
|        | 腓骨神経-前脛骨筋収縮<br>(麻酔下)    | ウサギ                                            | 雄 4  | 0, 10, 30, 100                                                                    | 100                   | >100                   | 影響なし                                                         |
|        | 摘出横隔膜神経筋収縮<br>(マグヌス管)   | ラット<br><i>in vitro</i><br>(Krebs-Henseleite 液) | 雄 4  | 0, 10 <sup>-6</sup> , 10 <sup>-5</sup> , 10 <sup>-4</sup> , 10 <sup>-3</sup> g/ml | 10 <sup>-3</sup> g/ml | >10 <sup>-3</sup> g/ml | 影響なし                                                         |

|     |                            |                                  |      |                                     |                |                 |                                                                     |
|-----|----------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 腎機能 | 腎機能                        | ラット                              | 雌雄 5 | 雌雄：0, 360, 550, 850, 1300<br>雄：2000 | 雄：550<br>雌：850 | 雄：850<br>雌：1300 | 1300 mg/kg 体重以上投与群で尿電解質濃度の上昇が認められた。雄の 850 mg/kg 体重以上投与群で尿量増加が認められた。 |
| 血液  | 血液凝固 PT、APTT、RBC、WBC、Ht、Hb | ウサギ                              | 雄 3  | 0, 10, 30, 100                      | 100            | >100            | 影響なし                                                                |
| 受容体 | 受容体結合試験                    | マウス、ラット、モルモット( <i>in vitro</i> ) | -    | 10 <sup>-4</sup> M                  | -              | -               | 末梢性ヒスタミン H1 受容体及び中枢性、筋肉性ニコチン N 受容体との結合を抑制、ヒスタミン H2 受容体との結合を増大した。    |

- ・ウサギを用いた脳波試験（静注）、腓骨神経-前脛骨筋収縮試験（静注）、摘出横隔膜神経筋収縮（*in vitro*）、摘出輸精管収縮（*in vitro*）、呼吸・循環器試験（静注）、摘出回腸試験（*in vitro*）、血液系試験（静注）、受容体試験（*in vitro*）以外は全て強制経口投与した。
- ・全試験で検体はジノテフラン原体を用いた。

## 11．急性毒性試験

### （1）急性毒性試験

ジノテフランの SD ラット及び ICR マウスを用いた急性経口毒性試験、SD ラットを用いた急性経皮毒性試験及び Wistar ラットを用いた急性吸入毒性試験が実施された。

各試験の結果は表 8 に示されている。（参照 57～60）

表 8 急性毒性試験結果概要

| 投与経路 | 動物種        | LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重) |       | 観察された症状                                                               |
|------|------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |            | 雄                           | 雌     |                                                                       |
| 経口   | SD ラット     | 2804                        | 2000  | 顔面赤色汚染、顔面痙攣、自発運動低下、よろめき歩行、円背位、虚脱、宿営、流涎過多、頻呼吸、呼吸困難、軟便、強直性もしくは間代性痙攣、振せん |
|      | ICR マウス    | 2450                        | 2275  | 体重減少、自発運動の低下、よろめき歩行、振せん、強直性痙攣、呼吸困難                                    |
| 経皮   | SD ラット     | >2000                       | >2000 | 軽度の体重減少、紅斑及び軽度の浮腫                                                     |
| 吸入   | Wistar ラット | LC <sub>50</sub> (mg/L)     |       | 症状なし                                                                  |
|      |            | >4.09                       | >4.09 |                                                                       |

代謝物 FNG、PHP、446-DO、UF、DN-3-OH、BCDN 及び DN について ICR マウスを用いた急性経口毒性試験が実施された。代謝物 NG、MNG、MG および混在物 A、B については、急性経口毒性に関する文献が報告されている。結果は表 9 に示されてい

る。（参照 61～75）

表 9 急性毒性試験結果概要

| 検体      | 動物種         | LD <sub>50</sub> ( mg/kg 体重 ) |       | 観察された症状        |
|---------|-------------|-------------------------------|-------|----------------|
|         |             | 雄                             | 雌     |                |
| FNG     | ICR マウス     | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| PHP     |             | 3560                          | 3190  | 自発運動減少、腹臥、呼吸停止 |
| 446-DO  |             | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| UF      |             | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| DN-3-OH |             | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| BCDN    |             | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| DN      |             | >5000                         | >5000 | 症状なし           |
| NG      | ラット         | 10200 <sup>*</sup>            |       | チアノーゼ          |
|         | マウス         | 3850 <sup>*</sup>             |       |                |
|         | モルモット       | 3120 <sup>*</sup>             |       |                |
| MNG     | Fischer ラット | >1000                         | >1000 | 症状なし           |
|         | ICR マウス     | >1538                         | >1538 | 体重減少           |
| MG      | マウス         | 680 <sup>*</sup>              |       | 痙攣             |
| 混在物 A   | ラット         | 1600 <sup>*</sup>             |       | 不明             |
| 混在物 B   | ラット         | 10200 <sup>*</sup>            |       | チアノーゼ          |
|         | マウス         | 3850 <sup>*</sup>             |       |                |
|         | モルモット       | 3120 <sup>*</sup>             |       |                |

\*：雌雄についての記載なし

## （２）急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた単回強制経口（原体：0、325、750 及び 1500 mg/kg 体重）投与し、15 日間観察して急性神経毒性試験が実施された。神経毒性に関連する所見は得られなかった。

本試験における無毒性量は、雌雄で 1500 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 76）

## 12．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性

NZW ウサギを用いた皮膚刺激性試験及び眼刺激性試験が実施された。皮膚及び眼に対する軽度の刺激性を認めた。（参照 77,78）

Hartley 雄モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施された。皮膚感作性は認められなかった。（参照 79）

### 13. 亜急性毒性試験

#### (1) 90日間亜急性毒性試験(ラット)

SD ラット(一群雌雄 10 匹)を用いた混餌(原体:0、500、5000、25000 及び 50000 ppm:平均検体摂取量は表 10 参照)投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 10 ラット 90 日間亜急性毒性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 500 ppm | 5000 ppm | 25000 ppm | 50000 ppm |
|-----------------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 34      | 336      | 1620      | 3160      |
|                       | 雌 | 38      | 384      | 1870      | 3620      |

各投与群で認められた主な所見は表 11 に示されている。

また 25000 ppm 以上投与群の雌雄で検体の忌避作用によると考えられる飼料の掻き出しが認められた。

本試験において、25000 ppm 投与群雄において体重増加抑制等が、5000 ppm 投与群雌において体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雄で 5000 ppm(336 mg/kg 体重/日)、雌で 500 ppm(38 mg/kg 体重/日)であると考えられた。(参照 80)

表 11 ラット 90 日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

| 投与群          | 雄                                                              | 雌                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 50000 ppm    | ・ APTT 減少、リンパ球数比の増加<br>・ Glu、TP、Glob 減少、BUN 増加<br>・ 副腎皮質球状帯空胞化 | ・ 副腎比重量 <sup>1</sup> の減少 |
| 25000 ppm 以上 | ・ 体重増加抑制、摂餌量減少                                                 | ・ 副腎皮質球状帯空胞化             |
| 5000 ppm 以上  | 5000 ppm 以下毒性所見なし                                              | ・ 体重増加抑制、摂餌量減少           |
| 500 ppm      |                                                                | 毒性所見なし                   |

#### (2) 90日間亜急性毒性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各 10 匹)を用いた混餌(原体:0、500、5000、25000 及び 50000 ppm:平均検体摂取量は表 12 参照)投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 12 マウス 90 日間亜急性毒性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 500 ppm | 5000 ppm | 25000 ppm | 50000 ppm |
|-----------------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 81      | 844      | 4440      | 10600     |
|                       | 雌 | 102     | 1060     | 5410      | 11600     |

各投与群で認められた主な所見は表 13 に示されている。

<sup>1</sup> 体重比重量のことを比重量という(以下同じ)

本試験の無毒性量は、25000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制等が認められたので、雌雄とも 25000ppm (雄: 4440 mg/kg 体重/日、雌: 5410 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 81)

表 13 マウス 90 日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

| 投与群          | 雄                                                                                           | 雌                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50000 ppm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・脳比重量増加</li> <li>・Alb 増加</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・脳比重量増加</li> <li>・尿 pH 低下</li> </ul> |
| 25000 ppm 以下 | 毒性所見なし                                                                                      | 毒性所見なし                                                                                       |

### (3) 90 日間亜急性毒性試験(イヌ)

ビーグル犬(一群雌雄各 10 匹)を用いた混餌(原体:0、1600、8000 及び 24000<sup>2</sup> ppm: 平均検体摂取量は表 14 参照)投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 14 イヌ 90 日間亜急性毒性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 1600 ppm | 8000 ppm | 24000 ppm |
|-----------------------|---|----------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 58       | 307      | 862       |
|                       | 雌 | 58       | 323      | 950       |

各投与群で認められた主な所見は表 15 に示されている。

高用量投与群では忌避作用による摂取量の著しい減少が見られたため検体濃度を変更した。40000 又は 30000 ppm (最終 24000 ppm 投与群) の投与期間中、3 例から黒色便が認められたが、これは著しい摂取量の減少に伴うストレス性の胃腸粘膜の出血に起因すると考えられた。

本試験において、24000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制等が、1600 ppm 投与群の雌で体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雄で 8000 ppm (307 mg/kg 体重/日)、雌で 1600 ppm (58 mg/kg 体重/日) 未満であると考えられた。(参照 82)

表 15 イヌ 90 日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

| 投与群                                  | 雄                   | 雌       |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| 24000 ppm<br>(開始時<br>40000~30000ppm) | ・体重増加抑制、摂餌量減少、飲水量低下 | ・摂餌量減少  |
| 8000ppm 以上                           | 8000ppm 以下毒性所見なし    | ・体重増加抑制 |

<sup>2</sup> 高用量群については、忌避作用による摂餌量の減少がみられたため、初日から 4 日までは 40000 ppm、5~11 日目は 30000 ppm、12 日目から 24000 ppm と投与濃度を変更した。

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| 1600ppm |  | ・体重増加抑制 |
|---------|--|---------|

**(4) 90日間亜急性神経毒性試験(ラット)**

SDラット(一群雌雄各10匹)を用いた混餌(原体:0、500、5000及び50000ppm:平均検体摂取量は表16参照)投与による90日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表16 ラット90日間亜急性神経毒性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 500 ppm | 5000 ppm | 50000 ppm |
|-----------------------|---|---------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 33      | 327      | 3410      |
|                       | 雌 | 40      | 400      | 3810      |

50000ppm投与群の雌雄で体重減少及び摂餌量低下が認められた。検体投与に関連する機能観察総合試験結果や病理所見は認められなかった。機能観察総合試験の結果や病理所見に検体投与の影響は認められなかった。

本試験において50000ppm投与群の雌雄で体重減少等が認められたので、無毒性量は雌雄で5000ppm(雄327mg/kg体重/日、雌400mg/kg体重/日)であると考えられた。神経毒性は認められなかった。(参照83)

**14. 慢性毒性試験及び発がん性試験****(1) 1年間慢性毒性試験(イヌ)**

ビーグル犬(一群雌雄各4匹)を用いた混餌(原体:0、640、3200及び16000ppm:平均検体摂取量は表17参照)投与による1年間の慢性毒性試験が実施された。

表17 イヌ1年間慢性毒性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 640 ppm | 3200 ppm | 16000 ppm |
|-----------------------|---|---------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 20      | 111      | 559       |
|                       | 雌 | 22      | 108      | 512       |

各投与群で認められた主な所見は表18に示されている。

本試験において、雄では毒性所見が認められず、3200ppm投与群の雌で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雄で16000ppm(559mg/kg体重/日)、雌で640ppm(22mg/kg体重/日)であると考えられた。(参照84)

表18 イヌ1年間慢性毒性試験で認められた毒性所見

| 投与群       | 雄      | 雌                      |
|-----------|--------|------------------------|
| 16000 ppm | 毒性所見なし | ・ Neu 減少<br>・ Alb、K 増加 |

|             |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
|             |  | ・尿 pH 上昇                |
| 3200 ppm 以上 |  | ・体重増加抑制<br>・卵巣及び子宮比重量増加 |
| 640 ppm     |  | 毒性所見なし                  |

## （２）２年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 90 匹：対照群及び 20000 ppm 投与群は雌雄各 100 匹）を用いた混餌（原体：0、60、200、2000 及び 20000 ppm：平均検体摂取量は表 19 参照）投与による 2 年間の慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 19 ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 60 ppm | 200 ppm | 2000 ppm | 20000 ppm |
|-----------------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 2.98   | 9.89    | 99.7     | 991       |
|                       | 雌 | 3.81   | 12.5    | 127      | 1330      |

各投与群で認められた主な所見は表 20 に示されている。

20000 ppm 投与群雄に腎盂拡張が見られたが、腎臓の鉍質沈着増加に関連した変化であると考えられ、ジノテフラン投与による変化である可能性は低いと考えられた。また同群雄に見られた前立腺の慢性活動性炎症については同系統の老齢ラットによく見られる自然発生病変である。本試験においてリンパ球系細胞浸潤あるいは化膿性炎症の前立腺も観察されており、これらを合計した発生頻度には有意な差異は認められないことから、この変化は検体投与によるものとは考えられなかった。

20000 ppm 投与群雌に見られた子宮腫瘍に対応すると考えられる子宮内膜間質ポリープについては、有意な増加は認められず背景データの範囲内であることから、検体投与との関連性はないと考えた。

全投与群雌に尿 pH 低下が見られたが、検体投与の影響と考えられなかった。

表 20 ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で認められた毒性所見（腫瘍性病変以外）

| 投与群         | 雄                                                                                                                                               | 雌                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20000 ppm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少</li> <li>・MCV、RBC、分葉核好中球数減少</li> <li>・Cre 増加</li> <li>・腎盂鉍質沈着、腎リンパ組織球系細胞浸潤、腎盂潰瘍</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少</li> <li>・MCH、MCHC 増加、Mon 減少</li> <li>・TP、Alb、Ca、K 減少</li> <li>・リンパ節肥大</li> <li>・下垂体赤色点/斑増加</li> </ul> |
| 2000 ppm 以下 | 毒性所見なし                                                                                                                                          | 毒性所見なし                                                                                                                                                      |

腫瘍性病変については、表 21 に示したとおり、雄では 20000 ppm 投与群で甲状腺 C

細胞腺腫増加が認められたが、腫瘍が増加する際に認められる C 細胞過形成病変の増加が見られなかったこと、C 細胞腺腫と C 細胞癌の合計が有意に増加していないことから、甲状腺 C 細胞腺腫が検体投与によるものとは考えられなかった。また雌についても C 細胞過形成が 60、200 及び 2000ppm 投与群で有意に増加したが、用量相関性が見られず、また C 細胞腺腫の発生数とも関連性が見られないことから、C 細胞過形成の発生増加は毒性所見と取らなかった。

また、20000 ppm 投与群の雌で肺に転移性癌が認められたが、その原発部位の内訳は、乳腺、胸腺、皮膚、甲状腺及び腎であり、特段の偏在は認められなかった。

表 21 甲状腺 C 細胞腺腫及び癌発生率

|               | 雄  |    |     |      |       | 雌   |     |      |      |       |
|---------------|----|----|-----|------|-------|-----|-----|------|------|-------|
| 投与量(ppm)      | 0  | 60 | 200 | 2000 | 20000 | 0   | 60  | 200  | 2000 | 20000 |
| 検査動物数         | 99 | 89 | 90  | 88   | 100   | 100 | 90  | 90   | 89   | 100   |
| C 細胞腺腫<br>所見数 | 8  | 12 | 10  | 12   | 17*   | 12  | 11  | 12   | 5    | 13    |
| C 細胞癌<br>所見数  | 1  | 0  | 0   | 0    | 0     | 0   | 0   | 1    | 1    | 1     |
| 合計            | 9  | 12 | 10  | 12   | 17    | 12  | 11  | 13   | 6    | 14    |
| C 細胞過形成       | 28 | 30 | 24  | 26   | 28    | 27  | 38* | 45** | 43** | 22    |

Fisher-Irwin の直接確率計算法、\*：p<0.05、\*\*：p<0.01

本試験において、20000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄で 2000 ppm（雄：100 mg/kg 体重/日、雌：127 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 85）

### （3）18 ヶ月間発がん性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 70 匹）を用いた混餌（原体：0、25、250、2500 及び 25000 ppm：平均検体摂取量は表 22 参照）投与による 18 ヶ月間の発がん性試験が実施された。

表 22 マウス 18 ヶ月間発がん性試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |   | 25 ppm | 250 ppm | 2500 ppm | 25000 ppm |
|-----------------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 3.35   | 34.1    | 345      | 3690      |
|                       | 雌 | 4.38   | 45.1    | 441      | 4730      |

各投与群で認められた主な所見は表 23 に示されている。

25000 ppm 投与群の雌で子宮腫瘍、腎盂拡張及び卵巣傍性のう胞増加が認められたが、腎盂拡張については腎及び尿路系に一時的な病変の増加は認められなかったことから、ジノテフラン投与による変化である可能性は低いと考えられた。卵巣におけるのう胞は

同系統の老齢マウスで頻繁に認められる変化である。また、病理組織学的検査により子宮の腫瘍性病変に差が観察されなかったことから、肉眼的に観察された子宮腫瘍については検体投与と関連性は認められなかった。

本試験において、25000 ppm 投与群の雌雄に体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄で 2500 ppm（雄：345 mg/kg 体重/日、雌：441 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 86）

表 23 マウス 18 ヶ月間発がん性試験で認められた毒性所見

| 投与群         | 雄                                                                                                                               | 雌                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25000 ppm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体重増加抑制</li> <li>・ 骨髓色素沈着</li> <li>・ 副腎皮質細胞肥大</li> <li>・ ハーダー腺リンパ形質細胞性細胞浸潤増加</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体重増加抑制</li> </ul> |
| 2500 ppm 以下 | 毒性所見なし                                                                                                                          | 毒性所見なし                                                     |

## 15．生殖発生毒性試験

### （１）２世代繁殖試験（ラット）

SD ラット〔一群雌雄各 30（P）、25（F<sub>1</sub>）匹〕を用いた混餌（原体：0、200、2000 及び 20000 ppm：平均検体摂取量は表 24 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 24 ラット 2 世代繁殖試験の平均検体摂取量

| 投与群                   |                   |   | 200 ppm | 2000 ppm | 20000 ppm |
|-----------------------|-------------------|---|---------|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | P 世代              | 雄 | 16.2    | 164      | 1690      |
|                       |                   | 雌 | 18.4    | 190      | 1840      |
|                       | F <sub>1</sub> 世代 | 雄 | 21.4    | 210      | 2170      |
|                       |                   | 雌 | 21.9    | 220      | 2230      |

親動物及び児動物における各投与群で認められた主な所見は、それぞれ表 25 に示されている。

親動物では、乳頭部の石灰化及び線維化並びに尿路上皮の剥離及び過形成、腎盂の出血が検体投与群で高頻度に観察された。

本試験において、親動物では 20000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制等が、児動物では 20000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は親動物及び児動物の雌雄で 2000 ppm（P 世代：雄 164 mg/kg 体重/日、雌 190 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 世代：雄 210 mg/kg 体重/日、雌 220 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖に対する影響は認められなかった。（参照 87）

表 25 ラット 2 世代繁殖試験で認められた毒性所見

|     | 投与群         | 親：P、児：F <sub>1</sub>              |                                     | 親：F <sub>1</sub> 、児：F <sub>2</sub> |                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     |             | 雄                                 | 雌                                   | 雄                                  | 雌                                  |
| 親動物 | 20000ppm    | ・体重増加抑制                           | ・体重増加抑制、摂餌量減少<br>・下垂体及び胸腺絶対重量、比重量減少 | ・体重増加抑制、摂餌量減少                      | ・体重増加抑制、摂餌量減少<br>・胸腺及び心臓絶対重量、比重量減少 |
|     | 2000 ppm 以下 | 毒性所見なし                            | 毒性所見なし                              | 毒性所見なし                             | 毒性所見なし                             |
| 児動物 | 20000ppm    | ・体重増加抑制<br>・胸腺絶対重量減少、脾絶対重量及び比重量減少 | ・体重増加抑制<br>・胸腺及び脾絶対重量減少             | ・体重増加抑制                            | ・体重増加抑制<br>・脾比重量減少                 |
|     | 2000 ppm 以下 | 毒性所見なし                            | 毒性所見なし                              | 毒性所見なし                             | 毒性所見なし                             |

## (2) 2 世代繁殖試験（追加：ラット）

泌尿器系への影響を検討するために、SD ラット（一群雌雄 10 匹）を用いて混餌（原体：0、2000 及び 20000 ppm：平均検体摂取量は表 26 参照）投与による 2 世代繁殖試験の追加試験が実施された。

表 26 ラット 2 世代繁殖試験（追加）の平均検体摂取量

| 投与群                   |                   |   | 2000 ppm | 20000 ppm |
|-----------------------|-------------------|---|----------|-----------|
| 検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | P 世代              | 雄 | 147      | 1390      |
|                       |                   | 雌 | 180      | 1690      |
|                       | F <sub>1</sub> 世代 | 雄 | 198      | 2040      |
|                       |                   | 雌 | 211      | 2180      |

親動物及び児動物における各投与群で認められた主な所見は、それぞれ表 27 に示されている。

泌尿器系に対して、検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、親動物では 20000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制等が、児動物では 20000 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制が認められたので、無毒性量は親動物及び児動物の雌雄で 2000 ppm（P 世代：雄 147mg/kg 体重/日、雌 180 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 世代：雄 198 mg/kg 体重/日、雌 211 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖に対する影響は認められなかった。（参照 88）

表 27 ラット 2 世代繁殖試験で認められた毒性所見

|     | 投与群      | 親：P、児：F <sub>1</sub> |               | 親：F <sub>1</sub> 、児：F <sub>2</sub> |               |
|-----|----------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|     |          | 雄                    | 雌             | 雄                                  | 雌             |
| 親動物 | 20000ppm | ・体重増加抑制、摂餌量減少        | ・体重増加抑制、摂餌量減少 | ・体重増加抑制、摂餌量減少                      | ・体重増加抑制、摂餌量減少 |
|     | 2000 ppm | 毒性所見なし               | 毒性所見なし        | 毒性所見なし                             | 毒性所見なし        |
| 児動物 | 20000ppm | ・体重増加抑制              | ・体重増加抑制       | ・体重増加抑制                            | ・体重増加抑制       |
|     | 2000 ppm | 毒性所見なし               | 毒性所見なし        | 毒性所見なし                             | 毒性所見なし        |

**（３）発生毒性試験（ラット）**

SD ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1000 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

母動物の 1000 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制、摂餌量低下及び飲水量増加が認められた。

胎児には投与の影響には認められなかった。

本試験の無毒性量は母動物で 300 mg/kg 体重/日、胎児で 1000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 89）

**（４）発生毒性試験（ウサギ）**

NZW ウサギ（一群雌 22 匹）の妊娠 6～18 日に強制経口（原体：0、52、125 及び 300 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

母動物の 300 mg/kg 体重/日投与群で自発運動低下、腹臥姿勢、浅速呼吸、鼻・耳介の潮紅、振戦、摂餌量低下及び飲水量減少が、125 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制、肝褐色化及び胃粘膜灰白色斑が認められた。

胎児には投与の影響は認められなかった。

本試験の無毒性量は母動物で 52 mg/kg 体重/日、胎児で 300 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 90）

**16．遺伝毒性試験**

ジノテフラン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター肺由来（CHL/IU）細胞を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験において、試験結果は全て陰性であった（表 28）。ジノテフランには遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 91～94）

表 28 遺伝毒性試験概要（原体）

| 試験              |                     | 対象                                                                                           | 投与量・処理濃度                                                                                           | 結果 |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>in vitro</i> | DNA 修復試験<br>(参照 92) | <i>B. subtilis</i> H17, M45 株                                                                | 1000 ~ 16000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)                                                  | 陰性 |
|                 | 復帰突然変異試験<br>(参照 93) | <i>S. typhimurium</i> TA98,<br>TA100, TA1535,TA1537<br>株,<br><i>E.coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株 | 1.2 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)<br>313 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9) | 陰性 |
|                 | 染色体異常試験<br>(参照 94)  | チャイニーズハムスター<br>肺由来細胞株(CHL/IU)                                                                | 500 ~ 2000 $\mu\text{g}/\text{ml}$                                                                 | 陰性 |
| <i>in vivo</i>  | 小核試験<br>(参照 95)     | BDF1 マウス<br>(一群雄 6 匹)                                                                        | 雄:0,270,540,1080<br>mg/kg<br>(強制 2 回経口投与)                                                          | 陰性 |

注) ±S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

ジノテフランの代謝物 NG、MNG、FNG、PHP、446-DO、UF、MG、DN-3-OH、BCDN 及び DN の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施され、結果は全て陰性であった（表 29）。（参照 95 ~ 104）

表 29 遺伝毒性試験結果概要（代謝物）

| 試験              |                           | 対象                                                                            | 処理濃度                                                                                                   | 結果 |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>in vitro</i> | 復帰突然変異試験<br>(参照 96 ~ 105) | <i>S. typhimurium</i><br>TA97,TA98,TA100,<br>TA102,TA1535,TA1537,<br>TA1538 株 | NG : 87.5 ~ 2800 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)                                                  | 陰性 |
|                 |                           | <i>S. typhimurium</i><br>TA98,TA100,TA1535,<br>TA1537,TA1538 株                | MNG : 1000 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)                                                 |    |
|                 |                           | <i>S. typhimurium</i><br>TA98,TA100,<br>TA1535,TA1537 株                       | FNG : 5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)                                                    |    |
|                 |                           | <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株                                              | PHP : 5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$<br>(+/-S9) |    |

|  |  |  |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 446-DO : 5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)     |  |
|  |  |  | UF : 0.305 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)     |  |
|  |  |  | MG : 5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)         |  |
|  |  |  | DN-3-OH :<br>5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9) |  |
|  |  |  | BCDN :<br>5 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)    |  |
|  |  |  | DN : 0.305 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)<br>156 ~ 5000 $\mu\text{g}/\text{7}^\circ\text{レ-ト}$<br>(+/-S9)     |  |

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

ジノテフランの混在物 2-MTI-446、FMPZ、FPZ、A、B の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。結果は、混在物 A を除き全て陰性であった。混在物 A の細菌 (TA100、TA102、TA97 及び TA98 株) を用いた復帰突然変異試験に関する文献が提出されており、S9mix の存在の有無にかかわらず TA98 及び TA100 株で陽性であったが、混在物 A は原体中 0.2%以下と微量であるため特に問題になるとは考えられなかった。

FPZ については、チャイニーズハムスター肺由来 (CHL/IU) 培養細胞を用いた染色体異常試験、ラットを用いた *in vivo/in vitro* 不定期 DNA 合成 (UDS) 試験及びマウスを用いた小核試験が実施され、染色体異常試験を除き、全て陰性であった。*in vitro* 染色体異常試験で陽性反応が認められたが、*in vivo* 小核試験が陰性であったので、生体において特に問題となるような遺伝毒性が発現するとは考えられなかった (表 30)。

(参照 105 ~ 112)

表 30 遺伝毒性試験結果概要(代謝物、原体混在物)

| 試験                                 | 対象                          | 処理濃度                                           | 結果 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----|
| <i>in vitro</i>                    | 復帰突然変異試験<br>(参照 106 ~ 110)  | 2-MTI-446 :<br>0.305 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9) | 陰性 |
|                                    |                             | 156 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9)                  |    |
|                                    |                             | FMPZ :<br>5 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9)          |    |
|                                    |                             | 156 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9)                  |    |
|                                    | 染色体異常試験<br>(参照 111)         | FPZ :<br>5 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9)           | 陽性 |
|                                    |                             | 156 ~ 5000 µg/プレート<br>(+/-S9)                  |    |
|                                    |                             | 混在物 A :<br>1000 ~ 50000 µg/プレート<br>(+/-S9)     |    |
| <i>in vitro/</i><br><i>in vivo</i> | 不定期 DNA<br>合成試験<br>(参照 112) | SD ラット(肝細胞)<br>(1 群雄 3 匹)                      | 陰性 |
|                                    |                             | FPZ :<br>0,2500,5000mg/kg<br>(単回強制経口投与)        |    |
| <i>in vivo</i>                     | 小核試験<br>(参照 113)            | ddY 系マウス<br>(1 群雄 6 匹)                         | 陰性 |

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

## ・総合評価

参照に挙げた資料を用いて「ジノテフラン」の食品健康影響評価を実施した。

ラットを用いた動物体内運命試験が実施され、血漿中濃度は単回投与の低用量投与群で 0.3 ~ 0.6 時間後、高用量投与群で 2 時間後に最高に達し、 $C_{max}$  はそれぞれ 41 ~ 46  $\mu\text{g/g}$  及び 471 ~ 566  $\mu\text{g/g}$  であり、 $T_{1/2}$  は 4 ~ 8 時間及び 14 ~ 15 時間であった。主な排泄経路は尿中であつた。組織内濃度は、胃、腎臓、腸管及び膀胱で高かった。尿中に排泄された放射能の大部分はジノテフランであり、主要代謝物は 446-CO、446-DO 及び PHP-Ac であつた。糞中からはジノテフランが僅かに検出され、代謝物として MNG、446-DO-Ac などが僅かに検出された。主要代謝経路は、脱ニトロ化、テトラヒドロフラン環の酸化、分子内環化、加水分解、グアニジン部及びテトラヒドロフラン環の開裂、脱メチル化又はニトロ基の還元と考えられた。

水稻、ナス、キャベツ、きゅうり、インゲン、イチゴ、かぶ、みかん、なし及びりんごを用いた植物体内運命試験が実施され、ジノテフランを葉面処理した場合、水稻で移行が認められたが、その他の植物では処理葉以外への移行は少なく、可食部への移行は僅かであった。土壌処理した場合、植物体に容易に吸収され、地上部全体に移行したが、果実部及び根部での分布は僅かであった。結実期の果樹において未成熟果実に処理した場合、処理放射能のほとんどが処理部にとどまり、果実内部への移行が認められたが、濃度は低かった。主要代謝物として、UF、DN 及び MNG が認められ、その他、PHP、446-DO、MG、DN-2-OH、DN-3-OH 及び BCDN が検出された。主要代謝物である UF、MNG 及び DN の代謝試験の結果から、UF 及び MNG は植物体で代謝され減衰し、UF については抱合体を生成した。DN は葉面及び植物体中で代謝を受けたが、その減衰は緩慢であり、また土壌から植物体には吸収されなかった。

土壌中運命試験が実施され、土壌中半減期はジノテフランで好氣的条件下の埴壌土で 5 ~ 6 週間、軽埴土で 10 ~ 11 週間、好氣的湛水条件下で 4 ~ 5 週間、嫌氣的条件下で 9 週間であり、代謝物 DN は好氣的条件下で 16 週間以上、好氣的湛水条件下で 6 週間、代謝物 UF は好氣的条件下で 7 日、好氣的湛水条件下で 16 週間、代謝物 MNG は好氣的条件下で 11 週間、嫌氣的土壌で 3 週間、代謝物 NG は好氣的土壌で 3 日、嫌氣的土壌で 8 日であった。土壌中移行試験が実施されたところ、ジノテフラン及び代謝物 NG、MNG 及び UF は水で溶脱されやすく、下方への移行性が認められたが、DN では認められなかった。鉛直浸透移行試験が実施されたところ、ジノテフランの到達深度は、畑圃場で 30 ~ 50cm、水田圃場で 10cm 以下であり、ジノテフラン及び代謝物を合算した半減期は、畑圃場で 13 ~ 58 日、水田圃場で 9 日であった。

水中加水分解試験が実施され、ジノテフランは pH9 では 40 で、pH11 及び 13 では 50 で分解が認められ半減期はそれぞれ 170 日、45 及び 4.2 時間であった。また、代謝物 MNG の pH9 における室温相当に外挿された半減期は 1050 日であった。

水中光分解試験が実施され、ジノテフランは速やかに分解され自然水での半減期は 3.8 時間であった。また、代謝物 DN 及び MNG の水中光分解試験での半減期は、それぞれ 23.8 時間 (pH5) 及び 1.2 日 (pH7) であった。その他の光分解試験として薄膜及び田面水中光分解試験が実施されたところ、田面水中でのジノテフラン、代謝物 DN、UF 及び MNG の半減期は東京の春の屋外条件でそれぞれ 1 日、300 日以上、100 日以上及び 1 日であり、ジノテフラン及び代謝物はそれぞれ二酸化炭素及びその他の揮発性成分にまで分解された。

稲、果樹及び野菜を用いてジノテフラン及び代謝物 MNG、UF、DN を分析対象化合物とした作物残留試験が実施され、ジノテフランの最大残留値は、200 g ai/ha で 2 回散布し、最終散布後 7 日目に収穫した茶（荒茶）の 19.7 mg/kg であったが、14 日目、21 日目にはそれ

2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ジノテフラン評価書（案）たたき台  
ぞれ 5.10、1.64 mg/kg と減衰した。代謝物 MNG、UF 及び DN は多くの作物ではほとんど  
検出限界以下か、0.12 mg/kg 体重以下（稲わら及びうめを除く）であった。

ホルスタイン種の泌乳牛を用いて、7 日間連続経口投与による乳汁試験が実施されたところ、  
乳汁からジノテフラン、代謝物 MNG、UF 及び DN は検出されなかった。

火山灰壌土、沖積土を用いてジノテフラン及び代謝物（MNG、UF 及び DN）を分析対象  
化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）を水田状態及び畑状態で実施したところ、ジ  
ノテフランの推定半減期は 2～24 日、ジノテフランと代謝物の含量としては 2～120 日以上  
であった。

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をジノテフラン（親化合物のみ）と設定  
した。

本剤の急性経口 LD<sub>50</sub> はラット雄で 2804 mg/kg 体重、雌で 2000 mg/kg 体重、マウス雄で  
2450 mg/kg 体重、雌で 2275 mg/kg 体重、経皮 LD<sub>50</sub> は、ラットの雌雄で 2000 mg/kg 体重超、  
吸入 LC<sub>50</sub> はラットの雌雄で 4.09mg/L 超であった。

亜急性毒性試験で得られた無毒性量は、ラットで 38 mg/kg 体重/日、マウスで 4440 mg/kg  
体重/日、イヌで 58 mg/kg 体重/日未満であった。イヌを用いた亜急性毒性試験で無毒性量が  
得られていないが、慢性毒性試験で 22 mg/kg 体重/日の無毒性量が得られていることから、  
特に再試験の必要はないと考えた。

慢性毒性及び発がん性試験で得られた無毒性量は、ラットで 100 mg/kg 体重/日、マウスで  
345 mg/kg 体重/日、イヌで 22 mg/kg 体重/日であると考えられた。発がん性は認められな  
かった。

繁殖試験で得られた無毒性量は、ラットで 147 mg/kg 体重/日であった。繁殖に対する影響  
は認められなかった。

催奇形性試験で得られた無毒性量は、ラットの母動物で 300 mg/kg 体重/日、胎児で 1000  
mg/kg 体重/日、ウサギの母動物で 52 mg/kg 体重/日、胎児で 300 mg/kg 体重/日であった。  
催奇形性は認められなかった。

遺伝毒性試験は、ジノテフラン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試  
験、チャイニーズハムスター培養細胞を用いた染色体異常試験、マウスを用いた小核試験が  
行われており、いずれも陰性であった。遺伝毒性は認められなかった。

代謝物（NG、MNG、FNG、PHP、446-DO、UF、MG、DN-3-OH、BCDN 及び DN）  
の細菌を用いた復帰突然変異試験において、試験結果は陰性であった。遺伝毒性は認められ  
なかった。

ジノテフランの混在物 2-MTI-446、FMPZ、B の細菌を用いた復帰突然変異試験は、全て  
陰性であった。混在物 A の細菌（*S.typhimurium* TA100、TA102、TA97 及び TA98 株）  
を用いた復帰突然変異試験に関する文献が提出されており、S9mix の存在の有無にかかわら  
ず TA98 及び TA100 株で陽性であったが、混在物 A は原体中 0.2%以下と微量であるため特  
に問題になるとは考えられなかった。

また、混在物 FPZ については、細菌を用いた復帰突然変異試験は陰性で、チャイニーズハ  
ムスター培養細胞を用いた染色体異常試験、マウスを用いた小核試験及びラットを用いた *in*  
*vivo/in vitro* 不定期 DNA 合成試験が実施され、染色体異常試験を除き、全て陰性であった。  
*in vitro* 染色体異常試験で陽性反応が認められたが、*in vivo* 小核試験が陰性であったことか  
ら生体において特に問題となるような毒性が発現するとは考えられなかった。

ウサギの発生毒性試験において認められた神経毒性症状と疑われる所見については、一般薬理試験において動物の中樞神経抑制作用と自律神経興奮作用が示唆されており、これらの結果と矛盾しないと考えられた。しかし動物代謝試験の結果から、ジノテフランが速やかに代謝を受けて排泄されることが示されており、蓄積効果による毒性症状の持続はないと推察された。また、認められた神経毒性を示唆する所見は、いずれも ADI 設定根拠の無毒性量よりも遥かに高用量でしか観察されなかった。

各試験における無毒性量は表 31 に示されている。なお、イヌの 90 日間亜急性毒性試験において雌で 58 mg/kg 体重/日未満と無毒性量が設定できなかったが、より長期のイヌの慢性毒性試験の雌の無毒性量が 22 mg/kg 体重/日と求められており、この値を ADI 設定の根拠に採用することは妥当であると判断した。

表 31 各試験における無毒性量及び最小毒性量

| 動物種 | 試験                          | 無毒性量<br>(mg/kg 体重/日)                                                           | 最小毒性量<br>(mg/kg 体重/日)                                                              | 備考 <sup>3</sup>                                         |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ラット | 90 日間亜急性<br>毒性試験            | 雄：336<br>雌：38                                                                  | 雄：1623<br>雌：384                                                                    | 雄：体重増加抑制等<br>雌：体重増加抑制、摂餌量減少                             |
|     | 90 日間亜急性<br>神経毒性試験          | 雄：327<br>雌：400                                                                 | 雄：3410<br>雌：3810                                                                   | 雌雄：体重減少、摂餌量減少<br>(神経毒性に関する影響なし)                         |
|     | 2 年間慢性毒性<br>/発がん性併合<br>毒性試験 | 雄：100<br>雌：127                                                                 | 雄：991<br>雌：1330                                                                    | 雌雄：体重増加抑制等<br>(発がん性は認められない)                             |
|     | 2 世代繁殖試験                    | 親動物及び児動物<br>P 雄：164<br>P 雌：190<br>F <sub>1</sub> 雄：210<br>F <sub>1</sub> 雌：220 | 親動物及び児動物<br>P 雄：1690<br>P 雌：1840<br>F <sub>1</sub> 雄：2170<br>F <sub>1</sub> 雌：2230 | 親動物<br>雌雄：体重増加抑制等<br>児動物<br>雌雄：体重増加抑制等<br>(繁殖毒性は認められない) |
|     | 2 世代繁殖試験<br>(追加)            | 親動物及び児動物<br>P 雄：147<br>P 雌：180<br>F <sub>1</sub> 雄：198<br>F <sub>1</sub> 雌：211 | 親動物及び児動物<br>P 雄：1390<br>P 雌：1690<br>F <sub>1</sub> 雄：2040<br>F <sub>1</sub> 雌：2180 | 親動物<br>雌雄：体重増加抑制等<br>児動物<br>雌雄：体重増加抑制<br>(繁殖毒性は認められない)  |
|     | 発生毒性試験                      | 母動物：300<br>胎児：1000                                                             | 母動物：1000<br>胎児：-                                                                   | 母動物：体重増加抑制等<br>児動物：影響なし<br>(催奇形性は認められない)                |
| マウス | 90 日間亜急性<br>毒性試験            | 雄：4440<br>雌：5410                                                               | 雄：10600<br>雌：11600                                                                 | 雌雄：体重増加抑制等                                              |
|     | 18 ヶ月間<br>発がん性試験            | 雄：345<br>雌：441                                                                 | 雄：3690<br>雌：4730                                                                   | 雌雄：体重増加抑制等<br>(発がん性は認められない)                             |
| ウサギ | 発生毒性試験                      | 母動物：52<br>胎児：300                                                               | 母動物：125<br>胎児：-                                                                    | 母動物：体重増加抑制等<br>胎児：影響なし<br>(催奇形性は認められない)                 |
| イヌ  | 90 日間亜急性<br>毒性試験            | 雄：307<br>雌：-                                                                   | 雄：862<br>雌：58                                                                      | 雄：体重増加抑制等<br>雌：体重増加抑制                                   |
|     | 1 年間慢性毒性<br>試験              | 雄：559<br>雌：22                                                                  | 雄：-<br>雌：108                                                                       | 雌：体重増加抑制等                                               |

- : 無毒性量または最小毒性量が設定できなかった

食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験の無毒性量の最小値がイヌを用いた 1 年間慢性毒性試験の 22 mg/kg 体重/日であったので、これを根拠として安全係数 100 で除した 0.22 を一日摂取許容量 (ADI) と設定した。

<sup>3</sup> 備考に最小毒性量で認められた所見の概要を示す。

ADI 0.22 mg/kg 体重/日

|              |               |
|--------------|---------------|
| （ADI 設定根拠資料） | 慢性毒性試験        |
| （動物種）        | イヌ            |
| （期間）         | 1 年間          |
| （投与方法）       | 混餌投与          |
| （無毒性量）       | 22 mg/kg 体重/日 |
| （安全係数）       | 100           |

## &lt;別紙1:代謝物/分解物等略称&gt;

## 代謝物

| 略称               | 化学名                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 446-CO           | 1-methyl-2-nitro-3-(2-oxotetrahydro-3-furylmethyl)guanidine                                                                                                          |
| 446-DO           | 1-[4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)butyl]-3-methyl-2-nitroguanidine                                                                                                       |
| 446-DO-Ac        | 1-[4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)butyl]-3-methyl-2-nitroguanidine acetyl conjugate                                                                                      |
| 446-DO-gul       | 1-[4-( $\beta$ -D-glucosyloxy)-2-(hydroxymethyl)butyl]-3-methyl-2-nitro-guanidine<br>1-[2-( $\beta$ -D-glucosyloxymethyl)-4-hydroxybutyl]-3-methyl-2-nitro-guanidine |
| 446-OH<br>+COOH  | 3-hydroxymethyl-4-(3-methyl-2-nitroguanidine)butyric acid<br>2-(2-hydroxyethyl)-3-(3-methyl-2-nitroguanidino)propionic acid                                          |
| BCDN             | 3-(methylamino)-9-oxa-2,4-diazabicyclo[4,3,0]non-3-ene                                                                                                               |
| DCM              | methylene dichloride                                                                                                                                                 |
| DN               | 1-methyl-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine                                                                                                                       |
| DN-2-OH          | 1-(2-hydroxytetrahydro-3-furylmethyl)-3-methylguanidine                                                                                                              |
| DN-3-OH          | 1-(3-hydroxytetrahydro-3-furylmethyl)-3-methylguanidine                                                                                                              |
| EtOAc            | acetic acid ethyl ester                                                                                                                                              |
| FNG <sup>*</sup> | 2-nitro-1-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine                                                                                                                        |
| MG               | 1-methylguanidine                                                                                                                                                    |
| MNG              | 1-methyl-2-nitroguanidine                                                                                                                                            |
| NG               | nitroguanidine                                                                                                                                                       |
| PHP              | 6-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-1,3-diazinane-2-ylidene- <i>N</i> -nitroamine                                                                                  |
| PHP-Ac           | 6-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-1,3-diazinane-2-ylidene- <i>N</i> -nitroamine acetyl conjugate                                                                 |
| PHP-gul          | 6-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-1,3-diazinane-2-ylidene- <i>N</i> -nitroamine <i>S</i> -glucose conjugate                                                      |
| UF               | 1-methyl-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)urea                                                                                                                            |
| UF-DM            | 1-(tetrahydro-3-furylmethyl)urea                                                                                                                                     |
| UF-gul           | 1-methyl-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)urea <i>S</i> -glucose conjugate                                                                                                |

## 原体混在物

| 略称        | 化学名 |
|-----------|-----|
| 2-MTI-446 |     |
| FMPZ      |     |
| FPZ       |     |

## &lt;別紙2:検査値等略称&gt;

| 略称               | 名称               |
|------------------|------------------|
| ai               | 有効成分量            |
| Alb              | アルブミン            |
| APTT             | 活性化部分トロンボプラスチン時間 |
| BUN              | 血液尿素窒素           |
| Ca               | カルシウム            |
| C <sub>max</sub> | 最高濃度             |
| Cre              | クレアチン            |
| Glob             | グロブリン            |
| Glu              | グルコース(血糖)        |
| Hb               | ヘモグロビン(血色素量)     |
| Ht               | ヘマトクリット値         |
| K                | カリウム             |
| LC <sub>50</sub> | 半数致死濃度           |
| LD <sub>50</sub> | 半数致死量            |
| MCH              | 平均赤血球血色素量        |
| MCHC             | 平均赤血球血色素濃度       |
| MCV              | 平均赤血球容積          |
| Mon              | 単球数              |
| Neu              | 好中球数             |
| PHI              | 最終使用から収穫までの日数    |
| PT               | プロトロンビン時間        |
| RBC              | 赤血球数             |
| RRR              | 抽出残渣放射能          |
| T <sub>1/2</sub> | 半減期              |
| TAR              | 総処理放射能           |
| T <sub>max</sub> | 最高濃度到達時間         |
| TP               | 総蛋白質             |
| TRR              | 総残留放射能           |
| WBC              | 白血球数             |

2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾈﾗﾙ評価書(案)たたき台

<別紙3:作物残留試験成績>

| 作物名<br>(部位)<br>実施年       | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)                                                             | 回数<br>(回)      | PHI<br>(日) | 残留値 (mg/kg) |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |               |                                                                              |                |            | ジノテフラン      |       | MNG   |       | UF    |       | DN    |       |
|                          |               |                                                                              |                |            | 最高値         | 平均値   | 最高値   | 平均値   | 最高値   | 平均値   | 最高値   | 平均値   |
| 水稻<br>(玄米)<br>1998年      | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>D</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 0.134       | 0.096 | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.099       | 0.089 | <0.01 | <0.01 | 0.03  | 0.03  | 0.01  | 0.01  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.102       | 0.072 | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |
| 水稻<br>(玄米)<br>1999年      | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>400 <sup>G</sup> × 1<br>150 <sup>D</sup> × 2         | 4              | 7          | 0.128       | 0.084 | <0.01 | <0.01 | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.116       | 0.062 | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.068       | 0.051 | <0.01 | <0.01 | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |
| 水稻<br>(玄米)<br>2001年      | 2             | 1g a.i./箱 <sup>G</sup><br>400 <sup>G</sup> × 3                               | 4              | 7          | 0.02        | 0.01  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.05        | 0.03  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.04        | 0.03  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 水稻<br>(玄米)<br>2001年      | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>SP</sup> × 3                                | 4              | 7          | 0.29        | 0.26  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.51        | 0.44  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.45        | 0.42  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.32        | 0.20  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(玄米)<br>2002年      | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>L</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 0.24        | 0.20  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.25        | 0.23  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 19-21      | 0.38        | 0.33  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.23        | 0.13  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(玄米)<br>2002-2003年 | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>100 <sup>L</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 0.28        | 0.22  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.40        | 0.38  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.40        | 0.34  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.16        | 0.13  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(玄米)<br>2004年      | 4             | 6 g ai/箱 <sup>G</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>150-200 <sup>SP</sup> × 3 | 5 <sup>a</sup> | 7          | 0.95        | 0.52  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 21         | 0.75        | 0.44  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 28         | 0.42        | 0.23  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              |                |            |             |       |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(玄米)<br>2004年      | 4             | 6 g ai/箱 <sup>G</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>100 <sup>SP</sup> × 3     | 5 <sup>a</sup> | 7          | 0.28        | 0.22  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 21         | 0.61        | 0.26  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 28         | 0.50        | 0.17  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              |                |            |             |       |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(稲わら)<br>1998年     | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>D</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 0.30        | 0.21  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.13  | 0.09  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.13        | 0.09  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.15  | 0.08  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.06        | 0.05  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.15  | 0.09  |
| 水稻<br>(稲わら)<br>1999年     | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>400 <sup>G</sup> × 1<br>150 <sup>D</sup> × 2         | 4              | 7          | 1.11        | 0.74  | <0.05 | <0.05 | 0.06  | 0.05  | 0.22  | 0.12  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 1.08        | 0.57  | <0.05 | <0.05 | 0.08  | 0.06  | 0.13  | 0.12  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.32        | 0.15  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.17  | 0.10  |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2001年     | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>400 <sup>G</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 0.98        | 0.59  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05  | <0.05 | <0.05 |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.36        | 0.21  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05  |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.28        | 0.15  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05  |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2001年     | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>SP</sup> × 3                                | 4              | 7          | 0.84        | 0.53  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.38        | 0.24  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.25        | 0.15  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.12        | 0.10  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2002年     | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>150 <sup>L</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 1.55        | 0.99  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.54        | 0.42  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 19-21      | 0.21        | 0.15  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.06        | 0.05  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2002-2003 | 2             | 1g ai/箱 <sup>G</sup><br>100 <sup>L</sup> × 3                                 | 4              | 7          | 3.10        | 1.75  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 14         | 0.47        | 0.38  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 21         | 0.52        | 0.36  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 4              | 28         | 0.20        | 0.14  |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2004年     | 4             | 6 g ai/箱 <sup>G</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>150-200 <sup>SP</sup> × 3 | 5 <sup>a</sup> | 7          | 5.15        | 2.27  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 21         | 0.40        | 0.24  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 28         | 0.16        | 0.10  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              |                |            |             |       |       |       |       |       |       |       |
| 水稻<br>(稲わら)<br>2004年     | 4             | 6 g ai/箱 <sup>G</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>100 <sup>SP</sup> × 3     | 5 <sup>a</sup> | 7          | 0.45        | 0.31  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 21         | 0.14        | 0.07  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 5 <sup>a</sup> | 28         | 0.13        | 0.06  |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              |                |            |             |       |       |       |       |       |       |       |
| 大豆<br>(乾燥子実)<br>2000年    | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>250-300 <sup>SP</sup> × 2                            | 3 <sup>a</sup> | 7          | 0.008       | 0.006 |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 3 <sup>a</sup> | 14         | 0.015       | 0.009 |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 3 <sup>a</sup> | 21         | 0.014       | 0.009 |       |       |       |       |       |       |
|                          |               |                                                                              | 3 <sup>a</sup> | 28         | 0.007       | 0.006 |       |       |       |       |       |       |

## 2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾈﾗﾙ評価書(案)たたき台

| 作物名<br>(部位)<br>実施年          | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)                                                                                            | 回数<br>(回)      | PHI<br>(日) | 残留値 (mg/kg) |       |       |      |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|                             |               |                                                                                                             |                |            | ジノテフラン      |       | MNG   |      | UF    |       | DN    |       |
|                             |               |                                                                                                             |                |            | 最高値         | 平均値   | 最高値   | 平均値  | 最高値   | 平均値   | 最高値   | 平均値   |
| ばれいしょ<br>(塊茎)<br>2001年      | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>300-400 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3 <sup>a</sup> | 7          | 0.03        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3 <sup>a</sup> | 13-14      | 0.03        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3 <sup>a</sup> | 28         | 0.02        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3 <sup>a</sup> | 42         | 0.01        | 0.01  |       |      |       |       |       |       |
| てんさい<br>(根)<br>2001年        | 2             | 120 <sup>SP</sup> × 1<br>300-600 <sup>SP</sup> × 2                                                          | 3 <sup>a</sup> | 6-7        | 0.04        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3 <sup>a</sup> | 13-14      | 0.02        | 0.01  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3 <sup>a</sup> | 21-22      | 0.02        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
| だいこん<br>(根)<br>1999年        | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1                                                                                        | 1              | 50-56      | 0.014       | 0.011 | 0.03  | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                                             | 1              | 57-63      | 0.026       | 0.015 | 0.02  | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                                             | 1              | 64-70      | 0.012       | 0.009 | 0.01  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| だいこん<br>(根)<br>2001年        | 2             | 600 <sup>G</sup> × 2<br>400 <sup>SP</sup> × 2                                                               | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.12        | 0.09  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.07        | 0.05  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.08        | 0.06  |       |      |       |       |       |       |
| だいこん<br>(葉)<br>1999年        | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1                                                                                        | 1              | 50-56      | 0.065       | 0.04  | <0.04 | 0.03 | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
|                             |               |                                                                                                             | 1              | 57-63      | 0.042       | 0.03  | <0.04 | 0.03 | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
|                             |               |                                                                                                             | 1              | 64-70      | 0.030       | 0.02  | <0.04 | 0.03 | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
| だいこん<br>(葉)<br>2001年        | 2             | 600 <sup>G</sup> × 2<br>400 <sup>SP</sup> × 2                                                               | 4 <sup>a</sup> | 7          | 1.52        | 1.29  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.56        | 0.37  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.15        | 0.11  |       |      |       |       |       |       |
| かぶ<br>(露地)(根)<br>2004年      | 2             | 900 <sup>G</sup> × 1<br>150-200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 3          | 2.89        | 2.30  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 1.21        | 0.82  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.33        | 0.20  |       |      |       |       |       |       |
| かぶ<br>(露地)(葉)<br>2004年      | 2             | 900 <sup>G</sup> × 1<br>150-200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 3          | 0.15        | 0.12  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 0.10        | 0.08  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.08        | 0.06  |       |      |       |       |       |       |
| はくさい<br>(茎葉)<br>2000年       | 2             | 0.03 g ai/株 <sup>G</sup><br>200-300 <sup>SP</sup> × 2                                                       | 3              | 3          | 0.436       | 0.306 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 0.310       | 0.213 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.169       | 0.126 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 21         | 0.094       | 0.070 |       |      |       |       |       |       |
| キャベツ<br>(葉球)<br>1998年       | 2             | 0.03 g ai/株 <sup>G</sup><br>200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 3          | 0.823       | 0.700 | 0.02  | 0.01 | 0.08  | 0.05  | 0.09  | 0.06  |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 0.924       | 0.603 | 0.02  | 0.01 | 0.08  | 0.05  | 0.11  | 0.07  |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.776       | 0.418 | 0.02  | 0.02 | 0.06  | 0.05  | 0.12  | 0.09  |
| キャベツ<br>(葉球)<br>2003年       | 2             | 2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.03g/株 <sup>G</sup><br>200 <sup>SP</sup> × 2                                     | 4 <sup>a</sup> | 3          | 0.28        | 0.18  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.20        | 0.14  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.18        | 0.12  |       |      |       |       |       |       |
| こまつな<br>(施設)(茎葉)<br>2004年   | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>150~200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 14-15      | 2.05        | 1.08  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 1.34        | 0.92  |       |      |       |       |       |       |
| みずな<br>(茎葉)<br>2004年        | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>150~200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 7          | 1.34        | 0.92  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.38        | 0.28  |       |      |       |       |       |       |
| ﾍﾞﾝｼﾞﾝ<br>(施設)(茎葉)<br>2003年 | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>150~300 × 2                                                                         | 3              | 3          | 3.94        | 2.76  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 2.94        | 1.60  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 1.73        | 0.87  |       |      |       |       |       |       |
| ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ<br>(花蕾)<br>2001年    | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>200 <sup>SP</sup> × 2                                                           | 3              | 3          | 0.68        | 0.35  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 0.31        | 0.20  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.04        | 0.04  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 21         | 0.04        | 0.02  |       |      |       |       |       |       |
| しゅんぎく<br>(茎葉)<br>2004年      | 2             | 0.01~0.05 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>2 g ai/箱箱 <sup>SP</sup><br>2000 <sup>G</sup> × 1<br>200 <sup>SP</sup> × 2 | 5 <sup>a</sup> | 1          | 12.7        | 9.76  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 5 <sup>a</sup> | 3          | 11.0        | 8.10  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 5 <sup>a</sup> | 7          | 7.19        | 4.09  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 5 <sup>a</sup> | 13         | 5.66        | 2.70  |       |      |       |       |       |       |
| 結球レタス<br>(施設)(茎葉)<br>2000年  | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>200-300 <sup>SP</sup> × 2                                                       | 3              | 3          | 1.01        | 0.732 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 7          | 0.942       | 0.537 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.520       | 0.324 |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 21         | 0.307       | 0.217 |       |      |       |       |       |       |
| 結球レタス<br>(施設)(茎葉)<br>2002年  | 2             | 2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.03g/株 <sup>G</sup><br>200-202 <sup>SP</sup> × 2                                 | 4 <sup>a</sup> | 3          | 2.61        | 2.00  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 7          | 1.51        | 1.35  |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 4 <sup>a</sup> | 14         | 1.37        | 0.99  |       |      |       |       |       |       |
| 食用菊<br>(施設)(花部)             | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>100-200 <sup>SP</sup> × 2                                                       | 3              | 7          | 2.0         | 1.6   |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 14         | 0.2         | 0.2   |       |      |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                                             | 3              | 21         | 0.2         | 0.2   |       |      |       |       |       |       |

## 2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾈﾗﾙ評価書(案)たたき台

| 作物名<br>(部位)<br>実施年              | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)                                                                                                                                  | 回数<br>(回)                                                                              | PHI<br>(日)              | 残留値 (mg/kg)                          |                                      |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |                         | ジノテフラン                               |                                      | MNG                     |                         | UF                   |                      | DN                      |                         |
|                                 |               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |                         | 最高値                                  | 平均値                                  | 最高値                     | 平均値                     | 最高値                  | 平均値                  | 最高値                     | 平均値                     |
| ねぎ<br>(茎葉)<br>2001年             | 2             | 600 <sup>G</sup> × 2<br>400 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                     | 4<br>4                                                                                 | 14<br>21                | 1.01<br>0.69                         | 0.60<br>0.39                         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ねぎ<br>(茎葉)<br>2004年             | 2             | 2 g ai/ﾄｲﾚ <sup>SP</sup><br>900 <sup>G</sup> × 1<br>2000 <sup>SP</sup> × 1<br>100-200 <sup>SP</sup> × 2                                           | 5 <sup>a</sup><br>5 <sup>a</sup><br>5 <sup>a</sup><br>5 <sup>a</sup>                   | 3<br>7<br>14<br>21      | 1.86<br>1.19<br>0.90<br>0.62         | 1.28<br>0.88<br>0.65<br>0.42         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| らっきょう<br>(鱗茎)<br>2002年          | 2             | 400-600 <sup>SP</sup> × 3                                                                                                                         | 3<br>3<br>3<br>3                                                                       | 1<br>3<br>7<br>14       | 0.27<br>0.21<br>0.26<br>0.21         | 0.20<br>0.16<br>0.19<br>0.19         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| にんじん<br>(露地)(根部)<br>2003-2004年  | 2             | 900 <sup>G</sup> × 1<br>340-1194 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                | 3 <sup>a</sup><br>3 <sup>a</sup><br>3 <sup>a</sup>                                     | 7<br>14<br>21           | 0.29<br>0.35<br>0.24                 | 0.19<br>0.23<br>0.15                 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| トマト<br>(施設)(果実)<br>1998年        | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>200-300 <sup>SP</sup> × 2                                                                                             | 3<br>3<br>3                                                                            | 1<br>3<br>7             | 0.256<br>0.349<br>0.252              | 0.173<br>0.200<br>0.159              | 0.03<br>0.02<br>0.03    | 0.02<br>0.01<br>0.01    | 0.02<br>0.01<br>0.01 | 0.01<br>0.01<br>0.01 | 0.01<br>0.01<br>0.01    | 0.01<br>0.01<br>0.01    |
| トマト<br>(施設)(果実)<br>2005年        | 2             | 0.4 g ai/L <sup>G</sup><br>0.02~0.1g ai/ﾄｲﾚ <sup>SP</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>G</sup> × 2<br>250 <sup>SP</sup> × 2      | 7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup>                   | 1<br>3<br>7<br>14       | 0.26<br>0.34<br>0.34<br>0.29         | 0.20<br>0.23<br>0.22<br>0.20         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ミニトマト<br>(施設)(果実)<br>2004-2005年 | 2             | 0.4 g ai/L <sup>G</sup><br>0.02~0.1g ai/ﾄｲﾚ <sup>SP</sup><br>2g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>G</sup> × 2<br>200-250 <sup>SP</sup> × 2   | 7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup> | 1<br>3<br>7<br>14<br>28 | 0.52<br>0.48<br>0.58<br>0.52<br>0.38 | 0.40<br>0.34<br>0.48<br>0.42<br>0.30 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ピーマン<br>(施設)(果実)<br>2000年       | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>200 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                 | 3<br>3<br>3<br>3                                                                       | 1<br>3<br>7<br>14       | 1.18<br>1.09<br>0.851<br>0.693       | 0.763<br>0.576<br>0.549<br>0.379     |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ピーマン<br>(施設)(果実)<br>2002年       | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>× 3                                                                                                                   | 3<br>3<br>3                                                                            | 1<br>3<br>7             | 0.08<br>0.10<br>0.09                 | 0.07<br>0.08<br>0.07                 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| なす<br>(施設)(果実)<br>1998年         | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>250 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                 | 3<br>3<br>3                                                                            | 1<br>3<br>7             | 0.529<br>0.497<br>0.400              | 0.343<br>0.305<br>0.213              | <0.01<br><0.01<br><0.01 | <0.01<br><0.01<br><0.01 | 0.02<br>0.02<br>0.01 | 0.01<br>0.01<br>0.01 | <0.01<br><0.01<br><0.01 | <0.01<br><0.01<br><0.01 |
| なす<br>(施設)(果実)<br>2001年         | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>0.02 g ai/株 × 2<br>157-200 <sup>SP</sup> × 2                                                                          | 4 <sup>a</sup><br>4 <sup>a</sup><br>4 <sup>a</sup>                                     | 1<br>3<br>7             | 0.49<br>0.39<br>0.23                 | 0.41<br>0.30<br>0.18                 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| なす<br>(施設)(果実)<br>2002年         | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>× 3                                                                                                                   | 3<br>3<br>3<br>3                                                                       | 1<br>3<br>7<br>14       | 0.06<br>0.07<br>0.08<br>0.07         | 0.05<br>0.05<br>0.06<br>0.05         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ししとう<br>(施設)(果実)<br>2003-2004年  | 2             | 0.02 g ai/株<br>150-250 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                          | 3<br>3<br>3                                                                            | 1<br>3<br>7             | 1.47<br>1.53<br>0.77                 | 1.33<br>1.33<br>0.65                 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| ししとう<br>(施設)(果実)<br>2005年       | 2             | 0.01~0.05 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>G</sup> × 2<br>90-300 <sup>SP</sup> × 2 | 7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup>                   | 1<br>3<br>7<br>14       | 1.60<br>1.42<br>0.82<br>0.58         | 1.40<br>1.32<br>0.78<br>0.48         |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| とうがらし<br>(施設)(果実)<br>2004年      | 2             | 0.02~0.1 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>2 g ai/箱 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>SP</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>G</sup> × 2<br>170-200 <sup>SP</sup> × 2 | 7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup><br>7 <sup>a</sup>                   | 1<br>3<br>7<br>14       | 1.7<br>1.2<br>1.8<br>1.5             | 1.6<br>1.2<br>1.2<br>1.0             |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| きゅうり<br>(施設)(果実)<br>1998年       | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>200 <sup>SP</sup> × 2                                                                                                 | 3<br>3<br>3                                                                            | 1<br>3<br>7             | 0.51<br>0.53<br>0.50                 | 0.42<br>0.45<br>0.39                 | <0.01<br><0.01<br><0.01 | <0.01<br><0.01<br><0.01 | 0.05<br>0.04<br>0.07 | 0.03<br>0.03<br>0.05 | 0.02<br>0.03<br>0.03    | 0.01<br>0.02<br>0.02    |
| きゅうり<br>(施設)(果実)<br>2001年       | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>× 2<br>200-250 <sup>SP</sup> × 2                                                                                      | 4<br>4<br>4                                                                            | 1<br>3<br>7             | 0.60<br>0.66<br>0.40                 | 0.47<br>0.46<br>0.23                 |                         |                         |                      |                      |                         |                         |

## 2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾈﾌﾗﾝ評価書(案)たたき台

| 作物名<br>(部位)<br>実施年          | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)                                                                  | 回数<br>(回)      | PHI<br>(日) | 残留値 (mg/kg) |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             |               |                                                                                   |                |            | ジノテフラン      |       | MNG   |       | UF    |       | DN    |       |
|                             |               |                                                                                   |                |            | 最高値         | 平均値   | 最高値   | 平均値   | 最高値   | 平均値   | 最高値   | 平均値   |
| すいか<br>(施設)(果実)<br>2001年    | 2             | 0.05 g ai/株 <sup>G</sup><br>0.02 g ai/株 <sup>F</sup><br>200-250 <sup>SP</sup> × 2 | 4              | 7          | 0.12        | 0.08  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4              | 14         | 0.16        | 0.11  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4              | 21         | 0.20        | 0.15  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4              | 28         | 0.17        | 0.12  |       |       |       |       |       |       |
| メロン<br>(施設)(果実)<br>1999年    | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup>                                                          | 1              | 80-85      | 0.021       | 0.013 | 0.01  | 0.01  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                   | 1              | 87-92      | 0.030       | 0.016 | 0.01  | 0.01  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                   | 1              | 94-99      | 0.022       | 0.012 | 0.01  | 0.01  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| メロン<br>(施設)(果実)<br>1999年    | 2             | 0.02 g ai/株 <sup>G</sup><br>500 <sup>SP</sup> × 2                                 | 3              | 3          | 0.28        | 0.13  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3              | 14         | 0.32        | 0.20  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3              | 28         | 0.49        | 0.34  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3              | 42         | 0.35        | 0.26  |       |       |       |       |       |       |
| ほうれん草<br>(施設)(茎葉)<br>2004年  | 2             | 900 <sup>G</sup> × 1<br>150-250 <sup>SP</sup> × 2                                 | 3 <sup>a</sup> | 3          | 9.43        | 7.70  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3 <sup>a</sup> | 7          | 4.77        | 3.04  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3 <sup>a</sup> | 14         | 3.29        | 1.72  |       |       |       |       |       |       |
| さやえんどう<br>(施設)(さや)<br>2004年 | 2             | 0.06 g ai/株 <sup>SP</sup><br>900 <sup>G</sup> × 2<br>200~300 <sup>SP</sup> × 2    | 5 <sup>a</sup> | 1          | 2.35        | 1.74  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 5 <sup>a</sup> | 3          | 2.54        | 1.82  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 5 <sup>a</sup> | 7          | 1.90        | 1.38  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 5 <sup>a</sup> | 14         | 1.11        | 0.89  |       |       |       |       |       |       |
| えだまめ<br>(さや)<br>2000年       | 2             | 600 <sup>G</sup> × 1<br>200-220 <sup>SP</sup> × 2                                 | 3 <sup>a</sup> | 7          | 0.704       | 0.508 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3 <sup>a</sup> | 14         | 0.537       | 0.356 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3 <sup>a</sup> | 21         | 0.502       | 0.300 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3 <sup>a</sup> | 28         | 0.133       | 0.108 |       |       |       |       |       |       |
| くわい<br>(露地)(塊茎)<br>2003年    | 2             | 300 <sup>G</sup>                                                                  | 3              | 60         | 0.03        | 0.02  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 3              | 90         | <0.02       | <0.02 |       |       |       |       |       |       |
| 温州みかん<br>(施設)(果肉)<br>2000年  | 2             | 800 <sup>SP</sup>                                                                 | 2              | 7-8        | 0.184       | 0.138 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.221       | 0.174 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 28         | 0.588       | 0.475 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 42         | 0.487       | 0.338 |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 49-56      | 0.497       | 0.373 |       |       |       |       |       |       |
| 温州みかん<br>(施設)(果皮)<br>2000年  | 2             | 800 <sup>SP</sup>                                                                 | 2              | 7-8        | 3.47        | 2.54  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 3.49        | 2.36  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 28         | 1.51        | 1.25  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 42         | 0.85        | 0.61  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 49-56      | 0.87        | 0.48  |       |       |       |       |       |       |
| 夏みかん<br>(果肉)<br>1998年       | 2             | 1000 <sup>SP</sup>                                                                | 2              | 7          | 0.021       | 0.010 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.035       | 0.018 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.033       | 0.016 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 夏みかん<br>(果皮)<br>1998年       | 2             | 1000 <sup>SP</sup>                                                                | 2              | 7          | 1.00        | 0.78  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | 0.05  | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 1.36        | 1.01  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.98        | 0.68  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
| 夏みかん<br>(全果実)<br>1998年      | 2             | 1000 <sup>SP</sup>                                                                | 2              | 7          | 0.24        | 0.21  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.50        | 0.32  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.24        | 0.19  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  | <0.04 | 0.03  |
| すだち<br>(果実)<br>1998年        | 1             | 1000 <sup>SP</sup>                                                                | 2              | 7          | 1.12        | 1.04  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.80        | 0.76  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.03  | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.58        | 0.54  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  |
| かぼす<br>(果実)<br>1998年        | 1             | 1500 <sup>SP</sup>                                                                | 2              | 7          | 0.84        | 0.83  | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.02  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.56        | 0.54  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01  | 0.01  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.59        | 0.58  | 0.01  | 0.01  | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.02  |
| りんご<br>(果実)<br>1998年        | 2             | 1000-1200 <sup>SP</sup>                                                           | 2              | 7          | 0.279       | 0.219 | <0.01 | <0.01 | 0.03  | 0.02  | 0.02  | 0.01  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.202       | 0.167 | <0.01 | <0.01 | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.187       | 0.144 | <0.01 | <0.01 | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |
| りんご<br>(果実)<br>2003-2004年   | 2             | 2000 <sup>SP</sup> × 1<br>500-600 <sup>SP</sup> × 3                               | 4 <sup>a</sup> | 1          | 0.14        | 0.10  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4 <sup>a</sup> | 3          | 0.12        | 0.08  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.11        | 0.08  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.09        | 0.06  |       |       |       |       |       |       |
|                             |               |                                                                                   | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.09        | 0.06  |       |       |       |       |       |       |
| なし<br>(果実)<br>1999年         | 2             | 800-1000 <sup>SP</sup>                                                            | 2              | 7          | 0.748       | 0.572 | 0.04  | 0.03  | 0.01  | 0.01  | 0.04  | 0.02  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 14         | 0.603       | 0.402 | 0.05  | 0.03  | 0.01  | 0.01  | 0.03  | 0.02  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 21         | 0.444       | 0.391 | 0.07  | 0.05  | 0.02  | 0.02  | 0.05  | 0.03  |
|                             |               |                                                                                   | 2              | 28         | 0.397       | 0.315 | 0.07  | 0.05  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  |

2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾅﾌﾟﾗﾝ評価書(案)たたき台

| 作物名<br>(部位)<br>実施年        | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)                                     | 回数<br>(回)      | PHI<br>(日) | 残留値 (mg/kg) |       |       |      |       |      |       |       |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|                           |               |                                                      |                |            | ジノテフラン      |       | MNG   |      | UF    |      | DN    |       |
|                           |               |                                                      |                |            | 最高値         | 平均値   | 最高値   | 平均値  | 最高値   | 平均値  | 最高値   | 平均値   |
| なし<br>(果実)<br>2003年       | 2             | 200 <sup>SP</sup><br>350 <sup>SP</sup> × 3           | 4 <sup>a</sup> | 1          | 0.42        | 0.24  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 3          | 0.39        | 0.20  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.27        | 0.14  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.15        | 0.10  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.16        | 0.10  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 28         | 0.16        | 0.10  |       |      |       |      |       |       |
| もも<br>(果肉)<br>1999年       | 2             | 400-450 <sup>SP</sup>                                | 2              | 7          | 0.477       | 0.301 | 0.01  | 0.01 | 0.03  | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 0.368       | 0.239 | 0.01  | 0.01 | 0.04  | 0.03 | <0.01 | <0.01 |
|                           |               |                                                      | 2              | 20-21      | 0.305       | 0.188 | 0.01  | 0.01 | 0.03  | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
|                           |               |                                                      | 2              | 26-27      | 0.169       | 0.097 | 0.01  | 0.01 | 0.02  | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| もも<br>(果肉)<br>2003年       | 2             | 1600-2000 <sup>SP</sup><br>400-500 <sup>SP</sup> × 3 | 4 <sup>a</sup> | 1          | 0.97        | 0.56  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 3          | 0.75        | 0.54  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.82        | 0.50  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 14         | 1.00        | 0.66  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 21         | 1.03        | 0.64  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 28         | 0.70        | 0.53  |       |      |       |      |       |       |
| もも<br>(果皮)<br>1999年       | 2             | 400-450 <sup>SP</sup>                                | 2              | 7          | 1.92        | 1.47  | <0.04 | 0.03 | 0.10  | 0.06 | 0.15  | 0.08  |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 1.22        | 0.90  | <0.04 | 0.03 | 0.10  | 0.06 | 0.14  | 0.07  |
|                           |               |                                                      | 2              | 20-21      | 0.80        | 0.50  | <0.04 | 0.03 | 0.06  | 0.04 | 0.09  | 0.05  |
|                           |               |                                                      | 2              | 26-27      | 0.33        | 0.24  | <0.04 | 0.03 | <0.04 | 0.03 | <0.04 | 0.03  |
| もも<br>(果皮)<br>2003年       | 2             | 1600-2000 <sup>SP</sup><br>400-500 <sup>SP</sup> × 3 | 4 <sup>a</sup> | 1          | 5.40        | 4.66  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 3          | 4.99        | 3.56  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 7          | 3.23        | 2.11  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 14         | 2.63        | 1.84  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 21         | 2.17        | 1.39  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 28         | 1.37        | 1.06  |       |      |       |      |       |       |
| ネクタリン<br>(果実)<br>2003年    | 2             | 270-700 <sup>SP</sup>                                | 3              | 1          | 0.94        | 0.80  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3              | 3          | 0.87        | 0.76  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3              | 7          | 0.60        | 0.42  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3              | 14         | 0.46        | 0.39  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3              | 21         | 0.45        | 0.36  |       |      |       |      |       |       |
| すもも<br>(果実)<br>2004年      | 2             | 2000 <sup>SP</sup> × 1<br>400~500 <sup>SP</sup> × 3  | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.18        | 0.18  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.17        | 0.14  |       |      |       |      |       |       |
| うめ<br>(果実)<br>1999年       | 2             | 400 <sup>SP</sup>                                    | 2              | 7          | 1.97        | 1.44  | 0.08  | 0.07 | 0.32  | 0.13 | 0.13  | 0.07  |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 1.00        | 0.842 | 0.14  | 0.08 | 0.23  | 0.14 | 0.10  | 0.07  |
|                           |               |                                                      | 2              | 21         | 0.804       | 0.734 | 0.17  | 0.11 | 0.20  | 0.15 | 0.10  | 0.07  |
| おうとう<br>(施設)(果実)<br>2002年 | 2             | 800-1000 <sup>SP</sup> × 2                           | 2              | 7          | 1.55        | 1.08  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 2.72        | 1.86  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 21         | 2.78        | 1.81  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 28         | 0.84        | 0.73  |       |      |       |      |       |       |
| おうとう<br>(施設)(果実)<br>2002年 | 2             | 200 <sup>SP</sup> × 1<br>400-500 <sup>SP</sup> × 2   | 3 <sup>a</sup> | 1          | 5.16        | 3.44  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 7          | 4.10        | 2.58  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 13-14      | 2.58        | 1.89  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 20-21      | 1.57        | 1.10  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 27-28      | 1.37        | 0.84  |       |      |       |      |       |       |
| いちご<br>(施設)(果実)<br>1999年  | 2             | 0.01g ai/株 <sup>G</sup><br>200-201 <sup>SP</sup> × 2 | 3 <sup>a</sup> | 1          | 2.28        | 1.76  | 0.01  | 0.01 | 0.07  | 0.07 | 0.02  | 0.02  |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 3          | 2.42        | 1.76  | 0.02  | 0.02 | 0.10  | 0.09 | 0.03  | 0.02  |
|                           |               |                                                      | 3 <sup>a</sup> | 7          | 2.12        | 1.48  | 0.02  | 0.02 | 0.12  | 0.11 | 0.03  | 0.02  |
| ぶどう<br>(施設)(果実)<br>1999年  | 2             | 560-800 <sup>SP</sup>                                | 2              | 7          | 3.52        | 2.66  | 0.02  | 0.02 | 0.08  | 0.05 | 0.05  | 0.03  |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 3.22        | 2.72  | 0.03  | 0.02 | 0.09  | 0.06 | 0.04  | 0.03  |
|                           |               |                                                      | 2              | 21         | 2.40        | 1.94  | 0.03  | 0.03 | 0.10  | 0.07 | 0.05  | 0.03  |
|                           |               |                                                      | 2              | 28         | 2.42        | 1.99  | 0.03  | 0.03 | 0.12  | 0.08 | 0.05  | 0.03  |
| かき<br>(果実)<br>2001年       | 2             | 600-626 <sup>SP</sup>                                | 2              | 7          | 0.63        | 0.50  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 0.72        | 0.42  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 20-21      | 0.54        | 0.42  |       |      |       |      |       |       |
| かき<br>(果実)<br>2003年       | 2             | 2g ai/樹 <sup>SP</sup><br>300-500 <sup>SP</sup> × 3   | 4 <sup>a</sup> | 1          | 0.55        | 0.37  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 3          | 0.47        | 0.34  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 7          | 0.39        | 0.29  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 14         | 0.30        | 0.20  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 4 <sup>a</sup> | 21         | 0.32        | 0.22  |       |      |       |      |       |       |
| 茶<br>(荒茶)<br>1999年        | 2             | 200 <sup>SP</sup>                                    | 2              | 7          | 19.7        | 13.9  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 14         | 5.10        | 4.81  |       |      |       |      |       |       |
|                           |               |                                                      | 2              | 21         | 1.64        | 1.10  |       |      |       |      |       |       |

2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ジノテフラン評価書（案）たたき台

| 作物名<br>(部位)<br>実施年 | 試験<br>圃場<br>数 | 使用量<br>(g ai/ha)      | 回数<br>(回) | PHI<br>(日) | 残留値 (mg/kg) |      |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |               |                       |           |            | ジノテフラン      |      | MNG |     | UF  |     | DN  |     |
|                    |               |                       |           |            | 最高値         | 平均値  | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 |
| 茶<br>(荒茶)<br>2004年 | 2             | 1200 <sup>G</sup> × 2 | 2         | 7          | 0.42        | 0.28 |     |     |     |     |     |     |
|                    |               |                       | 2         | 14         | 1.37        | 0.81 |     |     |     |     |     |     |
|                    |               |                       | 2         | 28         | 3.26        | 2.16 |     |     |     |     |     |     |
|                    |               |                       | 2         | 56         | 3.07        | 1.93 |     |     |     |     |     |     |

注) ai : 有効成分量、PHI : 最終使用 - 収穫間隔日数

G : 粒剤、D : 粉剤、SP : 水溶剤、L : 液剤

- ・農薬の使用回数が申請された使用方法よりも多い場合、回数に a を付した
- ・一部に検出限界以下 (<0.005、<0.01、<0.02、<0.04 及び <0.05) を含むデータの平均値は 0.005、0.01、0.02、0.04 及び 0.05 として計算し、< を付した。
- ・異なる検出限界値を含み、全て検出限界以下の場合、最高値には大きい方の検出限界値を、平均値には異なる検出限界値の平均を計算し、< を付した。
- ・MNG、UF、DN の残留値はジノテフランに換算して記載した。換算係数は、

ジノテフラン/MNG = 1.71

ジノテフラン/UF = 1.28

ジノテフラン/DN = 1.29

2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ｼﾞﾅﾌｫﾝ評価書(案)たたき台

<別紙4:推定摂取量>

| 作物名           | 残留値<br>(mg/kg) | 国民平均          |                 | 小児(1~6歳)      |                 | 妊婦            |                 | 高齢者(65歳以上)    |                 |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|               |                | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) |
| 米             | 0.52           | 185.1         | 96.2            | 97.7          | 50.8            | 139.7         | 72.6            | 188.8         | 98.2            |
| 大豆            | 0.009          | 56.1          | 0.50            | 33.7          | 0.30            | 45.5          | 0.41            | 58.8          | 0.53            |
| ばれいしょ         | 0.02           | 36.6          | 0.73            | 21.3          | 0.43            | 39.8          | 0.80            | 27.0          | 0.54            |
| てんさい          | 0.02           | 4.5           | 0.09            | 3.7           | 0.074           | 3.4           | 0.068           | 4.0           | 0.08            |
| だいこん類(根)      | 0.09           | 45.0          | 4.05            | 18.7          | 1.68            | 28.7          | 2.58            | 58.5          | 5.27            |
| だいこん類(葉)      | 1.29           | 2.2           | 2.84            | 0.5           | 0.65            | 0.9           | 1.16            | 3.4           | 4.39            |
| かぶ類(根)        | 2.30           | 2.6           | 5.98            | 0.7           | 1.61            | 0.7           | 1.61            | 4.2           | 9.66            |
| かぶ類(葉)        | 0.12           | 0.5           | 0.06            | 0.1           | 0.012           | 0.3           | 0.036           | 1.1           | 0.132           |
| はくさい          | 0.306          | 29.4          | 9.00            | 10.3          | 3.15            | 21.9          | 6.70            | 29.9          | 9.15            |
| キャベツ          | 0.603          | 22.8          | 13.7            | 9.8           | 5.91            | 22.9          | 13.8            | 19.9          | 12.0            |
| こまつな          | 1.08           | 4.3           | 4.64            | 2.0           | 2.16            | 1.6           | 1.73            | 5.9           | 6.37            |
| きょうな          | 0.92           | 0.3           | 0.28            | 0.1           | 0.09            | 0.1           | 0.09            | 0.3           | 0.28            |
| ﾁｬﾝｻｲ         | 2.76           | 1.4           | 3.86            | 0.3           | 0.83            | 1.0           | 2.76            | 1.9           | 5.24            |
| ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ       | 0.35           | 4.5           | 1.58            | 2.8           | 0.98            | 4.67          | 1.65            | 4.1           | 1.44            |
| しゅんぎく         | 9.76           | 2.5           | 24.4            | 0.6           | 5.86            | 1.9           | 18.5            | 3.7           | 36.1            |
| レタス           | 2.00           | 6.1           | 12.2            | 2.5           | 5.00            | 6.4           | 12.8            | 4.2           | 8.4             |
| その他の<br>きく科野菜 | 1.6            | 0.4           | 0.64            | 0.1           | 0.16            | 0.5           | 0.8             | 0.7           | 1.12            |
| ねぎ            | 1.28           | 11.3          | 14.5            | 4.5           | 5.76            | 8.2           | 10.5            | 13.5          | 17.3            |
| その他の<br>ゆり科野菜 | 0.20           | 0.9           | 0.18            | 0.1           | 0.02            | 0.1           | 0.02            | 1.8           | 0.36            |
| にんじん          | 0.23           | 24.6          | 5.66            | 16.3          | 3.75            | 25.1          | 5.77            | 22.3          | 5.13            |
| トマト           | 0.48           | 24.3          | 11.7            | 16.9          | 8.11            | 24.5          | 11.8            | 18.9          | 9.07            |
| ピーマン          | 0.763          | 4.4           | 3.36            | 2.0           | 1.53            | 1.9           | 1.45            | 3.7           | 2.82            |
| ナス            | 0.34           | 4.0           | 1.37            | 0.9           | 0.31            | 3.3           | 1.13            | 5.7           | 1.96            |
| その他の<br>なす科野菜 | 1.2            | 0.2           | 0.24            | 0.1           | 0.12            | 0.1           | 0.12            | 0.3           | 0.36            |
| きゅうり          | 0.46           | 16.3          | 7.50            | 8.2           | 3.77            | 10.1          | 4.65            | 16.6          | 7.64            |
| スイカ           | 0.15           | 0.1           | 0.015           | 0.1           | 0.015           | 0.1           | 0.015           | 0.1           | 0.015           |
| メロン類          | 0.34           | 0.4           | 0.136           | 0.3           | 0.102           | 0.1           | 0.034           | 0.3           | 0.102           |
| ほうれん草         | 7.70           | 18.7          | 144             | 10.1          | 77.8            | 17.4          | 134             | 21.7          | 167             |
| さや<br>えんどう    | 1.82           | 0.6           | 1.09            | 0.2           | 0.36            | 0.7           | 1.27            | 0.6           | 1.09            |
| えだまめ          | 0.508          | 0.1           | 0.051           | 0.1           | 0.051           | 0.1           | 0.051           | 0.1           | 0.051           |
| その他の<br>野菜    | 0.02           | 12.6          | 0.252           | 9.7           | 0.194           | 9.6           | 0.192           | 12.2          | 0.244           |
| みかん           | 0.475          | 41.6          | 19.8            | 35.4          | 16.8            | 45.8          | 21.8            | 42.6          | 20.2            |
| 夏みかん          | 0.018          | 0.1           | 0.018           | 0.1           | 0.018           | 0.1           | 0.018           | 0.1           | 0.018           |
| 夏みかん<br>(果皮)  | 1.01           | 0.1           | 0.101           | 0.1           | 0.101           | 0.1           | 0.101           | 0.1           | 0.101           |

## 2007/1/15 農薬専門調査会幹事会第9回会合ジノテフロン評価書（案）たたき台

| 作物名            | 残留値<br>(mg/kg) | 国民平均          |                 | 小児（1～6歳）      |                 | 妊婦            |                 | 高齢者(65歳以上)    |                 |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                |                | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) | ff<br>(g/人/日) | 摂取量<br>(μg/人/日) |
| 夏みかん<br>(果実全体) | 0.32           | 0.1           | 0.032           | 0.1           | 0.032           | 0.1           | 0.032           | 0.1           | 0.032           |
| その他の<br>かんきつ   | 1.04           | 0.4           | 0.416           | 0.1           | 0.104           | 0.1           | 0.104           | 0.6           | 0.624           |
| りんご            | 0.219          | 35.3          | 7.73            | 36.2          | 7.93            | 30.0          | 6.57            | 35.6          | 7.80            |
| 日本なし           | 0.572          | 5.1           | 2.92            | 4.4           | 2.52            | 5.3           | 3.03            | 5.1           | 2.92            |
| もも             | 0.64           | 0.5           | 0.32            | 0.7           | 0.45            | 4.0           | 2.56            | 0.1           | 0.064           |
| ネクタリン          | 0.8            | 0.1           | 0.08            | 0.1           | 0.08            | 0.1           | 0.08            | 0.1           | 0.08            |
| アンズ            | 1.44           | 0.1           | 0.14            | 0.1           | 0.14            | 0.1           | 0.14            | 0.1           | 0.14            |
| スモモ            | 0.18           | 0.2           | 0.036           | 0.1           | 0.018           | 1.4           | 0.252           | 0.2           | 0.036           |
| ウメ             | 1.44           | 1.1           | 1.58            | 0.3           | 0.432           | 1.4           | 2.02            | 1.6           | 2.30            |
| おうとう           | 3.44           | 0.1           | 0.344           | 0.1           | 0.344           | 0.1           | 0.344           | 0.1           | 0.344           |
| イチゴ            | 1.76           | 0.3           | 0.53            | 0.4           | 0.70            | 0.1           | 0.18            | 0.1           | 0.18            |
| ブドウ            | 2.66           | 5.8           | 15.4            | 4.4           | 11.7            | 1.6           | 4.26            | 3.8           | 10.1            |
| かき             | 0.42           | 31.4          | 13.2            | 8.0           | 3.36            | 21.5          | 9.03            | 49.6          | 20.8            |
| 茶              | 13.9           | 3.0           | 41.7            | 1.4           | 19.5            | 3.5           | 48.7            | 4.3           | 59.8            |
| みかんの皮          | 2.36           | 0.1           | 0.24            | 0.1           | 0.24            | 0.1           | 0.24            | 0.1           | 0.24            |
| 合計             |                |               | 475.37          |               | 245.99          |               | 408.47          |               | 538.44          |

注）・残留値は、申請されている使用時期・使用回数による各試験区のうち最大の残留を示す試験区の平均残留値を用いた（参照 別紙3）。

- ・「ff」：平成10年～12年の国民栄養調査（参照130～132）の結果に基づく農産物摂取量（g/人/日）
- ・「摂取量」：残留値及び農産物残留量から求めたジノテフロンの推定摂取量（μg/人/日）
- ・『きょうな』にはみずなの残留値を用いた。
- ・『その他のきく科野菜』には食用菊の残留値を用いた。
- ・『その他のゆり科野菜』にはらっきょうの残留値を用いた。
- ・『トマト』については、トマト及びミニトマトのうち、残留値の高いミニトマトの値を用いた。
- ・『その他のなす科野菜』については、ししとう及びとうがらしのうち、残留値の高いとうがらしの値を用いた。
- ・『その他の野菜』については、くわいの残留値を用いた。
- ・『その他のかんきつ』については、カボス、スダチのうち残留値の高いスダチの値を用いた。
- ・『アンズ』についてはウメの残留値を用いた。

< 参照 >

- 1 農薬抄録ジノテフラン（殺虫剤）（平成16年4月7日改訂）：三井化学株式会社、2004年、一部公表予定  
(URL : <http://www.acis.go.jp/syouroku/dinotefuran/index.htm>)
- 2 <sup>14</sup>C 標識ジノテフラン(MTI-446)を用いたラット体内における代謝試験-1（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.、2000年、未公表
- 3 <sup>14</sup>C 標識ジノテフラン(MTI-446)を用いたラット体内における代謝試験-2：三井化学（株）、2000年、未公表
- 4 *in vitro* 代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 5 水稻における代謝試験-1（GLP 対応）：Ricerca Inc.、2000年、未公表
- 6 水稻における代謝試験-2：三井化学（株）、2000年、未公表
- 7 ナスにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 8 キャベツにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 9 キュウリにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 10 インゲンにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 11 イチゴにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 12 カブにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 13 ミカンにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 14 ナシにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 15 リンゴにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 16 DN のキュウリおよびインゲンにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 17 UF のキュウリにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 18 MNG のキュウリにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 19 PHP および 446-DO のインゲンにおける代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 20 好氣的土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 21 好氣的湛水土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 22 嫌氣的土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 23 DN 土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 24 UF 土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 25 MNG 土壌代謝試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 26 NG 土壌代謝試験：三井化学（株）、2001年、未公表
- 27 ジノテフランの土壌吸着係数試験（GLP 対応）：（株）化学分析コンサルタント、2000年、未公表
- 28 代謝物 DN リン酸塩の土壌吸着係数試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001年、未公表
- 29 代謝物 MNG の土壌吸着係数試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001年、未公表
- 30 土壌カラムリーチング試験：三井化学（株）、2000年、未公表
- 31 エイジドリリーチング試験：三井化学（株）、2000年、未公表

- 32 DN、UF、MNG の土壌カラムリーチング試験：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 33 鉛直浸透試験（水田圃場）：三井化学（株）、2001 年、未公表
- 34 鉛直浸透試験（畑圃場）：三井化学（株）、2001 年、未公表
- 35 土壌表面光分解試験：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 36 ジノテフランの加水分解性試験（GLP 対応）：（株）化学分析コンサルタント、2000 年、未公表
- 37 ジノテフランの加水分解性試験（強アルカリ性を含む）（GLP 対応）：Huntingdon Life Sciences Ltd.、1998 年、未公表
- 38 代謝物 DN リン酸塩の加水分解性試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001 年、未公表
- 39 代謝物 MNG の加水分解性試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001 年、未公表
- 40 代謝物の水中安定性試験（BCDN、DN-2-OH）：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 41 ジノテフランの水中光分解試験（GLP 対応）：（株）化学分析コンサルタント、2000 年、未公表
- 42 代謝物 DN リン酸塩の水中光分解試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001 年、未公表
- 43 代謝物 MNG の水中光分解試験（GLP 対応）：RCC Ltd.、2001 年、未公表
- 44 薄膜光分解試験：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 45 水中光分解試験：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 46 DN 光分解試験（薄膜、水中）：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 47 UF 光分解試験（薄膜、水中）：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 48 MNG 光分解試験（薄膜、水中）：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 49 PHP、446-DO、BCDN、DN-3-OH 光分解試験（水中）：三井化学（株）、2000 年、未公表
- 50 ジノテフランの土壌残留試験成績：（財）化学物質評価研究機構、2003 年、未公表
- 51 ジノテフランの作物残留試験成績：日本食品分析センター、2003 年、未公表
- 52 ジノテフランの作物残留試験成績：三井化学（株）、2003 年、未公表
- 53 ジノテフランの作物残留試験成績：化学分析コンサルタント、2003 年、未公表
- 54 乳汁中のジノテフラン濃度：（財）畜産生物科学安全研究所、1999 年、未公表
- 55 乳汁中のジノテフラン及び主要代謝物の濃度：（財）畜産生物科学安全研究所、三井化学（株）、2000 年、未公表
- 56 ジノテフラン原体（MTI-446）の薬理試験：実医研、1999 年、未公表
- 57 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：Corning Hazleton（米国）、1997 年、未公表
- 58 ジノテフラン原体(MTI-446)のマウスにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：Corning Hazleton（米国）、1997 年、未公表
- 59 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットにおける急性経皮毒性試験（GLP 対応）：Corning Hazleton（米国）、1997 年、未公表
- 60 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットにおける急性吸入毒性試験（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.（英国）、1999 年、未公表

- 61 混在物、代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-7（FNG）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 62 代謝物（植物、土壌）A-2（NG）の急性経口毒性：Hygiene and Sanitation Vol.45, No.1, pp.18-20, 1980 年
- 63 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-3（MNG）の急性経口毒性：Toxicology and Industrial Health, Vol.9, No.3, pp.457-477, 1993 年
- 64 代謝物（動物、植物、光分解）A-9（MG）の急性経口毒性：Cesko-Slovenska Farmacie. Vol.1, pp.434, 1952 年
- 65 代謝物（動物、植物、光分解）A-4（PHP）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 66 代謝物（動物、植物）A-5（446-DO）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 67 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-6（UF）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 68 代謝物（動物、植物、光分解）A-11（DN-3-OH）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 69 代謝物（動物、植物、光分解）A-12（BCDN）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 70 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-13（DN）のマウスを用いた急性経口毒性試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、2000 年、未公表
- 71 混在物 A の急性経口毒性、1970 年、公表（*FAO Nutrition Meetings Report Series. 48A*, 94, (1970)）
- 72 混在物 B の急性経口毒性、1983 年、公表（*Hygiene and Sanitation. 48*, No.4, 66-67, (1983)）
- 73 代謝物（植物、土壌）A-2（NG）の急性経口毒性、1980 年、公表（*Hygiene and Sanitation. 45*, No.1, 18-20, (1980)）
- 74 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-3（MNG）の急性経口毒性、1993 年、公表（*Toxicology and Industrial Health. 9*, No.3, 457-477, (1993)）
- 75 代謝物（動物、植物、光分解）A-9（MG）の急性経口毒性、1952 年、公表（*Cesko-Slovenska Farmacie. 1*, 434 (1952)）
- 76 ジノテフラン原体（MTI-446）のラットを用いた急性経口神経毒性試験（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.（米国）、2001 年、未公表
- 77 ジノテフラン原体（MTI-446）のウサギを用いた眼一次刺激性試験（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.（米国）、1998 年、未公表
- 78 ジノテフラン原体（MTI-446）のウサギを用いた皮膚一次刺激性試験（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.（米国）、1998 年、未公表
- 79 ジノテフラン原体（MTI-446）のモルモットを用いた皮膚感作性試験（GLP 対応）：Covance Laboratories Inc.（米国）、1997 年、未公表

- 80 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた混餌投与による13週間亜急性経口毒性試験(GLP対応): Corning Hazleton.(米国)、1997年、未公表
- 81 ジノテフラン原体(MTI-446)のマウスを用いた混餌投与による13週間亜急性経口毒性試験(GLP対応): Corning Hazleton.(米国)、1997年、未公表
- 82 ジノテフラン原体(MTI-446)のイヌを用いた混餌投与による13週間亜急性経口毒性試験(GLP対応): Covance Laboratories Inc.(米国)、1999年、未公表
- 83 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた混餌投与による13週間亜急性神経毒性試験(GLP対応): Covance Laboratories Inc.(米国)、2001年、未公表
- 84 ジノテフラン原体(MTI-446)のイヌを用いた混餌投与による52週間慢性毒性試験(GLP対応): Covance Laboratories Inc.(米国)、1999年、未公表
- 85 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた飼料混入投与による104週間慢性毒性・発がん性試験(GLP対応): Covance Laboratories Inc.(米国)、2000年、未公表
- 86 ジノテフラン原体(MTI-446)のマウスを用いた混餌投与による78週間発がん性試験(GLP対応): Covance Laboratories Inc.(米国)、2001年、未公表
- 87 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた繁殖試験(GLP対応): (株)実医研、2000年、未公表
- 88 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた繁殖試験追加試験(GLP対応): (株)実医研、2000年、未公表
- 89 ジノテフラン原体(MTI-446)のラットを用いた催奇形性試験(GLP対応): (株)実医研、1998年、未公表
- 90 ジノテフラン原体(MTI-446)のウサギを用いた催奇形性試験(GLP対応): (株)実医研、1998年、未公表
- 91 ジノテフラン原体(MTI-446)の細菌を用いたDNA修復試験(GLP対応): ビー・エム・エル、1996年、未公表
- 92 ジノテフラン原体(MTI-446)の細菌を用いた復帰突然変異試験(GLP対応): オリンパス光学工業株式会社染色体研究センター(CRC)、1996年、未公表
- 93 ジノテフラン原体(MTI-446)のCHL/IU細胞を用いた*in vitro*染色体異常試験(GLP対応): オリンパス光学工業株式会社染色体研究センター(CRC)、1996年、未公表
- 94 ジノテフラン原体(MTI-446)のげっ歯類を用いた小核試験(GLP対応): (財)食品農医薬品安全性評価センター、1995年、未公表
- 95 代謝物(植物、土壌)A-2(NG)の細菌を用いた復帰突然変異試験: Letterman Army Institute of Research, San Francisco, CA Technical Report, No.260 Toxicology Series 107, 1988年、公表
- 96 代謝物(動物、植物、土壌、光分解)A-3(MNG)の細菌を用いた復帰突然変異試験: Final Report for the Period 11 June 1991 to 12 November 1991 AL-TR-1991-0161, Armstrong Laboratory, 1991年、公表

- 97 混在物、代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-7(FNG)の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、1999 年、未公表
- 98 代謝物（動物、植物、光分解）A-4(PHP)の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、2000 年、未公表
- 99 代謝物（動物、植物）A-5(446-DO)の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、2000 年、未公表
- 100 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-6（UF）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、1999 年、未公表
- 101 代謝物（動物、植物、光分解）A-9（MG）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、2000 年、未公表
- 102 代謝物（動物、植物、光分解）A-11（DN-3-OH）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、2000 年、未公表
- 103 代謝物（動物、植物、光分解）A-12（BCDN）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、2000 年、未公表
- 104 代謝物（動物、植物、土壌、光分解）A-13（DN）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：ボゾリサーチセンター、1999 年、未公表
- 105 混在物（2-MTI-446）の細菌を用いた復帰突然変異試験：ボゾリサーチセンター（GLP 対応）、1999 年、未公表
- 106 混在物（FMPZ）の細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：新日本科学、1999 年、未公表
- 107 混在物（FPZ）の細菌を用いた復帰突然変異試験：新日本科学、1999 年、未公表
- 108 混在物（混在物 A）の細菌を用いた復帰突然変異試験：微生物を用いる変異原性データ集（エル・アイ・シー社）、1991 年
- 109 混在物（混在物 B）の細菌を用いた復帰突然変異試験：Food Chemistry and Toxicology, Vol.22, No.8, pp623-636、1984 年
- 110 混在物（FPZ）の CHL/IU 細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験（GLP 対応）：ビー・エム・エル、1997 年、未公表
- 111 混在物（FPZ）のラット肝細胞を用いた *in vivo/in vitro* 不定期 DNA 合成試験（GLP 対応）：（財）食品農医薬品安全性評価センター、1997 年、未公表
- 112 混在物（FPZ）のげっ歯類を用いた小核試験（GLP 対応）：オリンパス光学工業株式会社染色体研究センター（CRC）、1996 年、未公表
- 113 ジノテフランの農薬抄録について：三井化学（株）、2005 年、未公表
- 114 ジノテフランの安全性評価資料 - 回答資料（2001 年 6 月 22 日） - ：三井化学（株）、2001 年、未公表
- 115 ジノテフランの安全性評価資料 - 回答資料（2001 年 10 月 18 日） - ：三井化学（株）、2001 年、未公表

- 116 ジノテフランの食品健康影響評価に係る追加資料の提出について：三井化学株式会社、2004 年、未公表
- 117 食品健康影響評価について：食品安全委員会第 44 回会合資料 1-1  
(URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai44/dai44kai-siryou1-1.pdf>)
- 118 「ジノテフラン」の食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第 1 項の規定に基づく、食品中の残留基準設定に係る食品健康影響評価について：食品安全委員会第 44 回会合資料 1-2  
(URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai44/dai44kai-siryou1-2.pdf>)
- 119 食品安全委員会農薬専門調査会第 11 回会合  
( URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai11/index.html> )
- 120 食品安全委員会農薬専門調査会第 23 回会合  
( URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai23/index.html> )
- 121 食品健康影響評価の結果の通知について[平成 17 年 6 月 16 日付、府食第 605 号  
( URL : <http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-170616-dinotefuran.pdf> )
- 122 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件  
(平成 17 年 7 月 28 日付、平成 17 年厚生労働省告示第 456 号)
- 123 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件  
(平成 17 年 11 月 29 日付、平成 17 年厚生労働省告示第 499 号)
- 124 農薬抄録ジノテフラン（殺虫剤）改訂版：三井化学株式会社、2006 年、一部公表予定  
( URL:<http://www.fsc.go.jp/hyouka/iken.html#02> )
- 125 ジノテフランの作物残留性試験成績：三井化学株式会社、2006 年、未公表
- 126 食品健康影響評価について：食品安全委員会第 158 回会合資料 1-1  
(URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai158/dai158kai-siryou1-1.pdf>)
- 127 「イミシアホス」及び「ジノテフラン」の食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第 1 項の規定に基づく、食品中の残留基準設定に係る食品健康影響評価について：食品安全委員会第 158 回会合資料 1-2  
(URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai158/dai158kai-siryou1-2.pdf>)
- 128 食品安全委員会農薬専門調査会総合評価第一部会第 7 回会合  
( URL : [http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/sougou1\\_dai7/index.html](http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/sougou1_dai7/index.html) )
- 129 食品安全委員会農薬専門調査会幹事会第 9 回会合  
( URL : [http://www.fsc.go.jp/osirase/nouyaku\\_annai\\_kanjikai\\_9.html](http://www.fsc.go.jp/osirase/nouyaku_annai_kanjikai_9.html) )
- 130 国民栄養の現状 - 平成 10 年国民栄養調査結果 - : 健康・栄養情報研究会編、2000 年
- 131 国民栄養の現状 - 平成 11 年国民栄養調査結果 - : 健康・栄養情報研究会編、2001 年
- 132 国民栄養の現状 - 平成 12 年国民栄養調査結果 - : 健康・栄養情報研究会編、2002 年