

(案)

## 農薬評価書

# シメコナゾール

2007年6月20日

食品安全委員会農薬専門調査会

## 目 次

・	目次	1
・	審議の経緯	3
・	食品安全委員会委員名簿	3
・	食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿	3
・	要約	5
I.	評価対象農薬の概要	6
	1. 用途	6
	2. 有効成分の一般名	6
	3. 化学名	6
	4. 分子式	6
	5. 分子量	6
	6. 構造式	6
	7. 開発の経緯	6
II.	毒性等に関する科学的知見	7
	1. 動物体内運命試験	7
	(1) ラットにおける動物体内運命試験	7
	薬物動態	7
	排泄	7
	体内分布	7
	代謝物同定・定量	8
	(2) ラット肝を用いた <i>in vitro</i> 代謝試験	9
	(3) マウスにおける動物体内運命試験	9
	薬物動態	9
	体内分布	9
	排泄	9
	代謝物同定・定量	9
	2. 植物体内運命試験	10
	(1) 水稻	10
	(2) りんご	10
	(3) 大豆	11
	3. 土壌中運命試験	12
	(1) 好氣的土壌中運命試験	12
	(2) 湛水土壌中運命試験	12
	(3) 湛水土壌中運命試験	12
	(4) 土壌カラムリーチング試験	13
	(5) 土壌吸着試験	13
	4. 水中運命試験	13
	(1) 加水分解試験	13
	(2) 加水分解試験	13
	(3) 水中光分解試験	14
	5. 土壌残留試験	14
	6. 作物残留試験	14
	7. 一般薬理試験	14
	8. 急性毒性試験	16

9.	眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	17
10.	亜急性毒性試験	17
	(1) 90 日間亜急性毒性試験(ラット)	17
	(2) 90 日間亜急性毒性試験(マウス)	18
	(3) 90 日間亜急性毒性試験(イヌ)	18
11.	慢性毒性試験及び発がん性試験	18
	(1) 1 年間慢性毒性試験(イヌ)	18
	(2) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)	19
	(3) 18 カ月間発がん性試験(マウス)	20
12.	生殖発生毒性試験	21
	(1) 2 世代繁殖試験(ラット)	21
	(2) 発生毒性試験(ラット)	22
	(3) 発生毒性試験(ウサギ)	22
13.	遺伝毒性試験	22
14.	その他の試験	24
	(1) 肝細胞腫瘍発現機序検討試験	24
	雄ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験	25
	雌ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験	25
	変異肝細胞巢の細胞増殖活性検査	25
	(2) 分娩異常発現機序検討試験	26
	雌ラットを用いた血清中ホルモン測定試験	26
	(3) 腎盂拡張発現機序検討試験	26
	妊娠ラットにおける血圧調節に及ぼす影響に関する試験	26
	血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験	26
	胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験	27
III.	総合評価	28
・	別紙 1: 代謝物/分解物等略称	31
・	別紙 2: 検査値等略称	32
・	別紙 3: 作物残留試験成績	33
・	参照	38

< 審議の経緯 >

- 2001年 10月 12日 初回農薬登録  
2005年 11月 29日 残留農薬基準告示(参照1)  
2007年 2月 5日 厚生労働大臣より残留基準(暫定基準)設定に係る食品健康影響評価について要請(厚生労働省発食安第0205002号)(参照4)  
2007年 2月 6日 同接受  
2007年 2月 8日 食品安全委員会第177回会合(要請事項説明)(参照5)  
2007年 5月 28日 農薬専門調査会確認評価第三部会第4回会合(参照6)  
2007年 6月 5日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について追加要請(厚生労働省発食安第0605002号) 同接受(参照7)  
2007年 6月 7日 食品安全委員会第193回会合(要請事項説明)(参照8)  
2007年 6月 20日 農薬専門調査会幹事会第20回会合(参照9)

< 食品安全委員会委員名簿 >

見上 彪(委員長)  
小泉直子(委員長代理)  
長尾 拓  
野村一正  
畑江敬子  
廣瀬雅雄\*  
本間清一

\*: 2007年4月1日から

< 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿 >

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士(座長)	三枝順三	根岸友恵
廣瀬雅雄(座長代理)	佐々木有	林 真
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 眞	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤正吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

(2007年4月1日から)

鈴木勝士(座長)	三枝順三	布柴達男
林 真(座長代理*)	佐々木有	根岸友恵
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 眞	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤正吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	西川秋佳**	

\* : 2007年4月11日から

\*\* : 2007年4月25日から

## 要 約

トリアゾール系殺菌剤である「シメコナゾール」(IUPAC : (RS)-2-(4-フルオロフェニル)-1-(1*H*,2,4-トリアゾール-1-イル)-3-(トリメチルシリル)プロパン-2-オール) について、農薬抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に供した試験成績は、動物体内運命(ラット、マウス)、植物体内運命(水稻、りんご、大豆)、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性(ラット、マウス)、亜急性毒性(ラット、マウス、イヌ)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性併合(ラット)、発がん性(マウス)、2 世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット、ウサギ)、遺伝毒性試験等である。

試験結果から、シメコナゾール投与により主に肝臓に影響が認められた。遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、ラット及びマウスで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。また、催奇形性については、2 世代繁殖試験においてラットの児動物に腎盂拡張が認められたが、この異常には閾値が存在し、閾値未満の用量であれば奇形は発生しないと考えられた。

各試験の無毒性量の最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.85 mg/kg 体重/日であったので、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0085 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量 (ADI) と設定した。

## ・評価対象農薬の概要

### 1. 用途

殺菌剤

### 2. 有効成分の一般名

和名：シメコナゾール

英名：Simeconazole (ISO名)

### 3. 化学名

IUPAC

和名：(RS)-2-(4-フルオロフェニル)-1-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-3-(トリメチルシリル)プロパン-2-オール

英名：(RS)-2-(4-fluorophenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(trimethylsilyl) propan-2-ol

CAS (No.149508-90-7)

和名：α-(4-フルオロフェニル)-α-[(トリメチルシリル)メチル]-1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール

英名：α-(4-fluorophenyl)-α-[(trimethylsilyl)methyl]-1*H*-1,2,4-triazole-1-ethanol


### 4. 分子式

C<sub>14</sub>H<sub>20</sub>FN<sub>3</sub>OSi

### 5. 分子量

293.41

### 6. 構造式



原体中組成  $R:S=1:1$

### 7. 開発の経緯

シメコナゾールは、三共アグロ株式会社により開発されたトリアゾール系殺菌剤である。作用機構は、菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合成の阻害であり、ラノステロールのC14位脱メチル化を阻害する。我が国ではおうとう、りんご、大豆等に農薬登録されている。諸外国では韓国においてきゅうり、ぶどう等に農薬登録されている。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準値が設定されている。

## ・毒性等に関する科学的知見

農薬抄録(2006年)を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した(参照2)。

各種運命試験( . 1 ~ 4 )は、シメコナゾールのトリアゾールの 3,5 位の炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの( tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾール)、フェニル環部分の炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの( phe- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾール)及び代謝物 I または III のトリアゾールの 3,5 位の炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの( tri- $^{14}\text{C}$ -代謝物 I または III)を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合シメコナゾールに換算した。代謝物/分解物等略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

### 1 . 動物体内運命試験

#### ( 1 ) ラットにおける動物体内運命試験

##### 薬物動態

F344 ラット(一群雌雄各 6 匹)に、tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾールを 5 mg/kg 体重(低用量)及び 70 mg/kg 体重(高用量)の用量で単回経口投与し、血中放射能濃度が測定された。

低用量投与群では、最高濃度到達時間( $T_{\max}$ )は雄で 8 時間、雌で 1 時間、最高濃度( $C_{\max}$ )は雄で 1.14  $\mu\text{g/g}$ 、雌で 0.58  $\mu\text{g/g}$ 、半減期( $T_{1/2}$ )は雄で 48 時間、雌で 26 時間であった。

高用量投与群では、 $T_{\max}$  は雄で 4 時間、雌で 2 時間、 $C_{\max}$  は雄で 10.4  $\mu\text{g/g}$ 、雌で 8.08  $\mu\text{g/g}$ 、 $T_{1/2}$  は雄で 86 時間、雌で 16 時間であった。(参照 2)

##### 排泄

F344 ラット(一群雌雄各 5 匹)に、tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾール及び phe- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、糞尿中の放射能濃度が測定された。

いずれの標識体投与群においても、投与後 72 時間に総投与放射能(TAR)の大部分(82.6~94.4%)が糞尿中に排泄され、尿中排泄量は 49.9~57%TAR、糞中排泄量は 27.9~41.9%TAR であった。呼気中への排泄は予備試験において殆ど認められなかった。

胆管カニューレを挿入した F344 ラット(一群雌雄各 3 匹)に、tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、尿、糞及び胆汁中排泄量が測定された。投与後 24 時間に雄では 70.7%TAR が、雌では 57.3%TAR が胆汁中に排泄された。尿中への排泄量は雄で 4.9%TAR、雌で 13.9%TAR であり、糞中には殆ど排泄されなかった。雌雄とも胆汁排泄が主要な排泄経路であった。(参照 2)

##### 体内分布

F344 ラット(一群雌雄各 3 匹)に、tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾールを 5 mg/kg 体重(低用量)及び 70 mg/kg 体重(高用量)の用量で単回経口投与し、雄では投与 6 時間後及び 48 時間後に、雌では投与 2 時間後及び 24 時間後に、組織及び臓器中放射能濃度が測定された。投与 168 時間後の測定は、tri- $^{14}\text{C}$ -シメコナゾール投与による排泄試験( 1 .( 1 ) ) に用いたラットで実施された。また、F344 ラット(一群雌雄各 5 匹)に、phe- $^{14}\text{C}$ -シメ

コナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、投与 168 時間後の組織及び臓器中放射能濃度が測定された。

低用量投与群では、投与 6 時間後の雄において肝臓の放射能濃度が最も高く(12.6 µg/g)、次いで副腎、腎臓であった。雌では投与 2 時間後の肝臓で最も高く(11.4 µg/g)、次いで腹腔内脂肪、皮下脂肪、副腎、腎臓であった。高用量投与群では、放射能は脂肪に比較的多く分布し、時間の経過とともに速やかに減少した。いずれの標識体投与群においても、投与 168 時間後ではほとんどの組織で少量の放射能しか検出されなかったが、雄の組織中放射能濃度は雌に比して高かった。(参照 2)

#### 代謝物同定・定量

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与による排泄試験(1.(1))に用いたラットの尿、糞及び胆汁、体内分布試験(1.(1))に用いたラットの血漿及び肝臓を試料として、代謝物の同定及び定量が行われた。また、F344 ラット(一群雌雄各 5 匹)に、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、糞尿中の代謝物の同定及び定量が行われた。

ラットの糞尿中における代謝物の種類には投与量による顕著な差はみられなかった。代謝物の種類に性差はみられなかったが、その量比は異なっていた。いずれの標識体投与群においても、尿中の主要代謝物は雄では VIII で、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与群では 12.9~16.8% TAR、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与群では 21.6% TAR 検出された。その他にも多くの代謝物(V のグルクロン酸抱合体、III のグルクロン酸抱合体、IX、III の硫酸抱合体、VII、V+VI、IV、III)が検出されたが、いずれも 10% TAR 以下であった。但し、代謝物 IX は tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与群の尿中でのみ認められた。雌の尿中主要代謝物は III の硫酸抱合体でいずれの投与群においても 30% TAR 以上検出された。糞中では、尿中で検出された代謝物がいずれも少量検出された。雌の糞中の主要代謝物は III の硫酸抱合体で、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与群では 31.6~34.9% TAR、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与群では 26.6% TAR 検出された。糞中に親化合物は検出されず、シメコナゾールは消化管から完全に吸収されたと考えられた。

血漿中の主要代謝物は雄では V 及び IV で、それぞれ血漿中放射能の 17.6%及び 50% 検出された。雌では親化合物が 48.5%を占め、主要代謝物として III の硫酸抱合体が 23.5% 検出された。他の代謝物は糞尿中で検出されたものと同種であった。

肝臓中の主要代謝物は雄では IV で、肝臓中放射能の 26.7%検出された。雌では III の硫酸抱合体が肝臓中放射能の 59.1%を占め、次いで親化合物が 28.2%検出された。他には糞尿中と同様の代謝物が少量検出された。

胆汁中の主要代謝物は雄では III のグルクロン酸抱合体で、投与後 24 時間に 56.5% TAR 検出され、雌では III のグルクロン酸抱合体と硫酸抱合体で、投与後 24 時間にそれぞれ 35.6% TAR 及び 16.6% TAR 検出された。

シメコナゾールはラット体内で III へと酸化され、III は硫酸抱合やグルクロン酸抱合を受け、さらに IV や VIII へと酸化されたと考えられた。また、胃液のような酸性条件下では、I へ容易に分解することが認められており、消化管内において親化合物の一部が I へ変化し、続いて V へと代謝され、VI へと酸化される経路及びグルクロン酸抱合を受け

る経路が示された。(参照 2)

### (2) ラット肝を用いた *in vitro* 代謝試験

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール、tri-<sup>14</sup>C-代謝物 I または tri-<sup>14</sup>C-代謝物 III を雄ラットの肝 9000g 上清に NADPH とともに加えて反応させ、代謝物を精査した。また、tri-<sup>14</sup>C-代謝物 III を雌雄ラットの肝ミクロソームに NADPH とともに加えて反応させ、生成する代謝物の精査を行った。

ラット肝 9000g 上清を用いた代謝試験では、NADPH 依存的な酸化的代謝によって、代謝物 III、IV、V、VI、VII が生じた。代謝物 III が反応の最も早い時期に生じたことから、ラットの体内に取り込まれたシメコナゾールは、酸化により代謝物 III に代謝された後、酸化代または抱合代を受けると推定された。

代謝物 III の *in vitro* 代謝試験では、生成する代謝物は親化合物の場合と同様であり、シメコナゾールの代謝が代謝物 III を経由していることが認められた。(参照 2)

### (3) マウスにおける動物体内運命試験

#### 薬物動態

ICR マウス(一群雌雄各 6 匹)に、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 5 mg/kg 体重(低用量)の用量で単回経口投与し、血中放射能濃度が測定された。T<sub>max</sub> は雌雄とも 2 時間、C<sub>max</sub> は雄で 1.28 μg/g、雌で 1.70 μg/g、T<sub>1/2</sub> は雄で 13 時間、雌で 9 時間であった。

#### 体内分布

ICR マウス(一群雌雄各 3 匹)に、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、雄では投与 2 時間後及び 13 時間後に、雌では投与 2 時間後及び 9 時間後に、組織及び臓器中の放射能濃度が測定された。投与 168 時間後の測定は、排泄試験(1.(3))に用いたマウスで実施された。

投与 2 時間後の小腸内容物で放射能濃度が最も高く(雄で 222 μg/g、雌で 99 μg/g)、次いで胃腸管、肝臓、腹腔内脂肪で比較的高かった。雄では投与 13 時間後、雌では投与 9 時間後に、盲腸またはその内容物を除く全ての組織で速やかに放射能は減少した。投与 168 時間後では、雌雄とも肝臓中放射能が最も高かった(雄で 0.487 μg/g、雌で 0.518 μg/g)。

#### 排泄

ICR マウス(一群雌雄各 5 匹)に、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 5 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、糞尿中の放射能濃度が測定された。投与後 48 時間に 90% TAR 以上が糞尿中に排泄され、尿中排泄量は 61.4~63.3% TAR、糞中排泄量は 24.3~28.7% TAR であった。

#### 代謝物同定・定量

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール投与による排泄試験(1.(3))に用いたマウスの糞及び尿、ならびに体内分布試験(1.(3))に用いたマウスの血漿、肝臓、腎臓、及び胆

汁を試料として、代謝物の同定及び定量が行われた。

尿中の主要代謝物は III のグルクロン酸抱合体で、雄では 20.7%TAR、雌では 21.5%TAR を占めた。その他に雄では代謝物 VIII が 17.9%TAR、10%TAR 以下の代謝物として IV、IX、VII、III、V のグルクロン酸抱合体及び親化合物が同定され、雌では代謝物 VIII が 15.2%TAR、IV が 11.5%TAR、10%TAR 以下の代謝物として IX、VII、V のグルクロン酸抱合体、III、III の硫酸抱合体が同定された。糞中でも尿中と同様の代謝物が認められたが、いずれも 10%TAR 以下であった。

雌雄マウスの血漿中主要代謝物は IV で、血漿中放射能の 26.7~38.0%検出され、親化合物が 21.1~24.1%認められた。その他に IX、III のグルクロン酸抱合体、III、VII が同定された。

雌雄マウスの肝臓及び腎臓中においても主要代謝物として IV と親化合物が検出されたが、いずれも 10%TAR 以下であった。

雌雄マウスの胆汁中の主要代謝物は III のグルクロン酸抱合体で、胆汁中放射能の 89.6~92.0%を占めた。その他に少量の代謝物として IV、VII、IX 及び親化合物が同定され、雌では III も認められた。(参照 2)

## 2. 植物体内運命試験

### (1) 水稲

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール及び phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 900 g ai/ha の用量で、水稲(品種: 日本晴)の幼苗を移植したポットの田面水に処理し、植物体内運命試験が実施された。試料は、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 15、30 及び 120 日後(収穫期)に、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 120 日後に稲体を採取した。また、各処理区とも処理 3 時間、1、3、6、15 日後に田面水を、処理 120 日後に土壌を採取した。

いずれの標識体処理区においても、田面水中放射能濃度は急速に減少し、処理 15 日後では総処理放射能(TAR)の 1.0%以下まで減少した。

稲体における放射能は、処理 30 日後の茎葉部で 7.1~13.9%TAR であった。収穫期の稲わら中の放射能は 13.9~23.8%TAR であったが、玄米では<0.1~0.2%TAR、籾殻では 0.1%TAR と少なかった。

処理 120 日後の稲わらでは、主要代謝物として III の糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)及び親化合物がそれぞれ 4.7~8.8%TAR 及び 2.5~3.9%TAR 検出された。玄米中の放射能は極性代謝物からなり、X 及び XI が同定されたが、0.1%TAR 未満と僅かであった。籾殻中の放射能も多くの代謝物から構成されていたが、生成量は僅かであった。(参照 2)

### (2) りんご

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール及び phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 600 g ai/ha の用量で、りんご(品種: ふじ)の果実及び葉に塗布し、植物体内運命試験が実施された。試料は、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 0、3、7、15 及び 45 日後(収穫期)に、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 0 及び 45 日後に果実及び葉を採取した。

いずれの標識体処理区においても、果実及び葉からの放射能の消失は速やかで、収穫

期の放射能は、果実で 15.8~18.0%TAR、葉で 15.7~18.2%TAR であった。

収穫期の果実では、親化合物が 5.52~6.75%TAR 検出された。主な代謝物として III の糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)が 2.49~3.31%TAR、代謝物 V が 1.51~1.74%TAR、その他に代謝物 I、II 及び III が 1%TAR 未満検出された。また微量であるが代謝物 IV 及び IX も同定された。

収穫期の葉では、親化合物が 9.42~9.63%TAR 検出され、主な代謝物として III の糖抱合体(モノグルコシド)が 3.43~4.27%TAR 検出された。その他にも果実と同様の代謝物が同定されたが、1%TAR 未満であった。

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールをりんご(品種:ふじ)の葉に塗布し、移行性試験が実施された。試料は、処理 0、3、7、14 及び 28 日後に処理葉を、処理 3、7、14 及び 28 日後に無処理葉を採取し、処理 28 日後には無処理果実も採取した。その結果、処理放射能は処理葉から速やかに消失し、処理葉から無処理葉または果実への移行は認められなかった。(参照 2)

### (3) 大豆

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール及び phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 160 g ai/ha の 2 回散布に相当する用量で、大豆(品種:タマホマレ)のさや及び葉に塗布し、植物体内運命試験が実施された。試料は、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 0、3、7、15 及び 37 日後(収穫期)にさや及び葉を採取し、37 日後には根も採取した。phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理区では、処理 0 及び 37 日後にさや及び葉を採取し、37 日後には根も採取した。

収穫期におけるさや全体の放射能は、39.3~48.2%TAR であった。さや表面に付着している放射能は経時的に減少し、収穫期における放射能は 0.84~1.70%TAR であったのに対して、さや内部に取り込まれた放射能は増加し、35.3~42.1%TAR であった。豆へ移行した放射能は経時的に増加し、収穫期における放射能は 2.35~5.22%TAR であった。収穫期における葉全体の放射能は 27.7~29.9%TAR であり、葉表面の放射能は 0.65~1.59%TAR であった。さや及び葉とも、標識位置による消失、移行性に大差は認められなかった。

さや処理 37 日後の親化合物の残留量は、さや及び豆でそれぞれ 7.38~7.85% TAR 及び 0.95~1.73% TAR であり、半減期は 4.6 日であった。主要代謝物として III の糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)が、さやで 9.36~14.1%TAR、豆で 0.74~1.01%TAR 検出された。その他に代謝物 III、X、XI が少量認められた。

葉処理 37 日後の葉中では、親化合物の残留量は 1.09~2.69% TAR であり、半減期は 2.4 日であった。主要代謝物として III の糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)が収穫期の葉で 18.7~21.7%TAR 検出された。

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 160 g ai/ha の 2 回散布に相当する用量で、大豆(品種:タマホマレ)の葉に塗布し、移行性試験が実施された。試料は、処理 0、3、7 及び 14 日後に処理葉を、処理 3、7 及び 14 日後に無処理葉を採取し、処理 14 日後には無処理未成熟さやも採取した。その結果、処理放射能は処理葉から速やかに消失し、処理葉から無処理葉またはさやへの移行は認められなかった。(参照 2)

### 3 . 土壤中運命試験

#### ( 1 ) 好氣的土壤中運命試験

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 2 種類の畑地土壤( 埴壤土：岩手、軽埴土：石川 ) に 3 mg/kg 土壤 ( 乾土 ) の用量で添加し、25 °C の暗所で最長 120 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

両土壤における二酸化炭素の発生量は少なく、処理 120 日後で 0.23~0.80% TAR であった。非抽出放射能は時間の経過とともに増加し、処理 120 日後で 38.2~52.9% TAR であった。主要分解物は I、II 及び IX で、岩手土壤では処理 120 日後に最高値として分解物 I が 19.5% TAR、II が 2.00% TAR、IX が 4.58% TAR 検出された。石川土壤では処理 120 日後に分解物 IX が 27.7% TAR と最高値を示したが、分解物 I は処理 7 日後、II は処理 15 日後にそれぞれ最高値 73.2% TAR 及び 3.12% TAR を示した後漸減した。シメコナゾールの土壤中半減期は、岩手土壤で 59 日、石川土壤で 3.5 日であった。大部分の非抽出放射能はフミン画分に分布していた。また、両土壤とも R 体及び S 体の存在比はおよそ 1:1 であり、土壤中での分解速度に差は認められなかった。( 参照 2 )

#### ( 2 ) 湛水土壤中運命試験

水田土壤 ( 埴壤土：岩手 ) に、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 1.2 mg/kg 土壤 ( 乾土 ) 及び phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 1.3 mg/kg 土壤 ( 乾土 ) の用量で添加し、25 °C の暗所で最長 360 日間インキュベートして、湛水土壤中運命試験が実施された。また、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを滅菌した水田土壤 ( 同上 ) に 1.2 mg/kg 土壤 ( 乾土 ) の用量で添加し、滅菌条件下での湛水土壤中運命試験も実施された。

tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理した非滅菌土壤では、二酸化炭素の発生量は時間の経過とともに増加したが、その量は処理 360 日後で 1.01% TAR と少なかった。phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理では、二酸化炭素の発生量はゆるやかに増加し、処理 360 日後には 23.0% TAR に達した。いずれの標識体処理においても主要分解物は I で、処理 60 日後に最高値として 36% TAR 以上検出され、少量の分解物として II が 180 日後に 2.22% TAR 検出された。その他に tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理では分解物 IX が時間の経過とともに増加し、処理 360 日後に 13.1% TAR 検出された。滅菌土壤では分解物 IX は検出されず、分解物 I が 120 日後に最大 25.6% TAR、分解物 II が少量 ( 0.67% TAR ) 検出された。

シメコナゾールの水田土壤における半減期は、非滅菌土壤の tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理で 19 日、phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾール処理で 20 日、滅菌土壤で 93 日であった。大部分の非抽出放射能はフミン画分に分布していた。また、両土壤とも R 体及び S 体の存在比はおよそ 1:1 であり、土壤中での分解速度に差は認められなかった。( 参照 2 )

#### ( 3 ) 湛水土壤中運命試験

水田土壤 ( 軽埴土：石川 ) に、tri-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを 1.2 mg/kg 土壤 ( 乾土 ) の用量で添加し、25 °C の暗所で最長 360 日間インキュベートして、湛水土壤中運命試験が実施された。

二酸化炭素の発生量は時間の経過とともに増加したが、その量は処理 360 日後で 1.56 % TAR と少なかった。主要分解物は I で、処理 15 日後に最高値として 21.9% TAR

検出され、その後は量的に大きな変動はみられなかった。その他に分解物 IX が時間の経過とともに増加し、処理 360 日後に 7.5% TAR 検出され、分解物 II が少量(0.8% TAR 以下)検出された。シメコナゾールの水田土壌における半減期は 122 日であった。(参照 2)

#### (4) 土壌カラムリーチング試験

国内の 4 種類の水田土壌(埴壌土:滋賀、岩手及び岡山、軽埴土:石川)を用いて、 $\text{tri-}^{14}\text{C}$ -シメコナゾール 900 g ai/ha 相当を土壌表層に処理し、土壌カラムリーチング試験が実施された。

いずれの土壌においても、放射能は土壌表層のみで検出され、溶出液及び土壌下層では検出されなかった。土壌表層には親化合物が 76.2~92.5% TAR、分解物 I が 0.6~11.1% TAR 検出され、シメコナゾールの下方移行性は低いと考えられた。(参照 2)

#### (5) 土壌吸着試験

国内の 2 種類の水田土壌(軽埴土:石川、茨城)及び 2 種類の畑地土壌(微砂質埴壌土:茨城、砂質埴壌土:愛知)を用いて土壌吸着試験が実施された。

シメコナゾールの土壌における Freundlich の吸着係数  $K_{\text{ads}}$  は 3.19~28.4、有機炭素含有率により補正した吸着係数  $K_{\text{oc}}$  は 219~2330 であり、土壌吸着性が高いことが認められた。(参照 2)

### 4. 水中運命試験

#### (1) 加水分解試験

$\text{tri-}^{14}\text{C}$ -シメコナゾールを pH 4.0 の酢酸緩衝液に 0.97 mg/L の用量で添加し、 $25 \pm 1$  の暗所で最長 30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

シメコナゾールの減少は速やかで、処理 30 日後の残存率は 48.8% (0.47 mg/L) であった。分解物として I が認められ、処理 30 日後の分解物 I の生成量は 50.2% TAR (0.48 mg/L) であった。シメコナゾールの緩衝液中での推定半減期は 29.1 日であった。(参照 2)

#### (2) 加水分解試験

シメコナゾールを pH 4.0 (リン酸緩衝液)、pH 7.0 (リン酸緩衝液) 及び pH 9.0 (ホウ酸緩衝液) の各緩衝液に 28 mg/L の用量で添加し、pH 4.0 の緩衝液は 50、60 及び 70 で、それ以外は 50 で最長 120 時間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

pH 4.0 の緩衝液中での推定半減期は 22.9 日であった。pH 7.0 及び 9.0 の緩衝液中ではシメコナゾールの分解は認められなかった。(参照 2)

### （ 3 ）水中光分解試験

phe-<sup>14</sup>C-シメコナゾールを滅菌蒸留水及び自然水に 1.19 mg/L の用量で添加し、25 ± 2 でキセノンランプの 14 日間照射（光強度：99.5 W/m<sup>2</sup>、測定波長：300~700 nm）を行い、水中光分解試験が実施された。

滅菌蒸留水中ではシメコナゾールは安定で、分解は認められなかった。自然水中では、照射 14 日後で親化合物の残留量は 21.6% TAR であり、主要分解物として I が最大 15.9% TAR（照射 10 日後）検出された。シメコナゾールの照射区における推定半減期は 7.2 日であった。（参照 2）

## 5 . 土壌残留試験

湛水状態の沖積・埴壤土（埼玉）及び火山灰・軽壤土（熊本）、畑状態の火山灰・埴壤土（青森）及び洪積・埴壤土（福島）を用いて、シメコナゾール（親化合物）、分解物 I 及び分解物 IX を分析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。

推定半減期は表 1 に示されている。分解物 IX については、湛水状態では容器内及び圃場試験のいずれにおいても検出限界未満（<0.01mg/kg）であり、畑状態では圃場試験の 182 日後における 0.06 mg/kg が最高値であった。（参照 2）

表 1 土壌残留試験成績

試験	濃度 <sup>1)</sup>	土壌	推定半減期	
			シメコナゾール	親化合物 + 分解物 I
容器内試験	湛水状態	沖積・埴壤土	100 日	101 日
		火山灰・軽壤土	52 日	52 日
	畑状態	火山灰・埴壤土	1 日以内	45 日
		洪積・埴壤土	130 日	166 日
圃場試験	湛水状態 (2 回)	沖積・埴壤土	5 日	5 日
		火山灰・軽壤土	7 日	7 日
	畑状態 (3 回)	火山灰・埴壤土	26 日	80 日
		洪積・埴壤土	60 日	73 日

<sup>1)</sup> 容器内試験では原体、圃場試験では湛水状態で 1% 粒剤、畑状態で 20% 水和剤を使用。

## 6 . 作物残留試験

シメコナゾール、代謝物 III 及び代謝物 V を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 3 に示されている。シメコナゾールの最高値は、もも（果皮）を除くと、最終散布 7 日後に収穫した茶（荒茶）の 8.30 mg/kg であった。（参照 2）

## 7 . 一般薬理試験

マウス、ラット及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表 2 に示されている。マウス及びラットにおいて、致死量（マウスで 320 mg/kg 体重以上、ラットで 800 mg/kg 体重以上）の投与で、種々の抑制性の症状が行動系、神経系、自律神経系の項目全般にみられた。（参照 2）

表2 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	無作用量 (mg/kg 体重)	作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢神経系	一般状態 及び体重 (Irwin 法)	マウス	雄 3 雌 3	0, 20.5, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (腹腔内)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上 で抑毒性定状 320 mg/kg 体重で雄 1 例、800 mg/kg 体 重以上で全例死亡
	一般状態 及び体重 (Irwin 法)	ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (経口)	128	320	320 mg/kg 体重以上 で抑毒性定状 800 mg/kg 体重で3 例、2000 mg/kg 体 重で全例死亡
	体温	ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (経口)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上 で投与後 1 時間~1 日にかけて体温低下
	ヘキソバル ピタル 睡眠	マウス	雄 8	0, 0.21, 0.52, 1.31 0, 3.28, 8.19, 20.5, 51.2, 128, 320 (腹腔内)	0.52	1.31	1.31 mg/kg 体重以上 で睡眠時間延長
	ペンチレン テトラゾール 痙攣	マウス	雄 10	0, 8.19, 20.5, 51.2, 128, 320 (腹腔内)	20.5	51.2	痙攣発現時間延長、 320 mg/kg 体重で死 亡発現時間延長、強 直性痙攣及び死亡発 現率低下
呼吸循環器系	血圧 心拍数	ラット	雄 5	0, 128, 320, 800, 2000 (経口)	128	320	320 mg/kg 体重以上 で心拍数減少、 2000 mg/kg 体重で 血圧低下、800 mg/kg 体重で1 例、 2000 mg/kg 体重で 4 例死亡
自律神経系	瞳孔径	ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (経口)	800	2000	2000 mg/kg 体重で 投与 1 日後に瞳孔径 増加、2 日後に全例 死亡
消化器	小腸炭末 輸送能	マウス	雄 8	0, 20.5, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (腹腔内)	320	800	800 mg/kg 体重以上 で炭末輸送能抑制、 2000 mg/kg 体重で 2 例死亡
	摘出回腸	モルモ ット	雄 4	0, 10 <sup>8</sup> , 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>6</sup> , 10 <sup>5</sup> , 10 <sup>4</sup> g/mL	10 <sup>-6</sup> g/mL	10 <sup>-5</sup> g/mL	10 <sup>5</sup> g/mL 以上でア ゴニスト収縮
骨格筋	握力	ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2000 (経口)	320	800	800 mg/kg 体重以上 で握力低下
	横隔膜 神経筋	ラット	雄 4	0, 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>6</sup> , 10 <sup>5</sup> , 10 <sup>4</sup> g/mL	10 <sup>-5</sup> g/mL	10 <sup>-4</sup> g/mL	10 <sup>4</sup> g/mL で神経刺 激による収縮の抑制

血液	溶血 凝固	ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 0, 320, 800, 2000 (経口)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上 でPT 延長 2000 mg/kg 体重で APTT 延長
----	-------	-----	-----	--	------	-----	---

## 8. 急性毒性試験

シメコナゾールのラット及びマウスを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表3に示されている。また、シメコナゾールの原体混在物及び代謝物のICRマウスを用いた急性経口毒性試験が実施されており、結果は原体と同等もしくはより低毒性であった(表4)。(参照2)

表3 急性毒性試験概要(原体)

投与経路	動物種	LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	F344 ラット 雌雄各5匹	611	682	自発運動低下、よろめき歩行、 腹臥位、横臥位、うずくまり、 沈静、呼吸緩徐、流涙、昏睡
	ICR マウス 雌雄各5匹	1180	1020	自発運動低下、よろめき歩行、 腹臥位、横臥位、うずくまり、 沈静、呼吸緩徐、流涙、昏睡、 痙攣、削瘦
経皮	F344 ラット 雌雄各5匹	>5000	>5000	中毒症状はみられない
吸入	F344 ラット 雌雄各5匹	LC <sub>50</sub> (mg/L)		軽度の振戦、眼瞼閉鎖、眼周囲 被毛の汚れ、鼻吻部赤色付着物
		>5.17	>5.17	

表4 急性毒性試験概要(原体混在物及び代謝物)

原体混在物及び代謝物	LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
AST-200 (代謝物 I)	641	600	自発運動低下及び消失、よろめき 歩行、うずくまり姿勢、腹臥姿勢、 呼吸緩徐、昏睡、
AST-474 (代謝物 II)	1690	1300	自発運動低下及び消失、うずくま り姿勢、腹臥姿勢、呼吸緩徐、昏 睡、よろめき歩行
HMF-155 (代謝物 III)	>5000	>5000	自発運動低下、よろめき歩行、う ずくまり姿勢、呼吸緩徐
ATP-3118 (代謝物 V)	3280	2710	腹臥位、自発運動低下または消 失、体温低下
トリアゾリルL-アラニン (代謝物 X)	>5000	>5000	中毒症状はみられない
トリアゾリル酢酸 (代謝物 XI)	5000	6120	自発運動低下、よろめき歩行、う ずくまり姿勢、腹臥姿勢、呼吸緩 徐
ATP-2474	988	745	腹臥位、自発運動低下または消

(原体混在物)			失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
ARK-158 (原体混在物)	988	1090	腹臥位、円背位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
AST-199 (原体混在物)	1280	1540	腹臥位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行、筋力低下
AST-292 (原体混在物)	2950	2050	腹臥位、円背位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
AST-293 (原体混在物)	>5000	>5000	中毒症状はみられない

いずれの試験も雌雄各5匹で実施。

## 9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験、ならびに Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験(Maximization 法)が実施されており、結果はすべて陰性であった。

(参照2)

## 10. 亜急性毒性試験

### (1) 90日間亜急性毒性試験(ラット)

F344 ラット(一群雌雄各12匹)を用いた混餌(原体:0, 20, 100, 500, 2500 ppm)投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表5に示されている。

本試験において、500 ppm 以上投与群の雌雄に肝絶対・比重量<sup>1)</sup>増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも100 ppm(雄:5.92 mg/kg 体重/日、雌:6.43 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照2)

表5 ラット90日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少</li> <li>・血色素量、RBC、MCH 低下</li> <li>・MCHC、PLT 増加</li> <li>・GGT、BUN、Ca 増加</li> <li>・Glu、Cl 減少</li> <li>・脾比重量増加</li> <li>・肝腫大</li> <li>・小葉中心性肝細胞肥大、小葉周辺性肝細胞脂肪化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Ht、RBC、MCV 低下</li> <li>・MCHC、PLT 増加</li> <li>・GGT、BUN、Ca 増加</li> <li>・TG、Glu、Cl 減少</li> <li>・腎絶対重量増加</li> <li>・脾絶対・比重量増加</li> <li>・肝腫大</li> <li>・小葉中心性肝細胞肥大、小葉周辺性肝細胞脂肪化</li> </ul>
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Ht、MCV 低下</li> <li>・TG 減少</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・腎比重量増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・腎比重量増加</li> </ul>

<sup>1)</sup> 体重比重量を比重量という(以下同じ)。

100 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし
------------	--------	--------

## (2) 90日間亜急性毒性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各12匹)を用いた混餌(原体:0, 20, 100, 500, 2500 ppm)投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表6に示されている。

本試験において、雄では100 ppm以上投与群で、雌では500 ppm以上投与群で小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化等が認められたので、無毒性量は雄で20 ppm(2.15 mg/kg 体重/日)、雌で100 ppm(13.6 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照2)

表6 マウス90日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・ALP、AST 増加</li> <li>・A/G 比、TG 減少</li> <li>・肝細胞単細胞壊死</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・肝細胞単細胞壊死</li> <li>・巣状肝細胞壊死</li> <li>・肝の小肉芽腫</li> </ul>
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ALT 増加</li> <li>・TP、Alb、T.Chol 減少</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・肝腫大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ALT、AST 増加</li> <li>・Alb、A/G 比、T.Chol 減少</li> <li>・TP 減少(500 ppmのみ)</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・肝腫大</li> <li>・小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化</li> </ul>
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化</li> </ul>	100 ppm 以下 毒性所見なし
20 ppm	毒性所見なし	

## (3) 90日間亜急性毒性試験(イヌ)

ビーグル犬(一群雌雄各4匹)を用いた混餌(原体:0, 40, 200, 1000 ppm)投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、1000 ppm投与群の雌雄に、ALP活性の上昇、肝絶対・比重量増加、び慢性肝細胞肥大が認められたので、無毒性量は雌雄とも200 ppm(雄:5.08 mg/kg 体重/日、雌:5.51 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照2)

## 1.1 慢性毒性試験及び発がん性試験

## (1) 1年間慢性毒性試験(イヌ)

ビーグル犬(一群雌雄各4匹)を用いた混餌(原体:0, 40, 200, 1000 ppm)投与による1年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表7に示されている。

本試験において、200 ppm以上投与群の雌雄にび慢性肝細胞肥大が認められたので、無毒性量は雌雄とも40 ppm(雄:0.96 mg/kg 体重/日、雌:0.97 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照2)

表7 イヌ1年間慢性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ALP 活性上昇</li> <li>・TG、GGT 増加</li> <li>・肝絶対重量増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ALP 活性上昇</li> <li>・Alb 減少、Glob 増加、A/G 比低下</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> </ul>
200 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・び慢性肝細胞肥大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・び慢性肝細胞肥大</li> </ul>
40 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

## (2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)

F344 ラット(一群雌雄各85匹(主群50匹、衛星群35匹))を用いた混餌(原体:0, 25, 200, 1600 ppm)投与による2年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見(腫瘍性病変以外)は表8に、精巣及び肝臓における腫瘍性病変の発生頻度は表9に示されている。

1600 ppm 投与群の雄において、精巣間細胞過形成及び肝細胞腺腫の発生頻度が有意に増加した。精巣間細胞過形成の増加については、対応する腫瘍である間細胞腫の発生頻度は1600 ppm 投与群ではむしろ少なく、検体投与による増殖性病変の誘発を示すものではないと考えられた。肝細胞腺腫に関しては、同群で変異肝細胞巣(好酸性細胞)も有意に増加しており、検体投与に関連した変化と考えられた。

本試験において、200 ppm 以上投与群の雌雄に近位尿細管褐色色素沈着等が認められたので、無毒性量は雌雄とも25 ppm(雄:0.85 mg/kg 体重/日、雌:1.10 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照2)

表8 ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験で認められた毒性所見  
(腫瘍性病変以外)

投与群	雄	雌
1600 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少傾向、食餌効率低下</li> <li>・MCV 減少、MCHC 増加、Ht, RBC 減少、PLT 増加</li> <li>・GGT, BUN 増加、TG, Cl 減少</li> <li>・TP, Alb, A/G 比増加、T.Chol 減少</li> <li>・肝絶対・比重量、腎比重量、脾比重量増加</li> <li>・肝臓の暗調化、腫大、び慢性肝細胞脂肪化、小葉中心性肝細胞肥大</li> <li>・副腎の束状帯細胞空胞化</li> <li>・精巣間細胞過形成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少傾向</li> <li>・MCV 減少、MCHC 増加、Ht, RBC 減少、PLT 増加</li> <li>・GGT, BUN 増加、TG, Cl 減少</li> <li>・Alb, A/G 比減少、T.Chol 増加</li> <li>・肝絶対・比重量、腎比重量、脾比重量増加</li> <li>・肝臓の暗調化、腫大、斑点、小葉中心性肝細胞肥大、小肉芽腫</li> </ul>
200 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腎臓の近位尿細管褐色色素沈着</li> <li>・肝臓の変異肝細胞巣(好酸性細胞)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腎臓の近位尿細管褐色色素沈着</li> <li>・肝臓のび慢性肝細胞脂肪化</li> </ul>
25 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

表9 精巣及び肝臓における腫瘍性病変の発生頻度

所見		投与量 (ppm)			
		0	25	200	1600
精巣間細胞腫	雄	41/80	45/80	42/80	38/80
肝細胞腺腫	雄	0/80	1/80	1/80	8/80**
肝細胞癌	雄	0/80	0/80	1/80	2/80

\*\*：p&lt;0.01

## (3) 18カ月間発がん性試験(マウス)

ICRマウス(一群雌雄各52匹)を用いた混餌(原体:0, 25, 100, 400 ppm)投与による18カ月間発がん性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見(腫瘍性病変以外)は表10に、肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度は表11に示されている。

400 ppm投与群の雌雄及び100 ppm投与群の雄で、肝細胞腺腫の発生頻度が有意に増加し、肝細胞癌の発生頻度もやや増加する傾向にあった。さらに、雄では肝細胞腺腫の初発時期の早期化傾向も認められ、本検体はマウスの肝臓に対して催腫瘍性を有するものと考えられた。

本試験において、100 ppm以上投与群の雄に肝細胞腺腫の増加、400 ppm投与群の雌にび慢性肝細胞脂肪化等が認められたので、無毒性量は雄で25 ppm(2.54 mg/kg体重/日)、雌で100 ppm(9.84 mg/kg体重/日)と考えられた。(参照2)

表10 マウス18カ月間発がん性試験で認められた毒性所見(腫瘍性病変以外)

投与群	雄	雌
400 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・食餌効率低下</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・肝臓の斑点、腫瘤増加、び慢性肝細胞脂肪化、クッパー細胞褐色色素沈着、肝細胞単細胞壊死、変異肝細胞巣(好酸性細胞、明細胞)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・食餌効率低下</li> <li>・肝絶対・比重量増加</li> <li>・肝臓の小葉像明瞭、腫大、腫瘤増加、び慢性肝細胞脂肪化、肝細胞単細胞壊死、変異肝細胞巣(好酸性細胞)</li> </ul>
100 ppm以下	毒性所見なし	毒性所見なし

表11 肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度

所見		投与量 (ppm)			
		0	25	100	400
肝細胞腺腫	雄	12/52	10/52	22/52**	26/52**
	雌	1/52	1/52	1/52	12/52**
肝細胞癌	雄	2/52	3/52	3/52	7/52
	雌	0/52	0/52	1/51	3/52

\*\*：p&lt;0.01

## 12. 生殖発生毒性試験

### (1) 2世代繁殖試験(ラット)

SD ラット(一群雌雄各 24 匹)を用いた混餌(原体:0, 20, 130, 800 ppm)投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 12 に示されている。

800 ppm 投与群の親動物では、F<sub>1</sub> 雄の精巣上体比重量及び F<sub>1</sub> 雌の腎絶対及び比重量の増加もみられたが、病理組織学的変化は認められず、投与とは関連のない変化と考えられた。

本試験において、親動物では 130 ppm 以上投与群で P 雌に卵巣重量増加、F<sub>1</sub> 雄に包皮分離日齢早期化、F<sub>1</sub> 雌に膈開口日齢遅延及び下垂体重量増加が認められ、児動物では 800 ppm 投与群で生存率(4日)低下等が認められたので、無毒性量は、親動物の一般毒性及び性成熟を含む繁殖能に対して 20 ppm(P 雄:1.25 mg/kg 体重/日、P 雌:1.42 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雄:1.48 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雌:1.63 mg/kg 体重/日) 児動物では 130 ppm(P 雄:8.25 mg/kg 体重/日、P 雌:9.00 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雄:9.71 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雌:10.5 mg/kg 体重/日)と考えられた。(参照 2)

表 12 ラット 2 世代繁殖試験で認められた毒性所見

投与群	親:P、児:F <sub>1</sub>		親:F <sub>1</sub> 、児:F <sub>2</sub>		
	雄	雌	雄	雌	
親動物	800 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少(一時的)</li> <li>・肝比重量増加</li> <li>・肝臓の血管剛化、小葉中心性肝細胞肥大、びまん性肝細胞脂肪化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加量増加(哺育期間中)</li> <li>・肝、副腎絶対・比重量増加、卵巣絶対重量増加</li> <li>・肝臓の血管剛化、腫大、小葉中心性肝細胞肥大</li> <li>・副腎末状層肥厚</li> <li>・子宮大型着床痕、卵巣大型黄体、子宮卵巣線維細胞大型集簇</li> <li>・出産率低下(分娩時死亡4例、死産2例)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加抑制</li> <li>・小葉中心性肝細胞肥大、びまん性肝細胞脂肪化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重増加量増加(哺育期間中)</li> <li>・肝、副腎及び卵巣絶対・比重量増加</li> <li>・肝臓の血管剛化、腫大、小葉中心性肝細胞肥大</li> <li>・副腎末状層肥厚</li> <li>・子宮大型着床痕、卵巣大型黄体、子宮卵巣線維細胞大型集簇</li> </ul>
	130 ppm 以上	130 ppm 以下 毒性所見なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・摂餌量減少(一時的)</li> <li>・卵巣比重量増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・包皮分離日齢早期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下垂体絶対重量増加</li> <li>・膈開口日齢遅延</li> </ul>
	20 ppm		毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	800 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生存率(4日)低下</li> <li>・腎盂拡張</li> <li>・上顎切歯萌出日齢遅延</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・生存率(4日)低下</li> <li>・腎盂拡張</li> <li>・上顎切歯萌出日齢遅延</li> </ul>	
	130 ppm 以下	毒性所見なし		毒性所見なし	

## （２）発生毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6~15 日に強制経口（原体：0, 5, 20, 100 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

100 mg/kg 体重/日投与群で、母動物に体重増加抑制、摂餌量の減少及び補正体重<sup>2)</sup>の低下がみられた。同群の胎児では、胚・胎児死亡率が 11%とやや高く、統計学的に有意ではなかったが、背景データの範囲を超えていた。また、胎盤重量の増加、骨格変異（頸肋及び腰肋）の出現頻度及び変異胎児数の増加が認められた。

本試験において、100 mg/kg 体重/日投与群で母動物に体重増加抑制等が、胎児に死亡率の上昇等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児とも 20 mg/kg 体重/日と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2）

## （３）発生毒性試験（ウサギ）

日本白色種ウサギ（一群雌 17~18 匹）の妊娠 6~18 日に強制経口（原体：0, 5, 30, 150 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

150 mg/kg 体重/日投与群で、母動物に軽度の体重増加抑制がみられ、統計学的な有意差はみられなかったが、投与期間中継続的に認められたことから、投与に関連した変化と考えられた。胎児に対しては、いずれの投与群においても投与の影響は認められなかった。

本試験において、150 mg/kg 体重/日投与群で母動物に体重増加抑制がみられ、胎児にはいずれの投与群でも影響が認められなかったので、無毒性量は母動物で 30 mg/kg 体重/日、胎児で 150 mg/kg 体重/日と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2）

## 13．遺伝毒性試験

シメコナゾール（原体）の各種遺伝毒性試験が実施されており、試験結果は全て陰性であった（表 13）。

シメコナゾールの原体混在物及び代謝物についても、細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。試験結果は表 14 に示されている。原体混在物 ARK-158 は、TA98 株においてのみ代謝活性化系非存在下で弱い復帰突然変異誘発性を示したが、菌株の生育阻害が認められる直前の用量のみで対照群の 2 倍程度の反応であること、代謝活性化系の導入により陰性となること、含有量が 0.2%以下の原体混在物であり暴露量は非常に低いと想定されることから、生体にとって特段問題となるものではないものと考えられた。その他の原体混在物及び代謝物の試験結果は全て陰性であった。（参照 2）

表 13 遺伝毒性試験概要（原体）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> H-17、M-45 株	100~5000 µg/ディスク 1~200 µg/ディスク 20~150 µg/ディスク (+/-S9)	陰性

<sup>2)</sup> 妊娠 20 日の体重から妊娠子宮重量を減じた重量

試験	対象	処理濃度・投与量	結果	
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA98, TA100, TA1535, TA1537株	7.8~500 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
		<i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	78~5000 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター肺 由来培養細胞 (CHL)	10~160 µg/mL (24時間処理、-S9) 5~80 µg/mL (48時間処理、-S9) 15.6~250 µg/mL (6時間処理、+S9)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験	ICR マウス	125~500 mg/kg 体重 (単回強制経口投与)	陰性

注) +/-S9: 代謝活性化系存在下及び非存在下

表 14 遺伝毒性試験概要 (原体混在物及び代謝物)

原体混在物及び代謝物	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
AST-200 (代謝物 I)	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	156~5000 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
AST-474 (代謝物 II)	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	20~5000 µg/プレート 313~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
HMF-155 (代謝物 III)	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA1537 株	100~5000 µg/プレート 156~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		<i>S. typhimurium</i> TA98 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	100~5000 µg/プレート(-S9) 200~5000 µg/プレート(+S9) 156~5000 µg/プレート(+/-S9) 200~5000 µg/プレート 313~5000 µg/プレート (+/-S9)	
ATP-3118 (代謝物 V)	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	21~5000 µg/プレート 156~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
トリアゾリルL- アラニン (代謝物 X)	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	200~5000 µg/プレート 313~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

原体混在物 及び代謝物	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
トリアゾリル 酢酸 (代謝物 XI)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	20~5000 µg/プレート 313~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
ATP-2474 (原体混在物)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	62~5000 µg/プレート 313~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
ARK-158 (原体混在物)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	21~5000 µg/プレート 156~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		<i>S. typhimurium</i> TA98 株	21~5000 µg/プレート 500~4000 µg/プレート (+/-S9)	
	染色体 異常試験	チャイニーズハム スター肺由来培養 細胞 (CHL)	254~2030 µg/mL <sup>1)</sup> (+/-S9)	陰性
AST-199 (原体混在物)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	18.5~4500 µg/プレート 125~4000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
AST-292 (原体混在物)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	7.4~1800 µg/プレート 56.3~1800 µg/プレート (+/-S9)	陰性
AST-293 (原体混在物)	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> TA100, TA1535, TA98, TA1537 株 <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i> 株	21~5000 µg/プレート 156~5000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

注) +/-S9: 代謝活性化系存在下及び非存在下

<sup>1)</sup>: 2030 µg/mL ではすべての系列で細胞毒性のため観察ができなかった。

#### 14. その他の試験

##### (1) 肝腫瘍発現機序検討試験

ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験(11.(2))でみられた肝細胞腫瘍の発生機序を解明するために、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能について検討された。

雄 F344 ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験

雄の F344 ラット(一群 12 匹)を用いた混餌(原体: 0, 25, 200, 1600 ppm)投与

による 7 日間肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が実施された。

1600 ppm 投与群で肝絶対・比重量増加、肝腫大及びび慢性肝細胞肥大が認められ、ミクロソーム蛋白量、チトクローム P-450 量及び PROD 活性が有意に増加した。また、CYP2B1 及び CYP3A2 含量が有意に増加し、CYP1A2 及び CYP4A1 含量が有意に減少した。200 ppm 投与群においても PROD 活性の有意な増加がみられた。これらの変化は PB による酵素誘導パターンと類似しており、シメコナゾールの肝薬物代謝酵素誘導能が確認された。肝細胞増殖活性検査では、1600 ppm 投与群の投与 3 日後において PCNA 標識率の有意な増加がみられたが、投与 7 日後では有意差はみられなかった。一般に、非変異原性肝発がん物質による細胞増殖効果は、投与開始後 2~3 日でピークに達し、その後は投与を継続しても消失することが知られており、本試験においても同様な傾向が認められた。

本試験において、200 ppm 以上の投与群に PROD 活性の有意な増加が認められたので、無影響量は 25 ppm (1.5 mg/kg 体重/日)であり、肝薬物代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用に閾値があると考えられた。(抄録 p172~175)(参照 2)

#### 雌 F344 ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験

前述(14.(1))の追加試験として、雌の F344 ラット(一群 12 匹)を用いた混餌(原体:0, 25, 200, 1600 ppm)投与による 7 日間肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が実施された。

1600 ppm 投与群で肝絶対・比重量増加、肝腫大及びび慢性肝細胞肥大が認められ、ミクロソーム蛋白量、チトクローム P-450 量及び PROD 活性が有意に増加した。また、CYP2B1、CYP3A2 及び CYP4A1 含量が有意に増加した。200 ppm 投与群では CYP1A2、CYP2B1 及び CYP3A2 含量の有意な増加が認められた。これらの変化は PB による酵素誘導パターンと類似しており、シメコナゾールの肝薬物代謝酵素誘導能が確認された。肝細胞増殖活性検査では、200 ppm 以上の投与群の投与 3 日後において PCNA 標識率の有意な増加がみられたが、投与 7 日後では有意差はみられず、雄と同様であった。

本試験において、200 ppm 以上の投与群で CYP2B1 及び CYP3A2 含量の有意な増加が認められたので、無影響量は 25 ppm (1.5 mg/kg 体重/日)であり、肝薬物代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用には閾値があることが、雄ラットの場合と同様に示唆された。(参照 2)

#### 変異肝細胞巢の細胞増殖活性検査

F344 ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験(11.(2))における対照群及び 1600 ppm 投与群の投与 52、78 及び 104 週後の計画殺動物、各群雌雄 10 匹から得られた肝組織標本を用いて、肝発がん過程で観察された変異肝細胞巢、特に好酸性及び好塩基性細胞巢の細胞増殖活性について比較検討された。

1600 ppm 投与群では、雄の好酸性変異肝細胞巢の PCNA 標識率は対照群に比して高値を示す傾向にあり、本剤の細胞分裂促進効果に起因する変化である可能性が示唆された。雌では変化はみられなかった。また、雌雄とも好酸性及び好塩基性細胞巢の

両細胞巢間における細胞増殖活性の差異は認められなかった。(参照 2)

以上のことから、F344 ラットにおける肝細胞腫瘍の発生頻度の増加には、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖活性の増加が関連していると考えられ、これらの作用には閾値があることが示唆された。

## (2) 分娩異常発現機序検討試験

### 雌 SD ラットを用いた血清中ホルモン測定試験

ラットの 2 世代繁殖試験(12.(1))において認められた分娩異常の原因を考察するために、SD ラット(一群雌 12 匹)に原体を 0, 20, 130, 800 ppm の用量で 28 日間混餌投与して、血清中ホルモンが測定された。

800 ppm 投与群で、黄体化ホルモンが有意に増加し、プロゲステロンが上昇傾向を示した。これらのホルモンは分娩時に低下することが知られており、繁殖試験でみられた分娩時死亡及び死産は、検体投与によってこれらのホルモン濃度の低下が阻害されたため、一部の母動物に分娩遅延が生じて分娩異常が惹起された可能性が考えられた。(参照 2)

## (3) 腎盂拡張発現機序検討試験

SD ラットの 2 世代繁殖試験(12.(1))において、児動物に腎盂拡張が認められたのに対し、SD ラットの発生毒性試験(12.(2))では認められなかった原因を考察するため、母動物の血圧調節及び血管収縮に及ぼす影響、ならびに胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験が実施された。

### 妊娠 SD ラットにおける血圧調節に及ぼす影響に関する試験

SD ラット(一群雌 12 匹)に原体を 0, 20, 130, 800 ppm の用量で約 7 週間(交配前 3 週間及び妊娠 20 日まで)混餌投与し、妊娠ラットにおける血圧調節に及ぼす影響について検討した結果、800 ppm 投与群で母動物の血中レニン活性に低下傾向がみられたが、血圧及び心拍数には群間で差は認められず、本試験における用量では血圧や心拍数に対して影響はないと考えられた。(参照 2)

### 血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験

SD ラット(一群雄 6 匹)の頸動脈を用いて、アンギオテンシン I 及びアンギオテンシン II の血管収縮反応に対するシメコナゾール投与の影響について検討された。

シメコナゾールは、 $3.4 \times 10^{-7}$ ~ $3.4 \times 10^{-5}$ M の濃度範囲において、アンギオテンシン I 及びアンギオテンシン II による両収縮反応を同等に濃度依存的に抑制したことから、アンギオテンシン I からアンギオテンシン II に変換するアンギオテンシン変換酵素活性に対する作用は有さず、受容体に対する直接的な拮抗作用を有するものと考えられた。(参照 2)

胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験(1世代繁殖試験)

SD ラット(一群雌 16 匹)に、妊娠 0~20 日または哺育 0~21 日に原体を 0, 20, 130, 800 ppm の用量で混餌投与し、胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響について検討された。

妊娠期暴露試験では、800 ppm 投与群で離乳児の腎盂拡張の出現頻度(8.9%)が、統計学的に有意ではないが対照群値(1.6%)を上回り、腎盂内に貯留する尿量も増加し、検体投与による腎盂拡張の誘発が示唆された。哺育期暴露試験では、母動物全例に肝腫大が認められたが、哺育児の腎臓に異常はみられなかった。(参照 2)

腎盂拡張については、妊娠期(特に後期)に検体投与された母動物から産まれた児動物において哺育中期から後期にかけて発生する(遅発性の催奇形性作用)ので、胎児期及び離乳期以前では検出されない。よって、発生毒性試験における胎児及び本試験における哺育期暴露群の哺育児においては腎盂拡張が認められなかったものと考えられる。血圧調節に及ぼす影響に関する試験(14.(3))及び血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験(14.(3))の結果から、この腎盂拡張は、シメコナゾールのレニン/アンギオテンシン系に対する循環調節阻害(特に、アンギオテンシン受容体拮抗作用)に起因すると考えられた。本所見に対する無毒性量は 130 ppm と考えられた。

## ・総合評価

参照に挙げた資料を用いて、農薬「シメコナゾール」の食品健康影響評価を実施した。

動物体内において、シメコナゾールは速やかに吸収及び排泄された。ラットでは主な排泄経路は胆汁中で、投与後 72 時間に 80%TAR 以上が糞尿中に排泄された。組織及び器官への蓄積性は認められなかった。糞尿中に親化合物は認められず、主要代謝物として雄では尿中に VIII が、雌では糞尿中に III の硫酸抱合体が検出された。胆汁中の主要代謝物は III のグルクロン酸抱合体であった。主な代謝経路は代謝物 III への酸化で、さらに硫酸抱合やグルクロン酸抱合を受ける経路であった。マウスにおいてもラットと同様にシメコナゾールの吸収及び排泄は速やかで、組織及び器官への蓄積性も認められなかった。主要代謝物は雌雄とも III のグルクロン酸抱合体であった。

植物体内における主要代謝物は、代謝物 III の糖抱合体であった。

シメコナゾール、代謝物 III 及び V を分析対象化合物とした作物残留試験の結果、シメコナゾールの最高値は、もも（果皮）を除くと、最終散布 7 日後に収穫した茶（荒茶）の 8.30 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、シメコナゾール投与により主に肝臓に影響が認められた。

遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、雄ラット及び雌雄マウスで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。また、催奇形性については、2 世代繁殖試験においてラットの児動物に腎盂拡張が認められたが、追加で実施された「胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験（1 世代繁殖試験）」等の結果、これはレニン/アンジオテンシン系に対する循環調節阻害によるものであり、この変化には閾値が存在すると考えられた。また、安全係数は 100 が妥当であると判断された。

各種試験結果から、農産物の暴露評価対象物質をシメコナゾール（親化合物のみ）と設定した。

評価に用いた各試験の無毒性量等は表 15 に示されている。

食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験の無毒性量の最小値はラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.85 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0085 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

ADI	0.0085 mg/kg 体重/日
（ADI 設定根拠資料）	慢性毒性/発がん性併合試験
（動物種）	ラット
（期間）	2 年間
（投与方法）	混餌
（無毒性量）	0.85 mg/kg 体重/日
（安全係数）	100

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

表15 各試験における無毒性量

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup>
			農薬抄録
ラット	90日間 亜急性 毒性試験	0, 20, 100, 500, 2500ppm	雄：5.92 雌：6.43
		雄：0, 1.19, 5.92, 30.2, 152 雌：0, 1.30, 6.43, 32.3, 158	雌雄：肝絶対・比重量増加等
	2年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	0, 25, 200, 1600ppm	雄：0.85 雌：1.10
		雄：0, 0.85, 6.76, 56.8 雌：0, 1.10, 8.72, 70.4	雌雄：近位尿細管褐色色素沈着等  (雄：肝細胞腺腫増加)
2世代 繁殖試験	0, 20, 130, 800ppm	親動物、繁殖能 P雄：1.25 F <sub>1</sub> 雄：1.48 P雌：1.42 F <sub>1</sub> 雌：1.63	
	P雄：0, 1.25, 8.25, 50.3 P雌：0, 1.42, 9.00, 56.0 F <sub>1</sub> 雄：0, 1.48, 9.71, 60.8 F <sub>1</sub> 雌：0, 1.63, 10.5, 65.4	児動物 P雄：8.25 F <sub>1</sub> 雄：9.71 P雌：9.00 F <sub>1</sub> 雌：10.5  親動物、繁殖能：卵巣比重量増加、 包皮分離日齢早期化等 児動物：生存率低下等	
発生毒性 試験	0, 5, 20, 100	母動物：20 胎児：20	
		母動物：体重増加抑制等 胎児：死亡率上昇等  (催奇形性は認められない)	
マウス	90日間 亜急性 毒性試験	0, 20, 100, 500, 2500ppm	雄：2.15 雌：13.6
		雄：0, 2.15, 11.5, 55.1, 263 雌：0, 2.69, 13.6, 66.1, 316	雌雄：小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化等
18カ月間 発がん性 試験	0, 25, 100, 400ppm	雄：2.54 雌：9.84	
		雄：0, 2.54, 10.6, 42.9 雌：0, 2.41, 9.84, 41.3	雄：肝細胞腺腫 雌：びまん性肝細胞脂肪化等  (雌雄：肝細胞腺腫増加)
ウサギ	発生毒性 試験	0, 5, 30, 150	母動物：30 胎児：150
		母動物：体重増加抑制  (催奇形性は認められない)	

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup>
			農薬抄録
イヌ	90日間 亜急性 毒性試験	0, 40, 200, 1000ppm ----- 雄：0, 1.03, 5.08, 25.8 雌：0, 1.10, 5.51, 29.0	雄：5.08 雌：5.51  雌雄：ALP 活性上昇等
		0, 40, 200, 1000ppm ----- 雄：0, 0.96, 4.78, 22.4 雌：0, 0.97, 4.88, 25.0	雄：0.96 雌：0.97  雌雄：び慢性肝細胞肥大
ADI			NOAEL：0.85 SF：100 ADI：0.0085
ADI 設定根拠資料			ラット2年間慢性毒性/発がん性 併合試験

NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 ADI：一日摂取許容量

<sup>1)</sup>：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

## &lt;別紙1:代謝物/分解物等略称&gt;

記号	略称	化学名
I	AST-200	1-[2-(4-フルオロフェニル)アリル]-1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール
II	AST-474	1-(4-フルオロフェニル)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノン
III	HMF-155	( <i>RS</i> )-2-(4-フルオロフェニル)-1-ヒドロキシメチルジメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
IV	ATP-3501	2-(4-フルオロフェニル)-1-ヒドロキシジメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
V	ATP-3118	( <i>RS</i> )-2-(4-フルオロフェニル)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-1,2-ジオール
VI	ATP-3502	2-(4-フルオロフェニル)-2-ヒドロキシ-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロピオン酸
VII	R5	3-(4-フルオロフェニル)-3-ヒドロキシ-4-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)酪酸
VIII	R11	2-(4-フルオロフェニル)-1-ジヒドロキシメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
IX	トリアゾール	1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール
X	トリアゾール-L-アラニン	3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)-L-アラニン
XI	トリアゾール酢酸	(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)酢酸
	ATP-2474	
	ARK-158	
	AST-199	
	AST-292	
	AST-293	

## &lt;別紙 2: 検査値等略称&gt;

略称	名称
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量
Alb	アルブミン
ALP	アルカリフォスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT))
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT))
BUN	血液尿素窒素
C <sub>max</sub>	最高濃度
GGT	γ-グルタミルトランスフェラーゼ (=γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ (γ-GTP))
Glob	グロブリン
Glu	グルコース(血糖)
Ht	ヘマトクリット値
LC <sub>50</sub>	半数致死濃度
LD <sub>50</sub>	半数致死量
MCH	平均赤血球血色素量
MCHC	平均赤血球血色素濃度
MCV	平均赤血球容積
NADPH	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
PB	フェノバルビタール
PCNA	増殖性細胞核抗原
PHI	最終使用から収穫までの日数
PLT	血小板数
PROD	ペントキシレゾルフィン <i>o</i> -デアルキラーゼ
PT	プロトロンビン時間
RBC	赤血球数
T <sub>1/2</sub>	半減期
TAR	総処理(投与)放射能
T.Chol	総コレステロール
TG	トリグリセリド
T <sub>max</sub>	最高濃度到達時間
TP	総蛋白質

## &lt;別紙3:作物残留試験成績&gt;

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験圃場数	使用量 (gai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 III		代謝物 V	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 (玄米) 1997年度	1	600 <sup>G</sup>	1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				52	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				68	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	1	600 <sup>G</sup>	2	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				52	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				68	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
水稻 (稲藁) 1997年度	1	600 <sup>G</sup>	1	53	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				62	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				78	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	1	600 <sup>G</sup>	2	53	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				62	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				78	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
水稻 (稲藁) 1997年度	1	600 <sup>G</sup>	1	43	0.07	0.06	0.12	0.08	<0.02	<0.02
				52	0.09	0.07	0.08	0.08	<0.02	<0.02
				68	0.13	0.08	0.13	0.12	<0.02	<0.02
	1	600 <sup>G</sup>	2	43	0.19	0.16	0.14	0.12	0.02	0.02*
				52	0.36	0.31	0.27	0.26	0.03	0.02*
				68	0.16	0.14	0.15	0.10	0.02	0.02*
水稻 (稲藁) 1997年度	1	600 <sup>G</sup>	1	53	0.31	0.27	0.11	0.10	<0.02	<0.02
				62	0.15	0.12	0.14	0.10	<0.02	<0.02
				78	0.14	0.10	0.12	0.11	<0.02	<0.02
	1	600 <sup>G</sup>	2	53	0.49	0.42	0.26	0.24	<0.02	<0.02
				62	0.29	0.27	0.19	0.16	<0.02	<0.02
				78	0.22	0.18	0.24	0.18	<0.02	<0.02
水稻 (玄米) 2003年度	1	600 <sup>G</sup>	2	21	0.04	0.04				
				28	0.04	0.04				
				42	0.02	0.02				
水稻 (稲藁) 2003年度	1	600 <sup>G</sup>	2	21	3.62	3.36				
				28	2.09	1.70				
				42	0.74	0.72				
大豆 (乾燥子実) 2000年度	2	160 <sup>D</sup>	2	14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				30	0.05	0.04	<0.02	0.02*	<0.02	<0.02
				60	0.04	0.03	0.02	0.02*	<0.02	<0.02
			4	14	0.05	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				30	0.10	0.08	0.02	0.02*	<0.02	<0.02
				60	0.05	0.03	<0.02	0.02*	<0.02	<0.02
大豆 (乾燥子実) 2002年度	2	300	2	14	<0.02	<0.02				
				30	0.04	0.04				
				60	0.03	0.02				
			4	14	0.05	0.04				
				30	0.13	0.08				
				60	0.04	0.03				

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験圃 場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 III		代謝物 V	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
大豆 (乾燥子実) 2004年度	2	500	2	14 29-30 59-60	<0.01 0.02 0.01	<0.01 0.01 0.01*	/	/	/	/
葉ネギ (茎葉) 2000年度	2	75	3	3 7 14 21	0.03 <0.02 <0.02 <0.02	0.02* <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
葉ネギ (茎葉) 2003年度	2	900 <sup>G</sup>	3	14 21 18	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
根深ネギ (茎葉) 2000年度	2	75	3	3 7 14 21	0.18 0.14 0.05 0.05	0.12 0.07* 0.04* 0.04*	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
根深ネギ (茎葉) 2000年度	2	900 <sup>G</sup>	3	14 21 18	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
ニンニク (鱗茎) 2001年度	2	100~ 150	3	7 14 21	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	/	/	/	/
トマト (施設) (果実) 2002年度	2	75	3	1 7 14	0.03 0.02 0.01	0.02* 0.01 0.01*	/	/	/	/
きゅうり (施設) (果実) 2000年度	2	79.5~ 125	3 5	1 3 7 1 3 7	0.08 0.06 0.03 0.11 0.07 0.04	0.06 0.04 0.02* 0.07 0.04 0.02*	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
スイカ(施設) (果実) 2000年度	2	75~150	5	1 7-8 14	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
メロン(施設) (果実) 2000年度	2	125	3 5	1 7 14 1 7 14	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
みかん (施設無袋) (果肉) 2000年度	2	250	3	7 14 21	0.02 <0.02 <0.02	0.02* <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
みかん (施設無袋) (果皮) 2000年度	2	250	3	7 14 21	0.30 0.15 0.08	0.20 0.11 0.08	0.05 0.06 0.03	0.02 0.03 0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (gai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 III		代謝物 V	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
夏みかん (無袋) (果実) 2000年度	2	319~ 350	3	7	0.20	0.11	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.08	0.04*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.06	0.04*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ゆず (無袋) (果実) 2000年度	2	250~ 400	3	7	0.23	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.11	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.09	0.05*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
りんご (無袋) (果実) 1997年度	2	350	1	14	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				30	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			2	14	0.04	0.03*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				30	0.05	0.03*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			3	59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.04	0.04*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
21	0.04	0.03*		<0.03	<0.03	<0.02	<0.02			
21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02				
	30	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02				
	59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02				
りんご (無袋) (果実) 2000年度	2	700~ 830	3	7	0.14	0.08	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.04	0.03*	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.03	0.02*	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
なし (無袋) (果実) 1998年度	2	200	2	1	0.21	0.15	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.07	0.04*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			3	28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				1	0.29	0.21	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.07	0.06	0.03	0.03*	<0.02	<0.02
21	0.03	0.03*	0.03	0.03*	<0.02	<0.02				
	28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02			
なし (無袋) (果実) 2003年度	2	350~ 400	3	7	0.18	0.12				
				14	0.15	0.09				
				21	0.10	0.04*				
もも (無袋) (果肉) 1998年度	2	150~ 200	2	14	0.04	0.03*	0.03	0.03*	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				28	<0.03	<0.03	0.04	0.03*	0.02	0.02*
			3	14	0.04	0.03*	0.04	0.03*	0.03	0.02*
				21	<0.03	<0.03	0.03	0.03*	0.04	0.02*
				28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.02*
もも (無袋) (果皮) 1998年度	2	150~ 200	2	14	0.67	0.39	0.07	0.05*	0.04	0.03*
				21	0.24	0.18	0.06	0.04*	0.03	0.02*
				28	0.12	0.06*	0.04	0.04*	0.04	0.03*
			3	14	0.60	0.33	0.10	0.06*	0.07	0.04*
				21	0.31	0.20	0.09	0.04*	0.06	0.04*
				28	0.15	0.10*	0.10	0.05*	0.06	0.04*

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験圃 場数	使用量 (gai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 III		代謝物 V	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
もも (無袋) (果肉) 2000年度	2	36~40	3	1 7 14	0.31 0.18 0.08	0.21 0.13 0.05	/	/	/	/
もも (無袋) (果皮) 2000年度	2	36~40	3	1 7 14	10.3 4.47 1.27	6.20 2.55 0.80	/	/	/	/
ネクタリン (無袋) (果実) 2003年度	2	270~ 400	3	1 7 14	0.39 0.14 0.04	0.32 0.08 0.03*	/	/	/	/
アンズ (露地無袋) (果実) 2006年度	2	400	3	1 3 7	0.41 0.32 0.09	0.34 0.27 0.08	/	/	/	/
スモモ (無袋) (果実) 2005年度	2	400~ 500	3	1 3 7	<0.05 <0.05 <0.05	<0.05 <0.05 <0.05	<0.05 <0.05 <0.05	<0.05 <0.05 <0.05	<0.05 <0.05 <0.05	<0.05 <0.05 <0.05
おうとう (施設) (果実) 2001年度	2	400~ 625	3	1 3 7 14	1.13 0.86 0.60 0.30	0.80 0.60 0.49 0.17	/	/	/	/
イチゴ (施設) (果実) 2004年度	2	200	3	1 3 7	1.49 1.09 0.67	0.76 0.59 0.34	/	/	/	/
ブドウ(施 設無袋) (果実) 2001年度	2	150~ 200	3	14 21 28	0.13 0.07 0.07	0.07* 0.04* 0.04*	/	/	/	/
かき (無袋) (果実) 1999年度	2	175~ 218	4	7 14 21	0.10 0.09 0.07	0.06 0.06 0.04*	<0.03 <0.03 <0.03	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
茶 (荒茶) 1999年度	2	100	1	7	4.58	2.65	1.70	1.10	0.04	0.03
14				0.88	0.65	0.76	0.66	0.02	0.02*	
摘採10日前 から簡易 被覆	2	100	2	7	4.80	3.18	1.91	1.48	0.04	0.03
				14	0.91	0.64	0.94	0.77	0.02	0.02*
				21	0.12	0.09	0.34	0.33	<0.02	<0.02

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験圃 場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 III		代謝物 V	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
茶 (浸出液) 1999年度  摘採10日前 から簡易 被覆	2	100	1	7	1.91	1.14	1.14	0.82	0.03	0.02*
				14	0.31	0.28	0.59	0.53	0.02	0.02*
				21	0.06	0.04	0.26	0.22	<0.02	<0.02
			2	7	2.01	1.45	1.21	1.16	0.03	0.03
14	0.34	0.28		0.68	0.64	0.02*	0.02*			
21	0.09	0.06		0.28	0.21	<0.02	<0.02			
茶 (荒茶) 2004年度	2	200	1	7	6.00	4.08				
				14	1.60	1.08				
				21	<0.50	0.31*				
			2	7	8.30	5.92				
14	2.10	1.58								
21	<0.50	0.33*								
茶 (浸出液) 2004年度	2	200	1	7	2.17	1.55				
				14	0.63	0.47				
				21	0.07	0.06*				
			2	7	2.58	2.09				
14	0.78	0.67								
21	0.10	0.08								

注)・使用量欄に G 印は粒剤、D 印は粉剤、それ以外は水和剤を用いた。

- ・一部に検出限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、検出限界値を検出したものとして計算し、\*印を付した。
- ・全てのデータが検出限界未満の場合は検出限界値の平均に<を付して記載した。
- ・これらの作物の他、今後、魚介類に対する残留値について報告される予定である。

< 参照 >

- 1 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の一部を改定する件(平成 17 年 11 月 29 日付、平成 17 年厚生労働省告示第 499 号)
- 2 農薬抄録シメコナゾール(殺菌剤)(平成 18 年 12 月 21 日改訂): 三共アグロ株式会社
- 3 食品健康影響評価について: 食品安全委員会第 177 回会合資料 1-1  
(URL;<http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai177/dai177kai-siryou1-1.pdf>)
- 4 暫定基準を設定した農薬等に係る食品安全基本法第 24 条第 2 項の規定に基づく食品健康影響評価について: 食品安全委員会第 177 回会合資料 1-3  
(URL;<http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai177/dai177kai-siryou1-3.pdf>)
- 5 食品安全委員会農薬専門調査会確認評価第三部会第 4 回会合  
(URL;[http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kakunin3\\_dai4/index.html](http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kakunin3_dai4/index.html))
- 6 食品健康影響評価について: 食品安全委員会第 193 回会合資料 1 - 1  
(URL; <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai193/dai193kai-siryou1-1.pdf>)
- 7 「クミルロン」及び「シメコナゾール」の食品安全基本法第 2 4 条第 1 項に基づく食品健康影響評価について: 食品安全委員会第 193 回会合資料 1 - 2  
(URL; <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai193/dai193kai-siryou1-2.pdf>)
- 8 食品安全委員会農薬専門調査会幹事会第 20 回会合  
(URL;[http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kanjikai\\_dai20/index.html](http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kanjikai_dai20/index.html))