（案）

農薬評価書

シメコナゾール

（第 2 版）

2008年12月9日

食品安全委員会農薬専門調査会

目次

	頁
○ 審議の経緯.....	4
○ 食品安全委員会委員名簿.....	4
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	5
○ 要約.....	7
I. 評価対象農薬の概要.....	8
1. 用途.....	8
2. 有効成分の一般名.....	8
3. 化学名.....	8
4. 分子式.....	8
5. 分子量.....	8
6. 構造式.....	8
7. 開発の経緯.....	8
II. 安全性に係る試験の概要.....	9
1. 動物体内運命試験.....	9
(1) 動物体内運命試験(ラット).....	9
① 血中濃度推移.....	9
② 排泄.....	9
③ 胆汁中排泄.....	9
④ 体内分布.....	10
⑤ 代謝物同定・定量.....	10
(2) ラット肝を用いた <i>in vitro</i> 代謝試験.....	11
(3) 動物体内運命試験(マウス).....	11
① 血中濃度推移.....	11
② 排泄.....	12
③ 体内分布.....	12
④ 代謝物同定・定量.....	12
2. 植物体内運命試験.....	13
(1) 水稻.....	13
(2) りんご.....	13
(3) だいず.....	14
3. 土壌中運命試験.....	14
(1) 好氣的土壌中運命試験.....	14
(2) 湛水土壌中運命試験①.....	15
(3) 湛水土壌中運命試験②.....	15

(4) 土壌溶脱試験.....	16
(5) 土壌吸着試験.....	16
4. 水中運命試験.....	16
(1) 加水分解試験①.....	16
(2) 加水分解試験②.....	16
(3) 水中光分解試験.....	16
5. 土壌残留試験.....	17
6. 作物等残留試験.....	17
(1) 作物残留試験.....	17
(2) 魚介類における最大推定残留値.....	17
7. 一般薬理試験.....	18
8. 急性毒性試験.....	19
9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験.....	20
10. 亜急性毒性試験.....	21
(1) 90日間亜急性毒性試験(ラット).....	21
(2) 90日間亜急性毒性試験(マウス).....	21
(3) 90日間亜急性毒性試験(イヌ).....	22
11. 慢性毒性試験及び発がん性試験.....	22
(1) 1年間慢性毒性試験(イヌ).....	22
(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット).....	23
(3) 18カ月間発がん性試験(マウス).....	24
12. 生殖発生毒性試験.....	24
(1) 2世代繁殖試験(ラット).....	24
(2) 発生毒性試験(ラット).....	25
(3) 発生毒性試験(ウサギ).....	26
13. 遺伝毒性試験.....	26
14. その他の試験.....	29
(1) 肝腫瘍発現機序検討試験.....	29
① 雄 Fischer ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験.....	29
② 雌 Fischer ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験.....	29
③ 変異肝細胞巢の細胞増殖活性検査.....	30
(2) 分娩異常発現機序検討試験.....	31
① 雌 SD ラットを用いた血清中ホルモン測定試験.....	31
(3) 腎盂拡張発現機序検討試験.....	31
① 妊娠 SD ラットにおける血圧調節に及ぼす影響に関する試験.....	31
② 血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験.....	31
③ 胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験(1世代繁殖試験).....	31

Ⅲ. 食品健康影響評価.....	33
・別紙1:代謝物/分解物等略称.....	37
・別紙2:検査値等略称.....	38
・別紙3:作物残留試験成績.....	40
・参照.....	45

<審議の経緯>

－第1版関係－

- 2001年 10月 12日 初回農薬登録
2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照1）
2007年 2月 5日 厚生労働大臣より残留基準（暫定基準）設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0205002号）
2007年 2月 6日 関係書類の接受（参照3）
2007年 2月 8日 第177回食品安全委員会（要請事項説明）（参照4）
2007年 5月 28日 第4回農薬専門調査会確認評価第三部会（参照5）
2007年 6月 1日 農林水産省より厚生労働省へ残留基準設定依頼（魚介類）
2007年 6月 5日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について追加要請（厚生労働省発食安第0605002号）、関係書類の接受（参照6、7）
2007年 6月 7日 第193回食品安全委員会（要請事項説明）（参照8）
2007年 6月 20日 第20回農薬専門調査会幹事会（参照9）
2007年 6月 28日 第196回食品安全委員会（報告）
2007年 6月 28日より7月 27日 国民からの御意見・情報の募集
2007年 8月 21日 農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告
2007年 8月 23日 第203回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）

－第2版関係－

- 2008年 9月 3日 農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及び基準設定依頼（かぼちゃ、うめ）
2008年 10月 7日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について追加要請（厚生労働省発食安第1007003号）、関係書類の接受（参照10、11）
2008年 10月 9日 第257回食品安全委員会（要請事項説明）（参照12）
2008年 12月 9日 第46回農薬専門調査会幹事会（参照13）

<食品安全委員会委員名簿>

見上 彪（委員長）	畑江敬子
小泉直子（委員長代理）	廣瀬雅雄*
長尾 拓	本間清一
野村一正	*：2007年4月1日から

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	三枝順三	根岸友恵
廣瀬雅雄（座長代理）	佐々木有	林 真
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 真	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤正吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	三枝順三	西川秋佳**
林 真（座長代理*）	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友恵
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 啓介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司
江馬 真	津田洋幸	柳井徳磨
大澤貫寿	出川雅邦	山崎浩史
太田敏博	長尾哲二	山手丈至
大谷 浩	中澤憲一	與語靖洋
小澤正吾	納屋聖人	吉田 緑
小林裕子	成瀬一郎***	若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2008年4月1日から)

鈴木勝士（座長）	佐々木有	根本信雄
----------	------	------

林 真（座長代理）	代田真理子	平塚 明
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清
石井康雄	田村廣人	堀本政夫
泉 啓介	津田修治	松本清司
今井田克己	津田洋幸	本間正充
上路雅子	長尾哲二	柳井徳磨
臼井健二	中澤憲一	山崎浩史
太田敏博	永田 清	山手丈至
大谷 浩	納屋聖人	與語靖洋
小澤正吾	西川秋佳	吉田 緑
川合是彰	布柴達男	若栗 忍
小林裕子	根岸友恵	

要 約

トリアゾール系殺菌剤である「シメコナゾール」(CAS No.149508-90-7)について、農薬抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット及びマウス）、植物体内運命（水稲、りんご及びびだいず）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物等残留、急性毒性（ラット及びマウス）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。

試験結果から、シメコナゾール投与による影響は主に肝臓に認められた。遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、ラット及びマウスで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価にあたり閾値を設定することは可能であると考えられた。また、催奇形性については、2世代繁殖試験においてラットの児動物に腎盂拡張が認められたが、この異常には閾値が存在し、閾値未満の用量であれば奇形は発生しないと考えられた。

各試験の無毒性量の最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の0.85 mg/kg体重/日であったので、これを根拠として、安全係数100で除した0.0085 mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

【専門員コメント】

「また、催奇形性については、2世代繁殖試験においてラットの児動物に腎盂拡張が認められたが、この異常には閾値が存在し、閾値未満の用量であれば奇形は発生しないと考えられた。」との記載がありますが、下記の理由により、これは削除したほうがよいと考えます。

1. ラット2世代繁殖試験の800ppm（50-65mg/kgに相当）で出生児に（生後4日時点の剖検か）腎盂拡張が認められているが、その後の観察時点では腎盂拡張は確認されていません。
>>>生後の発育段階で腎盂拡張は消失しているものと推察されます。
2. ラット発生毒性試験（催奇形試験）では最高用量の100mg/kgを含むいずれの投与群にも腎盂拡張の増加はみられていません。
3. 以上のことから、本化合物の場合には催奇形作用の指標として腎盂拡張の意義はうすいと考えられます。

この旨を評価書24ページのラット2世代繁殖試験で記載しておけば、要約の記述は不要と考えます。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺菌剤

2. 有効成分の一般名

和名：シメコナゾール

英名：simeconazole (ISO名)

3. 化学名

IUPAC

和名：(RS)-2-(4-フルオロフェニル)-1-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-3-(トリメチルシリル)プロパン-2-オール

英名：(RS)-2-(4-fluorophenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(trimethylsilyl)propan-2-ol

CAS (No.149508-90-7)

和名：α-(4-フルオロフェニル)-α-[(トリメチルシリル)メチル]-1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール

英名：α-(4-fluorophenyl)-α-[(trimethylsilyl)methyl]-1*H*-1,2,4-triazole-1-ethanol

4. 分子式

C₁₄H₂₀FN₃OSi

5. 分子量

293.41

6. 構造式

原体中組成 R : S = 1 : 1

7. 開発の経緯

シメコナゾールは、三共アグロ株式会社により開発されたトリアゾール系殺菌剤である。作用機構は、菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合成の阻害であり、ラノステロールの C14 位脱メチル化を阻害する。我が国ではおうとう、りんご、だいず等に農薬登録されている。諸外国では韓国においてきゅうり、ぶどう等に農薬登録されている。今回、かぼちゃ及びうめへの適用拡大申請がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

農薬抄録（2006年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した（参照2）。

各種運命試験（II. 1～4）は、シメコナゾールのトリアゾール環の3、5位の炭素を¹⁴Cで標識したもの（[tri-¹⁴C]シメコナゾール）、フェニル基の炭素を¹⁴Cで均一に標識したもの（[phe-¹⁴C]シメコナゾール）及び代謝物BまたはDのトリアゾール環の3、5位の炭素を¹⁴Cで標識したもの（[tri-¹⁴C]代謝物BまたはD）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合はシメコナゾールに換算した。代謝物/分解物等略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。

1. 動物体内運命試験

（1）動物体内運命試験（ラット）

① 血中濃度推移

Fischer ラット（一群雌雄各6匹）に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを5 mg/kg 体重（以下、[1.]において「低用量」という。）または70 mg/kg 体重（以下、[1.]において「高用量」という。）で単回経口投与し、血中濃度推移について検討された。

血液中放射能濃度推移は表1に示されている。

両投与群とも血液中放射能濃度は速やかな消失を示し、最高濃度は投与後8時間までに測定された。（参照2）

表1 血液中放射濃度推移

投与量 (mg/kg 体重)	5		70	
	雄	雌	雄	雌
T _{max} (時間)	8	1	4	2
C _{max} (μg/g)	1.14	0.58	10.4	8.08
T _{1/2} (時間)	48	26	86	16

② 排泄

Fischer ラット（一群雌雄各5匹）に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールまたは[phe-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、排泄試験が実施された。

いずれの標識体投与群においても、投与後72時間で総投与放射能（TAR）の大部分（82.6～94.4%）が糞尿中に排泄され、尿中排泄量は49.9～57%TAR、糞中排泄量は27.9～41.9%TARであった。呼気中への排泄は予備試験においてほとんど認められなかった。（参照2）

③ 胆汁中排泄

胆管カニューレを挿入した Fischer ラット（一群雌雄各3匹）に、[tri-¹⁴C]シ

メコナゾールを低用量で単回経口投与し、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後24時間で雄では70.7%TARが、雌では57.3%TARが胆汁中に排泄された。尿中への排泄量は雄で4.9%TAR、雌で13.9%TARであり、糞中にはほとんど排泄されなかった。雌雄とも胆汁中排泄が主要な排泄経路であった。

胆汁中排泄、尿中排泄及び体内残留放射能から算出した吸収率は、雄で84%、雌で74%であった。(参照2)

④ 体内分布

Fischer ラット(一群雌雄各3匹)に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを低用量または高用量で単回経口投与し、体内分布試験が実施された。雄では投与6及び48時間後に、雌では投与2及び24時間後に、組織及び臓器中放射能濃度が測定された。投与168時間後の測定は、[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与による排泄試験[1.(1)②]に用いたラットで実施された。また、Fischer ラット(雌雄各5匹)に、[phe-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、投与168時間後の組織及び臓器中放射能濃度が測定された。

低用量投与群では、投与6時間後の雄において肝臓の放射能濃度が最も高く(12.6 µg/g)、次いで副腎、腎臓であった。雌では投与2時間後の肝臓で最も高く(11.4 µg/g)、次いで腹腔内脂肪、皮下脂肪、副腎、腎臓であった。高用量投与群では、放射能は脂肪に比較的多く分布し、時間の経過とともに速やかに減少した。いずれの標識体投与群においても、投与168時間後ではほとんどの組織で少量の放射能しか検出されなかったが、雄の組織中放射能濃度は雌に比べて高かった。(参照2)

⑤ 代謝物同定・定量

[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与による排泄試験[1.(1)②及び③]に用いたラットの尿、糞及び胆汁、体内分布試験[1.(1)④]に用いたラットの血漿及び肝臓を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。また、Fischer ラット(雌雄各5匹)に、[phe-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、糞尿中の代謝物同定・定量試験が実施された。

ラットの糞尿中における代謝物の種類には投与量による顕著な差はみられなかった。代謝物の種類に性差はみられなかったが、その量比は異なっていた。いずれの標識体投与群においても、尿中の主要代謝物は雄ではIで、[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与群では12.9~16.8%TAR、[phe-¹⁴C]シメコナゾール投与群では21.6%TAR検出された。その他にも多くの代謝物(D、Dのグルクロン酸抱合体、Dの硫酸抱合体、E、Fのグルクロン酸抱合体、F+G、H、J)が検出されたが、いずれも10%TAR以下であった。ただし、Jは[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与群の尿中でのみ認められた。雌の尿中の主要代謝物はDの硫酸抱合体で、いずれの投与群においても30%TAR以上検出された。糞中では、尿中で検出された代謝物が

いずれも少量検出された。雌の糞中の主要代謝物は D の硫酸抱合体で、[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与群では 31.6~34.9% TAR、[phe-¹⁴C]シメコナゾール投与群では 26.6% TAR 検出された。糞中に親化合物は検出されず、シメコナゾールは消化管から完全に吸収されたと考えられた。

血漿中の主要代謝物は雄では E 及び F で、それぞれ血漿中放射能の 50 及び 17.6% 検出された。雌では親化合物が 48.5% を占め、主要代謝物として D の硫酸抱合体が 23.5% 検出された。他の代謝物は糞尿中で検出されたものと同種であった。

肝臓中の主要代謝物は雄では E で、肝臓中放射能の 26.7% 検出された。雌では D の硫酸抱合体が肝臓中放射能の 59.1% を占め、次いで親化合物が 28.2% 検出された。他には糞尿中と同様の代謝物が少量検出された。

胆汁中の主要代謝物は雄では D のグルクロン酸抱合体で、投与後 24 時間に 56.5% TAR 検出され、雌では D のグルクロン酸抱合体と硫酸抱合体で、投与後 24 時間にそれぞれ 35.6 及び 16.6% TAR 検出された。

シメコナゾールはラット体内で D へと酸化され、D は硫酸抱合やグルクロン酸抱合を受け、さらに E や I へと酸化されたと考えられた。また、胃液のような酸性条件下では、B へ容易に分解することが認められており、消化管内において親化合物の一部が B へ変化し、続いて F へと代謝され、G へと酸化される経路及びグルクロン酸抱合を受ける経路が示された。(参照 2)

(2) ラット肝を用いた *in vitro* 代謝試験

[tri-¹⁴C]シメコナゾール、[tri-¹⁴C]代謝物 B または [tri-¹⁴C]代謝物 D を雄ラットの肝 9,000g 上清にニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 (NADPH) とともに加えて反応させ、代謝物を精査した。また、[tri-¹⁴C]代謝物 D を雌雄ラットの肝ミクロソームに NADPH とともに加えて反応させ、生成する代謝物の精査を行った。

ラット肝 9,000g 上清を用いた代謝試験では、NADPH 依存的な酸化的代謝によって、代謝物 D、E、F、G 及び H が生じた。代謝物 D が反応の最も早い時期に生じたことから、ラットの体内に取り込まれたシメコナゾールは、酸化により D に代謝された後、酸化または抱合化を受けると推定された。

代謝物 D の *in vitro* 代謝試験では、生成する代謝物は親化合物の場合と同様であり、シメコナゾールの代謝が D を経由していることが認められた。(参照 2)

(3) 動物体内運命試験 (マウス)

① 血中濃度推移

ICR マウス (雌雄各 6 匹) に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、血中放射能濃度が測定された。

T_{max} は雌雄とも 2 時間、C_{max} は雄で 1.28 µg/g、雌で 1.70 µg/g、T_{1/2} は雄で 13

時間、雌で9時間であった。（参照2）

② 排泄

ICR マウス（雌雄各5匹）に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、排泄試験が実施された。

投与後48時間で90%TAR以上が糞尿中に排泄され、尿中排泄量は61.4～63.3%TAR、糞中排泄量は24.3～28.7%TARであった。（参照2）

③ 体内分布

ICR マウス（雌雄各3匹）に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、体内分布試験が実施された。雄では投与2時間後及び13時間後に、雌では投与2時間後及び9時間後に、組織及び臓器中の放射能濃度が測定され、投与168時間後の測定は、排泄試験[1. (3)②]に用いたマウスで実施された。

投与2時間後の小腸内容物で放射能濃度が最も高く（雄で222 µg/g、雌で99 µg/g）、次いで胃腸管、肝臓、腹腔内脂肪で比較的高かった。雄では投与13時間後、雌では投与9時間後に、盲腸またはその内容物を除くすべての組織で速やかに放射能は減少した。投与168時間後では、雌雄とも肝臓中放射能が最も高かった（雄で0.487µg/g、雌で0.518 µg/g）。（参照2）

④ 代謝物同定・定量

[tri-¹⁴C]シメコナゾール投与による排泄試験[1. (3)②]に用いたマウスの糞及び尿、ならびに体内分布試験[1. (3)③]に用いたマウスの血漿、肝臓、腎臓及び胆汁を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿中の主要代謝物はDのグルクロン酸抱合体で、雄では20.7%TAR、雌では21.5%TAR検出された。その他に雄では代謝物Iが17.9%TAR、10%TAR以下の代謝物としてD、E、Fのグルクロン酸抱合体、H、J及び親化合物が同定され、雌では代謝物Iが15.2%TAR、Eが11.5%TAR、10%TAR以下の代謝物としてD、Dの硫酸抱合体、Fのグルクロン酸抱合体、H及びJが同定された。糞中でも尿中と同様の代謝物が認められたが、いずれも10%TAR以下であった。

雌雄マウスの血漿中主要代謝物はEで、血漿中放射能の26.7～38.0%検出され、親化合物が21.1～24.1%認められた。その他にD、Dのグルクロン酸抱合体、H及びJが同定された。

雌雄マウスの肝臓及び腎臓中においても主要代謝物としてEと親化合物が検出されたが、いずれも10%TAR以下であった。

雌雄マウスの胆汁中の主要代謝物はDのグルクロン酸抱合体で、胆汁中放射能の89.6～92.0%を占めた。その他に少量の代謝物としてE、H、J及び親化合物が同定され、雌ではDも認められた。（参照2）

2. 植物体内運命試験

(1) 水稻

[tri-¹⁴C]シメコナゾールまたは[phe-¹⁴C]シメコナゾールを 900 g ai/ha の用量で、水稻(品種:日本晴)の幼苗を移植したポットの田面水に処理し、植物体内運命試験が実施された。試料として、[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理15、30及び120日後(収穫期)に、[phe-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理120日後に稲体を採取した。また、各処理区とも処理3時間、1、3、6、15日後に田面水を、処理120日後に土壌を採取した。

いずれの標識体処理区においても、田面水中放射能濃度は急速に減少し、処理15日後では総処理放射能(TAR)の1.0%以下まで減少した。

稲体における放射能は、処理30日後の茎葉部で7.1~13.9%TARであった。収穫期の稲わら中の放射能は13.9~23.8%TARであったが、玄米では<0.1~0.2%TAR、もみ殻では0.1%TARと少なかった。

処理120日後の稲わらでは、主要代謝物としてDの糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)及び親化合物がそれぞれ4.7~8.8%TAR及び2.5~3.9%TAR検出された。玄米中の放射能は極性代謝物からなり、K及びLが同定されたが、0.1%TAR未満とわずかであった。もみ殻中の放射能も多く代謝物から構成されていたが、生成量はわずかであった。(参照2)

(2) りんご

[tri-¹⁴C]シメコナゾールまたは[phe-¹⁴C]シメコナゾールを 600 g ai/ha の用量で、りんご(品種:ふじ)の果実及び葉に塗布し、植物体内運命試験が実施された。試料として、[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理0、3、7、15及び45日後(収穫期)に、[phe-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理0及び45日後に果実及び葉を採取した。

いずれの標識体処理区においても、果実及び葉からの放射能の消失は速やかで、収穫期の放射能は、果実で15.8~18.0%TAR、葉で15.7~18.2%TARであった。

収穫期の果実では、親化合物が5.5~6.8%TAR検出された。主な代謝物としてDの糖抱合体(モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量)が2.5~3.3%TAR、Fが1.5~1.7%TAR、その他にB、C及びDが1%TAR未満検出された。また、微量であるがE及びJも同定された。

収穫期の葉では、親化合物が9.4~9.6%TAR検出され、主な代謝物としてDの糖抱合体(モノグルコシド)が3.4~4.3%TAR検出された。その他にも果実と同様の代謝物が同定されたが、1%TAR未満であった。

[tri-¹⁴C]シメコナゾールをりんご(品種:ふじ)の葉に塗布し、移行性試験が実施された。試料として、処理0、3、7、14及び28日後に処理葉を、処理3、7、14及び28日後に無処理葉を採取し、処理28日後には無処理果実も採取した。

その結果、処理放射能は処理葉から速やかに消失し、処理葉から無処理葉また

は果実への移行は認められなかった。（参照 2）

（3）だいず

[tri-¹⁴C]シメコナゾールまたは[phe-¹⁴C]シメコナゾールを 160 g ai/ha の 2 回散布に相当する用量で、だいず（品種：タマホマレ）のさや及び葉に塗布し、植物体内運命試験が実施された。試料として、[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理 0、3、7、15 及び 37 日後（収穫期）にさや及び葉を採取し、37 日後には根も採取した。[phe-¹⁴C]シメコナゾール処理区では、処理 0 及び 37 日後にさや及び葉を採取し、37 日後には根も採取した。

収穫期におけるさや全体の放射能は、39.3～48.2%TAR であった。さや表面に付着している放射能は経時的に減少し、収穫期における放射能は 0.8～1.7%TAR であったのに対して、さや内部に取り込まれた放射能は増加し、35.3～42.1%TAR であった。豆へ移行した放射能は経時的に増加し、収穫期における放射能は 2.4～5.2%TAR であった。収穫期における葉全体の放射能は 27.7～29.9%TAR であり、葉表面の放射能は 0.7～1.6%TAR であった。さや及び葉のいずれにおいても、標識位置による消失、移行性に大差は認められなかった。

さや処理 37 日後の親化合物の残留量は、さや及び豆でそれぞれ 7.4～7.9%TAR 及び 1.0～1.7%TAR であり、半減期は 4.6 日であった。主要代謝物として D の糖抱合体（モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量）が、さやで 9.4～14.1%TAR、豆で 0.7～1.0%TAR 検出された。その他に D、K、L が少量認められた。

葉処理 37 日後の葉中では、親化合物の残留量は 1.1～2.7% TAR であり、半減期は 2.4 日であった。主要代謝物として D の糖抱合体（モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの含量）が収穫期の葉で 18.7～21.7%TAR 検出された。

[tri-¹⁴C]シメコナゾールを 160 g ai/ha の 2 回散布に相当する用量で、大豆（品種：タマホマレ）の葉に塗布し、移行性試験が実施された。試料として、処理 0、3、7 及び 14 日後に処理葉を、処理 3、7 及び 14 日後に無処理葉を採取し、処理 14 日後には無処理未成熟さやも採取した。

その結果、処理放射能は処理葉から速やかに消失し、処理葉から無処理葉またはさやへの移行は認められなかった。（参照 2）

3. 土壌中運命試験

（1）好氣的土壌中運命試験

[tri-¹⁴C]シメコナゾールを 2 種類の畑地土壌 [埴壤土（岩手）、軽埴土（石川）] に 3 mg/kg 土壌（乾土）の用量で添加し、25℃の暗所で最長 120 日間インキュベートして、好氣的土壌中運命試験が実施された。

両土壌における CO₂ の発生量は少なく、処理 120 日後で 0.2～0.8%TAR であった。非抽出放射能は時間の経過とともに増加し、処理 120 日後で 38.2～

52.9%TARであった。主要分解物はB、C及びJで、岩手土壌では処理120日後に最高値としてBが19.5%TAR、Cが2.0%TAR、Jが4.6%TAR検出された。石川土壌では処理120日後にJが27.7%TARと最高値を示したが、Bは処理7日後、Cは処理15日後にそれぞれ最高値73.2及び3.12%TARを示した後漸減した。シメコナゾールの推定半減期は、岩手土壌で59日、石川土壌で3.5日であった。大部分の非抽出放射能はフミン画分に分布していた。また、両土壌ともR体及びS体の存在比はおよそ1:1であり、土壌中での分解速度に差は認められなかった。（参照2）

（2）湛水土壌中運命試験①

水田土壌〔埴壤土（岩手）〕に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを1.2 mg/kg 土壌（乾土）または[phe-¹⁴C]シメコナゾールを1.3 mg/kg 土壌（乾土）の用量で添加し、25℃の暗所で最長360日間インキュベートして、湛水土壌中運命試験が実施された。また、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを滅菌した水田土壌（同上）に1.2 mg/kg 土壌（乾土）の用量で添加し、滅菌条件下での湛水土壌中運命試験も実施された。

[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理した非滅菌土壌では、CO₂の発生量は時間の経過とともに増加したが、その量は処理360日後で1.0%TARと少なかった。[phe-¹⁴C]シメコナゾール処理では、CO₂の発生量はゆるやかに増加し、処理360日後には23.0%TARに達した。いずれの標識体処理においても主要分解物はBで、処理60日後に最高値として36%TAR以上検出され、少量の分解物としてCが180日後に2.2%TAR検出された。その他に[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理ではJが時間の経過とともに増加し、処理360日後に13.1%TAR検出された。滅菌土壌ではJは検出されず、Bが120日後に最大25.6%TAR、Cが少量（0.67%TAR）検出された。

シメコナゾールの水田土壌における推定半減期は、非滅菌土壌の[tri-¹⁴C]シメコナゾール処理で19日、[phe-¹⁴C]シメコナゾール処理で20日、滅菌土壌で93日であった。大部分の非抽出放射能はフミン画分に分布していた。また、両土壌ともR体及びS体の存在比はおよそ1:1であり、土壌中での分解速度に差は認められなかった。（参照2）

（3）湛水土壌中運命試験②

水田土壌〔軽埴土（石川）〕に、[tri-¹⁴C]シメコナゾールを1.2 mg/kg 土壌（乾土）の用量で添加し、25℃の暗所で最長360日間インキュベートして、湛水土壌中運命試験が実施された。

CO₂の発生量は時間の経過とともに増加したが、その量は処理360日後で1.6%TARと少なかった。主要分解物はBで、処理15日後に最高値として21.9%TAR検出され、その後は量的に大きな変動はみられなかった。その他にJが時間の経過とともに増加し、処理360日後に7.5%TAR検出され、Cが少量

(0.8%TAR 以下) 検出された。シメコナゾールの水田土壌における推定半減期は 122 日であった。(参照 2)

(4) 土壌溶脱試験

国内の 4 種類の水田土壌 [埴壤土 (滋賀、岩手及び岡山)、軽埴土 (石川)] を用いて、[tri-¹⁴C]シメコナゾール 900 g ai/ha 相当を土壌表層に処理し、土壌溶脱試験が実施された。

いずれの土壌においても、放射能は土壌表層のみで検出され、溶出液及び土壌下層では検出されなかった。土壌表層には親化合物が 76.2~92.5%TAR、B が 0.6~11.1%TAR 検出され、シメコナゾールの下方移行性は低いと考えられた。(参照 2)

(5) 土壌吸着試験

国内の 2 種類の水田土壌 [軽埴土 (石川、茨城)] 及び 2 種類の畑地土壌 [微砂質埴壤土 (茨城)、砂質埴壤土 (愛知)] を用いて土壌吸着試験が実施された。

シメコナゾールの土壌における Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 3.19~28.4、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 219~2,330 であり、土壌吸着性が高いことが認められた。(参照 2)

4. 水中運命試験

(1) 加水分解試験①

[tri-¹⁴C]シメコナゾールを pH 4.0 の酢酸緩衝液に 0.97 mg/L の用量で添加し、25±1°C の暗所で最長 30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

シメコナゾールの分解は速やかで、処理 30 日後の残存率は 48.8% (0.47 mg/L) であった。分解物として B が認められ、処理 30 日後の B の生成量は 50.2%TAR (0.48 mg/L) であった。シメコナゾールの緩衝液中での推定半減期は 29.1 日であった。(参照 2)

(2) 加水分解試験②

シメコナゾールを pH 4.0 (リン酸緩衝液)、pH 7.0 (リン酸緩衝液) 及び pH 9.0 (ホウ酸緩衝液) の各緩衝液に 28 mg/L の用量で添加し、pH 4.0 の緩衝液は 50、60 及び 70°C で、それ以外は 50°C で最長 120 時間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

pH 4.0 の緩衝液中での推定半減期は 22.9 日であった。pH 7.0 及び 9.0 の緩衝液中ではシメコナゾールの分解は認められなかった。(参照 2)

(3) 水中光分解試験

[phe-¹⁴C]シメコナゾールを滅菌蒸留水 (pH 6.75) 及び自然水 [土壌浸出水 (滋

賀)、pH 5.3]に 1.19 mg/L の用量で添加し、25±2°Cでキセノンランプの 14 日間照射（光強度：99.5 W/m²、測定波長：300～700 nm）を行い、水中光分解試験が実施された。

滅菌蒸留水中ではシメコナゾールは安定で、分解は認められなかった。自然水中では、照射 14 日後で親化合物の残留量は 21.6%TAR であり、主要分解物として B が最大 15.9%TAR（照射 10 日後）検出された。シメコナゾールの照射区における推定半減期は 7.2 日であった。（参照 2）

5. 土壌残留試験

湛水状態の沖積土・埴壤土（埼玉）及び火山灰土・軽壤土（熊本）、畑状態の火山灰土・埴壤土（青森）及び洪積土・埴壤土（福島）を用いて、シメコナゾール（親化合物）、分解物 B 及び J を分析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。

推定半減期は表 2 に示されている。分解物 J については、湛水状態では容器内及び圃場試験のいずれにおいても検出限界未満（<0.01mg/kg）であり、畑状態では圃場試験の 182 日後における 0.06 mg/kg が最高値であった。（参照 2）

表 2 土壌残留試験成績

試験	濃度 ¹⁾	土壌	推定半減期	
			シメコナゾール	親化合物+B
容器内試験	0.6 mg/kg	沖積土・埴壤土	100 日	101 日
		火山灰土・軽壤土	52 日	52 日
	0.6 mg/kg	火山灰土・埴壤土	1 日以内	45 日
		洪積土・埴壤土	130 日	166 日
圃場試験	600 g ai/ha (2 回)	沖積土・埴壤土	5 日	5 日
		火山灰土・軽壤土	7 日	7 日
	350 g ai/ha (3 回)	火山灰土・埴壤土	26 日	80 日
		洪積土・埴壤土	60 日	73 日

1) 容器内試験では純品、圃場試験では湛水状態で 1%粒剤、畑状態で 20%水和剤を使用。

6. 作物等残留試験

(1) 作物残留試験

シメコナゾール、代謝物 D 及び F を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 3 に示されている。シメコナゾールの最高値は、もも（果皮）を除くと、最終散布 7 日後に収穫した茶（荒茶）の 8.30 mg/kg であった。（参照 2）

(2) 魚介類における最大推定残留値

シメコナゾールの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃

度(水産 PEC)及び生物濃縮係数(BCF)を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。(参照7)

シメコナゾールの水産 PEC は 0.28 µg/L、BCF は 110 (計算値)、魚介類における最大推定残留値は 0.154 mg/kg であった。(参照7)

7. 一般薬理試験

マウス、ラット及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表3に示されている。

マウス及びラットにおいて、致死量(マウスで 320 mg/kg 体重以上、ラットで 800 mg/kg 体重以上)の投与で、種々の抑制性の症状が行動系、神経系及び自律神経系の項目全般にみられた。(参照2)

表3 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢神経系	一般状態及び体重 (Irwin 法)	ICR マウス	雄 3 雌 3	0, 20.5, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (腹腔内)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上で抑制性症状、320 mg/kg 体重で雄 1 例、800 mg/kg 体重以上で全例死亡
	一般状態及び体重 (Irwin 法)	Fischer ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	128	320	320 mg/kg 体重以上で抑制性症状、800 mg/kg 体重で 3 例、2,000 mg/kg 体重で全例死亡
	体温	Fischer ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上で投与後 1 時間～1 日にかけて体温低下
	ヘキソバルビタール睡眠	ICR マウス	雄 8	0, 0.21, 0.52, 1.31, 3.28, 8.19, 20.5, 51.2, 128, 320 (腹腔内)	0.52	1.31	1.31 mg/kg 体重以上で睡眠時間延長
	ペンチレンテトラゾール痙攣	ICR マウス	雄 10	0, 8.19, 20.5, 51.2, 128, 320 (腹腔内)	20.5	51.2	痙攣発現時間延長、320 mg/kg 体重で死亡発現時間延長、強直性痙攣及び死亡発現率低下

呼吸循環器系	血圧、心拍数	Fischer ラット	雄 5	0, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	128	320	320 mg/kg 体重以上で心拍数減少、2,000 mg/kg 体重で血圧低下、800 mg/kg 体重で1例、2,000 mg/kg 体重で4例死亡
自律神経系	瞳孔径	Fischer ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	800	2,000	2,000 mg/kg 体重で投与1日後に瞳孔径増加、2日後に全例死亡
消化器	小腸炭末輸送能	ICR マウス	雄 8	0, 20.5, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (腹腔内)	320	800	800 mg/kg 体重以上で炭末輸送能抑制、2,000 mg/kg 体重で2例死亡
	摘出回腸	Hartley モルモット	雄 4	0, 10 ⁻⁸ , 10 ⁻⁷ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁴ g/mL	10 ⁻⁶ g/mL	10 ⁻⁵ g/mL	10 ⁻⁵ g/mL 以上でアゴニスト収縮
骨格筋	握力	Fischer ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	320	800	800 mg/kg 体重以上で握力低下
	横隔膜神経筋	Fischer ラット	雄 4	0, 10 ⁻⁷ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁴ g/mL	10 ⁻⁵ g/mL	10 ⁻⁴ g/mL	10 ⁻⁴ g/mL で神経刺激による収縮の抑制
血液	溶血、凝固	Fischer ラット	雄 5	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000 (経口)	51.2	128	128 mg/kg 体重以上でPT延長、2,000 mg/kg 体重でAPTT延長

8. 急性毒性試験

シメコナゾール（原体）の急性毒性試験が実施された。

結果は表4に示されている。（参照2）

表4 急性毒性試験概要（原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	Fischer ラット 雌雄各5匹	611	682	自発運動低下、よろめき歩行、腹臥位、横臥位、うずくまり、沈静、呼吸緩徐、流涙、昏睡
	ICR マウス 雌雄各5匹	1,180	1,020	自発運動低下、よろめき歩行、腹臥位、横臥位、うずくまり、沈静、呼吸緩徐、流涙、昏睡、痙攣、削瘦
経皮	Fischer ラット 雌雄各5匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし

吸入	Fischer ラット 雌雄各5匹	LC ₅₀ (mg/L)		軽度の振戦、眼瞼閉鎖、眼周囲 被毛の汚れ、鼻吻部赤色付着物
		>5.17	>5.17	

シメコナゾールの代謝物 (B、C、D、F、K 及び L) ならびに原体混在物 (M、N、O、P 及び Q) の急性毒性試験が実施された。

結果は表5に示されている。(参照2)

表5 急性毒性試験概要(代謝物及び原体混在物)

被験物質	投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
B	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	641	600	自発運動低下及び消失、よろめき歩行、うずくまり姿勢、腹臥姿勢、呼吸緩徐、昏睡
C	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	1,690	1,300	自発運動低下及び消失、うずくまり姿勢、腹臥姿勢、呼吸緩徐、昏睡、よろめき歩行
D	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	>5,000	>5,000	自発運動低下、よろめき歩行、うずくまり姿勢、呼吸緩徐、5,000 mg/kg 体重で雌1例死亡
F	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	3,280	2,710	腹臥位、自発運動低下または消失、体温低下
K	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし
L	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	5,000	6,120	自発運動低下、よろめき歩行、うずくまり姿勢、腹臥姿勢、呼吸緩徐
M	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	988	745	腹臥位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
N	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	988	1,090	腹臥位、円背位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
O	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	1,280	1,540	腹臥位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行、筋力低下
P	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	2,950	2,050	腹臥位、円背位、自発運動低下または消失、沈静、眼瞼下垂、よろめき歩行
Q	経口	ICR マウス 雌雄各5匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験、ならびに Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization 法) が実施されており、結果はす

べて陰性であった。（参照2）

10. 亜急性毒性試験

(1) 90日間亜急性毒性試験（ラット）

Fischer ラット（一群雌雄各12匹）を用いた混餌（原体：0、20、100、500及び2,500 ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表6に示されている。

本試験において、500 ppm以上投与群の雌雄で肝絶対及び比重量¹⁾増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも100 ppm（雄：5.92 mg/kg 体重/日、雌：6.43 mg/kg 体重/日）と考えられた。（参照2）

表6 ラット90日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制、摂餌量減少 ・ 血色素量、RBC、MCH 減少 ・ MCHC、PLT 増加 ・ GGT、BUN、カルシウム増加 ・ Glu、クロール減少 ・ 脾比重量増加 ・ 肝腫大 ・ 小葉中心性肝細胞肥大、小葉周辺性肝細胞脂肪化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ Ht、RBC、MCV 減少 ・ MCHC、PLT 増加 ・ GGT、BUN、カルシウム増加 ・ TG、Glu、クロール減少 ・ 腎絶対重量増加 ・ 脾絶対及び比重量増加 ・ 肝腫大 ・ 小葉中心性肝細胞肥大、小葉周辺性肝細胞脂肪化
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・ Ht、MCV 減少 ・ TG 減少 ・ 肝絶対及び比重量増加 ・ 腎比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 肝絶対及び比重量増加 ・ 腎比重量増加
100 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 90日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各12匹）を用いた混餌（原体：0、20、100、500及び2,500 ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表7に示されている。

本試験において、100 ppm以上投与群の雄及び500 ppm以上投与群の雌で小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化等が認められたので、無毒性量は雄で20 ppm（2.15 mg/kg 体重/日）、雌で100 ppm（13.6 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照2）

¹⁾ 体重比重量を比重量という（以下同じ）。

表7 マウス90日間亜急性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制 ・ALP、AST 増加 ・A/G 比、TG 減少 ・肝細胞単細胞壊死 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制 ・肝細胞単細胞壊死 ・巣状肝細胞壊死 ・肝の小肉芽腫
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・ALT 増加 ・TP、Alb、T.Chol 減少 ・肝絶対及び比重量増加 ・肝腫大 	<ul style="list-style-type: none"> ・ALT、AST 増加 ・Alb、A/G 比、T.Chol 減少 ・TP 減少（500 ppm のみ） ・肝絶対及び比重量増加 ・肝腫大 ・小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化 	100 ppm 以下 毒性所見なし
20 ppm	毒性所見なし	

(3) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いた混餌（原体：0、40、200及び1,000 ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、1,000 ppm 投与群の雌雄でALP増加、肝絶対及び比重量増加ならびにび慢性肝細胞肥大が認められたので、無毒性量は雌雄とも200 ppm（雄：5.08 mg/kg 体重/日、雌：5.51 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照2）

1.1 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いた混餌（原体：0、40、200及び1,000 ppm）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表8に示されている。

本試験において、200 ppm 以上投与群の雌雄でび慢性肝細胞肥大が認められたので、無毒性量は雌雄とも40 ppm（雄：0.96 mg/kg 体重/日、雌：0.97 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照2）

表8 イヌ1年間慢性毒性試験で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ALP 増加 ・TG、GGT 増加 ・肝絶対重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・ALP 増加 ・Alb 減少、Glob 増加、A/G 比減少 ・肝絶対及び比重量増加
200 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・び慢性肝細胞肥大 	<ul style="list-style-type: none"> ・び慢性肝細胞肥大
40 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)

Fischer ラット [一群雌雄各 85 匹 (主群 50 匹、衛星群 35 匹)] を用いた混餌 (原体 : 0、25、200 及び 1,600 ppm) 投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見 (非腫瘍性病変) は表 9 に、精巣及び肝臓における腫瘍性病変の発生頻度は表 10 に示されている。

1,600 ppm 投与群の雄において、精巣間細胞過形成及び肝細胞腺腫の発生頻度が有意に増加した。精巣間細胞過形成の増加については、対応する腫瘍である間細胞腫の発生頻度は 1,600 ppm 投与群ではむしろ少なく、検体投与による精巣への増殖性病変の誘発を示すものではないと考えられた。肝細胞腺腫に関しては、同群で変異肝細胞巣 (好酸性細胞) も有意に増加しており、検体投与に関連した変化と考えられた。

本試験において、200 ppm 以上投与群の雌雄で近位尿細管褐色色素沈着等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 25 ppm (雄 : 0.85 mg/kg 体重/日、雌 : 1.10 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2)

表 9 ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で認められた毒性所見 (非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
1,600 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制、摂餌量減少傾向、食餌効率低下 ・MCV 減少、MCHC 増加、Ht、RBC 減少、PLT 増加 ・GGT、BUN 増加、TG、クロール減少 ・TP、Alb、A/G 比増加、T.Chol 減少 ・肝絶対及び比重量、腎比重量、脾比重量増加 ・肝臓：暗調化、腫大、び慢性肝細胞脂肪化、小葉中心性肝細胞肥大 ・副腎束状帯細胞空胞化 ・精巣間細胞過形成 ・甲状腺小型小胞増加 専門委員修正 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制、摂餌量減少傾向 ・MCV 減少、MCHC 増加、Ht、RBC 減少、PLT 増加 ・GGT、BUN 増加、TG、クロール減少 ・Alb、A/G 比減少、T.Chol 増加 ・肝絶対及び比重量、腎比重量、脾比重量増加 ・肝臓：暗調化、腫大、斑点、小葉中心性肝細胞肥大、<u>肝小肉芽腫、変異肝細胞巣 (好酸性細胞)</u> ・甲状腺小型小胞増加 専門委員修正
200 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・近位尿細管褐色色素沈着 ・変異肝細胞巣 (好酸性細胞) 	<ul style="list-style-type: none"> ・近位尿細管褐色色素沈着 ・び慢性肝細胞脂肪化
25 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

表 10 精巣及び肝臓における腫瘍性病変の発生頻度

所見		投与量 (ppm)			
		0	25	200	1,600
精巣間細胞腫	雄	41/80	45/80	42/80	38/80
肝細胞腺腫	雄	0/80	1/80	1/80	8/80**
肝細胞癌	雄	0/80	0/80	1/80	2/80

** : p<0.01

(3) 18カ月間発がん性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各 52 匹)を用いた混餌(原体:0、25、100 及び 400 ppm)投与による 18 カ月間発がん性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見(非腫瘍性病変)は表 11 に、肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度は表 12 に示されている。

400 ppm 投与群の雌雄及び 100 ppm 投与群の雄で、肝細胞腺腫の発生頻度が有意に増加し、肝細胞癌の発生頻度もやや増加する傾向にあった。さらに、雄では肝細胞腺腫の初発時期の早期化傾向も認められ、本検体はマウスの肝臓に対して催腫瘍性を有するものと考えられた。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雄で肝細胞腺腫の増加、400 ppm 投与群の雌でび慢性肝細胞脂肪化等が認められたので、無毒性量は雄で 25 ppm (2.54 mg/kg 体重/日)、雌で 100 ppm (9.84 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2)

表 11 マウス 18 カ月間発がん性試験で認められた毒性所見(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
400 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制 ・食餌効率低下 ・肝絶対及び比重量増加 ・肝臓:斑点、腫瘤増加、び慢性肝細胞脂肪化、クッパー細胞褐色色素沈着、肝細胞単細胞壊死、変異肝細胞巢(好酸性細胞、明細胞) 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制 ・食餌効率低下 ・肝絶対及び比重量増加 ・肝臓:小葉像明瞭、腫大、腫瘤増加、び慢性肝細胞脂肪化、肝細胞単細胞壊死、変異肝細胞巢(好酸性細胞)
100 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

表 12 肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度

所見		投与量 (ppm)			
		0	25	100	400
肝細胞腺腫	雄	12/52	10/52	22/52**	26/52**
	雌	1/52	1/52	1/52	12/52**
肝細胞癌	雄	2/52	3/52	3/52	7/52
	雌	0/52	0/52	1/51	3/52

** : p<0.01

1 2. 生殖発生毒性試験**(1) 2 世代繁殖試験(ラット)**

SD ラット(一群雌雄各 24 匹)を用いた混餌(原体:0、20、130 及び 800 ppm)投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 13 に示されている。

800 ppm 投与群の親動物では、F₁ 雄の精巢上体比重量及び F₁ 雌の腎絶対及び比重量の増加もみられたが、病理組織学的変化は認められず、投与とは関連のな

い変化と考えられた。

本試験において、親動物では130 ppm以上投与群でP雌に卵巣比重量増加、F₁雄に包皮分離日齢早期化、F₁雌に膣開口日齢遅延及び下垂体重量増加が認められ、児動物では800 ppm投与群で生存率(4日)低下等が認められたので、無毒性量は、親動物の一般毒性及び性成熟を含む繁殖能に対して20 ppm(P雄:1.25 mg/kg体重/日、P雌:1.42 mg/kg体重/日、F₁雄:1.48 mg/kg体重/日、F₁雌:1.63 mg/kg体重/日)、児動物では130 ppm(P雄:8.25 mg/kg体重/日、P雌:9.00 mg/kg体重/日、F₁雄:9.71 mg/kg体重/日、F₁雌:10.5 mg/kg体重/日)と考えられた。(参照2)

表13 ラット2世代繁殖試験で認められた毒性所見

投与群	親:P、児:F ₁		親:F ₁ 、児:F ₂		
	雄	雌	雄	雌	
親動物	800 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制、摂餌量減少 肝比重量増加 肝臓:暗調化、小葉中心性肝細胞肥大、び慢性肝細胞脂肪化 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加量増加(哺育期間中) 肝、副腎絶対及び比重量増加、卵巣絶対重量増加 肝臓:暗調化、腫大、小葉中心性肝細胞肥大 副腎束状層肥厚 子宮大型着床痕、卵巣大型黄体、子宮脂肪顆粒細胞大型集簇 出産率低下(分娩時死亡4例、死産2例) 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制 小葉中心性肝細胞肥大、び慢性肝細胞脂肪化 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加量増加(哺育期間中) 肝、副腎及び卵巣絶対及び比重量増加 肝臓:暗調化、腫大、小葉中心性肝細胞肥大 副腎束状層肥厚 子宮大型着床痕、卵巣大型黄体、子宮脂肪顆粒細胞大型集簇
	130 ppm以上	130 ppm以下 毒性所見なし	<ul style="list-style-type: none"> 摂餌量減少 卵巣比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> 包皮分離日齢早期化 	<ul style="list-style-type: none"> 下垂体絶対重量増加 膣開口日齢遅延
	20 ppm		毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	800 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 生存率(4日)低下 腎盂拡張 上顎切歯萌出日齢遅延 		<ul style="list-style-type: none"> 生存率(4日)低下 腎盂拡張 上顎切歯萌出日齢遅延 	
	130 ppm以下	毒性所見なし		毒性所見なし	

(2) 発生毒性試験(ラット)

SDラット(一群雌24匹)の妊娠6~15日に強制経口(原体:0、5、20及び100 mg/kg体重/日、溶媒:1%CMC水溶液)投与して発生毒性試験が実施された。

100 mg/kg 体重/日投与群で、母動物に体重増加抑制、摂餌量減少及び補正体重²⁾の低下がみられた。同群の胎児では、胚・胎児死亡率が11%とやや高かった。これは統計学的に有意ではなかったが、背景データの範囲（2.2～10.0%）を超えており、さらに、用量設定試験においても100 mg/kg 体重/日以上投与群で有意に高かったことから、検体投与との関連が示唆された。また、100 mg/kg 体重/日投与群では、胎盤重量の増加及び骨格変異（頸肋、腰肋等）の出現頻度の有意な増加が認められた。これらの所見も用量設定試験で得られた結果と一致しており、検体投与に関連した変化と考えられた。一方、外表、内臓及び骨格奇形ならびに内臓変異の出現頻度には、検体投与に関連した影響は認められなかった。

本試験において、100 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制等が、胎児で死亡率の上昇等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児で20 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2）

（3）発生毒性試験（ウサギ）

日本白色種ウサギ（一群雌17～18匹）の妊娠6～18日に強制経口（原体：0、5、30及び150 mg/kg 体重/日、溶媒：1%CMC水溶液）投与して発生毒性試験が実施された。

150 mg/kg 体重/日投与群で、母動物に軽度の体重増加抑制がみられ、統計学的な有意差はなかったが、投与期間中継続的に認められたことから、投与に関連した変化と考えられた。胎児に対しては、いずれの投与群においても投与の影響は認められなかった。

本試験において、150 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制がみられ、胎児ではいずれの投与群においても影響が認められなかったので、無毒性量は母動物で30 mg/kg 体重/日、胎児で150 mg/kg 体重/日と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2）

1.3. 遺伝毒性試験

シメコナゾール（原体）の細菌を用いたDNA修復試験、復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター肺由来（CHL）細胞を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。試験結果は表14に示されているとおりすべて陰性であった。（参照2）

²⁾ 妊娠20日の体重から妊娠子宮重量を減じた重量

表14 遺伝毒性試験概要(原体)

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA修復試験	<i>Bacillus subtilis</i> (H-17、M-45株)	100~5,000 µg/ディスク 1~200 µg/ディスク 20~150 µg/ディスク (+/-S9)	陰性
	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537株)	7.8~500 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
		<i>Escherichia coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	78~5,000 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター 肺由来(CHL)細胞	10~160 µg/mL (24時間処理、-S9) 5~80 µg/mL (48時間処理、-S9) 15.6~250 µg/mL (6時間処理、+S9)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験	ICRマウス(骨髄細胞) (一群雌雄各5匹)	125、250、500 mg/kg体重 (単回強制経口投与)	陰性

注) +/-S9: 代謝活性化系存在下及び非存在下

代謝物(B、C、D、F、K及びL)ならびに原体混在物(M、N、O、P及びQ)の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。この他に、原体混在物NについてはCHL細胞を用いた染色体異常試験が実施された。試験結果は表15に示されている。

原体混在物Nは、TA98株においてのみ代謝活性化系非存在下で弱い復帰突然変異誘発性を示したが、菌株の生育阻害が認められる直前の用量のみで対照群の2倍程度の反応であること、代謝活性化系の導入により陰性となること、含有量が0.2%以下の原体混在物であり暴露量は非常に少ないと想定されることから、生体にとって特段問題となるものではないものと考えられた。その他の原体混在物及び代謝物の試験結果はすべて陰性であった。(参照2)

表15 遺伝毒性試験概要(代謝物及び原体混在物)

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
B	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	156~5,000 µg/プレート (+/-S9、各2回)	陰性
C	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	20~5,000 µg/プレート 313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
D	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、 TA1537株)	100~5,000 µg/プレート 156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		<i>S. typhimurium</i> (TA98株)	100~5,000 µg/プレート(-S9) 200~5,000 µg/プレート(+S9) 156~5,000 µg/プレート(+/-S9)	
		<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	200~5,000 µg/プレート 313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	
F	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	21~5,000 µg/プレート 156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
K	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	200~5,000 µg/プレート 313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
L	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	20~5,000 µg/プレート 313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
M	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	62~5,000 µg/プレート 313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
N	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	21~5,000 µg/プレート 156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		<i>S. typhimurium</i> (TA98株)	21~5,000 µg/プレート 500~4,000 µg/プレート (+/-S9)	
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター肺 由来培養細胞 (CHL)	254~2,030 µg/mL ¹⁾ (+/-S9)	陰性
O	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	18.5~4,500 µg/プレート 125~4,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
P	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	7.4~1,800 µg/プレート 56.3~1,800 µg/プレート (+/-S9)	陰性

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
Q	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA98、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	21~5,000 µg/プレート 156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

注) +/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下

¹⁾：2,030 µg/mL ではすべての系列で細胞毒性のため観察ができなかった。

14. その他の試験

(1) 肝腫瘍発現機序検討試験

ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験[11. (2)]でみられた肝細胞腫瘍の発生機序を解明するために、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能について検討された。

① 雄 Fischer ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験

Fischer ラット（一群雄 12 匹）を用いた混餌（原体：0、25、200 及び 1,600 ppm）投与による7日間肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が実施された。

1,600 ppm 投与群で肝絶対及び比重量増加、肝腫大及び慢性肝細胞肥大が認められ、ミクロソーム蛋白量、チトクローム P450 量及び PROD 活性が有意に増加した。また、CYP2B1 及び CYP3A2 含量が有意に増加し、CYP1A2 及び CYP4A1 含量が有意に減少した。200 ppm 投与群においても PROD 活性の有意な増加がみられた。これらの変化は PB による酵素誘導パターンと類似しており、シメコナゾールの肝薬物代謝酵素誘導能が確認された。肝細胞増殖活性検査では、1,600 ppm 投与群の投与3日後において PCNA 標識率の有意な増加がみられたが、投与7日後では有意差はみられなかった。一般に、非変異原性肝発がん物質による細胞増殖効果は、投与開始後2~3日でピークに達し、その後は投与を継続しても消失することが知られており、本試験においても同様な傾向が認められた。

本試験において、200 ppm 以上投与群に PROD 活性の有意な増加が認められたので、無影響量は 25 ppm（1.5 mg/kg 体重/日）であり、肝薬物代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用に閾値があると考えられた。（参照2）

② 雌 Fischer ラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験

前述[14. (1)①]の追加試験として、Fischer ラット（一群雌 12 匹）を用いた混餌（原体：0、25、200 及び 1,600 ppm）投与による7日間肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が実施された。

1,600 ppm 投与群で肝絶対及び比重量増加、肝腫大及び慢性肝細胞肥大が認められ、ミクロソーム蛋白量、チトクローム P450 量及び PROD 活性が有意に増加した。また、CYP2B1、CYP3A2 及び CYP4A1 含量が有意に増加した。200 ppm

投与群では CYP1A2、CYP2B1 及び CYP3A2 含量の有意な増加が認められた。これらの変化は PB による酵素誘導パターンと類似しており、シメコナゾールの肝薬物代謝酵素誘導能が確認された。肝細胞増殖活性検査では、200 ppm 以上の投与群の投与 3 日後において PCNA 標識率の有意な増加がみられたが、投与 7 日後では有意差はみられず、雄と同様であった。

本試験において、200 ppm 以上の投与群で CYP2B1 及び CYP3A2 含量の有意な増加が認められたので、無影響量は 25 ppm (1.5 mg/kg 体重/日) であり、肝薬物代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用には閾値があることが、雄ラットの場合と同様に示唆された。(参照 2)

③ 変異肝細胞巢の細胞増殖活性検査

Fischer ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験[11. (2)]における対照群及び 1,600 ppm 投与群の投与 52、78 及び 104 週後の計画殺動物、各群雌雄 10 匹から得られた肝組織標本を用いて、各時期に肝発がん過程で観察された変異肝細胞巢、特に好酸性及び好塩基性細胞巢の細胞増殖活性について比較検討された。

1,600 ppm 投与群では、52 週後で雄の好酸性変異肝細胞巢の PCNA 標識率は対照群に比して高値を示す傾向にあったが、~~91、78 週以降ではなく、本剤の細胞分裂促進効果に起因する変化である可能性が示唆された。~~雌では変化はみられなかった。また、雌雄とも好酸性及び好塩基性細胞巢の両細胞巢間における細胞増殖活性の差異は認められなかった。(参照 2)

【専門委員コメント】

この実験には理解できない部分がたくさんあります。

- まず、この実験の目的です。一般に GSTP 変異巢などでは、比較は変異巢の数、面積で行います。また増殖活性があるかは肝臓全体で観察します。これは①、②で行っています。この実験では変異巢の個体あたりの数などに触れることなく、単に変異巢内の PCNA 標識率だけを見えています。この実験は、対照群と投与群で発現した変異巢が性格が違うものということを出したいのでしょうか。少なくともこの実験結果から mitogenic activity などが投与によりあがったという表現はすくなくとも評価所からは削除していただきたいと思います。
- 動物数について。抄録 p.134 の慢毒・発癌性の表での各検査時期に認められた変異巢の発生頻度と、抄録 p.181 の細胞増殖活性を調べた報告書の各時期の動物数が全く合いません。同じ試験だと思うのですが、当方の勘違いでしょうか。もし発生頻度が異なっている場合、この試験は evidence もないので評価には用いなくてもよいと思います。

以上のことから、Fischer ラットにおける肝細胞腫瘍の発生頻度の増加には、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖活性の増加が関連していると考えられ、これらの作用には閾値があることが示唆された。

（2）分娩異常発現機序検討試験

① 雌SDラットを用いた血清中ホルモン測定試験

ラットの2世代繁殖試験[12. (1)]において認められた分娩異常の原因を考察するために、SDラット（一群雌12匹）に原体を0、20、130または800 ppmの用量で28日間混餌投与して、血清中ホルモンが測定された。

800 ppm投与群で、黄体化ホルモンが有意に増加し、プロゲステロンが上昇傾向を示した。これらのホルモンは分娩時に低下することが知られており、繁殖試験でみられた分娩時死亡及び死産は、検体投与によってこれらのホルモン濃度の低下が阻害されたため、一部の母動物に分娩遅延が生じて分娩異常が惹起された可能性が考えられた。（参照2）

（3）腎盂拡張発現機序検討試験

SDラットの2世代繁殖試験[12. (1)]において、児動物に腎盂拡張が認められたのに対し、SDラットの発生毒性試験[12. (2)]では認められなかった原因を考察するため、母動物の血圧調節及び血管収縮に及ぼす影響、ならびに胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験が実施された。

① 妊娠SDラットにおける血圧調節に及ぼす影響に関する試験

SDラット（一群雌12匹）に原体を0、20、130または800 ppmの用量で約7週間（交配前3週間及び妊娠20日まで）混餌投与し、妊娠ラットにおける血圧調節に及ぼす影響について検討した結果、800 ppm投与群で母動物の血中レニン活性に低下傾向がみられたが、血圧及び心拍数には群間で差は認められず、本試験における用量では血圧や心拍数に対して影響はないと考えられた。（参照2）

② 血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験

SDラット（一群雄6匹）の頸動脈を用いて、アンギオテンシンI及びアンギオテンシンIIの血管収縮反応に対するシメコナゾール投与の影響について検討された。

シメコナゾールは、 3.4×10^{-7} ～ 3.4×10^{-5} Mの濃度範囲において、アンギオテンシンI及びアンギオテンシンIIによる両収縮反応を同等に濃度依存的に抑制したことから、アンギオテンシンIからアンギオテンシンIIに変換するアンギオテンシン変換酵素活性に対する作用は有さず、受容体に対する直接的な拮抗作用を有するものと考えられた。（参照2）

③ 胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験（1世代繁殖試験）

SDラット（一群雌16匹）に、妊娠0～20日または哺育0～21日に原体を0、20、130または800 ppmの用量で混餌投与し、胎児または哺育児の腎臓に及ぼ

す影響について検討された。

妊娠期暴露試験では、800 ppm 投与群で離乳児の腎盂拡張の出現頻度（8.9%）が、統計学的に有意ではないが対照群値（1.6%）を上回り、腎盂内に貯留する尿量も増加し、検体投与による腎盂拡張の誘発が示唆された。哺育期暴露試験では、母動物全例に肝腫大が認められたが、哺育児の腎臓に異常はみられなかった。（参照2）

腎盂拡張については、妊娠期（特に後期）に検体投与された母動物から生まれた児動物において哺育中期から後期にかけて発生する（遅発性の催奇形性作用）ので、胎児期及び離乳期以前では検出されない。よって、発生毒性試験における胎児及び本試験における哺育期暴露群の哺育児においては腎盂拡張が認められなかったものと考えられる。血圧調節に及ぼす影響に関する試験[14. (3)①]及び血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験[14. (3)②]の結果から、この腎盂拡張は、シメコナゾールのレニン/アンギオテンシン系に対する循環調節阻害（特に、アンギオテンシン受容体拮抗作用）に起因すると考えられた。本所見に対する無毒性量は130 ppm（妊娠期：8.7 mg/kg 体重/日、哺育期：19.2 mg/kg 体重/日）と考えられた。

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて、農薬「シメコナゾール」の食品健康影響評価を実施した。

動物体内において、シメコナゾールは速やかに吸収及び排泄された。ラットでは主な排泄経路は胆汁中で、投与後 72 時間で 80%TAR 以上が糞尿中に排泄された。組織及び器官への残留性は認められなかった。糞尿中に親化合物は認められず、主要代謝物として雄では尿中に I が、雌では糞尿中に D の硫酸抱合体が検出された。胆汁中の主要代謝物は D のグルクロン酸抱合体であった。主な代謝経路は代謝物 D への酸化で、さらに硫酸抱合やグルクロン酸抱合を受ける経路であった。マウスにおいてもラットと同様にシメコナゾールの吸収及び排泄は速やかで、組織及び器官への残留性も認められなかった。主要代謝物は雌雄とも D のグルクロン酸抱合体であった。

植物体内における主要代謝物は D の糖抱合体であった。

シメコナゾール、代謝物 D 及び F を分析対象化合物とした作物残留試験の結果、シメコナゾールの最高値は、もも（果皮）を除くと、最終散布 7 日後に収穫した茶（荒茶）の 8.30 mg/kg であった。また、魚介類における最大推定残留値は 0.154 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、シメコナゾール投与により主に肝臓に影響が認められた。遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、雄ラット及び雌雄マウスで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価にあたり閾値を設定することは可能であると考えられた。また、催奇形性については、2 世代繁殖試験においてラットの児動物に腎盂拡張が認められたが、追加で実施された「胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験（1 世代繁殖試験）」等の結果、これはレニン／アンジオテンシン系に対する循環調節阻害によるものであり、この変化には閾値が存在すると考えられた。また、安全係数は 100 が妥当であると判断された。

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をシメコナゾール（親化合物のみ）と設定した。

評価に用いた各試験の無毒性量等は表 16 に示されている。

食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験の無毒性量の最小値がラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.85 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0085 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量 (ADI) と設定した。

ADI	0.0085 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 年間

（投与方法）	混餌
（無毒性量）	0.85 mg/kg 体重/日
（安全係数）	100

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

表16 各試験における無毒性量

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾
			農薬抄録
ラット	90日間 亜急性 毒性試験	0、20、100、500、2,500 ppm	雄：5.92 雌：6.43
		雄：0、1.19、5.92、30.2、152 雌：0、1.30、6.43、32.3、158	雌雄：肝絶対及び比重量増加等
	2年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	0、25、200、1,600 ppm	雄：0.85 雌：1.10
		雄：0、0.85、6.76、56.8 雌：0、1.10、8.72、70.4	雌雄：近位尿細管褐色色素沈着等 肝細胞腺腫増加(雄)
2世代 繁殖試験	0、20、130、800 ppm	親動物、繁殖能 P雄：1.25 F ₁ 雄：1.48 P雌：1.42 F ₁ 雌：1.63	
	P雄：0、1.25、8.25、50.3 P雌：0、1.42、9.00、56.0 F ₁ 雄：0、1.48、9.71、60.8 F ₁ 雌：0、1.63、10.5、65.4	児動物 P雄：8.25 F ₁ 雄：9.71 P雌：9.00 F ₁ 雌：10.5 親動物、繁殖能：卵巣比重量増加、 包皮分離日齢早期化等 児動物：生存率低下等	
発生毒性 試験	0、5、20、100	母動物：20 胎児：20 母動物：体重増加抑制等 胎児：死亡率上昇等 (催奇形性は認められない)	
マウス	90日間 亜急性 毒性試験	0、20、100、500、2,500 ppm	雄：2.15 雌：13.6
		雄：0、2.15、11.5、55.1、263 雌：0、2.69、13.6、66.1、316	雌雄：小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化等
18カ月間 発がん性 試験	0、25、100、400 ppm	雄：2.54 雌：9.84	雄：2.54 雌：9.84
		雄：0、2.54、10.6、42.9 雌：0、2.41、9.84、41.3	雄：肝細胞腺腫 雌：び慢性肝細胞脂肪化等 肝細胞腺腫増加(雌雄)
ウサギ	発生毒性 試験	0、5、30、150	母動物：30 胎児：150 母動物：体重増加抑制 (催奇形性は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾
			農薬抄録
イヌ	90日間 亜急性 毒性試験	0、40、200、1,000 ppm	雄：5.08 雌：5.51
		雄：0、1.03、5.08、25.8 雌：0、1.10、5.51、29.0	雌雄：ALP 増加等
	1年間 慢性毒性 試験	0、40、200、1,000 ppm	雄：0.96 雌：0.97
		雄：0、0.96、4.78、22.4 雌：0、0.97、4.88、25.0	雌雄：び慢性肝細胞肥大
ADI			NOAEL：0.85 SF：100 ADI：0.0085
ADI 設定根拠資料			ラット2年間慢性毒性/発がん性 併合試験

NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 ADI：一日摂取許容量

¹⁾：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙1:代謝物/分解物等略称>

記号	略称	化学名
B	AST-200	1-[2-(4-フルオロフェニル)アリル]-1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール
C	AST-474	1-(4-フルオロフェニル)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノン
D	HMF-155	(<i>RS</i>)-2-(4-フルオロフェニル)-1-ヒドロキシメチルジメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
E	ATP-3501	2-(4-フルオロフェニル)-1-ヒドロキシジメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
F	ATP-3118	(<i>RS</i>)-2-(4-フルオロフェニル)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-1,2-ジオール
G	ATP-3502	2-(4-フルオロフェニル)-2-ヒドロキシ-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロピオン酸
H	R5	3-(4-フルオロフェニル)-3-ヒドロキシ-4-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)酪酸
I	R11	2-(4-フルオロフェニル)-1-ジヒドロキシメチルシリル-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
J	トリアゾール	1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール
K	トリアゾリル-L-アラニン	3-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)-L-アラニン
L	トリアゾリル酢酸	(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)酢酸
M	ATP-2474	原体混在物
N	ARK-158	原体混在物
O	AST-199	原体混在物
P	AST-292	原体混在物
Q	AST-293	原体混在物

<別紙2: 検査値等略称>

略称	名称
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量
Alb	アルブミン
ALP	アルカリホスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT))
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT))
BCF	生物濃縮係数
BUN	血液尿素窒素
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
CYP	チトクローム P450 アイソザイム
GGT	γ-グルタミルトランスフェラーゼ (=γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ (γ-GTP))
Glob	グロブリン
Glu	グルコース (血糖)
Ht	ヘマトクリット値
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
MCH	平均赤血球ヘモグロビン量
MCHC	平均赤血球血色素濃度
MCV	平均赤血球容積
NADPH	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
PB	フェノバルビタール
PCNA	増殖性細胞核抗原
PEC	環境中予測濃度
PHI	最終使用から収穫までの日数
PLT	血小板数
PROD	ペントキシレゾルフィン O-デアアルキラーゼ
PT	プロトロンビン時間
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与 (処理) 放射能
T.Chol	総コレステロール
TG	トリグリセリド
T _{max}	最高濃度到達時間

TP	総蛋白質
----	------

＜別紙3：作物残留試験成績＞

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 D		代謝物 F	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
稲 (玄米) 1997年度	1	600 ^G	1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				52	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	68	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	2	600 ^G	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
			52	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	68	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
1	600 ^G	1	53	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
			62	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
78	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
2	600 ^G	53	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		62	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
78	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
稲 (稲わら) 1997年度	1	600 ^G	1	43	0.07	0.06	0.12	0.08	<0.02	<0.02
				52	0.09	0.07	0.08	0.08	<0.02	<0.02
	68	0.13		0.08	0.13	0.12	<0.02	<0.02		
	2	600 ^G	43	0.19	0.16	0.14	0.12	0.02	0.02*	
			52	0.36	0.31	0.27	0.26	0.03	0.02*	
	68	0.16	0.14	0.15	0.10	0.02	0.02*			
1	600 ^G	1	53	0.31	0.27	0.11	0.10	<0.02	<0.02	
			62	0.15	0.12	0.14	0.10	<0.02	<0.02	
78	0.14		0.10	0.12	0.11	<0.02	<0.02			
2	600 ^G	53	0.49	0.42	0.26	0.24	<0.02	<0.02		
		62	0.29	0.27	0.19	0.16	<0.02	<0.02		
78	0.22	0.18	0.24	0.18	<0.02	<0.02				
稲 (玄米) 2003年度	1	600 ^G	2	21	0.04	0.04				
				28	0.04	0.04				
				42	0.02	0.02				
稲 (稲わら) 2003年度	1	600 ^G	2	21	3.62	3.36				
				28	2.09	1.70				
				42	0.74	0.72				
だいず (乾燥子実) 2000年度	2	160 ^D	2	14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				30	0.05	0.04	<0.02	0.02*	<0.02	<0.02
				60	0.04	0.03	0.02	0.02*	<0.02	<0.02
			4	14	0.05	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				30	0.10	0.08	0.02	0.02*	<0.02	<0.02
				60	0.05	0.03	<0.02	0.02*	<0.02	<0.02
だいず (乾燥子実) 2002年度	2	300	2	14	<0.02	<0.02				
				30	0.04	0.04				
				60	0.03	0.02				
			4	14	0.05	0.04				
				30	0.13	0.08				
				60	0.04	0.03				

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験圃 場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 D		代謝物 F	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
だいず (乾燥子実) 2004年度	2	500	2	14 29-30 59-60	<0.01 0.02 0.01	<0.01 0.01 0.01*	/	/	/	/
葉ねぎ (茎葉) 2000年度	2	75	3	3 7 14 21	0.03 <0.02 <0.02 <0.02	0.02* <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
葉ねぎ (茎葉) 2003年度	2	900 ^G	3	14 21 18	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
根深ねぎ (茎葉) 2000年度	2	75	3	3 7 14 21	0.18 0.14 0.05 0.05	0.12 0.07* 0.04* 0.04*	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
根深ねぎ (茎葉) 2000年度	2	900 ^G	3	14 21 18	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
にんにく (鱗茎) 2001年度	2	100~ 150	3	7 14 21	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	/	/	/	/
トマト (施設) (果実) 2002年度	2	75	3	1 7 14	0.03 0.02 0.01	0.02* 0.01 0.01*	/	/	/	/
きゅうり (施設) (果実) 2000年度	2	79.5~ 125	3 5	1 3 7 1 3 7	0.08 0.06 0.03 0.11 0.07 0.04	0.06 0.04 0.02* 0.07 0.04 0.02*	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
かぼちゃ (果実) 2006年度	2	80	2	21 30 45	<0.05 <0.05 <0.05	<0.03 <0.03 <0.03	/	/	/	/
すいか (施設) (果実) 2003年度	2	75~150	5	1 7-8 14	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
メロン (施設) (果実) 2000年度	2	125	3 5	1 7 14 1 7 14	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
みかん (施設無袋) (果肉) 2000年度	2	250	3	7 14 21	0.02 <0.02 <0.02	0.02* <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験 圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 D		代謝物 F	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (施設無袋) (果皮) 2000年度	2	250	3	7	0.30	0.20	0.05	0.02	<0.02	<0.02
				14	0.15	0.11	0.06	0.03	<0.02	<0.02
				21	0.08	0.08	0.03	0.02	<0.02	<0.02
夏みかん (無袋) (果実) 2000年度	2	319~ 350	3	7	0.20	0.11	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.08	0.04*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.06	0.04*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ゆず (無袋) (果実) 2000年度	2	250~ 400	3	7	0.23	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.11	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.09	0.05*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
りんご (無袋) (果実) 1997年度	2	350	1	14	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				30	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			2	14	0.04	0.03*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				30	0.05	0.03*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			3	59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.04	0.04*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
21	0.04	0.03*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02				
	30	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02			
59-60	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02				
りんご (無袋) (果実) 2000年度	2	700~ 830	3	7	0.14	0.08	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.04	0.03*	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.03	0.02*	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
なし (無袋) (果実) 1998年度	2	200	2	1	0.21	0.15	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.07	0.04*	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
			3	1	0.29	0.21	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				14	0.07	0.06	0.03	0.03*	<0.02	<0.02
				21	0.03	0.03*	0.03	0.03*	<0.02	<0.02
				28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
なし (無袋) (果実) 2003年度	2	350~ 400	3	7	0.18	0.12	/	/	/	/
				14	0.15	0.09	/	/	/	/
				21	0.10	0.04*	/	/	/	/
もも (無袋) (果肉) 1998年度	2	150~ 200	2	14	0.04	0.03*	0.03	0.03*	<0.02	<0.02
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02
				28	<0.03	<0.03	0.04	0.03*	0.02	0.02*
				3	14	0.04	0.03*	0.04	0.03*	0.03
			3	21	<0.03	<0.03	0.03	0.03*	0.04	0.02*
				28	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.02*
				14	0.04	0.03*	0.04	0.03*	0.03	0.02*
				21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.02*

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験 圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 D		代謝物 F	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
もも (無袋) (果皮) 1998年度	2	150~ 200	2	14	0.67	0.39	0.07	0.05*	0.04	0.03*
				21	0.24	0.18	0.06	0.04*	0.03	0.02*
				28	0.12	0.06*	0.04	0.04*	0.04	0.03*
			3	14	0.60	0.33	0.10	0.06*	0.07	0.04*
				21	0.31	0.20	0.09	0.04*	0.06	0.04*
				28	0.15	0.10*	0.10	0.05*	0.06	0.04*
もも (無袋) (果肉) 2000年度	2	36~40	3	1	0.31	0.21				
				7	0.18	0.13				
				14	0.08	0.05				
もも (無袋) (果皮) 2000年度	2	36~40	3	1	10.3	6.20				
				7	4.47	2.55				
				14	1.27	0.80				
ネクタリン (無袋) (果実) 2003年度	2	270~ 400	3	1	0.39	0.32				
				7	0.14	0.08				
				14	0.04	0.03*				
あんず (露地無袋) (果実) 2006年度	2	400	3	1	0.41	0.34				
				3	0.32	0.27				
				7	0.09	0.08				
すもも (無袋) (果実) 2005年度	2	400~ 500	3	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
				3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
				7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
うめ (無袋) (果実) 2007年度	2	400	3	1	0.51	0.41				
				3	0.26	0.18				
				7	0.06	0.06*				
おうとう (施設) (果実) 2001年度	2	400~ 625	3	1	1.13	0.80				
				3	0.86	0.60				
				7	0.60	0.49				
				14	0.30	0.17				
いちご (施設) (果実) 2004年度	2	200	3	1	1.49	0.76				
				3	1.09	0.59				
				7	0.67	0.34				
ぶどう (施設無袋) (果実) 2001年度	2	150~ 200	3	14	0.13	0.07*				
				21	0.07	0.04*				
				28	0.07	0.04*				
かき (無袋) (果実) 1999年度	2	175~ 218	4	7	0.10	0.06	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				14	0.09	0.06	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02
				21	0.07	0.04*	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					シメコナゾール		代謝物 D		代謝物 F	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
茶 (荒茶) 1999年度 摘採10日前 から簡易 被覆	2	100	1	7	4.58	2.65	1.70	1.10	0.04	0.03
				14	0.88	0.65	0.76	0.66	0.02	0.02*
				21	0.10	0.08	0.31	0.28	<0.02	<0.02
			2	7	4.80	3.18	1.91	1.48	0.04	0.03
				14	0.91	0.64	0.94	0.77	0.02	0.02*
				21	0.12	0.09	0.34	0.33	<0.02	<0.02
茶 (浸出液) 1999年度 摘採10日前 から簡易 被覆	2	100	1	7	1.91	1.14	1.14	0.82	0.03	0.02*
				14	0.31	0.28	0.59	0.53	0.02	0.02*
				21	0.06	0.04	0.26	0.22	<0.02	<0.02
			2	7	2.01	1.45	1.21	1.16	0.03	0.03
				14	0.34	0.28	0.68	0.64	0.02*	0.02*
				21	0.09	0.06	0.28	0.21	<0.02	<0.02
茶 (荒茶) 2004年度	2	200	1	7	6.00	4.08				
				14	1.60	1.08				
				21	<0.50	0.31*				
			2	7	8.30	5.92				
				14	2.10	1.58				
				21	<0.50	0.33*				
茶 (浸出液) 2004年度	2	200	1	7	2.17	1.55				
				14	0.63	0.47				
				21	0.07	0.06*				
			2	7	2.58	2.09				
				14	0.78	0.67				
				21	0.10	0.08				

注)・使用量欄に G 印は粒剤、D 印は粉剤、それ以外は水和剤を用いた。

- ・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとして計算し、*印を付した。
- ・すべてのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

<参照>

1. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付、平成 17 年厚生労働省告示第 499 号）
2. 農薬抄録シメコナゾール（殺菌剤）（平成 18 年 12 月 21 日改訂）：三共アグロ株式会社、未公表
3. 食品健康影響評価について
（URL;<http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-uke-simeconazole-190206.pdf>）
4. 第 177 回食品安全委員会
（URL;<http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai177/dai177kai-siryou1-3.pdf>）
5. 第 4 回食品安全委員会農薬専門調査会確認評価第三部会
（URL;http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kakunin3_dai4/index.html）
6. 食品健康影響評価について
（URL; http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-uke-simeconazole_190605.pdf）
7. シメコナゾールの魚介類における最大推定残留値に係る資料
8. 第 193 回食品安全委員会
（URL; <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai193/dai193kai-siryou1-2.pdf>）
9. 第 20 回食品安全委員会農薬専門調査会幹事会
（URL;http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kanjikai_dai20/index.html）
10. 食品健康影響評価について
（URL;http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-uke-simeconazole_201007.pdf）
11. シメコナゾールの作物残留性試験成績：三共アグロ株式会社、2008 年、未公表
12. 第 257 回食品安全委員会
（URL; <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai257/dai257kai-siryou1-2.pdf>）
13. 第 46 回食品安全委員会農薬専門調査会幹事会
（URL;http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kanjikai_dai46/index.html）