

（案）

農薬評価書

フェンチオン

2009年9月11日

食品安全委員会農薬専門調査会

目 次

	頁
○ 審議の経緯.....	4
○ 食品安全委員会委員名簿.....	4
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	5
○ 要約.....	7
I. 評価対象農薬の概要.....	8
1. 用途.....	8
2. 有効成分の一般名.....	8
3. 化学名.....	8
4. 分子式.....	8
5. 分子量.....	8
6. 構造式.....	8
7. 開発の経緯.....	8
II. 安全性に係る試験の概要.....	9
1. 動物体内運命試験.....	9
(1) ラット①.....	9
(2) ラット②.....	12
(3) ヤギ.....	13
2. 植物体内運命試験.....	14
(1) 水稻.....	14
(2) アルファルファ.....	14
(3) グアバ.....	15
3. 土壌中運命試験.....	16
(1) 好氣的湛水土壌中運命試験.....	16
(2) 好氣的及び嫌氣的土壌中運命試験.....	17
(3) 嫌氣的湛水土壌中運命試験.....	19
(4) 土壌吸着試験.....	20
4. 水中運命試験.....	20
(1) 加水分解試験.....	20
(2) 水中光分解試験（自然水）.....	21
(3) 水中光分解試験（緩衝液）.....	21
5. 土壌残留試験.....	21
6. 作物等残留試験.....	22
(1) 作物残留試験.....	22
(2) 魚介類における最大推定残留値.....	22

1	8. 一般薬理試験	23
2	9. 急性毒性試験	24
3	(1) 急性毒性試験	24
4	(2) 急性神経毒性試験（ラット）	25
5	(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）	26
6	10. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	26
7	11. 亜急性毒性試験	27
8	(1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）	27
9	(2) 16 週間亜急性毒性試験（ラット）	27
10	(3) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）	28
11	(4) 12 週間亜急性毒性試験（イヌ）＜参考データ＞	28
12	(5) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）	29
13	(6) 30 日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）	30
14	12. 慢性毒性試験及び発がん性試験	30
15	(1) 1 年間慢性毒性試験（ラット）＜参考データ＞	30
16	(2) 2 年間慢性毒性試験（ラット）	31
17	(3) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	31
18	(4) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）	32
19	(5) 2 年間慢性毒性試験（イヌ）	32
20	(6) 2 年間慢性毒性試験（サル）	33
21	(7) 2 年間発がん性試験（マウス）	33
22	13. 生殖発生毒性試験	33
23	(1) 3 世代繁殖試験（ラット）	33
24	(2) 2 世代繁殖試験（ラット）	33
25	(3) 発生毒性試験（ラット）①	34
26	(4) 発生毒性試験（ラット）②	34
27	(5) 発生毒性試験（ウサギ）①	35
28	(6) 発生毒性試験（ウサギ）②	36
29	14. 遺伝毒性試験	37
30	15. その他の試験	38
31	(1) ヒトにおける 4 週間反復投与試験	38
32	(2) ChE 活性測定試験	38
33		
34	Ⅲ. 食品健康影響評価	40
35		
36	・別紙 1：代謝物/分解物略称	48
37	・別紙 2：検査値等略称	49
38	・別紙 3：作物残留試験成績	50

1	・ 参照.....	54
---	-----------	----

1 <審議の経緯>

2 ー清涼飲料水関係ー

1960 年 11 月 12 日 初回農薬登録
 2003 年 7 月 1 日 厚生労働大臣より清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第 0701015 号）
 2003 年 7 月 3 日 関係書類の接受（参照 1）
 2003 年 7 月 18 日 第 3 回食品安全委員会（要請事項説明）（参照 2）
 2003 年 10 月 8 日 追加資料受理（参照 3）
 （フェンチオンを含む要請対象 93 農薬を特定）
 2003 年 10 月 27 日 第 1 回農薬専門調査会（参照 4）
 2004 年 1 月 28 日 第 6 回農薬専門調査会（参照 5）
 2005 年 1 月 12 日 第 22 回農薬専門調査会（参照 6）

3

4 ーポジティブリスト制度及び魚介類の残留基準設定関係ー

2005 年 11 月 29 日 残留農薬基準告示（参照 7）
 2008 年 12 月 5 日 農林水産省から厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）
 2009 年 1 月 20 日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第 0120006 号）、関係書類の接受（参照 8～16、18）
 2009 年 1 月 22 日 第 270 回食品安全委員会（要請事項説明）（参照 19）
 2009 年 3 月 24 日 第 31 回農薬専門調査会総合評価第一部会（参照 20）
 2009 年 9 月 11 日 第 55 回農薬専門調査会幹事会（参照 21）

5

6 <食品安全委員会委員名簿>

(2006 年 6 月 30 日まで)	(2006 年 12 月 20 日まで)	(2009 年 6 月 30 日まで)
寺田雅昭（委員長）	寺田雅昭（委員長）	見上 彪（委員長）
寺尾允男（委員長代理）	見上 彪（委員長代理）	小泉直子（委員長代理*）
小泉直子	小泉直子	長尾 拓
坂本元子	長尾 拓	野村一正
中村靖彦	野村一正	畑江敬子
本間清一	畑江敬子	廣瀬雅雄**
見上 彪	本間清一	本間清一

*：2007 年 2 月 1 日から

**：2007 年 4 月 1 日から

（2009 年 7 月 1 日から）

小泉直子（委員長）

見上 彪（委員長代理*）

長尾 拓

野村一正

畑江敬子

廣瀬雅雄

村田容常

*：2009 年 7 月 9 日から

1

2 <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

（2006 年 3 月 31 日まで）

鈴木勝士（座長）

廣瀬雅雄（座長代理）

石井康雄

江馬 真

太田敏博

小澤正吾

高木篤也

武田明治

津田修治*

津田洋幸

出川雅邦

長尾哲二

林 真

平塚 明

吉田 緑

*：2005 年 10 月 1 日から

（2007 年 3 月 31 日まで）

鈴木勝士（座長）

廣瀬雅雄（座長代理）

赤池昭紀

石井康雄

泉 啓介

上路雅子

臼井健二

江馬 真

大澤貫寿

太田敏博

大谷 浩

小澤正吾

小林裕子

三枝順三

佐々木有

高木篤也

玉井郁巳

田村廣人

津田修治

津田洋幸

出川雅邦

長尾哲二

中澤憲一

納屋聖人

成瀬一郎

布柴達男

根岸友恵

林 真

平塚 明

藤本成明

細川正清

松本清司

柳井徳磨

山崎浩史

山手丈至

與語靖洋

吉田 緑

若栗 忍

根岸友恵

（2008 年 3 月 31 日まで）

鈴木勝士（座長）

林 真（座長代理*）

三枝順三

佐々木有

西川秋佳**

布柴達男

赤池昭紀
石井康雄
泉 啓介
上路雅子
臼井健二
江馬 眞
大澤貫寿
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
小林裕子

代田眞理子****
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
出川雅邦
長尾哲二
中澤憲一
納屋聖人
成瀬一郎***

根岸友恵
平塚 明
藤本成明
細川正清
松本清司
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
吉田 緑
若栗 忍

* : 2007 年 4 月 11 日から

** : 2007 年 4 月 25 日から

*** : 2007 年 6 月 30 日まで

**** : 2007 年 7 月 1 日から

(2008 年 4 月 1 日から)

鈴木勝士（座長）
林 眞（座長代理）
相磯成敏
赤池昭紀
石井康雄
泉 啓介
今井田克己
上路雅子
臼井健二
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
川合是彰
小林裕子
三枝順三***

佐々木有
代田眞理子
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
中澤憲一*
永田 清
納屋聖人
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄

平塚 明
藤本成明
細川正清
堀本政夫
松本清司
本間正充
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦**
吉田 緑
若栗 忍

* : 2009 年 1 月 19 日まで

** : 2009 年 4 月 10 日から

*** : 2009 年 4 月 28 日から

要 約

有機リン系殺虫剤「フェンチオン」(CAS No.55-38-9) について、農薬抄録及び各種資料 (JMPR、米国等) を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に供した試験成績は、動物体内運命 (ラット)、植物体内運命 (水稻、アルファルファ及びグアバ)、土壤中運命、水中運命、土壌残留、作物等残留、急性毒性 (ラット、マウス及びニワトリ)、亜急性毒性 (ラット、マウス、イヌ及びニワトリ)、慢性毒性 (ラット、イヌ及びサル)、慢性毒性/発がん性併合 (ラット)、発がん性 (マウス)、2 及び 3 世代繁殖 (ラット)、発生毒性 (ラット及びウサギ)、遺伝毒性試験等である。

試験結果から、フェンチオン投与による影響は、主に ChE 活性阻害であった。発がん性、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。繁殖試験において、高用量群で受胎率の低下が認められたが、母動物に毒性が発現しない用量では繁殖能に対する影響はみられなかった。

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ヒトの 4 週間反復投与試験及びサルの 2 年間慢性毒性試験における 0.07 mg/kg 体重/日であったので、これを根拠として、安全係数 30 で除した 0.0023 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量 (ADI) と設定した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺虫剤

2. 有効成分の一般名

和名：フェンチオン

英名：fenthion（ISO 名）

3. 化学名

IUPAC

和名：O,O-ジメチル O-4-メチルチオ-*m*-トリル ホスホロチオアート

英名：O,O-dimethyl O-4-methylthio-*m*-tolyl phosphorothioate

CAS（No. 55-38-9）

和名：O,O-ジメチル O-[3-メチル-4-(メチルチオ)フェニル]

ホスホロチオアート

英名：O,O-dimethyl O-[3-methy-4-(methylthio)phenyl]

phosphorothioate


4. 分子式

$C_{10}H_{15}O_3PS_2$

5. 分子量

278.3

6. 構造式



7. 開発の経緯

フェンチオンは、バイエルクロップサイエンス社により開発された、有機リン系殺虫剤である。アセチルコリンエステラーゼ（AChE）を失活させることでアセチルコリン（ACh）をシナプスに蓄積させ、神経に異常興奮を起こさせて殺虫作用を現す。

国内では稲、だいち、ばれいしょ等に登録されており、ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準値が設定されている。今回、魚介類への残留基準値の設定が申請されている。

II. 安全性に係る試験の概要

農薬抄録（2008 年）、JMPR 資料（1995 及び 1997 年）、米国資料（1998 及び 2001 年）及び豪州資料（1962～1997 年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照 8～17）

各種運命試験〔II. 1～4〕は、フェンチオンのフェニル基の 1 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（ ^{14}C -フェンチオン）または ^{13}C で標識したもの（ ^{13}C -フェンチオン）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合はフェンチオンに換算した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

（1）ラット①

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に、(i) ^{14}C -フェンチオンを 2 mg/kg 体重の用量で単回静脈内投与、(ii) ^{14}C -フェンチオンを 10 mg/kg 体重（以下、[1. (1)]において「低用量」という。）で単回経口投与、(iii) 低用量の非標識体を 14 日間反復経口投与後に ^{14}C -フェンチオンを同用量で単回投与、(iv) ^{14}C -フェンチオンを 100 mg/kg 体重（以下、[1. (1)]において「高用量」という。）で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

① 吸収

a. 血中濃度推移

各投与群における血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータは表 1 に示されている。

低用量単回投与群及び高用量群では、血漿中濃度は投与 20～45 分後に最大濃度（ $C_{\max}$ ）に達し、最大濃度到達時間（ $T_{\max}$ ）に投与量または雌雄による違いは認められなかった。低用量反復投与群では、正確な $T_{\max}$ を求めることはできなかったが、単回投与群に比べて遅かった。

低用量単回投与群及び高用量群において、雌の吸収速度定数に有意差はみられず、10～100 mg/kg 体重の範囲内では、吸収速度は投与量に相関していないことが示唆された。低用量単回投与群の雌雄及び高用量群の雌における消失速度定数は同様であり、消失速度にも投与量または雌雄による違いは認められなかった。分布速度定数は、静脈内投与群と低用量単回投与群で同様であったが、高用量群の雌では低用量単回投与群の雌に比べて小さかった。（参照 8）

表 1 血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータ

投与群	2 mg/kg 体重 単回静脈内		10 mg/kg 体重 単回経口		10 mg/kg 体重/日 反復経口		100 mg/kg 体重 単回経口	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
T _{max} (時間)	0.33	0.33	0.3~0.5	0.5~0.75	2~3	≤3	0.75	0.75
C _{max} (μg/mL)	18.2	20.4	4.2~4.4	2.9	約 3	約 4~6	23.1	50.1
T _{1/2} (時間)	3.01	3.46	8.66	9.90	-	-	-	11.6
吸収速度定数 (hr ⁻¹)	-	-	4.18	2.73	-	-	-	3.15
消失速度定数 (hr ⁻¹)	0.23	0.20	0.08	0.07	-	-	-	0.06
分布速度定数 (hr ⁻¹)	2.03	1.40	1.81	1.55	-	-	-	0.54

- : 算出されず

b. 吸収率

排泄試験 [1. (1)④] において、静脈内及び経口投与群における尿中排泄率にほとんど差が認められないことから、吸収率は 100%に近いと推定された。
(参照 8)

② 分布

投与 72 時間後の組織中残留放射能濃度は、反復投与群の雌の脂肪 (0.12 μg/g) 及び卵巣 (0.11 μg/g) を除き、いずれも 0.1 μg/g 未満であった。高用量群の組織中残留放射能濃度は投与量に相関して高い値を示したが、投与量で換算した場合の組織中残留率は低用量群と同等であった。高用量群の組織中では、脂肪における残留値が最も高かった (雄で 0.77 μg/g、雌で 3.42 μg/g)。(参照 8)

③ 代謝物同定・定量

尿及び糞中における主要代謝物は表 2 に示されている。

尿中で親化合物は検出されなかった。尿中の主要代謝物は、H の硫酸抱合体、I の硫酸抱合体及び N であった。その他に高用量群では K 及び L が、静脈内投与群の雌では I が回収放射能の 10%以上検出された。

糞中では回収放射能の 10%を超える代謝物は認められず、少量の親化合物と代謝物 G、H 及び I が検出された。

尿及び糞中の代謝物の分布に雌雄による違いは認められなかった。(参照 8)

1 表 2 尿及び糞中における主要代謝物（回収放射能に対する%）

投与群		2 mg/kg 体重 単回静脈内		10 mg/kg 体重 単回経口		10 mg/kg 体重/日 反復経口		100 mg/kg 体重 単回経口	
性別		雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	G	0.3	3.0	0.6	0.6	1.3	1.4	3.8	3.6
	G 硫酸抱合体	3.7	5.1	5.8	8.0	7.0	8.7	9.0	6.5
	G グルクロン酸抱合体	5.0	1.2	2.7	1.5	1.3	1.2	0.6	0.4
	小計	9.0	9.3	9.3	10.1	9.6	11.3	13.4	10.5
	H	0.3	4.7	0.2	0.2	0.9	1.2	4.1	4.3
	H 硫酸抱合体	16.6	14.5	15.5	12.2	16.3	12.5	13.0	11.3
	H グルクロン酸抱合体	5.3	3.0	2.9	6.0	2.5	6.8	0.5	0.6
	小計	22.2	22.2	18.6	18.4	19.7	20.5	17.6	16.2
	I	0.6	10.9	1.1	1.1	1.5	2.1	7.5	4.0
	I 硫酸抱合体	30.3	20.0	25.9	16.7	23.8	13.2	16.8	7.0
	I グルクロン酸抱合体	4.6	4.9	7.4	11.7	8.2	11.7	0.2	0.2
	小計	35.5	35.8	34.4	29.5	33.5	27.0	24.5	11.2
	K	3.7	4.8	3.4	4.8	1.9	4.0	3.8	13.4
	L	4.7	4.6	3.4	4.9	3.4	5.0	4.1	13.5
	N	11.6	9.3	13.4	14.1	15.3	15.3	17.0	16.5
	O	6.0	4.3	7.1	8.0	6.7	8.0	8.8	8.8
	E	1.1	2.3	3.8	4.5	2.3	3.7	2.0	2.1
糞	親化合物	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	1.3	0.8
	G	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4
	H	0.1	0.2	-	0.7	0.4	0.4	0.6	0.6
	I	-	-	0.9	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4

2 -：検出されず

4 ④ 排泄

5 投与後 72 時間で、尿、糞及びカーカス¹から総投与放射能 (TAR) の 93.5～111%
6 が回収された。投与後 72 時間における尿及び糞中排泄率は表 3 に示されている。

7 投与経路及び投与量にかかわらず、主要排泄経路は尿中であつた。糞中排泄量
8 はわずかであり、呼気中に放射能は排泄されなかった。低用量群では、単回及び
9 反復投与のいずれにおいても排泄は速やかで、回収放射能の 90%以上が投与後
10 24 時間で尿及び糞中に排泄された。高用量群では、投与後 24 時間における排泄
11 率は回収放射能の 58.6～81.7%であり、排泄速度は低用量群よりやや遅かったが、
12 投与後 48 時間では 95%以上が排泄された。（参照 8）

1 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ）。

表 3 投与後 72 時間における尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与群	2 mg/kg 体重 単回静脈内		10 mg/kg 体重 単回経口		10 mg/kg 体重/日 反復経口		100 mg/kg 体重 単回経口	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	107	92.3	90.0	90.0	94.7	90.1	87.6	89.3
糞	2.9	2.9	5.0	4.1	3.3	2.5	5.8	5.6

（２）ラット②

Wistar ラット（一群雌雄各 2～6 匹）に、(i) ^{14}C -フェンチオンを 0.125 mg/kg 体重の用量で単回静脈内投与、(ii) ^{14}C -フェンチオンを 0.3 mg/kg 体重（以下、[1. (2)]において「低用量」という。）で単回経口投与、(iii) 低用量の非標識体を 14 日間反復経口投与後に ^{14}C -フェンチオンを同用量で単回投与、(iv) ^{14}C -フェンチオンを 1.5 mg/kg 体重（以下、[1. (2)]において「高用量」という。）で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

① 分布

低用量及び高用量単回経口投与群では、投与 168 時間後の組織及び臓器中残留放射能濃度は検出限界未満であり、いずれの組織及び臓器においてもフェンチオン由来の残留成分は認められなかった。静脈内投与群では投与 168 時間後の肝臓及び肺で 0.1%TAR、反復経口投与群では投与 168 時間後の肺で 0.16%TAR が検出された。（参照 8）

② 代謝物同定・定量

尿中における主要代謝物は表 4 に示されている。

いずれの投与群においても、主要代謝物は H 及び I であった。高用量投与群のみから親化合物が検出された。（参照 8）

表 4 尿中における主要代謝物（尿中放射能に対する%）

投与群	0.3 mg/kg 体重 単回経口		0.3 mg/kg 体重/日 反復経口		1.5 mg/kg 体重 単回経口	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
親化合物	-	-	-	-	0.35	0.55
E	5.1	-	3.6	2.8	4.7	3.0
G	12.4	17.8	10.4	18.2	8.2	7.7
H	28.5	25.6	14.4	22.2	31.2	20.3
I	30.2	22.8	17.8	23.7	27.2	20.5

- : 検出されず

③ 排泄

各投与群における放射能回収率は、経口投与群では投与量及び投与回数にかか

わらず投与後 168 時間で 83～87%TAR、静脈内投与群では投与後 168 時間で 107%TAR であった。投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。

いずれの投与群においても、投与量の大部分が尿中に排泄され、少量が糞中に排泄された。高用量投与群の糞中排泄量は低用量投与群に比べてやや高かった。呼気中放射能は検出限界未満であった。いずれの投与群においても排泄は速やかで、尿中排泄量の 90%以上が投与後 24 時間で排泄された。糞中排泄も速やかであり、単回経口投与群では投与後 48 時間で排泄量が平衡に達した。と殺時の組織及びカーカス中の残留放射能は 1%TAR 未満であった。（参照 8）

表 5 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与群	0.125 mg/kg 体重 単回静脈内		0.3 mg/kg 体重 単回経口		0.3 mg/kg 体重/日 反復経口		1.5 mg/kg 体重 単回経口	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	103	104	82.3	83.8	77.1	81.8	78.5	77.0
糞	2.9	2.1	3.3	1.4	2.2	2.5	6.5	10.1
ケージ洗浄液	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.9	0.5	0.6

（３）ヤギ

泌乳ヤギ（系統不明、1 頭）に、¹⁴C-フェンチオンを 20 mg/kg 体重で 1 日 1 回、3 日間カプセル経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

初回投与から 2 回目の投与の間に、血漿中放射能濃度推移について検討された結果、 T_{max} は 3 時間、 $T_{1/2}$ は約 2.2 時間であり、半減期以降は緩やかに減衰した。

と殺時（最終投与 3.5 時間後）における臓器及び組織中の放射能濃度は、腎臓で最も高く（24.1 µg/g）、次いで肝臓（3.3 µg/g）及び腎周囲脂肪（2.7 µg/g）で比較的高かったが、臓器及び組織中の放射能残留量は全体で 1%TAR 未満であり、蓄積性は認められなかった。初回投与 24 時間後における乳汁中放射能濃度は 2.9 µg/g であった。

臓器及び組織ならびに乳汁中の代謝物は表 6 に示されている。いずれの試料においても親化合物は認められず、主要代謝物は肝臓で H、I、L 及び M、腎臓で H 及び I、筋で H 及び O、脂肪で H、M、B 及び C、乳汁中では H、I 及び O であった。主要代謝反応は、O-脱メチル化、メチルチオ基の酸化、リン酸エステルの加水分解及びオキソン体の生成であると考えられた。

と殺時までには 50.6%TAR が体外に排泄され、そのうち尿中排泄量は 44.1%TAR、糞中排泄量は 6.3%TAR、乳汁中排泄量は 0.2%TAR であった。なお、最終投与からと殺までの時間が 3.5 時間と短く、消化管内容物に相当量の放射能が残存していたものと考えられた。（参照 8）

表 6 各試料中の代謝物（%TRR）

試料	肝臓	腎臓	円回内筋	脇腹筋	腰部筋肉	脂肪	乳汁 ¹⁾
B	0.9	0.5	0.8	—	—	17.9	1.2
C	—	—	—	—	—	11.9	—
G	0.7	—	0.6	—	—	—	0.6
H	23.5	62.2	12.4	24.0	23.5	32.6	21.5
I	10.0	22.9	—	8.0	11.0	9.5	46.7
K	5.9	—	1.6	—	—	—	—
L	14.7	2.5	8.5	6.5	4.0	7.0	4.8
M	10.5	1.2	9.1	6.2	1.8	11.0	2.8
N	5.3	—	11.8	8.4	—	—	0.9
O	8.9	7.5	37.2	29.4	38.6	—	14.0

—：検出されず、¹⁾：初回投与 24 時間後採取試料

2. 植物体内運命試験

（1）水稻

砂質シルト質壤土を充填したポットに移植し温室内で栽培した水稻（品種：日本晴）の、乳熟初期から中期（収穫 28 日前）及びその 7 日後（収穫 21 日前）に、¹⁴C-フェンチオンの乳剤希釈液を 1,480 g ai/ha の用量で処理し、移植 149 日後に収穫して、植物体内運命試験が実施された。

水稻の各部位における代謝物分布は表 7 に示されている。いずれの試料においても親化合物は検出されず、主要代謝物は B、H 及び L であった。（参照 8）

表 7 水稻の各部位における代謝物分布

試料	稲わら		もみ殻		玄米	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能（TRR）	100	45.5	100	38.9	100	6.3
B	38.8	17.6	51.3	20.0	26.4	1.6
C	2.5	1.1	2.0	0.8	-	-
E	9.1	4.2	5.2	2.0	7.0	0.4
F	2.5	1.2	4.0	1.5	2.6	0.2
H	19.9	9.0	8.8	3.4	11.1	0.7
I	7.6	3.4	1.8	0.7	1.6	0.1
L	5.3	2.4	12.6	4.9	31.8	2.0
O	2.0	0.9	4.8	1.9	0.7	0.04
Q	1.2	0.6	2.7	1.1	3.7	0.2
未抽出残留物	7.0	3.2	3.3	1.3	3.6	0.2

-：検出されず

（2）アルファルファ

アルファルファ（品種：Luna）の播種 41 日後に、¹³C-フェンチオン及び ¹⁴C-フェンチオンの乳剤希釈液を 6 オンス ai/エーカー（約 420 g ai/ha）の用量で散

布処理し、処理 7 及び 30 日後に試料を採取して、植物体内運命試験が実施された。

処理 7 及び 30 日後のアルファルファにおける代謝物分布は表 8 に示されている。親化合物の割合は低く、主要代謝物は B 及び L であった。（参照 8）

表 8 処理 7 及び 30 日後のアルファルファにおける代謝物分布

試料採取日	処理 7 日後		処理 30 日後	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能	100	13	100	6.6
親化合物	2.4	0.3	1.0	0.08
B	41.8	5.4	19.7	1.5
C	6.1	0.9	5.9	0.5
E	3.6	0.5	0.7	0.05
G	0.3	0.04	0.5	0.04
H	1.1	0.1	2.2	0.2
I	0.3	0.04	1.4	0.1
L	20.9	2.7	29.9	2.3
M	2.3	0.3	6.1	0.5
O	1.9	0.3	2.2	0.2
Q	9.3	1.2	5.0	0.4
R	4.6	0.6	3.7	0.3
未抽出残留物	3.7	0.5	7.6	0.5

（３）グアバ

グアバの果実生育期に、 ^{14}C -フェンチオンの乳剤希釈液を 0.06 または 0.24% の濃度で、散布液が滴り落ちるまでハンドスプレーを用いて果実に 1 回散布処理し、処理 0、1、3、7、14、21、28 及び 32 日後に果実を採取して、植物体内運命試験が実施された。処理 0 日後試料は、散布液の乾燥後速やかに採取された。

グアバ果実の各部位における代謝物分布は表 9 に示されている。

処理 0 日後において、11.3%TRR が表面洗浄液に存在し、87.9%TRR が洗浄後の果皮で検出され、フェンチオンの果皮への吸収は速やかであった。

果実（果皮及び果肉）における主要成分は、親化合物（最大 60%TRR、処理 0 日後）、代謝物 B（最大 43.9%TRR、処理 4 日後）、H（最大 18.8%TRR、処理 28 日後）及び L（最大 60%TRR、処理 32 日後）であった。果肉では 10%TRR を超える代謝物は認められず、最大値は処理 14 日後に認められた L の 8.0%TRR であった。（参照 8）

表 9 グアバ果実の各部位における代謝物分布（%TRR）

試料	果実			果皮			果肉		
採取日 (処理後日数)	0	7	32	0	7	32	0	7	32
親化合物	60.0	7.0	0.5	58.9	6.5	0.5	<0.1	0.1	<0.1
B	34.9	28.5	8.3	26.2	23.0	5.5	<0.1	3.1	1.1
C	0.3	2.2	1.5	0.3	1.8	1.0	<0.1	0.2	0.2
E	0.2	8.7	6.3	-	6.0	4.6	<0.1	1.7	1.1
G	1.1	1.0	0.6	1.1	0.5	0.3	<0.1	0.5	0.3
H	0.1	13.0	15.7	-	8.5	11.3	<0.1	2.7	1.9
I	0.4	1.3	3.7	0.3	0.8	2.0	<0.1	0.4	0.8
L	1.7	35.1	60.0	1.1	24.4	52.8	<0.1	5.4	5.1
未抽出	0.2	4.3	3.5				0.2	4.3	3.5
合計	98.9	101	100	87.9	71.5	78.0	1.1	18.4	14.0

-: 検出されず

以上より、植物体における主要代謝経路は、メチルチオフェノールの硫黄の酸化によるスルホキシド (B) 及びスルホン (C) への酸化、オキシソニル体 (D) の酸化によるスルホキシド (E) 及びスルホン (F) への酸化、加水分解によるフェノールスルホキシド (H) の生成とその後の抱合体 (Q) の生成、リン酸エステルの脱メチル化による L の生成または O の生成であると考えられた。代謝物 F は水稻のみに検出された。

【上路専門委員修文】

急性毒性により評価対象物とする D、F の生成について追加した。

代謝物 F は加水分解でも検出されているので、「水稻」のみとした。

3. 土壌中運命試験

(1) 好氣的湛水土壌中運命試験

湛水した壤質砂土（オランダ、リンデン）及びシルト質壤土（米国カンサス州、スタンレー）に、 ^{14}C -フェンチオンを 1,500 g ai/ha の濃度で添加し、好氣的条件下、 $22\pm 2^\circ\text{C}$ の暗所で 66 日間インキュベートして土壌中運命試験が実施された。

各土壌の各抽出画分における放射能分布は表 10 に、抽出放射能の主要成分は表 11 に示されている。

いずれの土壌においても、フェンチオンは速やかに分解し、好氣的湛水土壌におけるフェンチオンの推定半減期は、壤質砂土で 8.3 日、シルト質壤土で 7.3 日であった。

分解物の消長は両土壌で類似していた。処理 0～14 日後には主要分解物として B が最大量検出されたが、その後減少した。分解物 B の推定半減期は、壤質砂土で 16 日、シルト質壤土で 12.7 日であった。時間の経過に伴って P が主要分

解物となり、培養終了時には H 及び I が主要分解物となった。好氣的湛水土壌において、フェンチオンは $^{14}\text{CO}_2$ まで分解された。試験終了時まで継続的に $^{14}\text{CO}_2$ が増加したことから、結合性残留物も無機化により減少すると推定された。

推定分解経路は、①フェンチオンのメチルチオフェノールの硫黄の酸化による B の生成と B の更なる酸化による C の生成、②B の加水分解による H 及び L の生成、③C の加水分解による I 及び M の生成、④H の酸化による I の生成、⑤L 及び C の酸化による O 及び P の生成、⑥ $^{14}\text{CO}_2$ への無機化及び未抽出残留物への取り込みであると考えられた。（参照 8）

表 10 各土壌の各抽出画分における放射能分布（%TAR）

処理後 日数	壤質砂土					シルト質壤土				
	水相	土壌		揮発性物質		水相	土壌		揮発性物質	
		抽出	未抽出	$^{14}\text{CO}_2$ ¹⁾	その他		抽出	未抽出	$^{14}\text{CO}_2$ ¹⁾	その他
0 日	77.8	20.9	0.4	-	-	81.8	17.0	0.5	-	-
31 日	47.1	12.4	42.2	3.5	0.4	18.3	10.3	70.3	4.9	0.2
66 日	28.5	7.6	55.6	9.8	0.3	6.6	5.3	74.6	11.5	0.4

-：検出されず、¹⁾：捕集管に捕集された量

表 11 抽出放射能の主要成分（%TAR）

	壤質砂土						シルト質壤土					
	処理 0 日後		処理 31 日後		処理 66 日後		処理 0 日後		処理 31 日後		処理 66 日後	
	水相	土壌	水相	土壌	水相	土壌	水相	土壌	水相	土壌	水相	土壌
親化合物	62.0	6.1	0.5	1.6	-	0.5	70.0	10.1	0.1	0.9	-	0.3
B	11.9	13.8	5.3	2.3	0.6	0.9	7.3	5.3	0.2	0.9	<0.1	0.5
H	0.3	-	7.0	1.3	11.0	2.2	0.4	-	4.2	1.2	0.5	0.6
I	-	-	5.0	1.0	8.6	2.1	-	-	3.0	1.6	2.9	1.9
P	1.1	0.7	19.7	3.6	2.2	0.8	0.4	0.7	5.7	2.7	0.5	0.7
$^{14}\text{CO}_2$ ²⁾	-		5.5		12.2		-		8.2		15	
未同定	2.1		8.3		2.9		4.7		3.6		2.3	
未抽出	0.4		42.2		55.6		0.5		70.3		74.6	

-：検出されず、²⁾：水相、土壌及び捕集管の $^{14}\text{CO}_2$ の合計

（２）好氣的及び嫌氣的土壌中運命試験

シルト質壤土（採取地不明）に、 ^{14}C -フェンチオンを 1 または 10 mg/kg となるように表面処理し、好氣的試料については、好氣的条件下の暗所（試験温度不明）で最長 120 日間インキュベート、嫌氣的試料については、好氣的条件下（試験温度不明）で 30 日間インキュベートした後湛水し、上部空間を窒素で置換してさらに 60 日間インキュベートして、好氣的及び嫌氣的土壌中運命試験が実施された。また、土壌を滅菌した後、非滅菌土壌と同様に処理し、室温の暗所で 30 日間培養して、滅菌条件における好氣的土壌中運命試験が実施された。

1 mg/kg 処理区の土壌各画分における放射能分布は表 12 に、抽出放射能の主

要成分は表 13 に示されている。

好氣的条件下でフェンチオンは速やかに分解され、推定半減期は 1 日未満であった。1 mg/kg 処理区では、主要分解物として B、C、H 及び I が処理 1～7 日後に最大量検出され、その後減少した。処理 14 日後以降では分解物 J も検出され、処理 59 日後に最大に達した後減少した。 $^{14}\text{CO}_2$ は処理 3 日後にはその生成が顕著となり、120 日後には回収放射能の 50% に達した。10 mg/kg 処理区では、フェンチオンの分解速度は 1 mg/kg 処理区よりも緩やかであったが、分解物の分布は類似していた。

好氣的土壌における主要分解経路は、①フェンチオンのメチルチオフェノールの硫黄の酸化による B 及び C への酸化、②B の加水分解による H の生成、③C の加水分解及び H の酸化による I の生成、④I のメチル化による J の生成、⑤ $^{14}\text{CO}_2$ への無機化及び未抽出残留物への取り込みであると考えられた。

嫌氣的条件下では、分解物 I の分解及び $^{14}\text{CO}_2$ の生成速度は好氣的条件下より緩やかであった。

フェンチオンは、非滅菌土壌に比べ滅菌土壌においてより安定であったが、分解は明らかに認められ、推定半減期は 14～21 日であった。主要分解物は B であり、30 日後に回収放射能の 34% に達した。その他には 21 日後以降に H が認められた。未抽出放射能の増加は、非滅菌土壌よりも緩やかであった。（参照 8）

表 12 1 mg/kg 処理区の土壌各画分における放射能分布（回収放射能に対する%）

画分	処理 0 日後	処理 30 日後	処理 120 日後
有機溶媒可溶画分	98.6	30.6	7.8
水溶性画分	1.2	1.0	0.6
$^{14}\text{CO}_2$	-	27.5	50.1
未抽出残留物	0.2	40.9	41.5

- : 検出されず

1 表 13 抽出放射能の主要成分（回収放射能に対する%）

試験条件	好気的条件							好気的及び嫌気的条件		滅菌条件		
処理量 (mg/kg)	1				10			1		1		
処理後 日数(日)	0	14	30	120	0	14	30	好気的 30	嫌気的 60	0	14	30
親化合物	95.2	3.0	1.9	0.4	95.6	3.8	1.9	1.9	1.0	93.8	54.7	32.6
B	2.4	3.9	1.9	0.7	2.4	4.5	1.5	1.9	0.7	4.0	30.6	34.4
C	0.4	1.5	1.8	1.2	0.2	0.9	0.4	1.8	0.6	-	-	9.5
H	-	7.5	2.3	0.4	-	14.8	2.7	2.3	0.5	-	-	-
I	-	28.2	14.2	1.1	-	31.1	26.8	14.2	9.6	-	-	-
J	-	3.3	5.4	3.8	-	1.8	3.8	5.4	2.3	-	-	-
¹⁴ CO ₂	-	13.9	27.5	50.1	-	9.9	24.3	27.5	34.5	-	-	-
未抽出残留物	0.2	37.1	40.9	41.5				40.9	43.1	0.3	3.9	8.9

2 - : 検出されず

3

4 (3) 嫌気的湛水土壌中運命試験

5 湛水したシルト質壤土（米国カンサス州、スタンレー）に、¹⁴C-フェンチオン
6 を 1,500 g ai/ha の濃度で添加し、嫌気的条件下、22±2℃の暗所で 360 日間イ
7 ンキュベートして、嫌気的湛水土壌中運命試験が実施された。

8 試験系の各画分における放射能分布は表 14 に、試験系全体（気相、水相及び
9 土壌）における抽出放射能の主要成分は表 15 に示されている。試験系全体の半
10 減期は約 4～5 日であった。

11 嫌気的湛水土壌において、親化合物は水相から速やかに消失し、処理 60 日後
12 には水相では検出されなかった。親化合物は処理 14 日後の土壌で最大
13 （59.5%TAR）に達した後、試験終了時には 0.2%TAR まで減少した。水相及び
14 土壌のいずれにおいても、主要分解物は G 及び H であり、処理 30～60 日後で
15 最大に達した後減少した。フェンチオンは嫌気的湛水土壌において ¹⁴CO₂ または
16 ¹⁴CH₄ まで分解された。¹⁴CO₂ 及び ¹⁴CH₄ 以外の揮発性放射能は検出されなかつ
17 た。試験終了時まで継続的に ¹⁴CO₂ が増加し、未抽出残留物が減少したことから、
18 結合性残留物も無機化により減少すると推定された。

19 推定分解経路は、①フェンチオンの加水分解による G 及び K の生成、②G 及
20 び K の酸化による H 及び L の生成、③¹⁴CO₂ または ¹⁴CH₄ の生成であると考え
21 られた。（参照 8）

22

23

表 14 各画分における放射能分布（%TAR）

画分	処理 0 日後	処理 30 日後	処理 60 日後	処理 120 日後	処理 360 日後
気相		<0.1	0.2	17.1	a
水相	72.7	46.6	62.7	48.7	14.0
土壌	28.3	50.6	33.9	28.5	25.2

24 a : 揮発性放射能の捕集が定量的にできなかった。

表 15 抽出放射能の主要成分（%TAR）

	処理 0 日後	処理 30 日後	処理 60 日後	処理 120 日後	処理 360 日後
親化合物	92.2	39.0	1.9	0.7	0.2
G	2.9	14.6	35.4	1.2	<0.1
H	0.8	26.1	24.5	0.8	<0.1
K	-	-	-	3.0	-
L	0.1	5.2	1.5	0.4	-
S	-	-	9.7	<0.1	-
$^{14}\text{CO}_2$		<0.1	1.0	51.6	a
$^{14}\text{CH}_4$				3.4	a

- : 検出されず。

a : 揮発性放射能の捕集が定量的にできなかった。

（４）土壌吸着試験

4 種類の国内土壌〔軽埴土（茨城）、シルト質壤土（宮崎）、埴壤土（福島）及びシルト質埴壤土（茨城）〕を用いて土壌吸着試験が実施された。

各土壌における Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 22.3～35.8、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 720～2400 であった。（参照 8）

4. 水中運命試験

（１）加水分解試験

pH 5、7 及び 9 のリン酸緩衝液（滅菌）に、 ^{14}C -フェンチオンを 5 mg/L となるように添加し、暗条件下、一定温度（5、25 及び 40℃）で最長 23 週間インキュベートして加水分解試験が実施された。

各緩衝液におけるフェンチオンの加水分解半減期は表 16 に、試験終了時の各緩衝液における抽出放射能の主要成分は表 17 に示されている。

フェンチオンは酸性条件で比較的安定であった。いずれの緩衝液においても、フェンチオンは 5℃で最も安定であり、試験終了時に 85～90%TAR が残存していた。各緩衝液に共通な主要分解物として、B、D 及び H が検出され、さらに pH 7 及び 9 の緩衝液では分解物 I も認められた。フェンチオンの水中における加水分解は、リン酸エステルの加水分解及び酸化により進行すると推定された。（参照 8）

表 16 各緩衝液におけるフェンチオンの加水分解半減期（日）

試験溶液	培養条件		
	5℃	25℃	40℃
pH 5	133	69	105
pH 7	8.0	5.9	4.6
pH 9	3.7	2.8	2.4

表 17 試験終了時の各緩衝液における抽出放射能の主要成分（%TAR）

試験 溶液	培養 条件 (℃)	経過 日数 (週)	親化 合物	分解物							原点 物質	水溶 性放 射能
				B	C	D	E	F	H	I		
pH 5	5	23	90	6	1	tr	tr	-	-	-	1	1
	25	10	42	11	tr	5	2	-	3	-	6	30
	40	16	4	37	-	tr	-	5	24	-	23	7
pH 7	5	16	85	9	-	3	-	-	1	-	1	1
	25	10	31	4	2	-	-	-	2	-	2	59
	40	16	2	12	tr	15	-	-	2	36	29	3
pH 9	5	23	86	4	-	2	-	1	tr	-	6	0
	25	10	22	4	-	1	-	4	3	-	6	60
	40	16	1	12	6	30	-	-	5	24	20	2

- : 検出されず、tr : 痕跡量

（２）水中光分解試験（自然水）

滅菌した河川水（茨城、pH 6.98）に、 ^{14}C -フェンチオンを 1.75 mg/L となるように添加し、 $23\pm 2^\circ\text{C}$ で最長 180 分間キセノン光（光強度：720 W/m²；波長範囲：300～800 nm）を照射して水中光分解試験が実施された。

フェンチオンは水中で光照射により速やかに分解され、処理 180 分後で 6.8%TAR に減少した。主要分解物は B、G、H 及び T であった。主要分解経路は、B への酸化または G への加水分解、さらに G の酸化から H を経由して T に至ると推定された。

フェンチオンの滅菌自然水中での光分解による推定半減期は 46.8 分〔東京、4～6 月の太陽光換算で 0.24 日（約 346 分）〕と算出された。（参照 8）

（３）水中光分解試験（緩衝液）

滅菌した酢酸ナトリウム緩衝液（pH 5）に、 ^{14}C -フェンチオンを 7 mg/L となるように添加し、 $23\pm 1^\circ\text{C}$ で最長 4 時間キセノン光（光強度：720 W/m²；波長範囲：300～800 nm）を照射して水中光分解試験が実施された。

フェンチオンは水中で光照射により速やかに分解され、処理 4 時間後で 7.2 %TAR に減少した。主要分解物は B、G 及び H であった。フェンチオンの水中における光分解は、リン酸エステルの加水分解と酸化により進行すると推定された。

フェンチオンの滅菌緩衝液中での光分解による推定半減期は 28.8 分（東京、4～6 月の太陽光換算で 29.6～74.0 分）と算出された。（参照 8）

５．土壌残留試験

鉦質土（愛知）、火山灰土、沖積土及び桶川土壌（埼玉）、火山灰土・壤土（青森）、洪積火山灰土・埴壤土（神奈川）、洪積土・壤土（京都）、沖積土・埴壤土（静岡）、湖沼堆積土・埴土（愛知）を用いて、フェンチオン、①フェンチオン+B+C 及び

②D+E+F を分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）が実施された。結果は表 18 に示されている。（参照 8）

表 18 土壌残留試験成績

試験		濃度 ¹⁾	土壌	推定半減期（日）	
				フェンチオン	①+②
容器内試験	畑水分状態	10 mg/kg	鉾質土 ²⁾	約 5	約 9
			火山灰土 ²⁾	約 2	約 13
	湛水状態		沖積土 ²⁾	約 18	約 19
			桶川土壌 ²⁾	約 25	約 32
圃場試験	畑地状態	2,500 g ai/ha	火山灰土・壤土	約 4	約 10
		3,000 g ai/ha	洪積火山灰土・埴壤土	約 2	約 4
	水田状態	1,200 g ai/ha ^D	洪積土・壤土	-	-
		1,600 g ai/ha ^G	沖積土・埴壤土	約 1.5	約 1.5
		1,200 g ai/ha ^{MG}	湖沼堆積土・埴土	約 5	約 6

¹⁾：容器内試験では原体、圃場試験の畑地状態では 50%乳剤、水田状態では 3%粉剤（D）、4%粒剤（G）及び 3%微粒剤（MG）を使用。

²⁾：土性不明。

-：残留値がすべて定量限界未満のため、算出されず。

6. 作物等残留試験

（１）作物残留試験

稲、あずき、だいず等を用いて、フェンチオン、酸化代謝物①（フェンチオン＋B＋C）及び酸化代謝物②（D＋E＋F）を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 3 に示されている。

フェンチオンの最大残留値は、散布 30 日後に収穫したあずき（乾燥子実）で認められた 0.002 mg/kg であった。①及び②の最大残留値は、いずれも散布 21 日後に収穫した稲わらで認められ、それぞれ 0.67 及び 0.47 mg/kg であった。可食部における最大残留値は、①では散布 100 日後に収穫したさとうきび（茎）の 0.043 mg/kg、②では散布 14 日後に収穫したあずき（乾燥子実）の 0.02 mg/kg であった。（参照 8）

（２）魚介類における最大推定残留値

フェンチオンの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃度（水産 PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。

フェンチオンの水産 PEC は 0.58 µg/L、フェンチオン及び代謝物 B、C、D、E、F を含めた BCF は 165（試験魚種：ブルーギル）、魚介類における最大推定残留値は 0.479 mg/kg であった。（参照 16）

8. 一般薬理試験

フェンチオンのラット、マウス及びウサギを用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 19 に示されている。（参照 8）

表 19 一般薬理試験

試験の種類		動物種	動物数/群	投与量 mg/kg 体重 (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
中枢神経系	一般状態 (Irwin 法)	マウス	雄 6	0、5、10、20、 50、100、200 (腹腔内) ^a	5	10	10 mg/kg 体重以上で認知力、運動性、正常姿勢及び筋緊張抑制、200 mg/kg 体重で全例死亡
	体温	ウサギ	3	0、50、100、 150、200 (静脈内) ^b	150	200	200 mg/kg 体重で直腸温上昇
呼吸・循環系	血圧	ウサギ	3~5	0、100、150、 200、300 (静脈内) ^b	100	150	150 mg/kg 体重以上投与群で急速に血圧下降し死亡
	呼吸数	ウサギ	5	0、100、150、 200、250 (静脈内) ^b	—	100	100 mg/kg 体重で呼吸数増加後に減少、150 mg/kg 体重以上で、呼吸数増加後死亡
	心電図	ウサギ	3~5	0、100、150、 200、250 (静脈内) ^b	100	150	150 mg/kg 体重以上で冠動脈不全症状（ST 下降、T 波平定化、R 棘下降）、R-R 延長または短縮、心不全で死亡、
自律神経系		ウサギ	5	0、50、100、 150、200 (静脈内) ^b	—	50	50 mg/kg 体重以上で縮腫
消化器系	腸管運動	ウサギ	3~5	0、100、150、 200、250 (静脈内) ^b	100	150	150 mg/kg 体重以上で腸管の収縮
腎機能		Wistar ラット	雄 6	0、25、50、 100、200、250 (皮下) ^b	200	250	250 mg/kg 体重で、ナトリウム量減少及びカリウム量増加
血液系	溶血	ウサギ		1×10^{-6} 、 1×10^{-5} 、 1×10^{-4} 、 1×10^{-3} 、 1×10^2 、 1×10^1 g/mL (<i>in vitro</i>)	1×10^1 g/mL	—	影響なし
	血液凝固	ウサギ	5	0、50、100、 150、200 (静脈内) ^b	150	200	200 mg/kg 体重で血液凝固時間短縮

試験の種類	動物種	動物数/群	投与量 mg/kg 体重 (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
ChE 活性	ウサギ	雄 6	0、50、100、 150、200 (静脈内) ^b	—	50	50 mg/kg 体重以上 で血漿及び赤血球 ChE 活性阻害、50 mg/kg 体重で 24 時 間後に回復傾向、 150 mg/kg 体重以 上で死亡例

1 注) 溶媒として、a はオリーブオイルを、b はポリエチレングリコール 400 を用いた。

2 —：最大無作用量または最小作用量が設定できない。

3

4 9. 急性毒性試験

5 (1) 急性毒性試験

6 フェンチオン原体のラット及びマウスを用いた急性毒性試験が実施された。

7 結果は表 20 に示されている。(参照 8)

8

表 20 急性毒性試験概要（原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	SD ラット 雌雄各 5 匹	405	566	活動性低下、流涎、流涙、 線維束性収縮、下痢 活動性低下、振戦、流涎、 流涙、呼吸数減少
	SD ラット 雌雄各 15 匹	320	509	
	ICR マウス 雌雄各 15 匹	272	273	
経皮	SD ラット 雌雄各 15 匹	2,000	≥2,000	
	ICR マウス 雌雄各 15 匹	約 2,000	約 2,000	
腹腔内	SD ラット 雌雄各 15 匹	479	672	
	ICR マウス 雌雄各 15 匹	215	227	
皮下	SD ラット 雌雄各 15 匹	658	757	
	ICR マウス 雌雄各 15 匹	224	252	
吸入	SD ラット 雌雄各 10 匹	LC ₅₀ (mg/L)		振戦、筋攣縮、流涎、呼 吸困難、目及び鼻からの 分泌物、粗毛
		0.507 ^b	0.454 ^b	
	Wistar ラット 雌雄各 10 匹	>1.2 ^a	>1.2 ^a	行動抑制、ChE の抑制 症状、呼吸抑制
		約 1.2 ^b	約 0.8 ^b	
		約 0.212 ^c	>0.055、 <0.212 ^c	

9 a：1 時間暴露、b：4 時間暴露、c：4 時間/日×5 回暴露

10

フェンチオンの代謝物（B～I）のラットを用いた急性経口毒性試験が実施された。結果は表 21 に示されている。（参照 8）

表 21 急性毒性試験概要（代謝物）

被験物質	投与経路	LD ₅₀ (mg/kg 体重)	
		雄	雌
B	経口	125	
	腹腔内		250
C	経口	125	
	腹腔内		250
D	経口	125	
	腹腔内		26
E	経口	50	
	腹腔内		22
F	経口	30	
	腹腔内		9
G	経口		6,500
H	経口		3,500
I	経口		7,000

（２）急性神経毒性試験（ラット）

Wistar ラット〔主群：雌雄各 12 匹、衛星群（ChE 活性測定用）：雌雄各 6 匹〕を用いた単回経口〔原体：0、1、50 及び 125 mg/kg 体重（雄）、0、1、75 及び 225 mg/kg 体重（雌）〕投与による急性神経毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 22 に、投与 5.5 時間後における ChE 活性阻害率は表 23 に示されている。

臨床症状観察及び機能観察総合検査（FOB）において、50（雄）/ 75（雌）mg/kg 体重以上投与群の雌雄で急性的なコリン作動性の毒性による作用が認められたが、病理組織学的変化は認められなかった。

ChE 活性測定では、1 mg/kg 体重投与群の雌で脳 ChE 活性阻害率（9%）に有意差が認められたが、生物学的に意味のある毒性とは考えられなかった。雌では全投与群で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）がみられたため、半対数グラフを用いて無影響量推定値が求められた。ChE 活性阻害率 20%を生物学的に意味のある阻害の指標として用いた場合、無影響量は 0.7 mg/kg であると推定された。

本試験において、50 mg/kg 体重以上投与群の雄及び 1 mg/kg 体重以上投与群の雌で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は、雄で 1 mg/kg 体重、雌で 1 mg/kg 体重未満（無影響量推定値：0.7 mg/kg 体重）であると考えられた。神経毒性は認められなかった。（参照 8）

【西川専門委員より】

「神経毒性は認められなかった」とあるが、神経症状はあるのではないか。

【事務局より】

コリン作動性の反応が認められているので、「神経毒性は認められなかった」という文言は削除しました。

表 22 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
125（雄）/ 225（雌） mg/kg 体重/日	・体重増加抑制 ・後肢足伸展低下	・死亡（4 例） ・体重増加抑制
50（雄）/ 75（雌） mg/kg 体重/日以上	・歩行失調、痙攣性歩行、跳躍痙攣、振戦、咀嚼運動、流涙、流涎、下痢、立毛、運動量減少、反応性低下、努力呼吸、筋緊張低下、低体温、不随意性間代性運動、活動性低下、縮瞳、正向反射乱れ、握力低下、接触に対する反応亢進 ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・歩行失調、痙攣性歩行、跳躍痙攣、振戦、咀嚼運動、流涙、流涎、下痢、立毛、運動量減少、反応性低下、努力呼吸、筋緊張低下、低体温、不随意性間代性運動、活動性低下、縮瞳、正向反射乱れ、握力低下 ・脳 ChE 活性阻害（20%以上）
1 mg/kg 体重/日以上	1 mg/kg 体重/日 毒性所見なし	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）

表 23 投与 5.5 時間後における ChE 活性阻害率（対照群の値に対する%）

投与群 (mg/kg 体重)	雄			雌		
	1	50	125	1	75	225
血漿 ChE	90	10**	10**	77	5**	4**
赤血球 ChE	92	11**	8**	78*	11**	10**
脳 ChE	96	20**	14**	91**	24**	19**

* : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ (adjusted Welch test)

(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）

LSL 系産卵鶏（一群雌 13～20 羽）を用いた強制経口（原体：0 及び 40 mg/kg 体重）投与による急性遅発性神経毒性試験が実施された。

検体投与群では、下痢、痙攣状態、活動性及び運動性低下、横臥位、努力呼吸が観察され、有意な体重減少及び死亡（20 例中 5 例）が認められた。また、脳 AChE 活性が有意に阻害（投与 1～2 日後で約 80%）された。しかし、強制運動能試験では、有機リン誘発性遅発性多発神経障害（OPIDP）で典型的な歩行異常は認められず、脳、脊髄及び坐骨神経における神経障害標的エステラーゼ（NTE）活性阻害はみられなかった。病理組織学的検査においても、神経組織に遅発性神経毒性に典型的な形態学的変化はみられなかった。

以上より、検体には遅発性神経毒性誘発性はないものと考えられた。（参照 8）

10. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。

その結果、ウサギの眼に対する刺激性は認められなかったが、皮膚に対して軽微な刺激性が認められた。（参照 8）

DHPW モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施され、結果は陰性であった。（参照 8）

1 1. 亜急性毒性試験

（1）90 日間亜急性毒性試験（ラット）

Donryu ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1、3、12、50 及び 200 ppm）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 24 に示されている。

200 ppm 投与群の雌雄で、腎臓、脳及び心臓の比重量²増加、さらに雄では精巣比重量、雌では肝比重量の増加が、50 ppm 投与群の雌にも脳比重量増加が認められた。しかし、いずれの臓器にも絶対重量に変化が認められなかったことから、これらは体重増加抑制に伴う変化であると考えられた。

本試験において、12 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 3 ppm（雄：0.228 mg/kg 体重/日、雌：0.256 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

表 24 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	- 振戦 - 摂餌量減少 - 体重増加抑制 - TP 減少、T.Chol 減少 - 耳下腺絶対及び比重量増加	- 振戦 - 摂餌量減少 - TP 減少、Glu 減少、ALT 増加 - 耳下腺絶対重量増加
50 ppm 以上		- 体重増加抑制 - 耳下腺比重量増加
12 ppm 以上	赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）	赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）
3 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（2）16 週間亜急性毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、2、3、5、25 及び 100 ppm）投与による 16 週間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 25 に示されている。

5 ppm 投与群では、雌において軽度（約 15%）の血清及び赤血球 ChE 活性阻害が認められたが、雄では影響はみられなかった。

本試験において、25 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球、顎下腺及び脳 ChE 活

² 体重比重量を比重量という（以下同じ）。

性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 5 ppm（0.25 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

表 25 16 週間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	・下痢、流涎、流涙 ・体重増加抑制	・下痢、流涎、流涙
25 ppm 以上	・赤血球、顎下腺及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・赤血球、顎下腺及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）
5 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（3）90 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1、3、12、50 及び 200 ppm）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 26 に示されている。

200 ppm 投与群の雄で脳、精巣及び耳下腺の比重量増加、雌で脳比重量増加、50 ppm 投与群の雄で脳比重量増加が認められたが、いずれも体重増加抑制に伴う変化であると考えられた。

本試験において、12 ppm 以上投与群の雄で脳 ChE 活性阻害（20%以上）が、雌で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 3 ppm（雄：0.304 mg/kg 体重/日、雌：0.553 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

表 26 90 日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・摂餌量減少 ・体重増加抑制	・摂餌量減少 ・体重増加抑制
50 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）	
12 ppm 以上	・脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）
3 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（4）12 週間亜急性毒性試験（イヌ）＜参考データ＞

ビーグル犬（一群雌雄各 2 匹）を用いた混餌（原体：0、2、5 及び 50 ppm）投与による 12 週間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、50 ppm 投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 5 ppm（0.125 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8、9）

（５）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、2、25 及び 125 ppm）投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 27 に示されている。

摂餌量について、125 ppm 投与群の雄では、投与期間中の総摂餌量が減少（-4%）し、雌では投与 2 週の摂餌量が減少（-18%）した。しかし、雌の摂餌量は 4 週以降では増加し、総摂餌量も増加（12%）した。体重あたりの摂餌量は、125 ppm 投与群の雌雄ともに投与期間の大部分で増加した。

ChE 活性は、25 ppm 以上投与群で用量相関的に阻害されたが、投与 4 週と 14 週の阻害率は同程度であったことから、累積的な影響はないことが示された。

機能観察検査（FOB）では、25 ppm 以上投与群でコリン作動性の毒性徴候が用量相関的に認められ、運動能及び移動運動能試験では、125 ppm 投与群でわずかな運動量減少がみられたが、投与 13 週にはいずれの影響にも回復傾向がみられた。

中枢神経系、末梢神経、骨格筋、眼球（視神経を含む）等の組織に投与に関連した変化は認められなかった。

本試験において、25 ppm 以上投与群の雌雄で、赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたので、無毒性量は雌雄で 2 ppm（雄：0.13 mg/kg 体重/日、雌：0.17 mg/kg 体重/日）であると考えられた。神経毒性は認められなかった。（参照 8）

【西川専門委員より】

「神経毒性は認められなかった」とあるが、神経症状はあるのではないか。

【事務局より】

コリン作動性の反応及び運動量の変化が認められているので、「神経毒性は認められなかった」という文言は削除しました。

表 27 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
125 ppm	・非協調性及び痙性歩行、跳躍痙攣、立毛、反応性低下、下痢 ・体重増加抑制 ・総摂餌量減少 ・オープンフィールドにおける異常歩行（協調運動障害、強直性歩行）、持続的不随意運動（筋肉の線維束性攣縮）、正向反射の協調性低下 ・前/後肢握力及び開脚着地幅減少 ・運動量及び移動運動量減少	・痙性歩行、跳躍痙攣、振戦 ・体重増加抑制 ・摂餌量減少（投与 2 週のみ） ・オープンフィールドにおける異常歩行（協調運動障害、強直性歩行）、持続的不随意運動（筋肉の線維束性攣縮、振戦）正向反射の協調性低下、体温低下 ・前/後肢握力及び開脚着地幅減少 ・運動量及び移動運動量減少

投与群	雄	雌
25 ppm 以上	・オープンフィールドにおける活動性低下 ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	・体重増加抑制 ・オープンフィールドにおける活動性低下 ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
2 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(6) 30 日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）

HNL 系ニワトリ（一群雌 8 羽）を用いた混餌（原体：0、10、25、50 及び 100 ppm）投与による 30 日間亜急性遅発性神経毒性試験が実施された。なお、投与終了後 30 日間の回復期間が設けられた。

各投与群で認められた毒性所見は表 28 に示されている。

コリン作動性の中毒症状は、検体投与終了後の観察期間中に全例で回復し、神経毒性障害の症状は認められなかった。血中 ChE 活性阻害は投与終了 1 日後には認められたが、検体投与終了 4 週間には回復していた。病理組織学的検査では、検体に起因する神経組織の変化は認められなかった。

本試験において、25 ppm 以上投与群で血中 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は 10 ppm（1.25 mg/kg 体重/日、換算値³）であると考えられた。遅発性神経毒性は認められなかった。（参照 8）

表 28 30 日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）で認められた毒性所見

投与群	雌
100 ppm	・死亡（1 例） ・体重増加抑制 ・摂餌量減少
50 ppm 以上	・コリン作動性の中毒症状
25 ppm 以上	・血中 ChE 活性阻害（20%以上）
10 ppm	毒性所見なし

1 2. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験（ラット）＜参考データ＞

SD ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌（原体：0、2、3、5、25 及び 100 ppm）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 29 に示されている。

本試験において、5 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 3 ppm（0.15 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

³ 文献に基づく平均値から求めた検体摂取量（参照 17）。以下同じ。

表 29 1 年間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	・摂餌量減少 ・体重増加抑制	・生存期間短縮 ・摂餌量減少 ・体重増加抑制
25 ppm 以上	・生存期間短縮 ・脳及び顎下腺 ChE 活性阻害 (20%以上)	・脳及び顎下腺 ChE 活性阻害 (20%以上)
5 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)
3 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 2 年間慢性毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 50 匹、対照群：一群雌雄各 100 匹）を用いた混餌（原体：0、3、15 及び 75 ppm）投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。

本試験において、15 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 3 ppm（雄：0.14 mg/kg 体重/日、雌：0.19 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8、9）

表 30 2 年間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
75 ppm	・体重増加抑制 ・死亡率増加（投与終了時）	・死亡率増加（投与終了時）
15 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)
3 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(3) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

Fischer ラット（主群：一群雌雄各 50 匹、中間と殺群：一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌（原体：0、5、20 及び 100 ppm）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 31 に示されている。

本試験において、20 ppm 以上投与群の雌雄で脳及び赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたので、無毒性量は雌雄で 5 ppm（雄：0.2 mg/kg 体重/日、雌：0.3 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 8）

1 表 31 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	・着色尿、脱毛、背彎姿勢、軟便、粗毛 ・体重増加抑制 ・角膜変性、角膜血管新生 ・涙鼻管空胞変性 ・胃(筋層または漿膜)鉍質沈着 ・精巣上体体部空胞変性 ・尾及び足の慢性活動性皮膚炎	・着色尿、脱毛、背彎姿勢、軟便、粗毛 ・体重増加抑制 ・網膜変性、後囊下白内障、角膜変性、角膜血管新生 ・肉芽腫性肺炎 ・胃(筋層または漿膜)鉍質沈着 ・尾及び足の慢性活動性皮膚炎
20 ppm 以上	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) ・肉芽腫性肺炎 ・精巣上体頭部空胞変性	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) ・網膜電位図抑制状態、網膜萎縮(両側性) ・涙鼻管空胞変性
5 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

2

3 (4) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）

4 ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（原体：0、2、10 及び 50 ppm）
5 投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

6 本試験において、50 ppm 投与群の雌雄で脳及び赤血球 ChE 活性阻害（20%
7 以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 10 ppm（雄：0.258 mg/kg 体重/日、
8 雌：0.262 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

9

10 (5) 2 年間慢性毒性試験（イヌ）

11 ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（原体：0、3、10 及び 30/50/60 ppm）
12 投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。高用量投与群では、投与 1～64
13 週までは 30 ppm、65～67 週までは 50 ppm、68～104 週までは 60 ppm の濃度
14 の混合飼料が与えられた。

15 各投与群で認められた毒性所見は表 32 に示されている。

16 本試験において、10 ppm 以上投与群の雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）
17 が、30 ppm 投与群の雌で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた
18 ので、無毒性量は雄で 3 ppm（0.09 mg/kg 体重/日）、雌で 10 ppm（0.33 mg/kg
19 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

20

21

22

表 32 2 年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
30/50/60 ppm	・脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）
10 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）	10 ppm 以下 毒性所見なし
3 ppm	毒性所見なし	

23

1 (6) 2 年間慢性毒性試験（サル）

2 アカゲザル（一群雌雄各 5 匹）を用いた強制経口（原体：0、0.02、0.07 及び

3 0.2 mg/kg 体重/日）投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。

4 本試験において、0.2 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で、赤血球 ChE 活性阻害（20%

5 以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 0.07 mg/kg 体重/日であると考えら

6 れた。（参照 8、9）

7

8 (7) 2 年間発がん性試験（マウス）

9 B6C3F1 マウス（投与群：一群雌雄各 60 匹、中間と殺群：一群雌雄各 20 匹）

10 を用いた混餌（原体：0、0.1、1、5 及び 25 ppm）投与による 2 年間発がん性試

11 験が実施された。

12 25 ppm 投与群の雄で、肝絶対重量の有意な増加（約 31%）及び肝比重量の統

13 計学的に有意ではないが約 20%の増加が認められた。同群の最終と殺動物では対

14 照群に比して大きな肝腫瘍を持つ動物が多く、この肝重量増加は肝腫瘍本体の重

15 量が影響している可能性が考えられたが、担腫瘍動物の発生頻度の増加は認めら

16 れなかった。

17 本試験において、25 ppm 投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以

18 上）及び体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雌雄で 5 ppm（雄：1.95

19 mg/kg 体重/日、雌：2.25 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認め

20 られなかった。（参照 8、9）

21

22 1 3. 生殖発生毒性試験

23 (1) 3 世代繁殖試験（ラット）

24 FB30 ラット（一群雄 10 匹、雌 20 匹）を用いた混餌（原体：0、3、15 及び

25 75 ppm）投与による 3 世代繁殖試験が実施された。

26 本試験において、親動物では 75 ppm 投与群の P 雌雄及び F₁ 雄で体重増加抑

27 制が認められ、児動物ではいずれの投与群にも毒性所見は認められなかったので、

28 無毒性量は親動物で 15 ppm（0.75 mg/kg 体重/日、換算値）、児動物で本試験の

29 最高用量 75 ppm（3.75 mg/kg 体重/日、換算値）であると考えられた。繁殖能に

30 対する影響は認められなかった。（参照 8）

31

32 (2) 2 世代繁殖試験（ラット）

33 SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、1、2、14 及び 100 ppm）

34 投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

35 各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。

36 100 ppm 投与群の P 及び F₁ 親動物で、妊娠動物数（F₁ 世代のみ）、平均着床

37 痕数及び平均同腹児数の低値傾向、F₁ 及び F₂ 児動物では死産児数の増加傾向、

38 総死亡児率及び生後 0～4 日の死亡児数の増加傾向、生後 4 日の生存率及び離乳

率の低値傾向が、F₂ 児動物では低体重傾向がみられた。これらの変化には統計学的な有意差は認められなかったが、背景データの範囲から外れていたことから、投与の影響であると考えられた。

本試験において、親動物では 14 ppm 以上投与群の P 及び F₁ 雌雄で赤血球または脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められ、児動物では 100 ppm 投与群の F₁ 及び F₂ 児動物で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたので、無毒性量は親動物の雌雄で 2 ppm（0.16 mg/kg 体重/日）、児動物で 14 ppm（1.16 mg/kg 体重/日）であると考えられた。また、100 ppm 投与群において受胎率低下が認められたことから、繁殖能に対する無毒性量は 14 ppm（1.16 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 8）

（抄録 毒-132~138 頁）

表 33 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親：P、児：F ₁		親：F ₁ 、児：F ₂	
		雄	雌	雄	雌
親動物	100 ppm	・脳 ChE 活性阻害（20%以上） ・精巣上体絶対重量増加	・体重増加抑制 ・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） ・受胎率低下	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） ・精巣上体比重量増加	・体重増加抑制 ・脳 ChE 活性阻害（20%以上） ・受胎率低下
	14 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） ・精巣上体管上皮空胞化	・脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・脳 ChE 活性阻害（20%以上） ・精巣上体管上皮空胞化	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）
	2 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	100 ppm	・低体重 ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）		・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）	
	14 ppm 以下	毒性所見なし		毒性所見なし	

（３）発生毒性試験（ラット）①

FB30 ラット（一群雌 19~20 匹）の妊娠 6~15 日に強制経口（原体：0、1、3 及び 10 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%クレモフォア水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても母動物及び胎児に対して検体投与の影響は認められなかったので、無毒性量は母動物及び胎児で本試験の最高用量 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 8、9）

（４）発生毒性試験（ラット）②

SD ラット（一群雌 33 匹）の妊娠 6~15 日に強制経口（原体：0、1、4.2 及び

18 mg/kg 体重/日、溶媒：5%エムルフォア水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 34 に示されている。

18 mg/kg 体重/日投与群において、母動物あたりの平均吸収胚数のわずかな増加（1.1）がみられ、統計学的に有意ではなかったが、背景データの範囲（0.2～1.0）よりわずかに高かった。しかし、吸収胚を持つ母動物の割合及び胚吸収率に差は認められなかったことから、投与の影響とは考えられなかった。

本試験において、1 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められ、胎児ではいずれの投与群においても検体投与の影響は認められなかったため、無毒性量は母動物で 1 mg/kg 体重/日未満、胎児で本試験の最高用量 18 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 8）

表 34 発生毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
18 mg/kg 体重/日	・流涎、流涙、振戦、眼球突出、自発運動低下 ・体重増加抑制 ・摂餌量減少	毒性所見なし
4.2 mg/kg 体重/日以上	・脳 ChE 活性阻害（20%以上）	
1 mg/kg 体重/日以上	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）	

（5）発生毒性試験（ウサギ）①

チンチラウサギ（一群雌 20 匹）の妊娠 7～27 日に強制経口（原体：0、2、6 及び 18 mg/kg 体重/日、溶媒：2%CMC 水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。

本試験において、6 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で後期吸収胚数増加、18 mg/kg 体重/日投与群の胎児で低体重が認められたため、無毒性量は母動物で 2 mg/kg 体重/日、胎児で 6 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 8）

表 35 発生毒性試験（ウサギ）①で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
18 mg/kg 体重/日	・腹臥姿勢、呼吸困難、流涎、下痢、流産、死亡 ・体重増加抑制 ・摂餌量減少	・低体重
6 mg/kg 体重/日以上	・後期吸収胚数増加	毒性所見なし
2 mg/kg 体重/日以	毒性所見なし	

1 **（６）発生毒性試験（ウサギ）②**

2 American Dutch ウサギ（一群雌 17 匹）の妊娠 6～18 日に強制経口（原体：
3 0、1、2.75 及び 7.5mg/kg 体重/日、溶媒：5%エムルフォア水溶液）投与して、発
4 生毒性試験が実施された。

5 各投与群で認められた毒性所見は表 36 に示されている。

6 7.5 mg/kg 体重/日投与群の母動物では、統計学的に有意ではないが、体重増加
7 抑制及び吸収胚数のわずかな増加がみられた。

8 本試験において、母動物では 2.75 mg/kg 体重/日以上投与群で赤血球及び脳 ChE
9 活性阻害（20%以上）等が認められ、胎児ではいずれの投与群でも検体投与の影
10 響は認められなかったので、無毒性量は母動物で 1 mg/kg 体重/日、胎児で本試
11 験の最高用量 7.5 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなか
12 った。（参照 8、12、14）

13
14 **表 36 発生毒性試験（ウサギ）②で認められた毒性所見**

投与群	母動物	胎児
7.5 mg/kg 体重/日		毒性所見なし
2.75 mg/kg 体重/日以上	・ 軟便 ・ 脳及び赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	
1 mg/kg 体重/日以	毒性所見なし	

1 4. 遺伝毒性試験

フェンチオン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験、復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞（CHO）または肺由来細胞（CHL）を用いた HPRT 座前進突然変異試験及び染色体異常試験、ラット初代培養肝細胞を用いた不定期 DNA 合成（UDS）試験、マウスまたはラットを用いた *in vivo* 染色体異常試験、UDS 試験、小核試験及び優性致死試験が実施された。

結果は表 37 に示されている。細菌を用いた復帰突然変異試験 4 試験のうち 1 試験において、TA1535 株にのみ弱い変異原性が認められたが、他の 3 試験では陰性であった。また、ラット初代培養肝細胞を用いた *in vitro* UDS 試験の結果は陽性であったが、*in vivo* 試験では陰性であった。その他の *in vitro* 及び *in vivo* 試験の結果はすべて陰性であったことから、生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 8、9）

表 37 遺伝毒性試験概要（原体）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験	<i>Bacillus subtilis</i> (M45、H17 株)	3~300 µg/ディスク	陰性
	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (M45、H17 株)	250~25,000 µg/ディスク	陰性
	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株)	1,000 µg/プレート (-S9) 0.1~1,000 µg/プレート (+S9)	陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2uvr)	10~5,000 µg/プレート (+/-S9)	TA1535 のみ +S9 で弱陽性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株)	20~12,500 µg/プレート 750~12,000 µg/プレート	陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株)	8~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	HPRT 座前進突然変異試験	チャイニーズハムスター卵巣由来細胞（CHO）	12.5~75.0 µg/mL (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター肺由来細胞（CHL）	23.5~94.0 µg/mL (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター卵巣由来細胞（CHO）	25~188 µg/mL (+/-S9)	陰性

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
	UDS 試験	ラット初代培養肝細胞	5~30 µg/mL	陽性
<i>in vivo</i>	染色体異常試験	NMRI マウス（骨髄細胞） （一群雄 6 匹）	0、43.8、87.5、175 mg/kg 体重 （単回腹腔内投与）	陰性
	UDS 試験	Wistar ラット（肝細胞） （一群雄 4 匹）	0、50、200 mg/kg 体重 （単回強制経口投与）	陰性
	小核試験	NMRI マウス（骨髄細胞） （一群雄 5 匹）	0、20、40、80 mg/kg 体重 （24 時間間隔で 2 回、腹腔内投与）	陰性
	優性致死試験	MRI マウス （一群雄 50~60 匹）	0、30、60 mg/kg 体重/日 （単回強制経口投与）	陰性

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

15. その他の試験

(1) ヒトにおける 4 週間反復投与試験

ヒト（ボランティア、一群男性 4 名）へのカプセル経口（原体：0、0.02 及び 0.07 mg/kg 体重/日）投与による 4 週間反復投与試験が実施された。

0.07 mg/kg 体重/日投与群で有意な血漿 ChE 活性阻害が認められたが、赤血球 ChE への影響はみられず、臨床症状も認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったため、無毒性量は本試験の最高用量 0.07 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 8、9）

(2) ChE 活性測定試験

Fischer ラット（一群雄 10 匹）にフェンチオン（原体：0、1、5 及び 25 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）を経口、経皮（6 時間塗布）及び皮下の 3 経路で単回投与して、ChE 活性測定試験が実施された。

各投与群の ChE 活性阻害率は表 38 に示されている。

経口及び皮下投与では、25 mg/kg 体重投与群において毒性学的に有意な ChE 活性阻害（20%以上）が認められたため、無毒性量は 5 mg/kg 体重であると考えられた。経皮投与では毒性学的に有意な ChE 活性阻害は認められず、無毒性量は本試験の最高用量 25 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 8）

1

表 38 ChE 活性阻害率（対照群の値に対する%）

投与経路	投与量 (mg/kg)	赤血球 ChE				脳 ChE
		投与-7 日後	投与 1 日後	投与 4 日後	投与 14 日後	投与 14 日後
経口	1	98	107	101	97	99
	5	97	92*	91*	93*	91*
	25	102	64*	75*	83*	81*
経皮	1	98	100	98	97	99
	5	96	89*	99	98	103
	25	91*	97	82*	91*	90*
皮下	1	97	97	95*	96	100
	5	94*	94	88*	94	99
	25	98	101	68*	75*	75*

2

* : p<0.05 (ANOVA + Dunnetts test)

3

4

III. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬「フェンチオン」の食品健康影響評価を実施した。

¹⁴C で標識したフェンチオンの動物体内運命試験では、ラットに経口投与されたフェンチオンの吸収及び排泄は速やかであり、臓器及び組織中への残留性は認められなかった。尿中の主要代謝物は H 及び I とそれらの抱合体、ならびに脱メチル化代謝物 N であった。主要排泄経路は尿中であつた。ヤギにおいても臓器及び組織中への蓄積性は認められず、主要排泄経路は尿中であつた。乳汁中排泄量は少なく (0.2% TAR)、乳汁中の主要代謝物は H、I 及び O であった。

¹⁴C で標識したフェンチオンの水稻、アルファルファ及びグアバを用いた植物体内運命試験では、いずれの植物においてもフェンチオンは速やかに代謝され、主要代謝物として B、H（抱合体 Q を含む）及び L が検出された。3 種の植物で代謝様式は共通であり、主要代謝経路は、メチルチオフェノールの硫黄の酸化によるスルホキシド (B) 及びスルホン (C) への酸化、加水分解によるフェノールスルホキシド (H) の生成とその後の抱合体 (Q) の生成、リン酸エステルの脱メチル化による L の生成または O の生成であると考えられた。代謝物 F は植物（水稻）のみに検出された。

フェンチオン、酸化代謝物①（フェンチオン+B+C）及び酸化代謝物②（D+E+F）を分析対象化合物とした作物残留試験の結果、フェンチオンの最大残留値は、散布 30 日後に収穫したあずき（乾燥子実）の 0.002 mg/kg であった。酸化代謝物①及び②の可食部における最大残留値は、①では散布 100 日後に収穫したさとうきび（茎）の 0.043 mg/kg、②では散布 14 日後に収穫したあずき（乾燥子実）の 0.02 mg/kg であった。また、フェンチオン及び代謝物 B、C、D、E、F を含めた魚介類における最大推定残留値は 0.479 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、フェンチオン投与による影響は、主に ChE 活性阻害であつた。発がん性、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。繁殖試験において、高用量群で受胎率の低下が認められたが、母動物に毒性が発現しない用量では繁殖能に対する影響はみられなかった。

代謝物 B、C、D、E 及び F は、親化合物より急性経口毒性が強い傾向が認められる。また、代謝物の分析は「①フェンチオン+B+C」と「②D+E+F」が一括して行われることから、食品中の暴露評価対象物質をフェンチオン（親化合物）及び代謝物 B、C、D、E、F と設定した。上路専門委員修文

各試験における無毒性量等は表 39 に示されている。

食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験で得られた無毒性量の最小値はヒトの 4 週間反復投与試験及びサルの 2 年間慢性毒性試験における 0.07 mg/kg 体重/日であつたので、これを根拠として、安全係数 30 [ヒトとサルの試験結果に種差が認められなかったことから種差：1、個体差：10、ヒトのデータが不完全である（例数が少なく、女性のデータが欠如している）ことによる追加係数：3] で除した 0.0023 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

1
2

ADI 0.0023 mg/kg 体重/日

(ADI設定根拠資料①) 反復投与試験
(動物種) ヒト
(期間) 4 週間
(投与方法) 経口
(無毒性量) 0.07 mg/kg 体重/日

(ADI設定根拠資料②) 慢性毒性試験
(動物種) サル
(期間) 2 年間
(投与方法) 経口
(無毒性量) 0.07 mg/kg 体重/日

(安全係数) 30

3
4
5
6
7

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

1

表 39 各試験における無毒性量の比較

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
ラット	90 日間 亜急性 毒性試験	0, 1, 3, 12, 50, 200ppm 雄 : 0, 0.077, 0.228, 1, 4.04, 18.9 雌 : 0, 0.088, 0.256, 1.14, 4.67, 20				雄 : 0.228 雌 : 0.256 雌雄 : 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	雄 : 0.228 雌 : 0.256 雌雄 : 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
	16 週間 亜急性 毒性試験	0, 2, 3, 5, 25, 100ppm 0, 0.1, 0.15, 0.25, 1.25, 5	0.25 ChE 活性阻害		0.15 血清、赤血球、顎 下腺及び脳 ChE 活 性阻害	雌雄 : 0.25 雌雄 : 赤血球、顎 下腺及び脳 ChE 活 性阻害 (20%以上)	雌雄 : 0.25 雌雄 : 赤血球、顎 下腺及び脳 ChE 活 性阻害 (20%以上)
	90 間 亜急性 神経毒性 試験	0, 2, 25, 125 ppm 雄 : 0, 0.13, 1.63, 8.5 雌 : 0, 0.17, 2.19, 12.6		神経毒性 雄 : 0.13 雌 : 0.17 体重増加抑制、筋 攣縮等 ChE 活性 雄 : 0.13 未満 雌 : 0.17 未満 血漿 ChE 活性阻害		雄 : 0.13 雌 : 0.17 雌雄 : 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等	雄 : 0.13 雌 : 0.17 雌雄 : 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
	2 年間 慢性毒性 試験	0、3、15、75 ppm	雄：0.14 雌：0.19			雄：0.14 雌：0.19	雄：0.14 雌：0.19
		雄：0、0.14、0.72、3.74 雌：0、0.19、0.93、4.64	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）			雌雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）
	2 年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	0、5、20、100 ppm	設定できない	雄：0.2 雌：0.3	設定できない	雄：0.2 雌：0.3	雄：0.2 雌：0.3
		雄：0、0.2、0.8、5.2 雌：0、0.3、1.3、7.3	全投与群で脳 ChE 活性阻害（10%超） (発がん性は認められない)	雄：精巣上体への 影響等 雌：眼への影響等 (発がん性は認められない)	全投与群で血漿 ChE 活性阻害 (発がん性は認められない)	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等 (発がん性は認められない)	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等 (発がん性は認められない)
	3 世代 繁殖試験	0、3、15、75 ppm				親動物 雌雄：0.75 児動物：3.75	親動物 雌雄：0.75 児動物：3.75
		0、0.15、0.75、3.75 (換算値) ³⁾				親動物 雌雄：体重増加 抑制 児動物：毒性所見 なし (繁殖能に対する 影響は認められない)	親動物 雌雄：体重増加 抑制 児動物：毒性所見 なし (繁殖能に対する 影響は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
	2 世代 繁殖試験	0、1、2、14、100ppm	母体：0.16 繁殖能：1.16	親動物：0.1 児動物：0.1	親動物 雄：0.16 雌：0.08 児動物：1.16	親動物 雌雄：0.16 児動物：1.16 繁殖能：1.16	親動物 雌雄：0.16 児動物：1.16 繁殖能：1.16
		0、0.08、0.16、1.16、8.3	母体：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害（20%以上） 繁殖能：受胎率低 下等 (受胎率低下等)	親動物：精巢上体 管上皮空胞化、血 漿 ChE 活性阻害等 児動物：血漿 ChE 活性阻害 (受胎率低下等)	親動物 雄：精巢上体の変 化等 雌：血漿 ChE 活性 阻害 児動物：新生児死 亡増加、低体重	親動物、児動物： 赤血球または脳 ChE 活 性 阻 害 (20%以上) 等 (受胎率低下等)	親動物、児動物： 赤血球または脳 ChE 活 性 阻 害 (20%以上) 等 (受胎率低下等)
	発生毒性 試験①	0、1、3、10	母動物：10 胎児：10 母動物及び胎児： 毒性所見なし (催奇形性は認め られない)			母動物：10 胎児：10 母動物及び胎児： 毒性所見なし (催奇形性は認め られない)	母動物：10 胎児：10 母動物及び胎児： 毒性所見なし (催奇形性は認め られない)
	発生毒性 試験②	0、1、4.2、18	母動物：設定でき ない 胎児：18 母動物：赤血球 ChE 活 性 阻 害 (20%超)、脳 ChE 活性阻害 (10%超) 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認め られない)	母動物、胎児：4.2 ChE 活性：1 未満 母動物：臨床症状等 胎児：吸収胚数増加 ChE：血漿、赤血 球及び脳 ChE 活性 阻害 (催奇形性は認め られない)	母動物：設定でき ない 胎児：4.2 母動物：赤血球 ChE 活性阻害等 胎児：吸収胚数増 加、骨化遅延 (催奇形性は認め られない)	母動物：1 未満 胎児：18 母動物：赤血球 ChE 活 性 阻 害 (20%以上) 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	母動物：1 未満 胎児：18 母動物：赤血球 ChE 活 性 阻 害 (20%以上) 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
マウス	90 日間 亜急性 毒性試験	0、1、3、12、50、200ppm 雄：0、0.153、0.304、1.87、 7.89、30.1 雌：0、0.175、0.553、2.16、 8.61、38.7				雄：0.304 雌：0.553 雄：脳 ChE 活性阻 害（20%以上） 雌：赤血球及び脳 ChE 活 性 阻 害 （20%以上）	雄：0.304 雌：0.553 雄：脳 ChE 活性阻 害（20%以上） 雌：赤血球及び脳 ChE 活 性 阻 害 （20%以上）
	2 年間 発がん性 試験	0、0.1、1、5、25ppm 雄：0、0.03、0.4、1.95、9.42 雌：0、0.03、0.47、2.25、 10.6	1.95 赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (発がん性は認め られない)	血漿 ChE 雌雄：0.03 赤血球 ChE 雄：1.95 雌：2.25 (発がん性は認め られない)	0.03 血漿 ChE 活性阻害 (発がん性は認め られない)	雄：1.95 雌：2.25 雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 （20%以上）等 (発がん性は認め られない)	雄：1.95 雌：2.25 雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 （20%以上）等 (発がん性は認め られない)
ウサギ	発生毒性 試験①	0、2、6、18			胎児：2 胎児：後期吸収胚 増加	母動物：2 胎児：6 母動物：後期吸収 胚数増加 胎児：低体重 (催奇形性は認め られない)	母動物：2 胎児：6 母動物：後期吸収 胚数増加 胎児：低体重 (催奇形性は認め られない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
	発生毒性 試験②	0、1、2.75、7.5	母動物：1 胎児：7.5 母動物：赤血球 ChE 活性阻害 (20%超)、脳 ChE 活性阻害 (10%超) 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認め られない)	母動物：1 胎児：2.75 母動物：赤血球及 び脳 ChE 活性阻害 胎児：中手骨未骨 化増加 (催奇形性は認め られない)	母動物：1 胎児：2.75 母動物：赤血球及 び脳 ChE 活性阻害 胎児：中手骨未骨 化増加 (催奇形性は認め られない)	母動物：1 胎児：7.5 母動物：赤血球及 び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	母動物：1 胎児：7.5 母動物：赤血球及 び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)
イヌ	1 年間 慢性毒性 試験	0、2、10、50 ppm	0.06	0.056	0.05	雄：0.258 雌：0.262	雄：0.258 雌：0.262
		雄：0.0056、0.258、1.23 雌：0.0056、0.262、1.18	脳 ChE 活性阻害 (10%超)	血漿及び赤血球 ChE 活性阻害	血漿 ChE 活性阻害	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
	2 年間 慢性毒性 試験	0、3、10、30/50/60 ppm	0.09		0.08	雄：0.09 雌：0.33	雄：0.09 雌：0.33
		雄：0.009、0.31、1.23 雌：0.01、0.33、1.25	雄：赤血球 ChE 活 性阻害 (20%超) 雌：脳 ChE 活性阻 害 (10%超)		血漿 ChE 活性阻害	雄：赤血球 ChE 活 性阻害 (20%以上) 雌：赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	雄：赤血球 ChE 活 性阻害 (20%以上) 雌：赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国 ²⁾	豪州 ²⁾	農薬抄録	食品安全委員会 農薬専門調査会
ニワトリ	30 日間 亜急性 遅発性 神経毒性 試験	0、10、25、50、100ppm				1.25	1.25
		0、1.25、3.13、6.25、12.5 (換算値) ³⁾				血中 ChE 活性阻害 (20%以上) (遅発性神経毒性 は認められない)	血中 ChE 活性阻害 (20%以上) (遅発性神経毒性 は認められない)
サル	2 年間 慢性毒性 試験	0、0.02、0.07、0.2	0.07	0.02 (LOEL)	0.07	雌雄：0.07	雌雄：0.07
			赤血球 ChE 活性阻 害 (20%超)	血漿 ChE 活性阻害	血漿 ChE 活性阻害	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害 (20%以 上)	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害 (20%以 上)
ヒト	4 週間 反復投与 試験	0、0.02、0.07	0.07	0.02 (LOEL)	血漿 ChE：0.02 赤血球 ChE：0.07	男性：0.07	男性：0.07
			毒性所見なし	血漿 ChE 活性阻害		毒性所見なし	毒性所見なし
ADI (cRfD)			NOAEL：0.07 SF：10 ADI：0.007	NOAEL/LOAEL (境界値)：0.02 UF：300 cRfD：0.00007	NOEL：0.02 SF：10 ADI：0.002	NOAEL：0.07 SF：10 ADI：0.007	NOEL：0.07 SF：30 ADI：0.0023
ADI (cRfD) 設定根拠資料			ヒト 4 週間反復 投与試験	サル 2 年間慢性 毒性試験	ヒト 4 週間反復 投与試験	ヒト 4 週間反復 投与試験	ヒト 4 週間反復 投与試験 サル 2 年間慢性 毒性試験

1 /：試験記載なし。

2 NOAEL：無毒性量 NOEL：無影響量 LOAEL：最小毒性量 LOEL：最小影響量 SF：安全係数 UF：不確実係数 ADI：一日摂取許容量

3 cRfD：慢性参照用量

4 ¹⁾：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。5 ²⁾：米国及び豪州ではすべて無影響量が示されている。6 ³⁾：INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY：Environmental Health Criteria 104：Principles for the Toxicological Assessment of
7 Pesticide Residues in Food (1990) (参照 17) を参照した。

1 <別紙 1：代謝物/分解物略称>

記号	抄録中の記号	名称（略称）	化学名
B	II	MPP スルホキシド P=S,SO	<i>O,O</i> -ジメチル <i>O</i> -4-メチルスルフィニル- <i>m</i> -トリル ホスホロチオアート
C	III	MPP スルホン P=S,SO ₂	<i>O,O</i> -ジメチル <i>O</i> -4-メチルスルホニル- <i>m</i> -トリル ホスホロチオアート
D	IV	MPP オキシソ P=O,S	<i>O,O</i> -ジメチル <i>O</i> -4-メチルチオ- <i>m</i> -トリルホスフェ ート
E	V	MPP オキシソンスルホキシド P=O,SO	<i>O,O</i> -ジメチル <i>O</i> -4-メチルスルフィニル- <i>m</i> -トリル ホスフェート
F	VI	MPP オキシソンスルホン P=O,SO ₂	<i>O,O</i> -ジメチル <i>O</i> -4-メチルスルホニル- <i>m</i> -トリル ホスフェート
G	VII	フェノール Ph-S	4-メチルチオ-3-メチルフェノール
H	VIII	フェノールスルホキシド Ph-SO	4-メチルスルフィニル-3-メチルフェノール
I	IX	フェノールスルホン Ph-SO ₂	4-メチルスルホニル-3-メチルフェノール
J	X	Ph-SO ₂ -Me	3-メチル-4-(メチルスルホニル)アニソール
K	XI	脱メチルフェンチオン 脱メチル PSS Des-Me-P=S,S	<i>O</i> -メチル <i>O</i> -4-メチル- <i>m</i> -トリル ホスホロチオ酸
L	XII	脱メチル PSSO Des-Me-P=S,SO	チオリン酸 <i>O</i> -(4-メタンスルフィニル-3-メチル- フェニル)エステル <i>O</i> -メチルエステル
M	XIII	Des-Me-P=S,SO ₂	チオリン酸 <i>O</i> -(4-メタンスルホニル-3-メチル- フェニル)エステル <i>O</i> -メチルエステル
N	XIV	脱メチル POS Des-Me-P=O,S	リン酸 メチルエステル 3-メチル-4-メチル スルファニル-フェニルエステル
O	XV	脱メチル POSO Des-Me-P=O,SO	リン酸 4-メタンスルフィニル-3-メチル-フェニル エステル メチルエステル
P	XVI	Des-Me-P=O,SO ₂	リン酸 4-メタンスルホニル-3-メチル-フェニル エステル メチルエステル
Q	XVII	Ph-SO グルコース抱合体 Ph-SO-glu	
R	XVIII	Ph-SO ₂ グルコース抱合体 Ph-SO ₂ -glu	
S	XIX	3-メチルフェノール 代謝物 X	3-メチル-フェノール
T	XX	Ph-SO ₃ H	4-ヒドロキシ-2-メチル-ベンゼンスルホン酸

2
3
4
5

1 <別紙 2：検査値等略称>

略称	名称
ACh	アセチルコリン
AChE	アセチルコリンエステラーゼ
ai	有効成分量
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT))
BCF	生物濃縮係数
ChE	コリンエステラーゼ
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
FOB	機能観察総合検査
Glu	グルコース（血糖）
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
NTE	神経障害標的エステラーゼ
OPIDP	有機リン剤誘発性遅発性多発神経障害
PEC	環境中予測濃度
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与（処理）放射能
T.Chol	総コレステロール
T _{max}	最高濃度到達時間
TP	総蛋白質
TRR	総残留放射能

2

3

4

5

6

1 <別紙 3：作物残留試験成績>

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					フェンチオン		①フェンチオン+B+C		②D+E+F		①+②
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	合計
稲 (玄米) 1993 年	2	1,600 ^G	2	60 82	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.009 <0.009
稲 (稲わら) 1993 年				60 82	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	0.03 <0.02	0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	0.04* <0.04
稲 (玄米) 1993 年	2	750 ^{EC} +800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.016	0.01	0.01	0.006*	0.016*
稲 (稲わら) 1993 年				21	<0.02	<0.02	0.67	0.54	0.47	0.30	0.84
稲 (玄米) 1993 年	1	800 ^D	2	21 30	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	0.005 <0.005	0.004* <0.004	0.005 <0.005	0.005* <0.005	0.009* <0.009
稲 (稲わら) 1993 年				21 30	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	0.13 0.06	0.13 0.06	0.08 0.03	0.08 0.03	0.21 0.09
稲 (玄米) 1994 年	2	1,600 ^G +800 ^D	2	20~21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.005	<0.005	<0.009
		1,600 ^G +750 ^{EC}	2	29~30	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.005	<0.005	<0.009
		750 ^{EC} +800 ^D	2	20~21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.005	<0.005	<0.009
		600 ^D	2	20~21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.005	<0.005	<0.009
稲 (玄米) 1994 年	4	1,600 ^G +800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.009	0.006*	<0.005	<0.005	0.011*
		1,600 ^G +750 ^{EC}	2	30	<0.005	<0.005	0.014	0.010	0.009	0.006	0.016
		750 ^{EC} +800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.015	0.013	0.009	0.007	0.020
	1	600 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.006	0.006	<0.005	<0.005	0.011*
	2	800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.007	0.006*	<0.005	<0.005	0.011*

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					フェンチオン		①フェンチオン+B+C		②D+E+F		①+②
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	合計
稲 (玄米) 1994 年	2	1,600 ^G +800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01
		1,600 ^G +750 ^{EC}	2	30	<0.005	<0.005	0.010	0.008*	0.007	0.006*	0.014*
		750 ^{EC} +800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.014	0.010*	0.008	0.006*	0.016*
		800 ^D	2	21	<0.005	<0.005	0.005	0.005*	0.006	0.006*	0.011*
あずき (乾燥子実) 1972 年	1	500 ^{EC}	4	63	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.02	<0.02	<0.025
			6	21	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.02	<0.02	<0.025
あずき (乾燥子実) 1971 年	1		4	30	0.002	0.002	<0.002				<0.002
			6	30	<0.001	<0.001	<0.002				<0.002
あずき (乾燥子実) 1994 年	2	750 ^{EC}	4	14 21	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	0.020 0.017	0.011* 0.010*	0.020 0.010	0.011* 0.007*	0.022* 0.017*
だいず (乾燥子実) 1980 年	2	900 ^{EC}	3	45	<0.005	<0.004	<0.005	<0.004	<0.008	<0.008	<0.012
	2	7,500 ^{EC}	3	45	<0.005	<0.004	<0.005	<0.004	<0.008	<0.008	<0.012
だいず (乾燥子実) 1994 年	2	750 ^{EC}	3	21 30	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.009 <0.009
ばれいしょ (塊茎) 1994 年	2	750 ^{EC}	2	7 14	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.005 <0.005	<0.004 <0.004	<0.009 <0.009
やまのいも (塊茎) 1979 年	1	4,500 ^G	1	37	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028
				47	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028
				107	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028
			1~3	36	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028
				63	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028
				97	<0.004	<0.004	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.028

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					フェンチオン		①フェンチオン+B+C		②D+E+F		①+②
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	合計
やまのいも (塊茎) 1994 年	2	4,500 G	3	29~30 45	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.01 <0.01 <0.01
かんしょ (塊根) 1973 年	2	3,000 G	1	28	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
				84	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
				44	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
				92	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
		4,500 G	1	28	0.004	0.003*	0.006	0.004*	<0.01	<0.007	0.011*
				84	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
				97	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
				44	<0.002	<0.002	<0.005	<0.004	<0.01	<0.007	<0.011
かんしょ (塊根) 1993 年	2	800 D	2	30	<0.003	<0.003	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01
		4,500 G	2	30	<0.003	<0.003	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01
さとうきび (茎) 1976 年	2	1,800 D + 18,000 EC	2	116	<0.002	<0.0014					
				213	<0.002	<0.0014					
				231	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022
				421	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022
		3,000 G	1	200	<0.002	<0.0014					
				297	<0.002	<0.0014					
				329	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022
				519	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022
		4,500 G	1	200	<0.002	<0.0014					
				298	<0.002	<0.0014					
				329	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022
				519	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.022

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					フェンチオン		①フェンチオン+B+C		②D+E+F		①+②
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	合計
さとうきび (茎) 1989 年	2	2,000 ^{EC}	2	90	<0.005	<0.005	0.005	0.005*	<0.01	<0.008	0.013*
				100	<0.005	<0.005	0.009	0.006*	<0.01	<0.008	0.014*
		20,000 ^{EC}		90	<0.005	<0.005	0.033	0.016*	0.01	0.009*	0.025*
				100	<0.005	<0.005	0.043	0.020*	0.01	0.009*	0.029*
		4,500 ^G		90	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.008	<0.012
				100	<0.005	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.008	<0.012

注) ai : 有効成分、PHI : 最終使用から収穫までの日数、G : 粒剤、EC : 乳剤、D : 粉剤

- 一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとして計算し、*印を付した。
- すべてのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

＜参照＞

- 1 食品安全委員会に意見を求められた案件／清涼飲料水：
 - 2 (URL : <http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-uke-bunsyo-20.pdf>)
- 3 2 7月1日付けで厚生労働大臣から食品安全委員会委員長へ食品健康影響評価を依頼した事
- 4 項：食品安全委員会第3回会合資料
- 5 (URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai3/dai3kai-kouseisyousiryou.pdf>)
- 6 3 7月1日に厚生労働省より意見の聴取要請のあった、清涼飲料水の規格基準の改正につい
- 7 て：食品安全委員会農薬専門調査会第1回会合資料6
- 8 (URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai1/nou1-siryou6.pdf>)
- 9 4 第1回食品安全委員会農薬専門調査会
- 10 (URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai1/index.html>)
- 11 5 第6回食品安全委員会農薬専門調査会
- 12 (URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai6/index.html>)
- 13 6 第22回食品安全委員会農薬専門調査会
- 14 (URL : <http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/n-dai22/index.html>)
- 15 7 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（平成
- 16 17年11月29日付、厚生労働省告示第499号）
- 17 8 農薬抄録 MPP（殺虫剤）（平成21年8月3日改訂）：バイエルクロップサイエンス株式
- 18 会社、一部公表予定
- 19 9 JMPR : 895_Fenthion (Pesticide residues in food : 1995 evaluations Part II
- 20 Toxicological & Environmental)
- 21 10 JMPR : 909_Fenthion (Pesticide residues in food : 1995 evaluations Part II
- 22 Toxicological & Environmental)
- 23 11 JMPR : 931_Fenthion (Pesticide residues in food : 1997 evaluations Part II
- 24 Toxicological & Environmental)
- 25 12 US EPA : FENTHION : The HED Chapter of the Reregistration Eligibility Decision
- 26 Document (RED) (1998)
- 27 13 US EPA : FENTHION : -RE-EVALUATION-Report of the Hazard Identification
- 28 Assessment Review Committee (1998)
- 29 14 US EPA : Interim Reregistration Eligibility Decision for Fenthion (2001)
- 30 15 Australia APVMA : Australian Residues Monograph for FENTHION (1962～1997)
- 31 16 フェンチオンの魚介類における最大推定残留値に係る資料
- 32 17 INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY : Environmental Health
- 33 Criteria 104 : Principles for the Toxicological Assessment of Pesticide Residues in
- 34 Food (1990)
- 35 18 食品健康影響評価について
- 36 (URL : http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-uke-fenthion_201209.pdf)
- 37 19 第270回食品安全委員会

- 1 (URL : <http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai270/index.html>)
- 2 20 第 31 回食品安全委員会農薬専門調査会総合評価第一部会
- 3 (URL : http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/sougou1_dai31/index.html)
- 4 21 第 55 回食品安全委員会農薬専門調査会幹事会
- 5 (URL : http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kanjikai_dai55/index.html)