

（案）

農薬評価書

アメトクトラジン

2012年10月26日

食品安全委員会農薬専門調査会

目 次

1		頁
2		
3	○ 審議の経緯.....	3
4	○ 食品安全委員会委員名簿.....	3
5	○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	3
6	○ 要約.....	5
7		
8	I. 評価対象農薬の概要.....	6
9	1. 用途.....	6
10	2. 有効成分の一般名.....	6
11	3. 化学名.....	6
12	4. 分子式.....	6
13	5. 分子量.....	6
14	6. 構造式.....	6
15	7. 開発の経緯.....	6
16		
17	II. 安全性に係る試験の概要.....	7
18	1. 動物体内運命試験.....	7
19	(1) 吸収.....	7
20	(2) 分布.....	8
21	(3) 代謝.....	9
22	(4) 排泄.....	10
23	2. 植物体内運命試験.....	11
24	(1) レタス.....	11
25	(2) トマト.....	12
26	(3) ばれいしょ.....	12
27	3. 土壌中運命試験.....	14
28	(1) 土壌中運命試験.....	14
29	(2) 土壌吸着試験.....	16
30	4. 水中運命試験.....	16
31	(1) 加水分解試験.....	16
32	(2) 水中光分解試験（緩衝液）.....	16
33	(3) 水中光分解試験（自然水）.....	17
34	5. 土壌残留試験.....	17
35	6. 作物残留試験.....	17
36	(1) 作物残留試験.....	17
37	(2) 推定摂取量.....	18
38	7. 一般薬理試験.....	18

1	8. 急性毒性試験	19
2	(1) 急性毒性試験	19
3	(2) 急性神経毒性試験（ラット）	20
4	9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	20
5	10. 亜急性毒性試験	20
6	(1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）	20
7	(2) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）	20
8	(3) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）	21
9	(4) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）	21
10	(5) 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 D、ラット）	22
11	(6) 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 E、ラット）	22
12	11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	22
13	(1) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）	22
14	(2) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	23
15	(3) 18 か月間発がん性試験（マウス）	23
16	12. 生殖発生毒性試験	24
17	(1) 2 世代繁殖試験（ラット）	24
18	(2) 発生毒性試験（ラット）	24
19	(3) 発生毒性試験（ウサギ）	25
20	13. 遺伝毒性試験	25
21	14. その他の試験	28
22	(1) マウスを用いた 4 週間混餌投与免疫毒性試験	28
23		
24	Ⅲ. 食品健康影響評価	29
25		
26	・別紙 1：代謝物/分解物等略称	33
27	・別紙 2：検査値等略称	34
28	・別紙 3：作物残留試験成績（国内）	35
29	・別紙 4：作物残留試験成績（海外）	37
30	・別紙 5：推定摂取量	65
31	・参照	66
32		
33		

1 <審議の経緯>

- 2011年 6月 2日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び
基準値設定依頼（新規：ばれいしょ、トマト等）
- 2011年 10月 6日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に
ついて要請（厚生労働省発食安 1006 第 12 号）
- 2011年 10月 11日 関係書類の接受（参照 1～56）
- 2011年 10月 13日 第 403 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2012年 2月 22日 第 15 回農薬専門調査会評価第三部会
- 2012年 6月 14日 インポートトレランス設定の要請（ホップ、たまねぎ等）
- 2012年 6月 18日 関係書類の接受（参照 57）
- 2012年 8月 23日 追加資料受理（参照 58、59）
- 2012年 9月 12日 第 20 回農薬専門調査会評価第三部会
- 2012年 10月 26日 第 87 回農薬専門調査会幹事会

2

3 <食品安全委員会委員名簿>

(2012年6月30日まで)	(2012年7月1日から)
小泉直子（委員長）	熊谷 進（委員長）
熊谷 進（委員長代理*）	佐藤 洋（委員長代理）
長尾 拓	山添 康（委員長代理）
野村一正	三森国敏（委員長代理）
畑江敬子	石井克枝
廣瀬雅雄	上安平冽子
村田容常	村田容常

*：2011年1月13日から

4

5 <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2012年3月31日まで)

納屋聖人（座長）	佐々木有	平塚 明
林 真（座長代理）	代田眞理子	福井義浩
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清
浅野 哲**	田村廣人	堀本政夫
石井康雄	津田修治	本間正充
泉 啓介	津田洋幸	増村健一**
上路雅子	長尾哲二	松本清司

臼井健二
太田敏博
小澤正吾
川合是彰
川口博明
桑形麻樹子***
小林裕子
三枝順三

永田 清
長野嘉介*
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄
八田稔久

柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦
吉田 緑
若栗 忍

* : 2011 年 3 月 1 日まで

** : 2011 年 3 月 1 日から

*** : 2011 年 6 月 23 日から

(2012 年 4 月 1 日から)

・ 幹事会

納屋聖人 (座長)	三枝順三	松本清司
西川秋佳 (座長代理)	永田 清	吉田 緑
赤池昭紀	長野嘉介	
上路雅子	本間正充	

・ 評価第一部会

上路雅子 (座長)	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀 (座長代理)	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍

・ 評価第二部会

吉田 緑 (座長)	桑形麻樹子	藤本成明
松本清司 (座長代理)	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充

・ 評価第三部会

三枝順三 (座長)	小野 敦	永田 清
納屋聖人 (座長代理)	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一

・ 評価第四部会

西川秋佳 (座長)	代田眞理子	森田 健
長野嘉介 (座長代理)	玉井郁巳	山手丈至
川口博明	根本信雄	與語靖洋

1

2 <第 20 回農薬専門調査会評価第三部会専門参考人名簿>

高木篤也

3

4 <第 87 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

小澤正吾 林 真

5

6

1 要 約

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ピリミジラミン系殺菌剤である「アメトクトラジン」（CAS No. 865318-97-4）について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（トマト、ばれいしょ等）、作物残留、亜急性毒性（ラット、マウス等）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。

各種毒性試験結果からアメトクトラジン投与による影響は体重（増加抑制）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、神経毒性、免疫毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値がイヌを用いた1年間慢性毒性試験の 273 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として安全係数 100 で除した 2.7 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

1 **I. 評価対象農薬の概要**

2 **1. 用途**

3 殺菌剤

5 **2. 有効成分の一般名**

6 和名：アメトクトラジン

7 英名：ametoctradin (ISO 名)

9 **3. 化学名**

10 **IUPAC**

11 和名：5-エチル-6-オクチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-アミン

12 英名：5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

13 **CAS (No. 865318-97-4)**

14 和名：[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-アミン, 5-エチル-6-オクチル

15 英名：[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, 5-ethyl-6-octyl


17 **4. 分子式**

18 $C_{15}H_{25}N_5$

20 **5. 分子量**

21 275.4

23 **6. 構造式**



29 **7. 開発の経緯**

30 アメトクトラジンは、2004年にBASF社（ドイツ）によって開発されたピリミ
31 ジラミン系殺菌剤である。作用機構はミトコンドリアの電子伝達系のタンパク質複
32 合体 III に作用し、呼吸阻害作用により抗菌活性を示すものと考えられている。今
33 回、農薬取締法に基づく登録申請（新規：ばれいしょ、トマト等）及びインポート
34 トレランス設定（ホップ、たまねぎ等）の要請がなされている。

35

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験〔II.1～4〕は、アメトクトラジンの 2 及び 7 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[amc- ^{14}C]アメトクトラジン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合はアメトクトラジンに換算した。代謝物/分解物等略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) 吸収

① 血中濃度推移

Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に [amc- ^{14}C]アメトクトラジンを 20、100、500 及び 1,000 mg/kg 体重で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。

血漿中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

血漿中の放射能は投与量にかかわらず 1 時間後に最大になり、以後速やかに減少した。血中放射能濃度についても雌雄ともに血漿と同様の経時的推移が認められた。

血液/血漿濃度比は約 0.3（投与後 1 時間）～7.9（投与後 96 時間）の範囲にあり、測定時間を通して経時的に増加したことから、放射能の一部が血球成分と結合したことが示唆されたが、投与後 168 時間の血球中残留放射能は約 0.1% TAR と僅かであった。（参照 1、2、59）

表 1 血漿中薬物動態学的パラメータ

標識体	[amc- ^{14}C]アメトクトラジン								
	20		100		500		1,000		
投与量 (mg/kg 体重)									
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌	
T_{\max} (時間)	1	1	1	1	1	1	1	1	
C_{\max} ($\mu\text{g/g}$)	0.83	0.73	2.43	2.86	6.45	7.88	12.5	13.1	
$T_{1/2}$ (時間)	第 1 相	2.13	2.51	2.42	1.74	2.91	1.18	2.54	1.91
	第 2 相	7.71	—	7.51	9.21	8.71	8.58	10.2	11.0
	終末相	20.7	20.7	31.3	29.1	31.2	29.9	29.1	28.5
AUC(h · $\mu\text{g/g}$)	6.5	5.1	23.0	22.0	66.9	79.9	136	126	

—：該当なし

② 吸収率

胆汁中排泄試験〔1. (4)②〕で得られた投与後 72 時間における尿、胆汁、ケージ洗浄液及びカーカス¹における残存放射能の合計から推定した経口投与後 72 時間

¹組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ）。

1 の吸収率は低用量群で 36.4～41.7%、高用量群で 15.9～23.3%と算出された。（参
2 照 1、2、59）

4 (2) 分布

5 Wistar ラット（一群雌雄各 12 匹）に[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを 50 mg/kg
6 体重（以下[1.]において「低用量」という。）又は 500 mg/kg 体重（以下[1.]
7 において「高用量」という。）で単回経口投与し、投与後 1、2.5、8 及び 20 時
8 間に臓器及び組織中放射能濃度を測定して体内分布が検討された。

9 主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。

10 低用量投与群では雌雄とも消化管、肝臓及び腎臓で残留放射能濃度が高かった
11 が、経時的に減少した。高用量投与群においては雌雄で、消化管、肝臓及び腎臓
12 でのほかに甲状腺で残留放射能濃度が高かった。雄の甲状腺や雌の肺及び雌雄の
13 カーカスでは投与約 20 時間後に最高値を示した。これらの高値は個体の変動に
14 よるもので蓄積性を示すものではないと考えられた。

15 尿及び糞中排泄試験[1. (4)①]の投与 168 時間後に行われた組織残留放射能測
16 定では低用量投与群では肝臓、皮膚、カーカス、腸及び腸内容物で、高用量単回
17 投与群では脾臓、肝臓、皮膚、カーカス及び腸で、反復投与群で血球、皮膚、カ
18 ーカス及び腸で放射能が検出されたが、いずれも 0.32%^{TAR} 未満であった。特
19 定の臓器及び組織への残留傾向は認められなかった。（参照 1、2、59）

20
21
22 表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度（ $\mu\text{g/g}$ ）

投与量 (mg/kg 体重) 投与法	性別	T _{max} 付近 ^a	投与 20 時間後 ^b
50 単回 経口	雄	消化管内容物 (1,380)、胃 (175)、腸 (78.9)、肝臓 (33.4)、腎臓 (15.2)、脂 肪組織 (6.01)、甲状腺 (5.65)、 副腎 (3.02)、脾臓 (2.87)、 血漿 (2.86)	消化管内容物 (239)、腸 (15.2)、 カーカス (2.54)、肝臓 (2.03)、 甲状腺 (0.86)、腎臓 (0.82)、 骨髄 (0.66)、胃 (0.54)、皮 膚 (0.52)、脾臓 (0.36)、血 漿 (0.16)
	雌	消化管内容物 (1,230)、胃 (118)、腸 (100)、肝臓 (30.8)、 腎臓 (22.5)、脾臓 (9.10)、 子宮 (6.41)、血漿 (4.48)、 甲状腺 (4.24)	消化管内容物 (45.0)、腸 (9.58)、骨髄 (1.53)、子宮 (1.10)、脾臓 (0.95)、肝臓 (0.61)、カーカス (0.51)、 卵巣 (0.51)、皮膚 (0.43)、 胃 (0.37)、血漿 (0.10)
500 単回 経口	雄	消化管内容物 (25,600)、胃 (1,200)、腸 (123)、甲状 腺 (41.9)、肝臓 (31.3)、 腎臓 (22.4)、副腎 (7.77)、 心臓 (5.75)、脾臓 (5.38)、	消化管内容物 (1,890)、甲状 腺 (84.5)、腸 (55.1)、カ ーカス (29.6)、骨髄 (3.86)、 副腎 (3.79)、肝臓 (3.78)、 脾臓 (2.03)、脾臓 (1.93)、

投与量 (mg/kg 体重) 投与法	性別	T _{max} 付近 ^a	投与 20 時間後 ^b
		骨髓 (5.26)、血漿 (3.83)	腎臓 (1.86)、胃 (1.60)、血漿 (0.45)
	雌 ^c	消化管内容物 (34,000)、胃 (2,280)、腸 (331)、甲状腺 (34.8)、肝臓 (24.9)、腎臓 (20.6)、骨髓 (18.8)、副腎 (9.80)、血漿 (4.09)	消化管内容物 (998)、肺 (41.0)、腸 (29.2)、甲状腺 (20.5)、胃 (17.0)、カーカス (14.2)、骨髓 (7.19)、肝臓 (3.19)、副腎 (2.45)、脾臓 (2.08)、腎臓 (1.99)、血漿 (0.7)

1 a: 投与 1 時間後

2 b: C_{max} の 1/8 になる時間、500 mg/kg 体重投与群雄では投与 22 時間後

3 c: 1 匹に異常な高値が認められたため除外 (動物番号 102) し、N=2 とした。

4

5 (3) 代謝

6 尿及び糞中排泄試験 [1. (4) ①] で採取された尿及び糞胆汁中排泄試験 [1. (4)
7 ②] で採取された胆汁を試料として代謝物同定・定量試験が実施された。

8 尿、糞及び胆汁中代謝物は表 3 に示されている。

9 尿中に未変化のアメトクトラジンは認められなかった。投与したアメトクトラ
10 ジンの大部分が、未変化体として糞中に排泄された。糞中に排泄された未変化の
11 アメトクトラジンの割合は高用量投与群でより高かった。投与量群、投与回数及
12 び雌雄の違いにかかわらず、全ての試料中において、側鎖の炭化水素が一部酸化
13 及び炭素 2 原子の単位で分解した G が主要な代謝物であった。14 尿中及び低用量投与群の糞中では他に G から更に炭素 2 原子の単位で分解し
15 た B が多くみられ、尿中にはα-酸化分解により得られる F も認められた。胆汁
16 中では G の他に、G にタウリンが抱合した K が両投与群及び雌雄で認められ、
17 抱合体生成は雄でより多かった。また、微量ではあるがグルクロン酸抱合体 J も
18 認められた。19 アメトクトラジンのラットにおける主要代謝経路は、①オクチル側鎖の末端メ
20 チル基の酸化によるカルボン酸の生成②カルボン酸側鎖の分解(炭素原子 2 個単
21 位又は炭素原子 1 個単位の消失)③酸化された側鎖カルボン酸のタウリン又はグ
22 ルクロン酸との抱合であると考えられた。(参照 1、3、59)

23

24

表 3 尿、糞及び胆汁における主要代謝物 (%TAR)

投与方法	投与量 (mg/kg 体重)	性別	試料 採取時間	アメトクト ラジン	代謝物
単回経口	50	雄	尿 (12-72h) ^a	ND	G(4.81)、B(0.48)、F(0.16)
			糞 (0-72h)	43.4	G(19.9)、B(4.59)

		雌	胆汁 (0-72h)	0.88	G(13.1)、K(3.81)、I(3.16)、 B(2.70)、H(0.81)、F+J(1.38)	
			尿 (12-120h) ^a	ND	G(7.71)、B(1.31)	
			糞 (0-96h)	69.3	G(11.4)、B(2.09)	
			胆汁 (0-72h)	0.22	G(8.00)、K(0.93)、B(0.85)、 H(0.67)、F+J(0.19)	
	500	雄	尿 (0-72h)	ND	G(1.55)、B(0.28)、F(0.05)	
			糞 (0-48h)	78.5	G(18.1)	
			胆汁 (0-42h)	0.23	G(4.84)、I(1.75)、K(1.64)、 B(0.99)、F+J(0.98)	
		雌	尿 (0-72h)	ND	G(2.44)、B(0.32)、F(0.08)	
			糞 (0-48h)	92.2	G(4.43)	
			胆汁 (0-48h)	ND	G(1.89)、H(0.21)、B(0.15)、 K(0.07)、F+J(0.06)	
	反復経口	500	雄	尿 (12-48h)	ND	G(1.08)、B(0.32)、F(0.12)
				糞 (0-48h)	87.5	G(2.90)
雌		尿 (12-48h)	ND	G(2.84)、B(0.34)、F(0.06)		
		糞 (0-48h)	75.7	G(5.16)		

ND：検出されず、a：0-12時間の尿試料は他の試験に使用された。

（４）排泄

① 尿及び糞中排泄

Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを低用量若しくは高用量で単回経口投与し、又は非標識体を高用量で 14 日間反復経口投与後に[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを高用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

単回経口投与したアメトクトラジンは投与後 48 時間に両用量投与群とも 91%TAR 以上が尿糞中に排泄され、主要排泄経路は糞中であつた。高用量投与群で、糞中排泄量はより増加する傾向が認められた。呼気への排泄は 2%TAR 未満であつた。

1 反復投与でも排泄パターンに違いは見られなかった。（参照 1、2、59）

3 表 4 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与方法 投与量 (mg/kg 体重)	単回経口投与				反復経口投与	
	50		500		500	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	19.4	21.8	6.51	8.51	4.76	6.03
糞	73.4	84.1	102	100	98.3	84.6
ケージ洗浄液	0.09	0.35	0.16	0.10	0.14	0.36
総回収率	93.2	106	109	110	104	91.5

5 ② 胆汁中排泄

6 胆管カニューレを挿入した Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[amc-¹⁴C]
7 アメトクトラジンを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実
8 施された。

9 投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。

10 胆汁中排泄率は、両用量投与群とも、雄で雌より多い傾向が見られた。また、
11 高用量投与群で、胆汁中排泄率の低下が認められた。主要排泄経路は低用量投与
12 群雌を除き、糞中であつた。（参照 1、2、59）

14 表 5 投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与量 (mg/kg 体重)	50		500	
	雄	雌	雄	雌
胆汁	22.5	12.4	10.8	3.22
尿	11.8	26.4	8.93	7.85
糞	32.7	21.9	48.4	36.3
消化器内容物	21.5	27.6	28.5	40.0
ケージ洗浄液	1.39	1.66	0.61	0.94
カーカス	0.68	1.26	2.92	3.90
総回収率	91.6	93.9	102	94.4

16 2. 植物体内運命試験

17 (1) レタス 上路専門委員修文

18 レタス（品種：Matilda）に、[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを 240 g ai/ha の用
19 量で苗移植後 21、31 及び 39 日後にそれぞれ 1 回、計 3 回散布処理し、最終処
20 理 7 日後に収穫して、植物体内運命試験が実施された。

21 レタス葉中の残留放射能は表 6 に示されている。

レタスの葉の残留放射能の大部分は（98.9%TRR）メタノール抽出液中に認められ、抽出物からは未変化のアメトクトラジンのみが検出された。水抽出液及び抽出残渣の残留放射能は1%TRR未満であった。（参照 1、4、59）

表 6 レタス葉中における残留放射能

	メタノール抽出液	水抽出液	抽出液合計	抽出残渣	総計
残留放射能濃度 (mg/kg)	8.39	0.038	8.43	0.056	8.49
残留放射能に対する割合 (%TRR)	98.9	0.4	99.3	0.7	100

(2) トマト 上路専門委員修文

トマト（品種：Goldene Königin）に、[^{14}C]アメトクトラジンを 300 g ai/ha の用量で苗移植後 47、54 及び 61 日後にそれぞれ 1 回、計 3 回茎葉散布処理し、最終処理 1 日後に完熟果実及び葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

トマト果実及び葉における残留放射能濃度は表 7 に示されている。

トマトの葉及び果実の放射能の大部分（約 99%TRR）はメタノール抽出液中に認められ、抽出物からは未変化のアメトクトラジンのみが検出された。水抽出液及び抽出残渣の残留放射能は1%TRR未満であった。（参照 1、5、59）

表 7 トマトの葉及び果実における残留放射能濃度

試料		メタノール抽出液	水抽出液	抽出液合計	抽出残渣	総計
葉	mg/kg	9.04	0.069	9.10	0.055	9.16
	%TRR	98.6	0.8	99.4	0.6	100
果実	mg/kg	0.357	0.001	0.358	0.002	0.360
	%TRR	99.1	0.2	99.3	0.7	100

(3) ばれいしょ

ばれいしょ（品種：Quarta）に、[^{14}C]アメトクトラジンを 480 g ai/ha の用量で収穫前 35 日、21 日及び 7 日にそれぞれ 1 回、計 3 回散布処理し、2 回目の処理直後に未成熟作物を、最終処理 7 日後に成熟作物を収穫して、植物体内運命試験が実施された。

ばれいしょ葉部及び塊茎部における残留放射能濃度は表 8 に、主要残留代謝物は表 9 に示されている。

塊茎では、残留放射能濃度は 0.041 mg/kg 以下であり、塊茎への移行は僅かであった。メタノール及び水による残留放射能の抽出率は、部位にかかわらず、いずれの成長時期においても極めて高かった。結合性残留放射能量は葉では 1.0%TRR 以下であり、塊茎では 11.3%TRR であったものの、濃度は 0.005 mg/kg

1 と微量であった。
 2 ばれいしょの葉及び未成熟塊茎における主要残留化合物は未変化のアメトク
 3 トラジンであった。葉ではほかに多数の代謝物が検出されたが、いずれも 2%TRR
 4 以下であった。未成熟塊茎ではアメトクトラジンのほかに D (13.1%TRR) 及び
 5 2 種類の未同定物質 (いずれも 7.5%TRR 以下) も検出された。成熟塊茎ではア
 6 メトクトラジンは 3.6%TRR と少なく、主要代謝物は側鎖の炭素鎖が短くなった
 7 D (39.5%TRR) 及び E (27.3%TRR) であった。更に ¹⁴C-糖化合物 (フルクト
 8 ース及び/又はスクロース) からなる 1 種類のマイナーなピーク (8.9%TRR 未満)
 9 も検出された。

10 アメトクトラジンのばれいしょにおける主要代謝経路は①オクチル側鎖の末
 11 端部の酸化によるカルボン酸の生成②その後の抱合反応による L 及び M の生成、
 12 又はカルボキシル側鎖の段階的分解 (脂肪酸のβ酸化あるいはα酸化様の反応によ
 13 り、炭素 2 原子あるいは炭素 1 原子の単位で消失) による B、D、E 及び N の生
 14 成である。このほか葉では、③E のエチル側鎖の水酸化及びその後の分子内エス
 15 テル化により、O が生成した。

16 これらの代謝物は他の植物で検出されなかった。(参照 1、6、59)

17
18

表 8 ばれいしょにおける残留放射能濃度

試料部位	葉				塊茎			
	2 回目処理直後		3 回目処理 7 日後		2 回目処理直後		3 回目処理 7 日後	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
メタノール抽出液	21.8	98.3	44.1	98.2	0.022	88.3	0.034	81.0
水抽出液	0.140	0.6	0.396	0.9	0.001	4.1	0.003	7.7
抽出残渣	0.227	1.0	0.387	0.9	0.002	7.6	0.005	11.3
総計	22.1	99.9	44.7	100	0.025	100	0.041	100

19
20

表 9 ばれいしょにおける主要残留代謝物

試料部位	葉				塊茎				
	2 回目処理直後		3 回目処理 7 日後		2 回目処理直後		3 回目処理 7 日後		
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	
抽出液 ^a	アメトクトラジン	21.0	95.1	38.0	84.9	0.017	67.3	0.001	3.6
	D	0.113	0.5	0.334	0.7	0.003	13.1	0.016	39.5
	B	0.056	0.3	0.230	0.5	ND	ND	ND	ND
	E					ND	ND	0.011	27.3
	L/M	ND	ND	0.161	0.4	ND	ND	ND	ND
	N ^{b)}	0.416	1.9	0.805	1.8	ND	ND	ND	ND
	O	ND	ND	0.093	0.2	ND	ND	ND	ND

	未同定	0.500	2.3	1.39	3.1	0.004	16.1	0.007	16.6
	抽出残渣	0.227	1.0	0.387	0.9	0.002	7.6	0.005	11.3
	合計	22.3	101	41.4	92.5	0.026	104	0.041	98.3

ND：検出されず、a：葉はメタノール抽出液+水抽出液、塊茎はメタノール抽出液のみ、b：処理液中にも存在

3. 土壤中運命試験

(1) 土壤中運命試験

① 好氣的土壤運命試験 上路専門委員修文

砂壤土（ドイツ）に[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを 1.92 mg/kg 乾土となるように処理し、土壤水分を最大容水量の 40%に調整し、好氣的条件下、20℃の暗所でインキュベートし、処理 0、1、2、3、6、10、15、30、62、90、119、181、269 及び 360 日後に試料を採取して土壤中運命試験が実施された。

好氣的土壤における代謝分解物分布は表 10 に示されている。

アメトクトラジンは好氣的土壤中において経時的に減少し、抽出性放射能は 360 日後の試験終了時点には 17.5%TAR に低下した。アメトクトラジンは処理直後から急速に減少し処理 1 日後には約半量となった。推定半減期は 1.2~1.4 日と算出された。

アメトクトラジンの主要代謝分解経路は *n*-オクチル側鎖の酸化的開裂によるカルボン酸 B、C、D、E の生成であった。これらの代謝物は更に CO₂ へ分解されるか、又は結合残留中に取り込まれた。（参照 1、7、59）

表 10 好氣的土壤における代謝分解物分布（%TAR）

処理後日数（日）	0	1	3	6	10	30	90	181	360	
溶媒抽出物	アメトクトラジン	96.1	56.2	20.9	13.2	7.8	3.9	1.7	1.1	0.8
	B	1.1	21.9	30.9	17.5	ND	ND	ND	ND	ND
	C	ND	6.8	13.0	12.7	11.4	ND	ND	ND	ND
	D	0.1	5.7	17.9	34.2	57.0	48.8	25.0	11.9	1.8
	E	ND	ND	ND	1.5	6.2	21.5	22.5	22.3	13.4
	未同定	0.5	4.4	3.0	3.5	1.7	ND	2.2	1.5	1.4
¹⁴ CO ₂	NA	0.0	0.2	0.4	0.7	3.3	14.2	29.4	42.1	
土壤残渣	2.3	7.0	11.2	13.0	14.3	21.0	28.4	29.1	28.5	
合計	100	102	97.1	95.9	99.1	98.5	93.9	95.4	88.2	

NA：未分析、ND：検出せず

② 好氣的土壤運命減衰試験 上路専門委員修文

砂壤土、壤質砂土①及び②（いずれもドイツ）に[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを 1.07 mg/kg 乾土となるように処理し、土壤水分を最大容水量の 40%に調整し、好氣的条件下、20℃の暗所でインキュベートし、処理 0、1、2、3、6、10、15、

30、62、93 及び 120 日後に試料を採取して土壤中運命試験が実施された。なお、分解挙動に対する温度の影響を検討するために、壤質砂土①については 10°C でも試験が実施された。

好氣的土壤における代謝分解物分布は表 11 に示されている。

20°Cの好氣的条件下でアメトクトラジンは急速に減少した。10°Cでの減衰は 20°C下に比べて遅かったが、処理後 120 日に親化合物は 4.2%TAR まで減少した。分解物の生成代謝物パターンは同様であり、同じ分解プロセスが遅い速度で起きていることが示唆された。推定半減期は 20°Cで 1.5~3.2 日、10°Cで 6.3 日と算出された。

アメトクトラジンの主要分解経路は *n*-オクチル側鎖の酸化的解裂であり、カルボン酸 B、C、D、E が生成した。この他、試験①では同定されていない 2 種類の分解代謝物 (P 及び Q) を同定した。生成した分解代謝物はさらに分解し、無機化されて CO₂ が生成するか、又は結合残留成分中に組み込まれた。(参照 1、8、59)

表 11 好氣的土壤における代謝分解物分布 (%TAR)

経過日数 (日)		0	1	3	6	10	30	93	120	
砂壤土	抽出物	アメトクトラジン	99.7	65.3	24.2	14.5	11.5	2.1	0.6	0.7
		B	ND	16.9	26.0	7.8	2.6	ND	ND	0.2
		C	ND	5.1	11.0	9.1	5.2	1.5	ND	0.3
		D	ND	5.8	20.5	39.0	39.4	34.9	7.5	4.3
		E	ND	ND	2.8	7.7	14.1	34.9	50.7	54.9
		P	ND	1.6	1.2	1.0	2.2	ND	0.5	ND
		Q	ND	ND	2.4	3.8	4.4	1.4	ND	ND
		未同定	ND	3.6	1.4	3.4	5.5	0.5	1.4	0.9
		¹⁴ CO ₂	NA	0.0	0.1	0.2	0.3	1.1	3.7	5.1
		抽出残渣	0.3	2.9	8.3	13.1	16.8	28.6	34.6	36.5
	総残留放射能	100	101	97.8	99.5	102	105	99.0	103	
壤質砂土①	抽出物	アメトクトラジン	99.7	86.5	51.8	24.6	14.6	5.4	3.1	3.4
		B	ND	11.4	37.3	52.0	53.9	9.4	0.3	ND
		C	ND	ND	2.3	3.6	2.4	ND	ND	ND
		D	ND	ND	4.0	8.5	13.4	50.9	34.8	27.6
		E	ND	ND	ND	0.9	2.9	10.7	22.2	30.3
		P	ND	0.8	1.6	1.2	ND	ND	0.6	0.6
		Q	ND	ND	ND	1.3	ND	2.4	ND	0.9
		未同定	ND	2.6	2.6	ND	1.8	1.1	1.3	1.9
		¹⁴ CO ₂	NA	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	3.6	4.6
		抽出残渣	0.3	1.8	5.7	10.7	14.1	23.0	29.8	29.9

	総残留放射能	100	103	105	103	103	104	95.7	99.2
壤質砂土②	アメトクトラジン	99.7	71.0	28.0	16.4	9.5	2.3	2.2	0.9
	B	ND	17.2	36.0	28.7	16.4	1.5	ND	0.6
	C	ND	1.2	3.6	4.3	5.5	3.3	ND	0.4
	D	ND	3.4	13.2	21.0	34.4	37.0	19.0	12.8
	E	ND	ND	ND	2.6	2.6	9.9	26.8	30.1
	P	ND	1.5	2.6	3.6	4.4	3.0	1.6	1.7
	Q	ND	ND	1.2	3.2	1.9	4.0	ND	1.0
	未同定	ND	2.7	3.5	3.7	4.2	6.1	3.9	5.5
	$^{14}\text{CO}_2$	NA	0.1	0.2	0.3	0.5	1.7	5.3	6.9
	抽出残渣	0.3	3.9	10.3	17.1	21.4	27.4	44.4	38.8
総残留放射能	100	101	98.4	101	101	96.2	103	98.7	

1 NA：適用なし、ND：検出せず

2 (2) 土壌吸着試験

3 アメトクトラジンを用いて、7種類の海外土壌〔壤質砂土①、壤質砂土②、壤質砂土③及び壤土①（いずれもドイツ）、壤土②（米国）、砂壤土①（ドイツ）、砂壤土②（米国）〕及び1種類の国内土壌〔シルト質壤土（北海道）〕における

4 土壌吸着試験が実施された。

5 Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 14.2～80.0、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 1,580～6,620 であった。（参照 1、9、59）

6 4. 水中運命試験

7 (1) 加水分解試験

8 pH4 及び 5（クエン酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）及び pH9（ホウ酸緩衝液）の各種滅菌緩衝液に[$\text{amc-}^{14}\text{C}$]アメトクトラジンを 0.08 mg/L となるように

9 添加し、 $49.9 \pm 0.1^\circ\text{C}$ 密封条件下、暗所で 7 日間インキュベートして加水分解試験が実施された。

10 アメトクトラジンは、いずれの緩衝液においても加水分解的に安定で、7 日後に、pH4 で 97.2% TAR、pH5 で 93.6% TAR、pH7 で 98.2% TAR、pH9 で 94.3% TAR 認められた。アメトクトラジンの半減期は 1 年以上と推定された。（参照 1、10、59）

11 (2) 水中光分解試験（緩衝液）

12 pH7（リン酸緩衝液）の滅菌緩衝液に[$\text{amc-}^{14}\text{C}$]アメトクトラジンを 0.025 mg/L となるように添加し、 $22 \pm 1^\circ\text{C}$ で 15 日間キセノンランプ（光強度：29.2～30.2 W/m^2 、波長：290 nm 以下をカット）を照射して水中光分解試験が実施された。

13 アメトクトラジンはゆるやかに光分解され照射 15 日後に 69.3% TAR まで減少

1 した。暗所対照中では、分解はほとんどみられなかった。照射 15 日後、HPLC
2 分析において 3 本の未知ピーク（それぞれ 9%TAR、6%TAR 及び 12%TAR）が
3 検出され、アメトクトラジンと同様の分子量（MS 値）を示したものの同定には
4 至らなかった。

5 アメトクトラジンの pH7 緩衝液中での推定半減期は 38.4 日、北緯 35°C（東京）、
6 春（4 月から 6 月）の自然太陽光下における半減期は 148 日と算出された。（参
7 照 1、11、59）

9 (3) 水中光分解試験（自然水）上路専門委員修文

10 滅菌自然水（ドイツ湖沼水、pH8.18）に[amc-¹⁴C]アメトクトラジンを 0.025
11 mg/L となるように添加し、22±1°C で 15 日間キセノンランプ（光強度：29.9～
12 30.7 W/m²、波長：290 nm 以下をカット）を照射して水中光分解試験が実施さ
13 れた。

14 アメトクトラジンは経時的に分解され、照射 15 日後に 47.9%TAR まで減少し
15 た。照射 15 日後で合計 49.9%TAR の未同定分解物が認められたが、個々の分解
16 物は 9%TAR を上回る分解物はなかった。暗所対照試料中では、分解は起こら
17 なかった。

18 アメトクトラジンの自然水中での推定半減期は 14.1 日、北緯 35°C（東京）、
19 春の自然太陽光下における半減期は 54.3 日と算出された。（参照 1、12、59）

21 5. 土壌残留試験

22 火山灰軽埴土（茨城）及び沖積砂壤土（山梨）を用いて、アメトクトラジン及び
23 分解物 B、C、D 及び E を分析対象化合物とした土壌残留試験（圃場）が実施され
24 た。推定半減期は表 12 に示されている。（参照 1、13、59）

26 表 12 土壌残留試験成績

試験		濃度 (処理回数)	土壌	推定半減期（日）	
				アメトクトラジン	アメトクトラジン +B、C、D、E
圃 場	畑 地	1,130 g ai/ha ^{SC} (3 回)	火山灰軽埴土	16.7	27.9
			沖積砂壤土	9.8	16.3

27 SC：フロアブル剤

29 6. 作物残留試験

30 (1) 作物残留試験

31 国内において、ばれいしょ、ミニトマト、きゅうり、たまねぎ及びぶどう等
32 用い、アメトクトラジン、代謝物 D、E 及び原体混在物 R を分析対象化合物とし

1 た作物残留試験が実施された。

2 結果は別紙 3 に示されている。アメトクトラジンの最大残留値は、最終散布
3 21 日後に収穫したぶどう（小粒種）（果実）で認められた 17.8 mg/kg であった。
4 代謝物 D、E 及び原体混在物 R については全て定量限界未満であった。（参照 1、
5 14、59）

6 海外において、たかな、非結球レタス、ほうれんそう等を用いてアメトクトラ
7 ジン、代謝物 D 及び E を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

8 結果は別紙 4 に示されている。アメトクトラジン、代謝物 D 及び E の最大残
9 留値はそれぞれ、最終散布 1 日後に収穫したほうれんそう（葉）の 38.3 mg/kg
10 （アメトクトラジン）、散布 7 日後に収穫したたかな（葉）の 0.18 mg/kg（代
11 謝物 D）並びに散布 10 日後に収穫した非結球レタス（葉）及び散布 7 日後に収
12 穫したほうれんそう（葉）の 0.02 mg/kg（代謝物 E）であった。（参照 57）

【上路専門委員より】
原体混在物 R は分析対象化合物になっているので、別紙 1 に化学名を記載できないか。

13 14 (2) 推定摂取量

15 別紙 3 の作物残留試験の分析値を用いてアメトクトラジン（親化合物のみ）を
16 暴露評価対象化合物として国内で栽培される農産物から摂取される推定摂取量
17 が表 13 に示されている。（別紙 5 参照）なお、本推定摂取量の算定は、申請さ
18 れた使用方法から、アメトクトラジンが最大の残留を示す使用条件で、今回申請
19 された全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くない
20 との仮定の下に行った。（参照 54～56）

21
22 表 13 食品中より摂取されるアメトクトラジンの推定摂取量

	国民平均 (体重：53.3 kg)	小児（1～6 歳） (体重：15.4 kg)	妊婦 (体重：55.6 kg)	高齢者（65 歳以上） (体重：54.2 kg)
推定摂取量 ($\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$)	177	127	98.5	128

23 24 7. 一般薬理試験

25 アメトクトラジンのラット、マウス、ウサギ及びモルモットを用いた一般薬理試
26 験が実施された。

27 結果は表 14 に示されている。（参照 1、15、59）

28
29
30
31 表 14 一般薬理試験

試験項目	動物種	動物数 (匹/群)	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢神経系	一般状態 [FOB] 呼吸作用	SD ラット	雄 5	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし
	一般状態 [Irwin 法]	ICR マウス	雌雄 3	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし
	自発運動 量測定	SD ラット	雄 5	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし
	電撃痙攣	ICR マウス	雄 5	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし
腎機能	尿量・電解質・浸透圧	SD ラット	雄 5	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし
循環器系	血圧・心拍数（無麻酔）	SD ラット	雄 5	0、200、600、 2,000 (経口)	2,000	—	投与による影響なし

注) 溶媒：1% CMC 水溶液

—：最小作用量は設定できなかった。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

アメトクトラジン原体のラット及びマウスを用いた急性毒性試験が実施された。

結果は表 15 に示されている。（参照 1、16～18、59）

表 15 急性毒性試験概要（原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口 ^a	Wistar ラット 雌 6 匹	/		症状及び死亡例なし
経皮 ^a	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし
吸入 ^b	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		呼吸数の増加、うずくまり姿勢、立毛、汚物又は被験物質による被毛の汚れ 死亡例なし
		>5.5	>5.5	

a：0.5%CMC 水溶液に懸濁 b：1%Aerosil 添加、4 時間鼻部暴露

1 (2) 急性神経毒性試験（ラット）

2 Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた単回強制経口（原体：0、125、500
3 及び 2,000 mg/kg 体重/日、溶媒：1%CMC 水溶液）投与による急性神経毒性試
4 験が実施された。

5 いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかった。

6 本試験における無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量である 2,000 mg/kg 体
7 重/日であると考えられた。急性神経毒性は認められなかった。（参照 1、19、59）
8

9 9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

10 NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、眼刺激性及び
11 皮膚刺激性は認められなかった。（参照 1、20、21、59）

12 Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施され、
13 皮膚感作性は陰性であると判断された。（参照 1、22、59）
14

15 10. 亜急性毒性試験

16 (1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）

17 Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,500、5,000 及
18 び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 16 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試
19 験が実施された。
20

21 表 16 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		1,500	5,000	15,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	106	358	1,080
	雌	123	416	1,240

22 いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒
23 性量は本試験の最高用量である 15,000 ppm（雄：1,080 mg/kg 体重/日、雌：1,240
24 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、23、59）
25
26

27 (2) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）

28 C57BL/6NCrl マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、500、2,000
29 及び 6,000 ppm：平均検体摂取量は表 17 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試
30 験が実施された。
31

表 17 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		500	2,000	6,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	101	370	1,120
	雌	168	597	2,090

32

1 1 1 1 1
 2 1 1 1 1 1
 3 1 1 1 1 1
 4 1 1 1 1 1
 5 1 1 1 1 1
 6 1 1 1 1 1
 7 1 1 1 1 1
 8 1 1 1 1 1
 9 1 1 1 1 1
 10 1 1 1 1 1

いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒性量は本試験の最高用量である 6,000 ppm（雄：1,120 mg/kg 体重/日、雌：2,090 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、25、59）

5 (3) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）

6 1 1 1 1 1
 7 1 1 1 1 1
 8 1 1 1 1 1
 9 1 1 1 1 1
 10 1 1 1 1 1

ビーグル犬（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（原体：0、3,000、10,000 及び 30,000 ppm：平均検体摂取量は表 18 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

11 表 18 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		3,000	10,000	30,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	93	299	912
	雌	100	330	1,010

11 1 1 1 1 1
 12 1 1 1 1 1
 13 1 1 1 1 1
 14 1 1 1 1 1
 15 1 1 1 1 1
 16 1 1 1 1 1
 17 1 1 1 1 1
 18 1 1 1 1 1
 19 1 1 1 1 1
 20 1 1 1 1 1
 21 1 1 1 1 1

いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量である 30,000 ppm（雄：912 mg/kg 体重/日、雌：1,010 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、24、59）

16 (4) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

17 1 1 1 1 1
 18 1 1 1 1 1
 19 1 1 1 1 1
 20 1 1 1 1 1
 21 1 1 1 1 1

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,500、5,000 及び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 19 参照）投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

22 表 19 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		1,500	5,000	15,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	89.4	300	921
	雌	105	350	1,080

22 1 1 1 1 1
 23 1 1 1 1 1
 24 1 1 1 1 1
 25 1 1 1 1 1
 26 1 1 1 1 1
 27 1 1 1 1 1
 28 1 1 1 1 1
 29 1 1 1 1 1
 30 1 1 1 1 1
 31 1 1 1 1 1

15,000ppm 投与群雄の投与 85 日に前肢握力の有意な低下（5.5 ニュートン²：対照群の 76%）がみられたが、試験機関の背景データの範囲内（5.3～7.9 ニュートン）であり、関連する臨床的又は組織病理学的所見が認められなかったことから偶発的なものであると考えられた。15,000ppm 投与群雌の投与 22 日に認められた立ち上がり回数の有意な増加は、その他の検査時期では対照群と同等であったことから偶発的なものであると考えられた。

31 本試験において検体投与による影響は認められなかったので、無毒性量は本試験の最高用量である 15,000 ppm（雄：921 mg/kg 体重/日、雌：1,080 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 1、26、

1 59)

2
3 **(5) 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 D、ラット）**

4 Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（代謝物 D：0、1,500、5,000
5 及び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 22 参照）投与による 90 日間亜急性毒性
6 試験が実施された。

7
8 **表 20 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 D、ラット）の平均検体摂取量**

投与群 (ppm)		1,500	5,000	15,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	89.5	299	943
	雌	107	349	1,090

9
10 いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒
11 性量は本試験の最高用量である 15,000 ppm（雄：943 mg/kg 体重/日、雌：1,090
12 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、27、59）

13
14 **(6) 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 E、ラット）**

15 Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（代謝物 E：0、1,500、5,000
16 及び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 21 参照）投与による 90 日間亜急性毒性
17 試験が実施された。

18
19 **表 21 90 日間亜急性毒性試験（代謝物 E、ラット）の平均検体摂取量**

投与群 (ppm)		1,500	5,000	15,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	96.9	318	1,030
	雌	115	418	1,160

20
21 いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒
22 性量は本試験の最高用量である 15,000 ppm（雄：1,030 mg/kg 体重/日、雌：1,160
23 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、28、59）

24
25 **1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験**

26 **(1) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）**

27 ビーグル犬（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（原体：0、3,000、10,000 及び
28 30,000 ppm：平均検体摂取量は表 22 参照）投与による 1 年間慢性毒性試験が実
29 施された。

30
31
21 kg の質量を持つ物体に 1 m/s² の加速度を生じさせる力を 1 ニュートンという。

1
2

表 22 1 年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		3,000	10,000	30,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	84	273	848
	雌	85	305	936

3

4 3,000 ppm 投与群雄の 1 例で体温上昇及び摂餌量の低下がみられ、試験 161
5 日目に切迫と殺されたが、多発性動脈炎／疼痛症候群³と診断された。同疾患は
6 遺伝的要因が強く、低用量投与群の 1 例のみに認められたことから、検体投与に
7 による影響とは考えられなかった。

8 本試験において 30,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制が認められたことか
9 ら、無毒性量は雌雄とも 10,000 ppm（雄：273 mg/kg 体重/日、雌：305 mg/kg
10 体重/日）であると考えられた。（参照 1、29、59）

11

12 **（2）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）**

13 Wistar ラット（発がん群；一群雌雄各 50 匹、慢性群；一群雌雄各 10 匹）を
14 用いた混餌（原体：0、150、1,500 及び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 23
15 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性試験併合試験が実施された。

16

17 表 23 2 年間慢性毒性/発がん性試験併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)		150	1,500	15,000/20,000/22,500 ⁴
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	6.9	69.9	871
	雌	9.6	95.0	979

18

19 検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

20 いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒
21 性量は雌雄とも本試験の最高用量である 15,000 ppm（雄：871 mg/kg 体重/日、
22 雌：979 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参
23 照 1、30、59）

24

25 **（3）18 か月間発がん性試験（マウス）**

26 C57BL/6JRj マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌（原体：0、60、600 及
27 び 6,000 ppm：平均検体摂取量は表 24 参照）投与による 18 か月間発がん性試験
28 が実施された。

³ a) T. J. Hayes *et al.*, *Tox. Pathol.* (1989), 17, 129-137. b) P. W. Snyder *et al.*, *Vet. Pathol.* (1995), 32, 337-345.

⁴ 雄の高用量群については検体摂取量が 1,000 mg/kg 体重/日となるよう、試験 308~335 日は 20,000 ppm、試験 336 日以降は 22,500 ppm に投与量が段階的に引き上げられた。

1
2

表 24 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)		60	600	6,000
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	10.6	104	1,100
	雌	15.2	154	1,540

3
4
5
6
7
8

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

いずれの投与群においても検体投与による影響は認められなかったので、無毒性量は本試験の最高用量である 6,000 ppm（雄：1,100 mg/kg 体重/日、雌：1,540 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 1、31、59）

9

10 **1 2. 生殖発生毒性試験**11 **(1) 2 世代繁殖試験（ラット）**

Wistar ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、平均検体摂取量は表 25 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

15
16

表 25 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

性別		雄			雌		
投与群 (mg/kg 体重/日)		100	300	1,000	100	300	1,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	94.4	283	944	95.5	285	951
	F ₁ 世代	93.6	280	939	96.8	291	965

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

各投与群で認められた毒性所見は表 26 に示されている。

300 mg/kg 体重/日投与群の F₁ 雄の 1 例で咽喉に非特異的腫瘍が認められたため、試験 9 週目に切迫と殺された。

いずれの投与群においても、検体投与の影響が認められなかったので、無毒性量は親動物及び児動物で本試験の最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日（P 雄：944 mg/kg 体重/日、P 雌：951 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：939 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：965 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 1、32、59）

27 **(2) 発生毒性試験（ラット）**

Wistar ラット（一群妊娠雌 25 匹）の妊娠 6～19 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：CMC 水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

30

1,000 mg/kg 体重/日投与群の胎児で認められた頭蓋骨骨化不全（9.4%）、胸骨分節変形（53.1%）、三角筋粗面変形（3.8%）が認められたが、いずれも背景データ（頭蓋骨骨化不全：平均 4.5%、範囲 0.0～11.0%、胸骨分節変形：平均 26.6%、範囲 7.7～52.1%、三角筋粗面変形：平均 0.3%、範囲 0.0～6.8%）と同程度であり、検体投与の影響ではないと考えられた。

いずれの投与群においても、母動物及び胎児とも検体投与の影響が認められなかったため、無毒性量は母動物及び胎児で本試験の最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 1、33、59）

(3) 発生毒性試験（ウサギ）

ヒマラヤウサギ（一群雌 25 匹）の妊娠 6～28 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：CMC 水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

1,000 mg/kg 体重/日投与群において、過剰 13 肋骨がみられる胎児数が増加したが（7.0%）、背景データ（平均 2.8%、範囲 0.0～10.4%）の範囲内であり、検体投与の影響ではないと考えられた。

いずれの投与群においても、母動物及び胎児とも検体投与の影響は認められなかったため、無毒性量は母動物及び胎児で本試験の最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 1、34、59）

1 3. 遺伝毒性試験

アメトクトラジン原体の、細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来（CHO-K1）細胞を用いた遺伝子突然変異試験、チャイニーズハムスター（V79）細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験、*in vivo* UDS 試験、ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験及びマウスの骨髄細胞を用いた小核試験が実施された。

結果は表 26 に示されている。

全ての試験結果が陰性であり、アメトクトラジンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 1、35～40、59）

表 26 遺伝毒性試験概要（原体）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>Escherichia coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>Salmonella typhimurium</i> (TA1535、TA100、TA1537 及び TA98 株)	20～5,000 µg/プレート (+/-S 9) (標準プレート法及びプレインキュベーション法)	陰性

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
	遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来 (CHO-K1) 細胞 (<i>Hgpert</i> 遺伝子)	1 回目 : 31.3~1,000 $\mu\text{g} / \text{mL}$ (+/-S 9) 2 回目 : 25.0~300 $\mu\text{g} / \text{mL}$ (+/-S 9)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター (V79) 細胞	1 回目 : 25~100 $\mu\text{g} / \text{mL}$ (+/-S 9) 2 回目 : 25~200 $\mu\text{g} / \text{mL}$ (-S 9) 12.5~50 $\mu\text{g} / \text{mL}$ (+S 9)	陰性
<i>in vivo</i>	UDS 試験	Wistar ラット (一群雄 4 匹) (肝細胞)	0、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (強制単回経口投与)	陰性
	染色体異常試験	Wistar ラット (一群雄 5 匹) (骨髄細胞)	500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (強制単回経口投与)	陰性
	小核試験	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雄 5 匹)	500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (強制単回経口投与)	陰性

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

アメトクトラジンの原体混在物 S、T、主として植物及び土壌由来の代謝物 C、D 及び E について細菌を用いた復帰突然変異試験、代謝物 D 及び E についてチャイニーズハムスター卵巣由来 (CHO-K1) 細胞を用いた遺伝子突然変異試験及びチャイニーズハムスター (V79) 細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験、代謝物 C 及び D についてマウスの骨髄細胞を用いた小核試験が実施された。

結果は表 27 に示されているとおり、いずれの試験においても陰性であった。
(参照 1、41~51、59)

表 27 遺伝毒性試験概要 (原体混在物及び代謝物)

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
原体混在物 S	<i>in vitro</i> 復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA100、 TA1537 及び TA98 株)	20~5,000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ (+/-S 9) (標準プレート法及び プレインキュベーション法) 2~500 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ (+/-S 9) (プレイン キュベーション法、 TA98 のみ)	陰性

被験物質	試験		対象	処理濃度・投与量	結果
原体混在物 T		復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA100、 TA1537 及び TA98 株)	20~5,000 µg/プレート (+/-S 9) (標準プレート法) 312.5~5,000 µg/プレート (+/-S 9) (プレイン キュベーション法)	陰性
代謝物 C		復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA100、 TA1537 及び TA98 株)	24~6,000 µg/プレート (+/-S 9) (標準プレート法及 びプレインキュベー ション法)	陰性
	<i>in vivo</i>	小核試験	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雄 5 匹)	500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (強制単回 経口投与)	陰性
代謝物 D	<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA100、 TA1537 及び TA98 株)	20~5,000 µg/プレート (+/-S 9) (標準プレ ート法) 4~4,000 µg/プレート (+/-S 9) (プレイン キュベーション法)	陰性
		遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来 (CHO-K1) 細胞 (<i>Hgpert</i> 遺伝子)	1 回目 : 800~1,800 µg / mL (-S9)、100~1,000 µg / mL (+S9) 2 回目 : 1,400~1,600 µg / mL (-S9)、500~ 1,000 µg / mL (+S9)	陰性
		染色体異常試験	チャイニーズハムスター (V79) 細胞	550~2,200 µg / mL (+/-S 9)	陰性
	<i>in vivo</i>	小核試験	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雄 5 匹)	500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (強制単回 経口投与)	陰性
代謝物 E	<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA100、 TA1537 及び TA98 株)	20~5,000 µg/プレート (+/-S 9) (標準プレ ート法及びプレイン キュベーション法)	陰性
		遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来 (CHO-K1) 細胞 (<i>Hgpert</i> 遺伝子)	1 回目 : 131.3~2,100 µg / mL (+/-S 9) 2 回目 : 500~2,100 µg / mL (-S9)、 131.3~2,100 µg / mL (+S9)	陰性

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター (V79) 細胞	525~2,100 µg / mL (+/-S 9)	陰性

1

2 **14. その他の試験**3 **(1) マウスを用いた 4 週間混餌投与免疫毒性試験**松本専門委員修文

4 C57BL/6JRj マウス（一群雌 8 匹）を用いた混餌（原体：0、500、2,000 及び
5 6,000 ppm：平均検体摂取量は表 28 参照）投与による 4 週間混餌投与免疫毒性
6 試験が実施された。陽性対照群として（一群雌 8 匹）シクロホスファミド強制経
7 口（12 mg/kg 体重/日）投与群が設定された。

8

9

表 28 4 週間混餌投与免疫毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)	500	2,000	6,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	160	604	1,960

10

11 陽性対照群では、免疫毒性として、総リンパ球数及びリンパ球分画数の異常値、
12 SRBC（ヒツジ赤血球）IgM 抗体価の有意差な低下並びに脾臓及び胸腺絶対及び
13 比重量の低下（胸腺は有意差あり）が認められたが、検体投与群ではこれらの指
14 標に影響は認められなかった。

15 本試験より、6,000 ppm（1,960 mg/kg 体重/日）までの検体濃度の飼料を雌マ
16 ウスに 28 日間投与した試験条件下において、免疫毒性はないと考えられた。（参
17 照 1、52、59）

【松本専門委員より】リンパ球数の減少が評価書で確認できましたら、分画を削除した方が良いと思います。

18

19

1 III. 食品健康影響評価

2 参照に挙げた資料を用いて農薬「アメトクトラジン」の食品健康影響評価を実施
3 した。

4 ¹⁴C で標識したアメトクトラジンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経
5 口投与されたアメトクトラジンの体内吸収率は低用量群で 36.4～41.7%、高用量群
6 で 15.9～23.3%と算出された。血漿中における T_{max} は 1 時間であり、その後血漿
7 中濃度は速やかに減少した。投与後 48 時間以内に 91% TAR 以上が尿糞中に排泄さ
8 れ、蓄積傾向はみられなかった。処理した有効成分の大部分が、未変化体として糞
9 中に排泄された。主要排泄経路は糞中であり、主要代謝物は B 及び G であった。

10 植物体内運命試験の結果、いずれの植物においても残留放射能の主要成分は未変
11 化のアメトクトラジンであった。ばれいしょ（成熟塊茎）における主要代謝物は D
12 （39.5% TRR）及び E （27.3% TRR）であったが、残留放射能濃度は 0.041 mg/kg
13 以下であった。

14 国内におけるアメトクトラジン、代謝物 D、E 及び原体混在物 R を分析対象化合
15 物とした作物残留試験の結果、アメトクトラジンの最大残留値は、最終散布 21 日
16 後に収穫したぶどう（小粒種）（果実）の 17.8 mg/kg であった。代謝物 D 及び E、
17 原体混在物 R については全て定量限界未満であった。また海外におけるアメトクト
18 ラジン、代謝物 D 及び E を分析対象化合物とした作物残留試験の結果、最大残留
19 値はそれぞれ、最終散布 1 日後に収穫したほうれんそう（葉）の 38.3 mg/kg（ア
20 メトクトラジン）、散布 7 日後に収穫したたかな（葉）の 0.18 mg/kg（代謝物 D）
21 並びに散布 10 日後に収穫した非結球レタス（葉）及び散布 7 日後に収穫したほう
22 れんそう（葉）の 0.02 mg/kg（代謝物 E）であった。 上路専門委員修文

【事務局より】

網掛け部分については、部会で、これらの記載があった方が対象化合物が明確となりわかり
やすいとのご意見がございました。

24 各種毒性試験結果からアメトクトラジン投与による影響は、体重（増加抑制）に
25 認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、神経毒性、免疫毒性及び
26 遺伝毒性は認められなかった。

27 植物体内運命試験において 10% TRR 以上認められた代謝物 D 及び E については、
28 ラットを用いた 90 日間亜急性毒性試験において検体投与の影響が認められず、遺
29 伝毒性試験の結果は陰性であった。以上より、農産物中の暴露評価対象物質をアメ
30 トクトラジン（親化合物のみ）と設定した。

31 各試験における無毒性量等は表 29 に示されている。

32 食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値がイ
33 ヌを用いた 1 年間慢性毒性試験の 273 mg/kg 体重/日であったことから、これを根
34 拠として、安全係数 100 で除した 2.7 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と
35

1 設定した。

2

ADI	2.7 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	273 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

3

4

1
2

表 29 各試験における無毒性量及び最小毒性量

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考
ラット	90 日間 亜急性 毒性試験	0、1,500、5,000、 15,000 ppm 雄：0、106、358、 1,080 雌：0、123、416、 1,240	雄：1,080 雌：1,240	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし
	90 日間 亜急性神 経毒性試 験	0、1,500、5,000、 15,000 ppm 雄：0、89.4、300、 921 雌：0、105、350、 1,080	雄：921 雌：1,080	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし (神経毒性は認 められない)
	2 年間慢 性毒性/ 発がん性 併合試験	0、1,500、5,000、 15,000* ppm 雄：0、6.9、69.9、 871 雌：0、9.6、95.0、 979	雄：871 雌：979	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし (発がん性は認 められない)
	2 世代 繁殖試験	0、100、300、 1,000 P 雄：0、94.4、 283、944 P 雌：0、95.5、 285、951 F ₁ 雄：0、93.6、 280、939 F ₁ 雌：0、96.8、 291、965	親動物及び児動 物 P 雄：944 P 雌：951 F ₁ 雄：939 F ₁ 雌：965	親動物及び 児動物 P 雄：— P 雌：— F ₁ 雄：— F ₁ 雌：—	親動物及び 児動物：毒性所 見なし (繁殖能に対す る影響は認め られない)
	発生毒性 試験	0、100、300、 1,000	母動物：1,000 胎児：1,000	母動物：— 胎児：—	母動物：毒性所 見なし 胎児：毒性所見 なし (催奇形性は認 められない)
マウス	90 日間 亜急性 毒性試験	0、500、2,000、 6,000 ppm 雄：0、101、370、 1,120 雌：0、168、597、 2,090	雄：1,120 雌：2,090	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし

	18 か月 間発がん 性試験	0、60、600、6,000 ppm ----- 雄：0、10.6、104、 1,100 雌：0、15.2、154、 1,540	雄：1,100 雌：1,540	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし (発がん性は認められない)
ウサギ	発生毒性 試験	0、100、300、 1,000	母動物：1,000 胎児：1,000	母動物：— 胎児：—	母動物：毒性所見 なし 胎児：毒性所見 なし (催奇形性は認められない)
イヌ	90 日間 亜急性 毒性試験	0、3,000、 10,000、30,000 ppm ----- 雄：0、93、299、 912 雌：0、100、330、 1,010	雄：912 雌：1,010	雄：— 雌：—	雌雄：毒性所見 なし
	1 年間 慢性毒性 試験	0、3,000、 10,000、30,000 ppm ----- 雄：0、84、273、 848 雌：0、85、305、 936	雄：273 雌：305	雄：848 雌：936	雌雄：体重増加 抑制

- 1 —：無毒性量又は最小毒性量は設定できなかった。
2 備考には最小毒性量で認められた毒性所見の概要を示した。
3 *：雄の高用量群については検体摂取量が 1,000 mg/kg 体重/日となるよう、試験 308~335 日は 20,000
4 ppm、試験 336 日以降は 22,500 ppm に投与量が段階的に引き上げられた。
5
6

1 <別紙 1：代謝物/分解物等略称>

記号	略号	化学名
B	M650F01 Reg.No.5178872	4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoic acid
C	M650F02 Reg.No.5178871	3-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propanoic acid
D	M650F03 Reg.No.5178870	(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)acetic acid
E	M650F04 Reg.No.5211623	7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
F	M650F05	5-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)pentanoic acid
G	M650F06	6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid
H	M650F09	8-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)octanoic acid
I	M650F10	2-{{8-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl) octanoyl}amino}ethanesulfonic acid
J	M650F11	Glucuronide of 6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid
K	M650F12	2-{{6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoyl}amino}ethanesulfonic acid
L	M650F13	Glucoside of 8-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)octan-1-ol (又は異性体)
M	M650F14	8-(7-(β-aspartylamino)-5-ethyl[1,2,4] triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)octanoic acid (又は異性体)
N	M650F18	7-(7-amino-5-ethyl[1,2,4] triazolo[1,5-a] pyrimidin-6-yl)heptanoic acid (又は異性体)
O	M650F28	8-amino-5-methyl-5 <i>H</i> ,7 <i>H</i> -furo[3,4-d][1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-one
P	M650F31	Methyl 3-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propionate
Q	M650F33	7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
原体混在物 R		
原体混在物 S		
原体混在物 T		

2

3

1 <別紙 2：検査値等略称>

略称	名称
ai	有効成分量
AUC	薬物血中濃度－時間曲線下面積
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
HPLC	高速液体クロマトグラフ
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
PHI	最終使用から収穫までの日数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与(処理)放射能
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成

2

1 <別紙 3 : 作物残留試験成績（国内）>

2

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 圃場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	分析結果 (ppm)																
					公的分析機関						社内分析機関										
					アメトクトラジン		代謝物[D]		代謝物[E]		アメトクトラジン		代謝物[D]		代謝物[E]		原体混在物[R]				
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値			
ばれいしょ (露地) (塊茎) 平成 20 年度	1	755 ^{SC}	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01		
				3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
	1			1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
				3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ばれいしょ (露地) (塊茎) 平成 21 年度	2	265 ^{SC} +ジメトモル フ 198 ^{SC}	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
ミニトマト (施設) (果実) 平成 20 年度	1	1,130 ^{SC}	3	1	2.15	2.15	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2.58	2.52	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01			
				7	2.18	2.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.87	1.84	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
				14	1.77	1.76	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2.10	2.08	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
	1	945 ^{SC}		1	1.40	1.39	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.53	1.50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				7	1.06	1.06	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.38	1.34	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				14	1.21	1.19	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.44	1.40	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
きゅうり (施設) (果実) 平成 20 年度	1	377 ^{SC}	3	1	0.125	0.124	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.111	0.109	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01			
				3	0.032	0.032	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	0.046	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
				7	0.008	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.020	0.020	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
	1			1	0.487	0.482	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.675	0.644	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				3	0.493	0.492	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.483	0.472	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				7	0.204	0.204	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.161	0.154	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			

たまねぎ (露地) (鱗茎) 平成 20 年度	1	377 ^{SC}	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
				14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	1			1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
				14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
ぶどう (小粒種) (施設・無袋) 平成 20 年度	1	567 ^{SC}	3	7	3.15	3.15	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2.85	2.82	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				14	3.78	3.76	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2.35	2.33	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				21	3.26	3.24	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	3.46	3.45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				28	2.75	2.75	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.82	1.75	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	1			7	8.41	8.33	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	6.55	6.35	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
				14	9.14	9.04	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4.37	4.30	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
				21	17.8	17.4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	14.4	14.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
				28	14.3	14.2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12.1	12.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	
ぶどう (大粒種) (施設・無袋) 平成 20 年度	1	567 ^{SC}	3	7	0.520	0.516	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.233	0.210	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				14	0.425	0.424	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.237	0.230	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				21	0.478	0.474	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.310	0.284	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
				28	0.443	0.436	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.277	0.246	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	1			7	2.59	2.58	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5.87	5.77	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				14	2.88	2.87	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	3.03	3.00	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				21	3.72	3.66	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	3.26	3.13	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				28	1.92	1.86	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2.71	2.69	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			

1
2
3
4
5
6

注) ・試験には SC : フロアブル剤、MC : マイクロカプセル剤、WP : 水和剤を用いた。

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

・農薬の使用回数及び使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している場合は、回数又は PHI に a を付した。

1 <別紙 4：作物残留試験成績（海外）>

2

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
ブロッコリー (花蕾)	1	3	922 ^{SC}	0	1.68	<0.01	<0.01	1.70			
					1.97	<0.01	<0.01	1.99			
				1	2.04	<0.01	<0.01	2.06			
					2.77	<0.01	<0.01	2.79			
				3	2.06	<0.01	<0.01	2.08			
					1.27	<0.01	<0.01	1.29			
				7	1.14	<0.01	<0.01	1.16			
					1.16	<0.01	<0.01	1.18			
				10	0.19	<0.01	<0.01	0.21			
					0.05	<0.01	<0.01	0.07			
				1	3	891 ^{SC}	0	1.34	<0.01	<0.01	1.36
								1.30	<0.01	<0.01	1.32
	1	1.13	<0.01				<0.01	1.15			
		1.09	<0.01				<0.01	1.11			
	3	0.69	<0.01				<0.01	0.71			
		0.96	<0.01				<0.01	0.98			
	7	0.57	<0.01				<0.01	0.59			
		0.40	<0.01				<0.01	0.42			
	10	0.12	<0.01				<0.01	0.14			
		0.19	<0.01				<0.01	0.21			
	1	3	962 ^{SC}				0	1.79	<0.01	<0.01	1.81
								1.57	<0.01	<0.01	1.59
				1	1.45	<0.01	<0.01	1.47			
					1.65	<0.01	<0.01	1.67			
				3	1.04	<0.01	<0.01	1.06			
					1.16	<0.01	<0.01	1.18			
				7	1.15	<0.01	<0.01	1.17			
					0.92	<0.01	<0.01	0.94			
				10	0.56	<0.01	<0.01	0.58			
					0.72	<0.01	<0.01	0.74			
				1	3	928 ^{SC}	0	2.52	<0.01	<0.01	2.54
								2.54	<0.01	<0.01	2.56
	1	2.39	<0.01				<0.01	2.41			
		1.91	<0.01				<0.01	1.93			
	3	1.35	<0.01				<0.01	1.37			
		1.61	<0.01				<0.01	1.63			
7	1.38	<0.01	<0.01				1.40				
	1.55	<0.01	<0.01				1.57				
10	0.55	<0.01	<0.01				0.57				
	0.88	<0.01	<0.01				0.90				
1	3	892 ^{SC}	0				3.16	<0.01	<0.01	3.18	
							2.89	<0.01	<0.01	2.91	
			1	3.58	<0.01	<0.01	3.60				
				2.90	<0.01	<0.01	2.92				
			3	2.47	<0.01	<0.01	2.49				
				2.39	<0.01	<0.01	2.41				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
				7	2.20	<0.01	<0.01	2.22			
					2.51	<0.01	<0.01	2.53			
				10	2.13	<0.01	<0.01	2.15			
					2.13	<0.01	<0.01	2.15			
				1	3	897 ^{SC}	0	1.42	<0.01	<0.01	1.44
								1.00	<0.01	<0.01	1.02
							1	0.85	<0.01	<0.01	0.87
								0.61	<0.01	<0.01	0.63
	3	0.81	<0.01				<0.01	0.83			
		0.83	<0.01				<0.01	0.85			
	7	0.62	<0.01				<0.01	0.64			
		0.77	<0.01				<0.01	0.79			
	10	0.34	<0.01	<0.01	0.36						
		0.57	<0.01	<0.01	0.59						
	1	3	916 ^{SC}	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
	10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03						
		<0.01	<0.01	<0.01	<0.03						
	1	3	910 ^{SC}	0	2.59	<0.01	<0.01	2.61			
					3.22	<0.01	<0.01	3.24			
				1	2.22	<0.01	<0.01	2.24			
					2.05	<0.01	<0.01	2.07			
3				1.71	<0.01	<0.01	1.73				
				2.03	<0.01	<0.01	2.05				
7				1.67	<0.01	<0.01	1.69				
				1.34	<0.01	<0.01	1.36				
10	1.82	<0.01	<0.01	1.84							
	0.76	<0.01	<0.01	0.78							
1	3	905 ^{SC}	0	1.63	<0.01	<0.01	1.65				
				1.64	<0.01	<0.01	1.66				
1	3	905 ^{SC}	1	1.27	<0.01	<0.01	1.29				
				1.17	<0.01	<0.01	1.19				
			3	0.51	<0.01	<0.01	0.53				
				0.76	<0.01	<0.01	0.78				
			7	0.46	<0.01	<0.01	0.48				
				0.58	<0.01	<0.01	0.60				
10	0.12	<0.01	<0.01	0.14							
	0.37	<0.01	<0.01	0.39							
1	3	893 ^{SC}	0	1.36	<0.01	<0.01	1.38				
				1.01	<0.01	<0.01	1.03				
			1	0.91	<0.01	<0.01	0.93				
				0.68	<0.01	<0.01	0.70				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)							
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計				
				3	0.68	<0.01	<0.01	0.70				
					0.72	<0.01	<0.01	0.74				
				7	0.54	<0.01	<0.01	0.56				
					0.38	<0.01	<0.01	0.40				
				10	0.28	<0.01	<0.01	0.30				
					0.29	<0.01	<0.01	0.31				
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	907 ^{SC}	0	1.48	<0.01	<0.01	1.50				
					1.63	<0.01	<0.01	1.65				
				1	1.73	<0.01	<0.01	1.75				
					1.57	<0.01	<0.01	1.59				
				3	0.96	<0.01	<0.01	0.98				
					1.12	<0.01	<0.01	1.14				
				7	1.14	<0.01	<0.01	1.16				
					0.69	<0.01	<0.01	0.71				
				10	0.70	<0.01	<0.01	0.72				
					0.58	<0.01	<0.01	0.60				
				キャベツ (外葉なし結球)	1	3	907 ^{SC}	0	0.18	<0.01	<0.01	0.20
									0.07	<0.01	<0.01	0.09
1	0.05	<0.01	<0.01					0.07				
	0.07	<0.01	<0.01					0.09				
3	0.03	<0.01	<0.01					0.05				
	0.02	<0.01	<0.01					0.04				
7	<0.01	<0.01	<0.01					<0.03				
	0.05	<0.01	<0.01					0.07				
10	0.01	<0.01	<0.01					0.03				
	0.01	<0.01	<0.01					0.03				
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	901 ^{SC}					0	3.45	<0.01	<0.01	3.47
									2.77	<0.01	<0.01	2.79
				1	2.77	<0.01	<0.01	2.79				
					2.63	<0.01	<0.01	2.65				
				3	2.79	<0.01	<0.01	2.81				
					3.32	<0.01	<0.01	3.34				
				7	2.27	<0.01	<0.01	2.29				
					1.61	<0.01	<0.01	1.63				
				10	1.89	<0.01	<0.01	1.91				
					1.41	<0.01	<0.01	1.43				
				キャベツ (外葉なし結球)	1	3	901 ^{SC}	0	0.45	<0.01	<0.01	0.47
									0.25	<0.01	<0.01	0.27
1	0.49	<0.01	<0.01					0.51				
	0.31	<0.01	<0.01					0.33				
3	1.13	<0.01	<0.01					1.15				
	1.15	<0.01	<0.01					1.17				
7	0.16	<0.01	<0.01					0.18				
	0.16	<0.01	<0.01					0.18				
10	0.13	<0.01	<0.01					0.15				
	0.19	<0.01	<0.01					0.21				
キャベツ (外葉あり)	1	3	889 ^{SC}					0	2.02	<0.01	<0.01	2.04
									2.37	<0.01	<0.01	2.39
				1	3.30	<0.01	<0.01	3.32				

作物名 り結球)	圃場数	回数 (回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)									
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計						
り結球)					3.27	<0.01	<0.01	3.29						
					3	1.79	<0.01	<0.01	1.81					
						1.52	<0.01	<0.01	1.54					
					7	1.49	<0.01	<0.01	1.51					
						1.45	<0.01	<0.01	1.47					
					10	1.44	<0.01	<0.01	1.46					
						2.11	<0.01	<0.01	2.13					
					キャベツ (外葉なし結球)					0	0.05	<0.01	<0.01	0.07
										1	0.04	<0.01	<0.01	0.06
											0.07	<0.01	<0.01	0.09
3	0.03	<0.01	<0.01	0.05										
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
	0.02	<0.01	<0.01	0.04										
10	0.01	<0.01	<0.01	0.03										
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	895 ^{SC}							0	0.27	<0.01	<0.01	0.29
					1	0.25	<0.01	<0.01	0.27					
						0.30	<0.01	<0.01	0.32					
					3	0.24	<0.01	<0.01	0.26					
						0.35	<0.01	<0.01	0.37					
					7	0.35	<0.01	<0.01	0.37					
						0.15	<0.01	<0.01	0.17					
					10	0.21	<0.01	<0.01	0.23					
						0.14	<0.01	<0.01	0.16					
					キャベツ (外葉なし結球)					0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
	0.02	<0.01	<0.01	0.04										
7	0.04	<0.01	<0.01	0.06										
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03										
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	901 ^{SC}							0	3.10	<0.01	<0.01	3.12
					1	2.82	<0.01	<0.01	2.84					
						3.06	<0.01	<0.01	3.08					
					3	3.26	<0.01	<0.01	3.28					
						2.14	<0.01	<0.01	2.16					
					7	2.51	<0.01	<0.01	2.53					
						2.22	<0.01	<0.01	2.24					
					10	1.97	<0.01	<0.01	1.99					
						0.92	<0.01	<0.01	0.94					
					キャベツ					0	1.23	<0.01	<0.01	1.25
0.70	<0.01	<0.01	0.72											
					0.44	<0.01	<0.01	0.46						

作物名 (外葉なし結球)	圃場数	回数 (回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)							
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計				
(外葉なし結球)				1	0.32	<0.01	<0.01	0.34				
					0.23	<0.01	<0.01	0.25				
				3	0.11	<0.01	<0.01	0.13				
					0.13	<0.01	<0.01	0.15				
				7	0.09	<0.01	<0.01	0.11				
					0.08	<0.01	<0.01	0.10				
				10	0.04	<0.01	<0.01	0.06				
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03				
				キャベツ (外葉あり結球)	1	3	891 ^{SC}	0	1.17	<0.01	<0.01	1.19
									1.89	<0.01	<0.01	1.91
1	1.97	<0.01	<0.01					1.99				
	2.49	<0.01	<0.01					2.51				
3	0.33	<0.01	<0.01					0.35				
	0.41	<0.01	<0.01					0.43				
7	1.56	<0.01	<0.01					1.58				
	1.16	<0.01	<0.01					1.18				
10	1.17	<0.01	<0.01					1.19				
	0.90	<0.01	<0.01					0.92				
キャベツ (外葉なし結球)	1	3	891 ^{SC}	0	0.11	<0.01	<0.01	0.13				
					0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				1	0.07	<0.01	<0.01	0.09				
					0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				3	0.05	<0.01	<0.01	0.07				
					0.02	<0.01	<0.01	0.04				
				7	0.08	<0.01	<0.01	0.10				
					0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				10	0.04	<0.01	<0.01	0.06				
					0.03	<0.01	<0.01	0.05				
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	900 ^{SC}	0	0.96	<0.01	<0.01	0.98				
					0.71	<0.01	<0.01	0.73				
				1	1.54	<0.01	<0.01	1.56				
					1.97	<0.01	<0.01	1.99				
				3	1.18	<0.01	<0.01	1.20				
					1.59	<0.01	<0.01	1.61				
				7	0.74	<0.01	<0.01	0.76				
					0.83	<0.01	<0.01	0.85				
				10	1.87	<0.01	<0.01	1.89				
					0.90	<0.01	<0.01	0.92				
キャベツ (外葉なし結球)	1	3	900 ^{SC}	0	0.09	<0.01	<0.01	0.11				
					0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				1	0.11	<0.01	<0.01	0.13				
					0.13	<0.01	<0.01	0.15				
				3	0.14	<0.01	<0.01	0.16				
					0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				7	0.04	<0.01	<0.01	0.06				
					0.06	<0.01	<0.01	0.08				
				10	0.06	<0.01	<0.01	0.08				
					0.10	<0.01	<0.01	0.12				
キャベツ	1	3	903 ^{SC}	0	5.31	<0.01	<0.01	5.33				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)							
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計				
(外葉あり結球)					7.07	<0.01	<0.01	7.09				
					1	7.21	<0.01	<0.01	7.23			
						7.75	<0.01	<0.01	7.77			
					3	4.88	<0.01	<0.01	4.90			
						6.75	<0.01	<0.01	6.77			
					7	5.01	<0.01	<0.01	5.03			
						3.06	<0.01	<0.01	3.08			
					10	4.57	<0.01	<0.01	4.59			
						4.20	<0.01	<0.01	4.22			
					キャベツ (外葉なし結球)	1	3	903 ^{SC}	0	0.80	<0.01	<0.01
0.54	<0.01	<0.01	0.56									
1	1.09	<0.01	<0.01	1.11								
	0.91	<0.01	<0.01	0.93								
3	0.59	<0.01	<0.01	0.61								
	0.35	<0.01	<0.01	0.37								
7	0.62	<0.01	<0.01	0.64								
	0.56	<0.01	<0.01	0.58								
10	0.25	<0.01	<0.01	0.27								
	0.27	<0.01	<0.01	0.29								
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	926 ^{SC}	0					1.10	<0.01	<0.01	1.12
									0.91	<0.01	<0.01	0.93
				1	1.24	<0.01	<0.01	1.26				
					0.90	<0.01	<0.01	0.92				
				3	0.69	<0.01	<0.01	0.71				
					0.56	<0.01	<0.01	0.58				
				7	1.16	<0.01	<0.01	1.18				
					0.62	<0.01	<0.01	0.64				
				10	0.51	<0.01	<0.01	0.53				
					0.56	<0.01	<0.01	0.58				
				キャベツ (外葉なし結球)	1	3	926 ^{SC}	0	0.09	<0.01	<0.01	0.11
									0.12	<0.01	<0.01	0.14
1	0.07	<0.01	<0.01					0.09				
	0.11	<0.01	<0.01					0.13				
3	0.03	<0.01	<0.01					0.05				
	0.03	<0.01	<0.01					0.05				
7	0.02	<0.01	<0.01					0.04				
	0.05	<0.01	<0.01					0.07				
10	0.04	<0.01	<0.01					0.06				
	0.08	<0.01	<0.01					0.10				
キャベツ (外葉あり結球)	1	3	902 ^{SC}	0	1.60	<0.01	<0.01	1.62				
					1.16	<0.01	<0.01	1.18				
				1	0.63	<0.01	<0.01	0.65				
					0.85	<0.01	<0.01	0.87				
				3	0.98	<0.01	<0.01	1.00				
					0.86	<0.01	<0.01	0.88				
				7	0.44	<0.01	<0.01	0.46				
					0.50	<0.01	<0.01	0.52				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
キャベツ (外葉なし結球)				10	0.35	<0.01	<0.01	0.37			
					0.42	<0.01	<0.01	0.44			
				0	0.09	<0.01	<0.01	0.11			
					0.10	<0.01	<0.01	0.12			
				1	0.10	<0.01	<0.01	0.12			
					0.10	<0.01	<0.01	0.12			
				3	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
				7	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.07	<0.01	<0.01	0.09			
10	0.02	<0.01	<0.01	0.04							
	0.02	<0.01	<0.01	0.04							
たかな (葉)	1	3	892 ^{SC}	0	13.75	<0.01	<0.01	13.77			
					13.18	<0.01	<0.01	13.20			
				1	13.40	<0.01	<0.01	13.42			
					12.36	<0.01	<0.01	12.38			
				3	10.52	<0.01	<0.01	10.54			
					10.60	<0.01	<0.01	10.62			
				7	4.56	<0.01	<0.01	4.58			
					4.20	<0.01	<0.01	4.22			
				10	3.24	<0.01	<0.01	3.26			
					3.12	<0.01	<0.01	3.14			
				1	3	885 ^{SC}	0	27.49	0.02	<0.01	27.52
								28.12	0.01	<0.01	28.14
	1	21.04	0.02				<0.01	21.07			
		22.12	0.02				<0.01	22.15			
	3	14.57	0.04				<0.01	14.62			
		14.04	0.03				<0.01	14.08			
	7	9.41	0.06				<0.01	9.48			
		11.33	0.04				<0.01	11.38			
	10	8.38	0.04				<0.01	8.43			
		10.23	0.04				<0.01	10.28			
	1	3	902 ^{SC}				0	13.06	0.07	<0.01	13.14
								13.60	0.09	<0.01	13.70
				1	11.70	0.13	<0.01	11.84			
					11.83	0.14	<0.01	11.98			
3				12.33	0.17	<0.01	12.51				
				9.06	0.05	<0.01	9.12				
7				14.72	0.18	<0.01	14.91				
				17.15	0.12	<0.01	17.28				
10				12.38	0.10	<0.01	12.49				
				11.80	0.16	<0.01	11.97				
1				3	886 ^{SC}	0	17.80	<0.01	<0.01	17.82	
							9.05	<0.01	<0.01	9.07	
	1	8.67	<0.01			<0.01	8.69				
		8.83	<0.01			<0.01	8.85				
	3	7.92	<0.01			<0.01	7.94				
		6.67	<0.01			<0.01	6.69				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
			887 ^{SC}	7	4.58	<0.01	<0.01	4.60			
					4.20	<0.01	<0.01	4.22			
				10	3.09	<0.01	<0.01	3.11			
					3.69	<0.01	<0.01	3.71			
				1	3	887 ^{SC}	0	18.60	0.01	<0.01	18.62
								19.41	0.01	<0.01	19.43
	1	17.18	0.02				<0.01	17.21			
		17.96	0.01				<0.01	17.98			
	3	14.81	0.02				<0.01	14.84			
		15.14	0.02				<0.01	15.17			
	7	12.65	0.02				<0.01	12.68			
		7.93	0.02				<0.01	7.96			
	10	4.42	0.03	<0.01	4.46						
		4.96	0.02	<0.01	4.99						
	1	3	902 ^{SC}	0	8.32	<0.01	<0.01	8.34			
					5.15	<0.01	<0.01	5.17			
				1	10.30	<0.01	<0.01	10.32			
					8.10	<0.01	<0.01	8.12			
				3	7.40	<0.01	<0.01	7.42			
					8.93	<0.01	<0.01	8.95			
				7	3.55	<0.01	<0.01	3.57			
					3.43	<0.01	<0.01	3.45			
				10	3.68	<0.01	<0.01	3.70			
					2.05	<0.01	<0.01	2.07			
1				3	882 ^{SC}	0	29.22	<0.01	<0.01	29.24	
							15.95	<0.01	<0.01	15.97	
	1	21.94	<0.01			<0.01	21.96				
		25.75	<0.01			<0.01	25.77				
	3	13.23	<0.01			<0.01	13.25				
		15.83	<0.01			<0.01	15.85				
	7	8.96	<0.01			<0.01	8.98				
		11.29	<0.01			<0.01	11.31				
	10	7.51	<0.01			<0.01	7.53				
		8.90	<0.01			<0.01	8.92				
	ホップ (乾燥 花序)	1	3			947 ^{SC}	7	0.82	<0.01	<0.01	0.84
		1	3			898 ^{SC}	7	0.96	<0.01	<0.01	0.98
1		3	922 ^{SC}	0	4.42	<0.01	<0.01	4.44			
				3	6.71	<0.01	<0.01	6.73			
				7	4.63	<0.01	<0.01	4.65			
				10	6.08	<0.01	<0.01	6.10			
				14	2.11	<0.01	<0.01	2.13			
1		3	914 ^{SC}	0	2.52	<0.01	<0.01	2.54			
				3	4.09	<0.01	<0.01	4.11			
				7	2.38	<0.01	<0.01	2.40			
				10	6.71	<0.01	<0.01	6.73			
				14	2.18	<0.01	<0.01	2.20			
1		3	907 ^{SC}	7	2.42	<0.01	<0.01	2.44			
1		3	902 ^{SC}	7	1.65	<0.01	<0.01	1.67			
たまねぎ	1	3	908 ^{SC}	0	0.22	<0.01	<0.01	0.24			

作物名 (鱗茎)	圃場数	回数 (回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
					0.20	<0.01	<0.01	0.22			
					1	0.18	<0.01	<0.01	0.20		
				3	0.17	<0.01	<0.01	0.19			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
				7	0.19	<0.01	<0.01	0.21			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
				10	0.22	<0.01	<0.01	0.24			
					0.26	<0.01	<0.01	0.28			
				1	3	897 ^{SC}	0	0.15	<0.01	<0.01	0.17
								0.14	<0.01	<0.01	0.16
							1	0.07	<0.01	<0.01	0.09
								0.06	<0.01	<0.01	0.08
	3	0.03	<0.01				<0.01	0.05			
		0.02	<0.01				<0.01	0.04			
	7	0.04	<0.01				<0.01	0.06			
		0.02	<0.01				<0.01	0.04			
	10	0.02	<0.01	<0.01	0.04						
		<0.01	<0.01	<0.01	<0.03						
	1	3	909 ^{SC}	0	0.28	<0.01	<0.01	0.30			
					0.22	<0.01	<0.01	0.24			
				1	0.09	<0.01	<0.01	0.11			
					0.09	<0.01	<0.01	0.11			
				3	0.09	<0.01	<0.01	0.11			
					0.06	<0.01	<0.01	0.08			
				7	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					0.03	<0.01	<0.01	0.05			
				10	0.01	<0.01	<0.01	0.03			
0.02					<0.01	<0.01	0.04				
1				3	893 ^{SC}	0	0.83	<0.01	<0.01	0.85	
							0.85	<0.01	<0.01	0.87	
	2	0.65	<0.01			<0.01	0.67				
		0.59	<0.01			<0.01	0.61				
	3	0.47	<0.01			<0.01	0.49				
		0.43	<0.01			<0.01	0.45				
	7	0.16	<0.01			<0.01	0.18				
		0.14	<0.01			<0.01	0.16				
	10	0.27	<0.01			<0.01	0.29				
		0.23	<0.01			<0.01	0.25				
	1	3	930 ^{SC}			0	0.20	<0.01	<0.01	0.22	
							0.06	<0.01	<0.01	0.08	
1				0.06	<0.01	<0.01	0.08				
				0.03	<0.01	<0.01	0.05				
3				0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				0.10	<0.01	<0.01	0.12				
7				0.22	<0.01	<0.01	0.24				
				0.16	<0.01	<0.01	0.18				
10				0.03	<0.01	<0.01	0.05				
				0.03	<0.01	<0.01	0.05				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
	1	3	916 ^{SC}	0	0.16	<0.01	<0.01	0.18			
					0.26	<0.01	<0.01	0.28			
				1	0.07	<0.01	<0.01	0.09			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
				3	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.11	<0.01	<0.01	0.13			
				7	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					0.04	<0.01	<0.01	0.06			
				10	0.02	<0.01	<0.01	0.04			
					0.03	<0.01	<0.01	0.05			
				1	3	903 ^{SC}	0	0.37	<0.01	<0.01	0.39
								0.39	<0.01	<0.01	0.41
	1	0.03	<0.01				<0.01	0.05			
		0.34	<0.01				<0.01	0.36			
	3	0.46	<0.01				<0.01	0.48			
		0.46	<0.01				<0.01	0.48			
	7	0.28	<0.01				<0.01	0.30			
		0.26	<0.01				<0.01	0.28			
	10	0.26	<0.01				<0.01	0.28			
		0.35	<0.01				<0.01	0.37			
	1	3	891 ^{SC}				0	0.10	<0.01	<0.01	0.12
								0.09	<0.01	<0.01	0.11
				1	0.07	<0.01	<0.01	0.09			
					0.09	<0.01	<0.01	0.11			
3				0.06	<0.01	<0.01	0.08				
				0.05	<0.01	<0.01	0.07				
7				0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				0.08	<0.01	<0.01	0.10				
10				0.02	<0.01	<0.01	0.04				
				0.04	<0.01	<0.01	0.06				
1				3	977 ^{SC}	0	0.09	<0.01	<0.01	0.11	
							0.10	<0.01	<0.01	0.12	
	1	0.04	<0.01			<0.01	0.06				
		0.03	<0.01			<0.01	0.05				
	3	0.05	<0.01			<0.01	0.07				
		0.09	<0.01			<0.01	0.11				
	7	0.07	<0.01			<0.01	0.09				
		0.04	<0.01			<0.01	0.06				
	10	0.06	<0.01			<0.01	0.08				
		0.04	<0.01			<0.01	0.06				
	1	3	924 ^{SC}			0	0.48	<0.01	<0.01	0.50	
							0.38	<0.01	<0.01	0.40	
1				0.37	<0.01	<0.01	0.39				
				0.36	<0.01	<0.01	0.38				
3				0.34	<0.01	<0.01	0.36				
				0.35	<0.01	<0.01	0.37				
7				0.21	<0.01	<0.01	0.23				
				0.22	<0.01	<0.01	0.24				
10				0.19	<0.01	<0.01	0.21				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
葉たまねぎ (根を除く全体)	1	3	927	0	0.23	<0.01	<0.01	0.25			
					3.05	<0.01	<0.01	3.07			
				1	3.85	<0.01	<0.01	3.87			
					2.90	<0.01	<0.01	2.92			
				3	3.38	<0.01	<0.01	3.40			
					2.50	<0.01	<0.01	2.52			
				7	2.19	<0.01	<0.01	2.21			
					1.77	<0.01	<0.01	1.79			
				10	1.41	<0.01	<0.01	1.43			
					0.86	<0.01	<0.01	0.88			
				10	1.07	<0.01	<0.01	1.09			
					4.22	<0.01	<0.01	4.24			
	1	3	899 ^{SC}	0	3.68	<0.01	<0.01	3.70			
					4.18	<0.01	<0.01	4.20			
				1	4.35	<0.01	<0.01	4.37			
					3.58	<0.01	<0.01	3.60			
				3	4.29	<0.01	<0.01	4.31			
					3.08	<0.01	<0.01	3.10			
				7	3.44	<0.01	<0.01	3.46			
					2.84	<0.01	<0.01	2.86			
				10	2.43	<0.01	<0.01	2.45			
					11.13	<0.01	<0.01	11.15			
				1	3	931 ^{SC}	0	7.09	<0.01	<0.01	7.11
								7.33	<0.01	<0.01	7.35
1	7.11	<0.01	<0.01				7.13				
	6.37	<0.01	<0.01				6.39				
3	3.46	<0.01	<0.01				3.48				
	5.24	<0.01	<0.01				5.26				
7	4.35	<0.01	<0.01				4.37				
	4.31	<0.01	<0.01				4.33				
10	3.77	<0.01	<0.01				3.79				
	0.04	<0.01	<0.01				0.06				
きゅうり (果実)	1	3	900 ^{SC}				0	0.06	<0.01	<0.01	0.08
								0.03	<0.01	<0.01	0.05
				1	0.09	<0.01	<0.01	0.11			
					0.03	<0.01	<0.01	0.05			
				3	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
				7	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					0.01	<0.01	<0.01	0.03			
				10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					0.09	<0.01	<0.01	0.11			
				1	3	890 ^{SC}	0	0.06	<0.01	<0.01	0.08
								0.15	<0.01	<0.01	0.17
1	0.08	<0.01	<0.01				0.10				
	0.05	<0.01	<0.01				0.07				
3	0.06	<0.01	<0.01				0.08				
	0.05	<0.01	<0.01				0.07				
7	0.05	<0.01	<0.01				0.07				
	0.03	<0.01	<0.01				0.05				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
				9	0.01	<0.01	<0.01	0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
	1	3	900 ^{SC}	0	0.11	<0.01	<0.01	0.13			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
				1	0.11	<0.01	<0.01	0.13			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
				3	0.11	<0.01	<0.01	0.13			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
				7	0.07	<0.01	<0.01	0.09			
					0.07	<0.01	<0.01	0.09			
				10	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.05	<0.01	<0.01	0.07			
				1	3	910 ^{SC}	0	0.08	<0.01	<0.01	0.10
							3	0.07	<0.01	<0.01	0.09
							7	0.02	<0.01	<0.01	0.04
							10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01					<0.03			
	1	3	910 ^{SC}	0	0.17	0.01	<0.01	0.19			
					0.14	<0.01	<0.01	0.16			
				1	0.14	<0.01	<0.01	0.16			
					0.12	0.01	<0.01	0.14			
				3	0.17	0.01	<0.01	0.19			
					0.09	0.01	<0.01	0.11			
				7	0.10	<0.01	<0.01	0.12			
					0.07	0.01	<0.01	0.09			
				10	0.05	<0.01	<0.01	0.07			
					0.08	0.01	<0.01	0.10			
				1	3	900 ^{SC}	0	0.32	0.03	<0.01	0.36
0.15								0.04	<0.01	0.20	
1							0.16	0.03	<0.01	0.20	
							0.10	0.02	<0.01	0.13	
3	0.09	0.01	<0.01				0.11				
	0.13	<0.01	<0.01				0.15				
7	0.02	0.04	<0.01				0.07				
	0.02	0.10	<0.01				0.13				
10	0.01	0.11	<0.01				0.13				
	0.02	0.15	<0.01				0.18				
1	3	910 ^{SC}	0				0.09	<0.01	<0.01	0.11	
							0.09	<0.01	<0.01	0.11	
			1				0.09	<0.01	<0.01	0.11	
							0.07	<0.01	<0.01	0.09	
			3	0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				0.03	0.01	<0.01	0.05				
			7	0.05	0.01	<0.01	0.07				
				0.02	0.01	<0.01	0.04				
			10	0.03	0.01	<0.01	0.05				
				0.03	0.01	<0.01	0.05				
1	3	910 ^{SC}	0	0.16	<0.01	<0.01	0.18				
				0.11	<0.01	<0.01	0.13				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)							
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計				
				1	0.15	<0.01	<0.01	0.17				
					0.17	<0.01	<0.01	0.19				
				3	0.09	<0.01	<0.01	0.11				
					0.06	<0.01	<0.01	0.08				
				7	0.07	<0.01	<0.01	0.09				
					0.07	<0.01	<0.01	0.09				
				10	0.04	<0.01	<0.01	0.06				
					0.03	<0.01	<0.01	0.05				
				カンタ ローブ (果実)	1	3	910 ^{SC}	0	0.37	<0.01	<0.01	0.39
									0.57	<0.01	<0.01	0.59
								1	0.57	<0.01	<0.01	0.59
									0.61	<0.01	<0.01	0.63
								3	0.36	<0.01	<0.01	0.38
									0.38	<0.01	<0.01	0.40
7	0.25	<0.01	<0.01					0.27				
	0.26	<0.01	<0.01					0.28				
10	0.07	<0.01	<0.01					0.09				
	0.06	<0.01	<0.01					0.08				
	1	3	910 ^{SC}					0	1.73	<0.01	<0.01	1.75
									1.69	<0.01	<0.01	1.71
								1	1.26	<0.01	<0.01	1.28
									1.33	<0.01	<0.01	1.35
				3	1.17	<0.01	<0.01	1.19				
					1.03	<0.01	<0.01	1.05				
				7	0.59	<0.01	<0.01	0.61				
					1.20	<0.01	<0.01	1.22				
				10	0.79	<0.01	<0.01	0.81				
					0.80	<0.01	<0.01	0.82				
					1	3	910 ^{SC}	0	0.49	<0.01	<0.01	0.51
									0.50	<0.01	<0.01	0.52
								1	0.43	<0.01	<0.01	0.45
									0.29	<0.01	<0.01	0.31
3	0.26	<0.01	<0.01					0.28				
	0.39	<0.01	<0.01					0.41				
7	0.28	<0.01	<0.01					0.30				
	0.32	<0.01	<0.01					0.34				
10	0.28	<0.01	<0.01					0.30				
	0.49	<0.01	<0.01					0.51				
	1	3	890 ^{SC}					0	0.42	<0.01	<0.01	0.44
									0.50	<0.01	<0.01	0.52
	1	3	890 ^{SC}					1	0.35	<0.01	<0.01	0.37
									0.36	<0.01	<0.01	0.38
				3	0.43	<0.01	<0.01	0.45				
					0.78	<0.01	<0.01	0.80				
				7	0.64	<0.01	<0.01	0.66				
					0.32	<0.01	<0.01	0.34				
				10	0.16	<0.01	<0.01	0.18				
					0.12	<0.01	<0.01	0.14				
				1	3	920 ^{SC}	0	1.44	<0.01	<0.01	1.46	

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
					1.17	<0.01	<0.01	1.19			
					1	0.51	<0.01	<0.01	0.53		
				3	0.74	<0.01	<0.01	0.76			
					0.60	<0.01	<0.01	0.62			
				7	0.68	<0.01	<0.01	0.70			
					0.48	<0.01	<0.01	0.50			
				10	0.43	<0.01	<0.01	0.45			
					0.22	<0.01	<0.01	0.24			
				1	3	930 ^{SC}	0	0.33	<0.01	<0.01	0.35
								0.08	<0.01	<0.01	0.10
							1	0.15	<0.01	<0.01	0.17
								0.11	<0.01	<0.01	0.13
	3	0.15	<0.01				<0.01	0.17			
		0.17	<0.01				<0.01	0.19			
	7	0.19	<0.01	<0.01	0.21						
		0.17	<0.01	<0.01	0.19						
	1	3	900 ^{SC}	10	0.20	<0.01	<0.01	0.22			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
				0	0.16	<0.01	<0.01	0.18			
					0.75	<0.01	<0.01	0.77			
	1	3	910 ^{SC}	1	0.80	<0.01	<0.01	0.82			
					0.70	<0.01	<0.01	0.72			
	3	7	910 ^{SC}	3	0.89	<0.01	<0.01	0.91			
					0.48	<0.01	<0.01	0.50			
7	10	910 ^{SC}	7	1.01	<0.01	<0.01	1.03				
				0.74	<0.01	<0.01	0.76				
10	3	910 ^{SC}	10	0.47	<0.01	<0.01	0.49				
				0.66	<0.01	<0.01	0.68				
0	3	910 ^{SC}	0	0.91	<0.01	<0.01	0.93				
				0.72	<0.01	<0.01	0.74				
1	3	910 ^{SC}	1	0.72	<0.01	<0.01	0.74				
				0.56	<0.01	<0.01	0.58				
3	7	910 ^{SC}	3	0.37	<0.01	<0.01	0.39				
				0.53	<0.01	<0.01	0.55				
7	10	910 ^{SC}	7	0.59	<0.01	<0.01	0.61				
				0.20	<0.01	<0.01	0.22				
10	3	910 ^{SC}	10	0.29	<0.01	<0.01	0.31				
				0.08	<0.01	<0.01	0.10				
0	7	910 ^{SC}	0	0.20	<0.01	<0.01	0.22				
				0.46	<0.01	<0.01	0.48				
1	10	910 ^{SC}	1	0.27	<0.01	<0.01	0.29				
				0.26	<0.01	<0.01	0.28				
3	3	900 ^{SC}	3	0.31	<0.01	<0.01	0.33				
				0.28	<0.01	<0.01	0.30				
7	7	900 ^{SC}	7	0.38	<0.01	<0.01	0.40				
				0.17	<0.01	<0.01	0.19				
10	10	900 ^{SC}	10	0.32	<0.01	<0.01	0.34				
				0.22	<0.01	<0.01	0.24				
かぼちゃ (果実)	1	3	900 ^{SC}	0	0.15	<0.01	<0.01	0.17			
					0.15	<0.01	<0.01	0.17			

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
	1	3	890 ^{SC}	0	0.34	<0.01	<0.01	0.36			
					0.34	<0.01	<0.01	0.36			
				1	0.33	<0.01	<0.01	0.35			
					0.23	<0.01	<0.01	0.25			
				3	0.31	<0.01	<0.01	0.33			
					0.35	<0.01	<0.01	0.37			
				7	0.18	<0.01	<0.01	0.20			
					0.15	<0.01	<0.01	0.17			
				10	0.22	<0.01	<0.01	0.24			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
				1	3	900 ^{SC}	0	0.19	<0.01	<0.01	0.21
								0.07	<0.01	<0.01	0.09
	1	0.02	<0.01				<0.01	0.04			
		0.02	<0.01				<0.01	0.04			
	3	0.08	<0.01				<0.01	0.10			
		0.01	<0.01				<0.01	0.03			
	7	0.01	<0.01				<0.01	0.03			
		<0.01	<0.01				<0.01	<0.03			
	10	<0.01	<0.01				<0.01	<0.03			
		<0.01	<0.01				<0.01	<0.03			
	1	3	890 ^{SC}				0	0.08	<0.01	<0.01	0.10
								0.07	<0.01	<0.01	0.09
				1	0.11	<0.01	<0.01	0.13			
					0.08	<0.01	<0.01	0.10			
3				0.08	<0.01	<0.01	0.10				
				0.05	<0.01	<0.01	0.07				
1				3	890 ^{SC}	7	0.14	<0.01	<0.01	0.16	
							0.06	<0.01	<0.01	0.08	
	10	0.09	<0.01			<0.01	0.11				
		0.02	<0.01			<0.01	0.04				
1	3	900 ^{SC}	0	0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				0.04	<0.01	<0.01	0.06				
			1	0.18	<0.01	<0.01	0.20				
				0.07	<0.01	<0.01	0.09				
			3	0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				0.08	<0.01	<0.01	0.10				
			7	0.13	<0.01	<0.01	0.15				
				0.16	<0.01	<0.01	0.18				
			10	0.11	<0.01	<0.01	0.13				
				0.14	<0.01	<0.01	0.16				
			1	3	880 ^{SC}	0	0.19	<0.01	<0.01	0.21	
							0.22	<0.01	<0.01	0.24	
1	0.17	<0.01				<0.01	0.19				
	0.28	<0.01				<0.01	0.30				
3	0.08	<0.01				<0.01	0.10				
	0.08	<0.01				<0.01	0.10				
7	0.01	<0.01				<0.01	0.03				
	0.01	<0.01				<0.01	0.03				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
				10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03			
	1	3	900 ^{SC}	0	1.25	<0.01	<0.01	1.27			
					1.21	<0.01	<0.01	1.23			
				1	1.35	<0.01	<0.01	1.37			
					1.24	<0.01	<0.01	1.26			
				3	1.32	<0.01	<0.01	1.34			
					1.24	<0.01	<0.01	1.26			
				7	0.45	<0.01	<0.01	0.47			
					0.64	<0.01	<0.01	0.66			
				10	0.39	<0.01	<0.01	0.41			
					0.29	<0.01	<0.01	0.31			
				1	3	910 ^{SC}	0	0.87	<0.01	<0.01	0.89
								0.82	<0.01	<0.01	0.84
							1	0.68	<0.01	<0.01	0.70
								1.29	<0.01	<0.01	1.31
	3	0.82	<0.01				<0.01	0.84			
		0.62	<0.01				<0.01	0.64			
	7	0.42	<0.01				<0.01	0.44			
		0.83	<0.01				<0.01	0.85			
	10	0.66	<0.01				<0.01	0.68			
		0.40	<0.01				<0.01	0.42			
	1	3	920 ^{SC}	0	1.08	<0.01	<0.01	1.10			
					1.16	<0.01	<0.01	1.18			
1				0.45	<0.01	<0.01	0.47				
				0.43	<0.01	<0.01	0.45				
3				0.23	<0.01	<0.01	0.25				
				0.32	<0.01	<0.01	0.34				
7				0.02	<0.01	<0.01	0.04				
				0.03	<0.01	<0.01	0.05				
10				<0.01	<0.01	<0.01	<0.03				
				<0.01	<0.01	<0.01	<0.03				
1				3	900 ^{SC}	0	0.47	<0.01	<0.01	0.49	
							0.47	<0.01	<0.01	0.49	
	1	0.44	<0.01			<0.01	0.46				
		0.46	<0.01			<0.01	0.48				
	3	0.39	<0.01			<0.01	0.41				
		0.36	<0.01			<0.01	0.38				
	7	0.34	<0.01			<0.01	0.36				
		0.40	<0.01			<0.01	0.42				
	10	0.60	<0.01			<0.01	0.62				
		0.31	<0.01			<0.01	0.33				
	トマト (果実)	1	2			900 ^{SC}	4	0.15	<0.01	<0.01	0.17
								0.18	<0.01	<0.01	0.20
10				0.13	<0.01		<0.01	0.15			
				0.17	<0.01		<0.01	0.19			
14				0.17	<0.01		<0.01	0.19			
				0.10	<0.01		<0.01	0.12			
1				2	900 ^{SC}		4	0.11	<0.01	<0.01	0.14

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
				10	0.10	<0.01	<0.01	0.12			
					0.09	<0.01	<0.01	0.11			
				14	0.10	<0.01	<0.01	0.12			
					0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					2	890 ^{SC}	4	0.14	<0.01	<0.01	0.16
								0.16	<0.01	<0.01	0.18
		2	910 ^{SC}	4	0.18	<0.01	<0.01	0.20			
					0.21	<0.01	<0.01	0.23			
		2	910 ^{SC}	10	0.12	<0.01	<0.01	0.14			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
		2	880 ^{SC}	10	0.12	<0.01	<0.01	0.14			
					0.14	<0.01	<0.01	0.16			
		2	890 ^{SC}	14	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					0.02	<0.01	<0.01	0.04			
		2	920 ^{SC}	4	0.14	<0.01	<0.01	0.16			
					0.18	<0.01	<0.01	0.20			
		2	890 ^{SC}	10	0.12	<0.01	<0.01	0.14			
					0.14	<0.01	<0.01	0.16			
		2	920 ^{SC}	14	0.03	<0.01	<0.01	0.05			
					0.04	<0.01	<0.01	0.06			
		2	900 ^{SC}	4	0.18	<0.01	<0.01	0.20			
					0.17	<0.01	<0.01	0.19			
		2	920 ^{SC}	10	0.13	<0.01	<0.01	0.15			
					0.12	<0.01	<0.01	0.14			
	2	890 ^{SC}	14	0.10	<0.01	<0.01	0.12				
				0.14	<0.01	<0.01	0.16				
	2	920 ^{SC}	4	0.13	<0.01	<0.01	0.15				
				0.10	<0.01	<0.01	0.12				
	2	900 ^{SC}	10	0.08	<0.01	<0.01	0.10				
				0.06	<0.01	<0.01	0.08				
	2	920 ^{SC}	14	0.05	<0.01	<0.01	0.07				
				0.03	<0.01	<0.01	0.05				
	2	900 ^{SC}	4	0.08	<0.01	<0.01	0.10				
				0.13	<0.01	<0.01	0.15				
	2	920 ^{SC}	10	0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				0.07	<0.01	<0.01	0.09				
	2	900 ^{SC}	14	0.04	<0.01	<0.01	0.06				
				0.04	<0.01	<0.01	0.06				
	2	900 ^{SC}	4	0.15	<0.01	<0.01	0.17				
				0.20	<0.01	<0.01	0.22				
	2	900 ^{SC}	10	0.17	<0.01	<0.01	0.19				
				0.22	<0.01	<0.01	0.24				
	2	900 ^{SC}	14	0.09	<0.01	<0.01	0.11				
				0.11	<0.01	<0.01	0.13				
	2	900 ^{SC}	4	0.13	<0.01	<0.01	0.15				
				0.18	<0.01	<0.01	0.20				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)				
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計	
				10	0.14	<0.01	<0.01	0.16	
					0.12	<0.01	<0.01	0.14	
					14	0.12	<0.01	<0.01	0.14
						0.14	<0.01	<0.01	0.16
	1	2	920 ^{SC}	4	0.05	<0.01	<0.01	0.07	
					0.05	<0.01	<0.01	0.07	
	1	2	920 ^{SC}	10	0.04	<0.01	<0.01	0.06	
					0.02	<0.01	<0.01	0.04	
				14	0.04	<0.01	<0.01	0.06	
					0.02	0.02	<0.01	0.05	
				4	0.06	<0.01	<0.01	0.08	
					0.16	<0.01	<0.01	0.18	
				10	0.07	<0.01	<0.01	0.09	
					0.08	<0.01	<0.01	0.10	
				14	0.08	<0.01	<0.01	0.10	
					0.07	<0.01	<0.01	0.09	
				4	0.61	<0.01	<0.01	0.63	
					0.79	<0.01	<0.01	0.81	
				10	0.57	<0.01	<0.01	0.59	
					0.59	<0.01	<0.01	0.61	
				14	0.41	<0.01	<0.01	0.43	
					0.43	<0.01	<0.01	0.45	
				4	0.83	<0.01	<0.01	0.85	
					0.58	<0.01	<0.01	0.60	
			10	0.64	<0.01	<0.01	0.66		
				0.54	<0.01	<0.01	0.56		
			14	0.91	<0.01	<0.01	0.93		
				0.61	<0.01	<0.01	0.63		
			4	0.04	<0.01	<0.01	0.06		
				0.03	<0.01	<0.01	0.05		
			10	0.02	<0.01	<0.01	0.04		
				0.03	<0.01	<0.01	0.05		
			14	0.02	<0.01	<0.01	0.04		
				0.02	<0.01	<0.01	0.04		
			4	0.21	<0.01	<0.01	0.23		
				0.17	<0.01	<0.01	0.19		
			10	0.26	<0.01	<0.01	0.28		
				0.19	<0.01	<0.01	0.21		
			14	0.17	<0.01	<0.01	0.19		
				0.13	<0.01	<0.01	0.15		
			4	0.18	<0.01	<0.01	0.20		
				0.26	<0.01	<0.01	0.28		
			10	0.20	<0.01	<0.01	0.22		
				0.17	<0.01	<0.01	0.19		
			14	0.17	<0.01	<0.01	0.19		
				0.16	<0.01	<0.01	0.18		
			4	0.19	<0.01	<0.01	0.21		
				0.31	<0.01	<0.01	0.33		

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)				
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計	
	1	2	920 ^{SC}	10	0.33	<0.01	<0.01	0.35	
					0.15	<0.01	<0.01	0.17	
				14	0.14	<0.01	<0.01	0.16	
					0.23	<0.01	<0.01	0.25	
チェリー トマト (果実)	1	2	910 ^{SC}	4	0.26	<0.01	<0.01	0.28	
					0.39	<0.01	<0.01	0.41	
				10	0.13	<0.01	<0.01	0.15	
					0.17	<0.01	<0.01	0.19	
				14	0.25	<0.01	<0.01	0.27	
					0.13	<0.01	<0.01	0.15	
	1	2	900 ^{SC}	4	0.37	<0.01	<0.01	0.39	
					0.42	<0.01	<0.01	0.44	
				10	0.53	<0.01	<0.01	0.55	
					0.66	<0.01	<0.01	0.68	
				14	0.43	<0.01	<0.01	0.45	
					0.62	<0.01	<0.01	0.64	
ピーマン (果実)	1	3	900 ^{SC}	4	0.09	<0.01	<0.01	0.11	
					0.08	<0.01	<0.01	0.10	
				10	0.03	<0.01	<0.01	0.05	
					0.02	<0.01	<0.01	0.04	
				14	0.02	<0.01	<0.01	0.04	
					0.02	<0.01	<0.01	0.04	
		1	3	911 ^{SC}	4	0.16	<0.01	<0.01	0.18
						0.17	<0.01	<0.01	0.19
					10	0.13	<0.01	<0.01	0.15
						0.10	<0.01	<0.01	0.12
					14	0.14	<0.01	<0.01	0.16
						0.13	<0.01	<0.01	0.15
	1	3	905 ^{SC}	4	0.04	<0.01	<0.01	0.06	
					0.06	<0.01	<0.01	0.08	
				10	0.06	<0.01	<0.01	0.08	
					0.03	<0.01	<0.01	0.05	
				14	0.01	<0.01	<0.01	0.03	
					0.01	<0.01	<0.01	0.03	
		1	3	933 ^{SC}	4	0.20	<0.01	<0.01	0.22
						0.24	<0.01	<0.01	0.26
					10	0.15	<0.01	<0.01	0.17
						0.15	<0.01	<0.01	0.17
					14	0.17	<0.01	<0.01	0.19
						0.16	<0.01	<0.01	0.18
	1	3	900 ^{SC}	4	0.11	<0.01	<0.01	0.13	
					0.16	<0.01	<0.01	0.18	
				10	0.11	<0.01	<0.01	0.13	
					0.08	<0.01	<0.01	0.10	
	1	3	900 ^{SC}	14	0.07	<0.01	<0.01	0.09	
					0.07	<0.01	<0.01	0.09	
				4	0.09	<0.01	<0.01	0.11	
					0.07	<0.01	<0.01	0.09	

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
			892 ^{SC}	10	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.08	<0.01	<0.01	0.10			
				14	0.06	<0.01	<0.01	0.08			
					0.04	<0.01	<0.01	0.06			
				4	0.69	<0.01	<0.01	0.71			
					0.98	<0.01	<0.01	1.00			
	10	0.44	<0.01	<0.01	0.46						
		0.62	<0.01	<0.01	0.64						
	14	0.23	<0.01	<0.01	0.25						
		0.23	<0.01	<0.01	0.25						
	その他の なす科 野菜 (果実)	1	3	900 ^{SC}	4	0.18	<0.01	<0.01	0.20		
						0.12	<0.01	<0.01	0.14		
10					0.08	<0.01	<0.01	0.10			
					0.07	<0.01	<0.01	0.09			
14					0.05	<0.01	<0.01	0.07			
					0.06	<0.01	<0.01	0.08			
1		3	881 ^{SC}	4	0.79	<0.01	<0.01	0.81			
					0.58	<0.01	<0.01	0.60			
				10	0.41	<0.01	<0.01	0.43			
					0.43	<0.01	<0.01	0.45			
				14	0.27	<0.01	<0.01	0.29			
					0.17	<0.01	<0.01	0.19			
1		3	928 ^{SC}	4	0.39	<0.01	<0.01	0.41			
					0.46	<0.01	<0.01	0.48			
				10	0.50	<0.01	<0.01	0.52			
					0.49	<0.01	<0.01	0.51			
				14	0.37	<0.01	<0.01	0.39			
					0.46	<0.01	<0.01	0.48			
非結球 レタス (葉)	1	3	897 ^{SC}	0	19.51	0.02	<0.01	19.54			
					16.21	0.02	<0.01	16.24			
				1	8.8	0.01	<0.01	8.82			
					9.2	0.01	<0.01	9.22			
				3	4.86	0.02	<0.01	4.89			
					3.94	0.02	<0.01	3.97			
				7	3.57	0.05	<0.01	3.63			
					2.56	0.05	<0.01	2.62			
				10	1.48	0.10	0.02	1.60			
					1.77	0.11	0.02	1.90			
				1	3	896 ^{SC}	0	9.09	<0.01	<0.01	9.11
								6.63	<0.01	<0.01	6.65
	1	5.58	<0.01				<0.01	5.60			
		4.85	<0.01				<0.01	4.87			
	3	2.39	<0.01				<0.01	2.41			
		2.61	<0.01				<0.01	2.63			
	7	0.61	<0.01				<0.01	0.63			
		0.73	<0.01				<0.01	0.75			
	10	0.80	<0.01				<0.01	0.82			
		0.75	<0.01				<0.01	0.77			
	1	3	918 ^{SC}	0	18.44	<0.01	<0.01	18.46			

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)								
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計					
					17.21	<0.01	<0.01	17.23					
					1	16.79	<0.01	<0.01	16.81				
				3	11.04	<0.01	<0.01	11.06					
					5.06	<0.01	<0.01	5.08					
				7	5.96	<0.01	<0.01	5.98					
					2.36	<0.01	<0.01	2.38					
				10	2.5	<0.01	<0.01	2.52					
					1.77	<0.01	<0.01	1.79					
								0	1.16	<0.01	<0.01	1.18	
									3.72	<0.01	<0.01	3.74	
					1	3	896 ^{SC}	1	4.06	<0.01	<0.01	4.08	
									3.7	<0.01	<0.01	3.72	
	4	2.07	<0.01					<0.01	2.09				
		0.87	<0.01					<0.01	0.89				
	7	0.79	<0.01					<0.01	0.81				
		1.22	<0.01					<0.01	1.24				
	10	0.98	<0.01					<0.01	1.00				
		1.32	<0.01					<0.01	1.34				
									0	0.8	<0.01	<0.01	0.82
										14.4	<0.01	<0.01	14.42
		1	3					905 ^{SC}	1	15.25	<0.01	<0.01	15.27
										12.78	<0.01	<0.01	12.80
				3	14.36	<0.01	<0.01		14.38				
					16.68	<0.01	<0.01		16.70				
7				20.45	<0.01	<0.01	20.47						
				19.72	<0.01	0.01	19.74						
10				19.28	<0.01	<0.01	19.30						
				16.57	<0.01	<0.01	16.59						
							0		14.93	<0.01	<0.01	14.95	
									2.73	<0.01	<0.01	2.75	
				1	3	904 ^{SC}	1		2.79	<0.01	<0.01	2.81	
									4.18	<0.01	<0.01	4.20	
	3	5.25	<0.01				<0.01	5.27					
		4.54	<0.01				<0.01	4.56					
	7	5.56	<0.01				<0.01	5.58					
		1.97	<0.01				<0.01	1.99					
	10	0.95	<0.01				<0.01	0.97					
		0.82	<0.01				<0.01	0.84					
								0	0.67	<0.01	<0.01	0.69	
									4.71	<0.01	<0.01	4.73	
		1	3				906 ^{SC}	1	5.61	<0.01	<0.01	5.63	
									4.2	<0.01	<0.01	4.22	
3				4.65	<0.01	<0.01		4.67					
				5.14	<0.01	<0.01		5.16					
7				4.75	<0.01	<0.01		4.77					
				2.61	<0.01	<0.01		2.63					
10				2.38	<0.01	<0.01		2.40					
				2.85	<0.01	<0.01		2.87					
								0	1.73	<0.01	<0.01	1.75	

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
	1	3	922 ^{SC}	0	8.24	<0.01	<0.01	8.26			
					8.76	<0.01	<0.01	8.78			
				1	5.95	<0.01	<0.01	5.97			
					8.41	<0.01	<0.01	8.43			
				3	5.75	<0.01	<0.01	5.77			
					3.99	<0.01	<0.01	4.01			
				7	2.83	<0.01	<0.01	2.85			
					2.73	<0.01	<0.01	2.75			
				10	1.04	<0.01	<0.01	1.06			
					1.13	<0.01	<0.01	1.15			
				1	3	924 ^{SC}	0	11.16	<0.01	<0.01	11.18
								11.74	<0.01	<0.01	11.76
	1	11.08	<0.01				<0.01	11.10			
		9.63	<0.01				<0.01	9.65			
	3	5.42	<0.01				<0.01	5.44			
		7.02	<0.01				<0.01	7.04			
	7	2.98	<0.01	<0.01	3.00						
		2.88	<0.01	<0.01	2.90						
	1	3	895 ^{SC}	0	2.88	<0.01	<0.01	2.90			
					2.97	<0.01	<0.01	2.99			
				1	2.89	<0.01	<0.01	2.91			
					3	<0.01	<0.01	3.02			
				3	1.65	<0.01	<0.01	1.67			
					1.63	<0.01	<0.01	1.65			
	7	1.03	<0.01	<0.01	1.05						
		1.21	<0.01	<0.01	1.23						
	10	0.92	<0.01	<0.01	0.94						
		0.81	<0.01	<0.01	0.83						
	結球 レタス (外葉あり結球)	1	3	898	0	3.89	<0.01	<0.01	3.91		
						3.95	<0.01	<0.01	3.97		
1					4.63	<0.01	<0.01	4.65			
					4.94	<0.01	<0.01	4.96			
3					4.21	<0.01	<0.01	4.23			
					3.43	<0.01	<0.01	3.45			
7		1.65	<0.01	<0.01	1.67						
		2.17	<0.01	<0.01	2.19						
10		1.79	<0.01	<0.01	1.81						
		1.06	<0.01	<0.01	1.08						
1	3	903 ^{SC}	0	2.45	<0.01	<0.01	2.47				
				2.8	<0.01	<0.01	2.82				
			1	1.58	<0.01	<0.01	1.60				
				1.54	<0.01	<0.01	1.56				
			3	1.09	<0.01	<0.01	1.11				
				1.11	<0.01	<0.01	1.13				
			7	0.55	<0.01	<0.01	0.57				
				0.55	<0.01	<0.01	0.57				
10	0.46	<0.01	<0.01	0.48							

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
	1	3	916 ^{SC}	0	0.47	<0.01	<0.01	0.49			
					5.39	<0.01	<0.01	5.41			
				1	4.91	<0.01	<0.01	4.93			
					5.12	<0.01	<0.01	5.14			
				3	4.78	<0.01	<0.01	4.80			
					3.78	<0.01	<0.01	3.80			
				7	3.73	<0.01	<0.01	3.75			
					3.95	<0.01	<0.01	3.97			
				10	3.64	<0.01	<0.01	3.66			
					1.84	<0.01	<0.01	1.86			
				1	3	905 ^{SC}	0	1.85	<0.01	<0.01	1.87
								6.63	<0.01	<0.01	6.65
	1	5.71	<0.01				<0.01	5.73			
		6.16	<0.01				<0.01	6.18			
	3	6.11	<0.01				<0.01	6.13			
		5.02	<0.01				<0.01	5.04			
	7	4.95	<0.01				<0.01	4.97			
		6.11	<0.01				<0.01	6.13			
	10	8.1	<0.01				<0.01	8.12			
		6.40	<0.01				<0.01	6.42			
	1	3	900 ^{SC}				0	3.42	<0.01	<0.01	3.44
								6.63	<0.01	<0.01	6.65
				1	4.79	<0.01	<0.01	4.81			
					2.21	<0.01	<0.01	2.23			
3				2.29	<0.01	<0.01	2.31				
				1.04	<0.01	<0.01	1.06				
7				1.0	<0.01	<0.01	1.02				
				0.73	<0.01	<0.01	0.75				
10				0.74	<0.01	<0.01	0.76				
				0.27	<0.01	<0.01	0.29				
1				3	907 ^{SC}	0	0.49	<0.01	<0.01	0.51	
							2.89	<0.01	<0.01	2.91	
	1	3.79	<0.01			<0.01	3.81				
		4.58	<0.01			<0.01	4.60				
	3	3.69	<0.01			<0.01	3.71				
		1.4	<0.01			<0.01	1.42				
	7	1.81	<0.01			<0.01	1.83				
		1.27	<0.01			<0.01	1.29				
	10	2.46	<0.01			<0.01	2.48				
		2.66	<0.01			<0.01	2.68				
	1	3	899 ^{SC}			0	2.25	<0.01	<0.01	2.27	
							2.79	<0.01	<0.01	2.81	
1				3.62	<0.01	<0.01	3.64				
				1.6	<0.01	<0.01	1.62				
3				1.2	<0.01	<0.01	1.22				
				1.46	<0.01	<0.01	1.48				
7	1.97	<0.01	<0.01	1.99							
	0.43	<0.01	<0.01	0.45							
				0.29	<0.01	<0.01	0.31				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)						
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計			
ほうれん そう (葉)				10	0.41	<0.01	<0.01	0.43			
					0.47	<0.01	<0.01	0.49			
	1	3	913 ^{SC}	0	7.03	<0.01	<0.01	7.05			
					4.99	<0.01	<0.01	5.01			
				1	3.62	<0.01	<0.01	3.64			
					2.45	<0.01	<0.01	2.47			
				3	3.61	<0.01	<0.01	3.63			
					3.86	<0.01	<0.01	3.88			
				7	1.92	<0.01	<0.01	1.94			
					1.27	<0.01	<0.01	1.29			
				10	0.94	<0.01	<0.01	0.96			
					1.01	<0.01	<0.01	1.03			
				1	3	901 ^{SC}	0	21.94	<0.01	<0.01	21.96
								17.1	<0.01	<0.01	17.12
							1	12.7	<0.01	<0.01	12.72
								20.07	<0.01	<0.01	20.09
	3	12.88	<0.01				<0.01	12.90			
		11.99	<0.01				<0.01	12.01			
	7	3.21	<0.01				<0.01	3.23			
		2.33	<0.01				<0.01	2.35			
	10	1.03	<0.01				<0.01	1.05			
		1.14	<0.01				<0.01	1.16			
	1	3	901 ^{SC}				0	33.98	<0.01	<0.01	34.00
								34.06	<0.01	<0.01	34.08
							1	31.13	<0.01	<0.01	31.15
								38.3	<0.01	<0.01	38.32
				3	6.01	<0.01	<0.01	6.03			
					5.07	<0.01	<0.01	5.09			
				7	3.99	<0.01	<0.01	4.01			
					2.39	<0.01	<0.01	2.41			
				10	4.8	<0.01	<0.01	4.82			
					4.94	<0.01	<0.01	4.96			
				1	3	939 ^{SC}	0	12.2	<0.01	<0.01	12.22
								11.98	<0.01	<0.01	12.00
							1	10.38	<0.01	<0.01	10.40
								13.18	<0.01	<0.01	13.20
	3	7.93	<0.01				<0.01	7.95			
		10.6	<0.01				<0.01	10.62			
	7	5.67	<0.01				<0.01	5.69			
		8.44	<0.01				<0.01	8.46			
	10	5.58	<0.01				<0.01	5.60			
		4.66	<0.01				<0.01	4.68			
1	3	896 ^{SC}	0				14.75	<0.01	<0.01	14.77	
							11.61	<0.01	<0.01	11.63	
			1				11.19	<0.01	<0.01	11.21	
							10.08	<0.01	<0.01	10.10	
			3	9.66	<0.01	<0.01	9.68				
				9.93	<0.01	<0.01	9.95				
			7	6.55	<0.01	<0.01	6.57				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)					
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計		
セロリ (茎葉)	1	3	902 ^{SC}	0	7.26	<0.01	<0.01	7.28		
					6.03	<0.01	<0.01	6.05		
				10	7.27	<0.01	<0.01	7.29		
					14.7	<0.01	<0.01	14.72		
				0	11.6	<0.01	<0.01	11.62		
					10.99	<0.01	<0.01	11.01		
				1	10.4	<0.01	<0.01	10.42		
					9.74	<0.01	<0.01	9.76		
				3	9.78	<0.01	<0.01	9.80		
					4.59	<0.01	<0.01	4.61		
				7	5.94	<0.01	<0.01	5.96		
					10	2.56	<0.01	<0.01	2.58	
	10	2.92	<0.01	<0.01	2.94					
		1	3	909 ^{SC}	0	16.31	<0.01	<0.01	16.33	
	21.37					<0.01	<0.01	21.39		
	1				18.10	<0.01	<0.01	18.12		
					9.94	<0.01	0.01	9.96		
	3				18.58	<0.01	<0.01	18.60		
					23.74	<0.01	<0.01	23.76		
	7				13.74	<0.01	0.01	13.76		
					14.34	<0.01	0.02	14.37		
	10				14.56	<0.01	0.01	14.58		
					14.04	<0.01	0.01	14.06		
	1				3	890 ^{SC}	0	13.52	<0.01	<0.01
9.13								<0.01	<0.01	9.15
1		5.61	<0.01	<0.01			5.63			
		7.33	<0.01	<0.01			7.35			
3		7.45	<0.01	<0.01			7.47			
		4.24	<0.01	<0.01			4.26			
7		5.23	<0.01	<0.01			5.25			
		4.49	<0.01	<0.01			4.51			
10		4.9	<0.01	<0.01			4.92			
		4.43	<0.01	<0.01			4.45			
1		3	908 ^{SC}	0			4.47	<0.01	<0.01	4.49
							5.78	<0.01	<0.01	5.80
	1			1.33	<0.01	<0.01	1.35			
				1.05	<0.01	<0.01	1.07			
	3			0.50	<0.01	<0.01	0.52			
				0.67	<0.01	<0.01	0.69			
	7			0.61	<0.01	<0.01	0.63			
				0.66	<0.01	<0.01	0.68			
	10			0.69	<0.01	<0.01	0.71			
				0.72	<0.01	<0.01	0.74			
	1			3	904 ^{SC}	0	7.15	<0.01	<0.01	7.17
							5.26	<0.01	<0.01	5.28
1		6.06	<0.01			<0.01	6.08			
		6.41	<0.01			<0.01	6.43			
3		2.56	<0.01			<0.01	2.58			
		4.44	<0.01			<0.01	4.46			

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)			
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計
				7	3.97	0.03	<0.01	4.01
					2.79	0.03	<0.01	2.83
				10	3.08	0.04	<0.01	3.13
					2.45	0.04	<0.01	2.50
				0	5	<0.01	<0.01	5.02
					5.91	<0.01	<0.01	5.93
	1	4.83	<0.01	<0.01	4.85			
		5.1	<0.01	<0.01	5.12			
	3	4.61	<0.01	<0.01	4.63			
		4.16	<0.01	<0.01	4.18			
	7	2.29	<0.01	<0.01	2.31			
		2.65	<0.01	<0.01	2.67			
	10	2.21	<0.01	<0.01	2.23			
		1.7	<0.01	<0.01	1.72			
	1	3	905 ^{SC}	0	3.34	<0.01	<0.01	3.36
					3.51	<0.01	<0.01	3.53
				1	2.48	<0.01	<0.01	2.50
					2.82	<0.01	<0.01	2.84
				3	1.22	<0.01	<0.01	1.24
					1.23	<0.01	<0.01	1.25
		7	1.86	<0.01	<0.01	1.88		
			1.88	<0.01	<0.01	1.90		
		10	0.96	<0.01	<0.01	0.98		
			1.02	<0.01	<0.01	1.04		
1		3	907 ^{SC}	0	4.59	<0.01	<0.01	4.61
					4.8	<0.01	<0.01	4.82
	1			4.39	<0.01	<0.01	4.41	
				3.48	<0.01	<0.01	3.50	
	3			1.22	<0.01	<0.01	1.24	
				1.24	<0.01	<0.01	1.26	
	7	2.39	<0.01	<0.01	2.41			
		2.45	<0.01	<0.01	2.47			
	10	1.15	<0.01	<0.01	1.17			
		1.17	<0.01	<0.01	1.19			
	1	3	899 ^{SC}	0	10.17	<0.01	<0.01	10.19
					11.18	<0.01	<0.01	11.20
1				10.52	<0.01	<0.01	10.54	
				8.5	<0.01	<0.01	8.52	
3				6.15	<0.01	<0.01	6.17	
				5.81	<0.01	<0.01	5.83	
7		6.39	<0.01	<0.01	6.41			
		8.16	<0.01	<0.01	8.18			
10		4.97	<0.01	<0.01	4.99			
		2.81	<0.01	<0.01	2.83			
1		3	899 ^{SC}	0	6.01	<0.01	<0.01	6.03
					7.99	<0.01	<0.01	8.01
	1			5.38	<0.01	<0.01	5.40	
				5.6	<0.01	<0.01	5.62	
3	2.47	<0.01	<0.01	2.49				

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)			
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計
	1	3	922 ^{SC}	7	2.89	<0.01	<0.01	2.91
					2.94	<0.01	<0.01	2.96
				10	1.94	<0.01	<0.01	1.96
					1.18	<0.01	<0.01	1.20
				0	1.19	<0.01	<0.01	1.21
					1.78	<0.01	<0.01	1.80
		1	3.36		<0.01	<0.01	3.38	
			2.96		<0.01	<0.01	2.98	
		3	5.48		<0.01	<0.01	5.50	
			1.37		<0.01	<0.01	1.39	
		7	1.10	<0.01	<0.01	1.12		
			0.52	<0.01	<0.01	0.54		
	10	0.67	<0.01	<0.01	0.69			
		0.57	<0.01	<0.01	0.59			
		0	0.38	<0.01	<0.01	0.40		
			2.66	<0.01	<0.01	2.68		
		1	4.6	<0.01	<0.01	4.62		
			1.89	<0.01	<0.01	1.91		
	3	2.84	<0.01	<0.01	2.86			
		9.21	<0.01	<0.01	9.23			
	7	4.28	<0.01	<0.01	4.30			
		1.07	<0.01	<0.01	1.09			
	10	1.38	<0.01	<0.01	1.40			
		2.07	<0.01	<0.01	2.09			
ばれいし よ (塊茎)	1	3	906 ^{SC}	4	0.02	<0.01	<0.01	0.04
					0.05	<0.01	<0.01	0.07
	1	3	903 ^{SC}	4	0.02	<0.01	<0.01	0.04
					0.03	<0.01	<0.01	0.05
	1	3	924 ^{SC}	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
	1	3	884 ^{SC}	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
	1	3	901 ^{SC}	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
	1	3	898 ^{SC}	4	<0.01	0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	0.01	0.03
	1	3	895 ^{SC}	4	0.02	<0.01	<0.01	0.04
					0.03	<0.01	<0.01	0.05
	1	3	916 ^{SC}	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
	1	3	891 ^{SC}	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
				4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03

作物名	圃場数	回数(回)	使用量 (g a.i./ha)	PHI (日)	残留濃度(mg/kg)				
					アメトクトラジン	代謝物 D	代謝物 E	合計	
				10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	898 ^{SC}	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	996 ^{SC}	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	911 ^{SC}	4	4	0.01	<0.01	<0.01	0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	895 ^{SC}	4	4	0.01	<0.01	<0.01	0.03	
					0.01	<0.01	<0.01	0.03	
1	3	915	4	4	0.01	<0.01	<0.01	0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	889	4	4	0.01	<0.01	<0.01	0.03	
					0.01	<0.01	<0.01	0.03	
1	3	917	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	903	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	3	914	4	4	0	0.01	<0.01	<0.01	0.03
					1	0.01	<0.01	<0.01	0.03
					2	0.02	<0.01	<0.01	0.04
					3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
1	3	907	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					0.01	<0.01	<0.01	0.03	
1	3	924	4	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	
1	4	1195	4	4	0.03	<0.01	<0.01	0.05	
					0.01	<0.01	<0.01	0.03	

1 注)・全てフロアブル剤の葉茎処理。

2

1 <別紙 5：推定摂取量>

食品名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：53.3 kg)		小児(1～6歳) (体重：15.8 kg)		妊婦 (体重：55.6 kg)		高齢者(65歳以上) (体重：54.2 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μ g/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μ g/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μ g/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μ g/人/日)
トマト	2.58	24.3	62.7	16.9	43.6	24.5	63.2	18.9	48.8
きゅうり	0.675	16.3	11.0	8.2	5.54	10.1	6.82	16.6	11.2
ブドウ	17.8	5.8	103	4.4	78.3	1.6	28.5	3.8	67.6
合計			177		127		98.5		128

- 2 ・定量限界未満であった作物は（ばれいしょ、たまねぎ）は摂取量の計算に含めていない。
3 ・「ff」：平成 10～12 年の国民栄養調査（参照 54～56）の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）
4 ・妊婦及び高齢者の魚介類の ff は国民平均の ff を用いた。
5 ・「摂取量」：残留値から求めたアメトクトラジンの推定摂取量（ μ g/人/日）
6 ・トマトはミニトマトの値、ブドウは小粒種の値を使用
7

- 1 <参照>
- 2 1. 農薬抄録 アメトクトラジン（殺菌剤）（2011 年）：BASF ジャパン株式会社、
 - 3 未公表
 - 4 2. ラットを用いた ¹⁴C-BAS 650 F の体内動態試験（GLP）：BASF SE 毒性・環境
 - 5 研究所、2008 年、未公表
 - 6 3. ラットにおける ¹⁴C-BAS 650 F(登録番号 4993353)の代謝（GLP）：BASF SE
 - 7 農業研究所、2008 年、未公表
 - 8 4. レタスにおける BAS 650 F の代謝（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008
 - 9 年、未公表
 - 10 5. トマトにおける BAS 650 F の代謝（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008
 - 11 年、未公表
 - 12 6. ばれいしょにおける BAS 650 F の代謝（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008
 - 13 年、未公表
 - 14 7. BAS 650 F の好氣的土壌代謝（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008 年、
 - 15 未公表
 - 16 8. 好気性土壌における BAS 650 F の分解速度（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、
 - 17 2008 年、未公表
 - 18 9. BAS 650 F (Reg.No. 4993353) のヨーロッパ 5 種及び北米 2 種の土壌並びに日本
 - 19 土壌 1 種における吸着試験（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008 年、未公
 - 20 表
 - 21 10. BAS 650F:4 つの異なる pH 値における加水分解（GLP 対応）：RCC(現 Harlan)
 - 22 株式会社、2006 年、未公表
 - 23 11. BAS 650 F の水中光分解（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、2008 年、未公
 - 24 表
 - 25 12. 滅菌自然水中における BAS 650 F の光分解（GLP 対応）：BASF SE 農業研究所、
 - 26 2009 年、未公表
 - 27 13. 土壌残留試験成績：日本植物防疫協会研究所、（株）日曹分析センター、2008
 - 28 年、未公表
 - 29 14. 作物残留試験成績：日本植物防疫協会研究所、2008～2009 年、未公表
 - 30 15. アメトクトラジンのラットおよびマウスにおける薬理試験（GLP 対応）：日精バ
 - 31 イリス（株）、2008 年、未公表
 - 32 16. ラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007 年、
 - 33 未公表
 - 34 17. ラットにおける急性経皮毒性試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007 年、
 - 35 未公表
 - 36 18. Wistar 系ラットを用いた急性吸入毒性試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2006
 - 37 年、未公表
 - 38 19. 強制経口投与による Wistar 系ラットを用いた急性経口神経毒性試験（GLP 対

- 1 応) : BASF 毒性研究所、2009、未公表
- 2 20. ウサギを用いた急性眼刺激性試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2007 年、
- 3 未公表
- 4 21. ウサギを用いた急性皮膚刺激性/腐食性試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、
- 5 2007 年、未公表
- 6 22. モルモットを用いた Maximization 試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、20
- 7 年、未公表
- 8 23. BAS 650 FWistar 系ラットにおける 90 日間反復経口毒性;混餌投与 (GLP 対
- 9 応) : BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 10 24. ビーグル犬を用いた混餌投与による BAS 650 F の 90 日間反復経口毒性試験
- 11 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 12 25. BAS 650 FC57BL/6NCrl 系マウスにおける 90 日間反復経口毒性;混餌投与 (GLP
- 13 対応) : BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 14 26. Wistar 系ラットを用いた BAS 650 F の混餌投与による 90 日間反復経口神経毒性
- 15 試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2009 年、未公表
- 16 27. Wistar 系ラットを用いた混餌投与による登録番号 5178870 (BAS 650 F の代謝
- 17 物)の 90 日間反復経口毒性試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2008 年、未
- 18 公表
- 19 28. 登録番号 5211623 (BAS 650 F の代謝物) Wistar 系ラットを用いた混餌投与によ
- 20 る 90 日間反復経口投与毒性試験 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2008 年、未
- 21 公表
- 22 29. ビーグル犬を用いた 12 ヶ月間混餌投与慢性毒性試験 (GLP 対応) : BASF 毒性
- 23 研究所、2007 年、未公表
- 24 30. BAS 650F Wistar 系ラットを用いた慢性毒性/発がん性併合試験 ; 24 ヶ月間飼料
- 25 混入による投与 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 26 31. BAS 650F C57BL/6 J Rj マウスを用いた発がん性試験 ; 18 ヶ月間飼料混入に
- 27 による投与 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 28 32. BAS 650F Wistar 系ラットを用いた混餌投与による 2 世代繁殖毒性試験 (GLP
- 29 対応) : BASF 毒性研究所、2008 年、未公表
- 30 33. BAS 650 F の強制経口投与による Wistar 系ラットにおける出生前発生毒性試験
- 31 報告書 (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2006 年、未公表
- 32 34. ヒマラヤ種ウサギを用いた BAS 650 F の出生前発生毒性試験 (強制経口投与) :
- 33 BASF 毒性研究所、2006 年、未公表
- 34 35. BAS 650 F のネズミチフス菌 (*Salmonella Typhimurium*) /大腸菌 (*Escherichia*
- 35 *Coli*) を用いた復帰突然変異試験 (標準プレート法及びプレインキュベーション
- 36 法) (GLP 対応) : BASF 毒性研究所、2008 年、未公表
- 37 36. BASF 650 F の CHO 細胞 (*HPRT* 遺伝子座) における *in vitro* 遺伝子突然変異

- 1 試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 2 37. 登録番号 4993353 のチャイニーズハムスターV79 細胞における *in vitro* 染色体異
- 3 常試験（GLP 対応）：RCC-CCR（ドイツ）、2005 年、未公表
- 4 38. 登録番号 4993353 のラット肝細胞を用いる *in vivo* 不定期 DNA 合成（GLP 対
- 5 応）：RCC-CCR（ドイツ）、2005 年、未公表
- 6 39. 登録番号 4993353 の Wistar 系ラットを用いた単回経口投与による *in vivo* 骨髄
- 7 染色体分析（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2005 年、未公表
- 8 40. 登録番号 4993353 を単回経口投与したマウスの小核試験による *in vivo* 細胞遺伝
- 9 学的試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2005 年、未公表
- 10 41. 登録番号 5141477（BAS 650 F の原体不純物）のネズミチフス菌/大腸菌を用い
- 11 た復帰突然変異試験（標準プレート法及びプレインキュベーション法）（GLP 対
- 12 応）：BASF 毒性研究所、2008 年、未公表
- 13 42. 登録番号 5142036（BAS 650 F の原体不純物）のネズミチフス菌/大腸菌を用い
- 14 た復帰突然変異試験（標準プレート法及びプレインキュベーション法）（GLP 対
- 15 応）：BASF 毒性研究所、2008 年、未公表
- 16 43. 登録番号 5178871（BAS 650 F の代謝物）に関するネズミチフス菌（*Salmonella*
- 17 *Typhimurium*）/大腸菌（*Escherichia Coli*）を用いた復帰突然変異試験（標準
- 18 プレート法及びプレインキュベーション法）（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、
- 19 2005 年、未公表
- 20 44. 単回経口投与によるマウス小核試験における Reg.No.5178871（BAS 650 F の代
- 21 謝物）の *in vivo* 細胞遺伝学的試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2006 年、
- 22 未公表
- 23 45. 登録番号 5178870（BAS 650 F の代謝物）に関するネズミチフス菌（*Salmonella*
- 24 *Typhimurium*）/大腸菌（*Escherichia Coli*）を用いた復帰突然変異試験（標準
- 25 プレート法及びプレインキュベーション法）（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、
- 26 2005 年、未公表
- 27 46. Reg.No.5178870（BAS 650 F の代謝物）の CHO 細胞を用いた *in vitro* 遺伝子突
- 28 然変異試験（*HPRT* 遺伝子座検定）（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2006 年、
- 29 未公表
- 30 47. 登録番号 5178870（BAS 650 F の代謝物）の V79 細胞を用いた *in vitro* 染色体
- 31 異常試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 32 48. 単回経口投与によるマウス小核試験における Reg.No.5178870（BAS 650 F の代
- 33 謝物）の *in vivo* 細胞遺伝学的試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2006 年、
- 34 未公表
- 35 49. 登録番号 5211623（BAS 650 F の代謝物）のネズミチフス菌（*Salmonella*
- 36 *Typhimurium*）/大腸菌（*Escherichia Coli*）を用いた復帰突然変異試験（標準プ
- 37 レート法及びプレインキュベーション法）（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007
- 38 年、未公表

- 1 50. 登録番号 5211623（BASF 650 F の代謝物）の CHO 細胞における *in vitro* 遺伝
2 子突然変異試験（*HPRT* 遺伝子座アッセイ）（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、
3 2006 年、未公表
- 4 51. 登録番号 5211623（BAS 650 F の代謝物）の V79 細胞を用いた *in vitro* 染色体
5 異常試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2007 年、未公表
- 6 52. BAS 650 F の雌 C57BL/6 J Rj マウスにおける 4 週間飼料混入投与による免疫毒
7 性試験（GLP 対応）：BASF 毒性研究所、2009 年、未公表
- 8 53. 食品健康影響評価について（平成 23 年 1 月 20 日付け厚生労働省発食安 0120 第
9 5 号）
- 10 54. 国民栄養の現状－平成 10 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2000
11 年
- 12 55. 国民栄養の現状－平成 11 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2001
13 年
- 14 56. 国民栄養の現状－平成 12 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2002
15 年
- 16 57. アメトクトラジン 海外作物残留試験成績：BASF ジャパン株式会社、2009～2010
17 年、未公表
- 18 58. アメトクトラジンの食品健康影響評価に係る追加資料の提出について（回答）：
19 BASF ジャパン株式会社、未公表
- 20 59. 農薬抄録 アメトクトラジン（殺菌剤）（2012 年）：BASF ジャパン株式会社、
21 未公表
- 22