

オイゲノールの推定摂取量(単位: μ g/人/day)

食品名	基準値 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1～6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以 上)
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05	0.5	0.3	0.2	0.6
魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05	0.1	0.0	0.1	0.1
魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05	1.7	0.7	1.0	2.1
魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05	1.4	0.6	0.8	1.9
魚介類（甲殻類に限る。）	0.05	0.3	0.2	0.3	0.3
計		4.0	1.8	2.4	5.0
計 (mg/kg体重/day)		0.000073	0.000108	0.000040	0.000089

TMDI：理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。

オキシクロザニドの推定摂取量(単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品名	基準値 (ppm)	暴露評価に 用いた値 (ppm)	国民平均 EDI	幼小児 (1～6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以 上)
牛の筋肉	0.1	0.2 [※]	3.1	1.9	4.2	2.0
牛の脂肪	0.5					
牛の肝臓	0.5	0.1 [※]	0.0	0.0	0.1	0.0
牛の腎臓	0.5	0.1 [※]	0.0	0.0	0.0	0.0
牛の食用部分	0.5	0.2 [※]	0.1	0.0	0.7	0.1
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の筋肉	0.3	2	0.8	0.2	0.8	0.8
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の脂肪	0.02					
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の肝臓	1					
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の腎臓	1					
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の食用部分	2					
乳	0.3	0.005 [※]	1.3	1.7	1.8	1.1
計			5.3	3.8	7.6	3.9
計 (mg/kg体重/day)			0.00010	0.00023	0.00013	0.00007

EDI: 推定1日摂取量 (Estimate Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。

※ 残留試験における休薬期間時点の残留濃度の平均値

クロルヘキシジンの推定摂取量(単位: μ g/人/day)

食品名	基準値 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1～6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上)
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の筋肉	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の脂肪	0.5				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の肝臓	0.5				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の腎臓	0.5				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の食用部分	0.5				
乳	0.05	13.2	16.6	18.2	10.8
計		13.4	16.7	18.4	11.0
計 (mg/kg体重/day)		0.00024	0.00101	0.00032	0.00020

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。