厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）と 家畜抗菌薬モニタリング事業（JVARM）の連携

国立感染症研究所細菌第2部
鈴木里和

JANIS集計プログラムを利用したJVARMデータの集計

家畜由来細菌の薬剤耐性モニタリング

調査実施体制(JVARM)

JVARM収集データ

農場の情報

- ・農場名
- ・検体番号
- ・飼養頭羽数
- ・採材年月日(*年度)

家畜の情報

- ・動物種*
- ・採材時の家畜年齢
- ・飼養頭羽数
- ・抗菌性物質投与状況

菌株の情報

- ・株番号*
- ・生化学的性状
- ・MICデータ*

*のデータを
今回JANISに送付

JANISの目的と5部門

わが国における薬剤耐性菌の分離状況と薬剤耐性菌による感染症の発生状況、および院内感染の発生状況に関する情報提供を目的とする。

部門	収集データ
検査部門	分母：検体提出患者数（菌種別抗菌薬感受性：菌株数） 分子：該当菌分離患者数（菌種別抗菌薬感受性：菌株数）
全入院患者部門	分母：入院患者数 分子：該当薬剤耐性菌による感染症発症患者数
手術部位感染(SSI)部門	分母：該当手術手技実施件数 分子：SSI発生件数
集中治療室(ICU)部門	分母：ICU入室患者数（48時間以上在室のみ） 分子：人工呼吸器関連肺炎、尿路感染症、血管カテーテル関連感染症、発症数
新生児集中治療室(NICU)部門	分母：NICU入室患児数 分子：感染症発症患児数

JANIS参加医療機関数推移

任意参加（年1回募集）

対象：2013年までは200床以上の医療機関

2014年～ 病床条件撤廃

2014年度診療報酬改定

JANIS検査部門の参加が感染対策防止加算1の要件化

	参加医療機関数
検査部門	1482
全入院患者部門	841
SSI部門	714
ICU部門	187
NICU部門	109
全部門計	1671

我が国の医療機関数 7588施設
（精神科病院除く）
200床以上の医療機関数 2070施設
（平成22年医療施設(動態)調査より）

参加医療機関の代表性（検査部門）

- 日本には病院が約7500→先進国では病院数の多い国
 - 500床以上の大規模病院→約400
 - 200～499床の中規模病院→約1600
 - 200床未満の小規模病院→約5500
- } 病院内に細菌検査室あり
} 急性期医療機関が中心
} 細菌検査を外注

1. 集計対象医療機関数(916医療機関)

*JANIS参加 = 2014年10～12月 集計対象医療機関数
 †JANIS非参加 = (2013年 全国医療機関数 †) - (2014年10～12月 集計対象医療機関数)

厚生労働省院内感染対策サーベイランス (Japan Nosocomial Infections Surveillance, JANIS)

JANIS運営体制の図

数字で見る日本
 e-statは、日本の統計が閲覧できる

(1)国の統計調査
 (2)秘密の保護に万全を期す
 *データの研究利用に際しては申請が必要
 総務省・統計法の管轄

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業

公開情報

検査部門 JANIS(一般向け) 期報・年報

新システム

年	四半期報				年報
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	
2011年	報告済	報告済	報告済	報告済	報告済
2010年	報告済	報告済	報告済	報告済	報告済
2009年	報告済	報告済	報告済	報告済	報告済
2008年	報告済	報告済	報告済	報告済	報告済
2007年	-	-	報告済	報告済	報告済

旧システム

2012/06/09 5月24日...
2012/05/25 還元情報システムのダウンロード、通...
2012/05/14 SSI部門の...

公開情報 2011年1月～12月 年報
院内感染対策サーベイランス 検査部門

【検査部門におけるサーベイランスの概要と目的】
本サーベイランスの目的は、細菌検査により検出される主要な細菌の分離頻度とその抗菌薬感受性を継続的に収集・解析し、医療機関における主要な細菌ならびに薬剤耐性菌の分離状況を明らかにすることである。
サーベイランスの対象となる主要菌ならびに薬剤耐性菌の分離率は、医療機関から提出された陰性検体を含むすべての細菌検査データを基に集計し、算出している。また検査材料別の分離菌割合や菌種別の分離患者数、集計医療機関の分離率分布を算出し、医療機関における主要菌ならびに薬剤耐性菌のベンチマークとなる情報を提供している。

JANIS ホームページ <http://www.nih-janis.jp/index.asp>

JANIS検査部門データ

- 細菌検査に関わる全データを収集
培養陰性も含めた全データ

JANISシステムへ
データ送信

- 患者ID、年齢、性別
- 検体提出日
- 検体の種類：コード
- 病棟、診療科
- 菌名、薬剤感受性試験結果（MIC値）

菌名/抗菌薬：数字4ケタの
菌名/抗菌薬コード
→新薬の市場導入時や菌種
名変更時には改訂

ID	254566877
菌種	1300
抗菌薬 A	245
MICA	4
抗菌薬 B	225
MICB	16

JANISデータフォーマット

必須/推奨	No	項目名
◎	1	調査対象
◎	2	医療機関
◎	3	ID
○	4	入院日
○	5	性別
○	6	生年月日(西暦)
◎	7	入院外来
○	8	診療科
○	9	病棟
	10	検査の目的

必須/推奨	No	項目名
◎	145	検査材料名
◎	146	検体提出日(受付日)
○	147	検体採取日
◎	1237	検体番号

検体提出数・検体提出患者数・分離患者数

162	A菌名	数字	別紙資料「菌名コード」参照
	...	...	
166	B菌	"	薬剤耐性率・分離率
170	C菌	"	
174	D菌	"	
178	E菌	"	
182	A-1薬剤名	"	別紙資料「抗菌薬コード」参照
183	A-1検査方法	"	別紙資料「薬剤感受性検査測定法コード」参照
184	A-1仕切法	"	1:<(より小), 2:>(より大), 3:<=(より小さい又は等しい), 4:>=(より大きい又は等しい), =(等しい)は半角スペース
185	A-1MIC	数字/小数点	□□□□整数(右寄せ)または□.□□□(小数点位置固定)
186	A-1阻止円径	数字	整数(mm)
187	A-1判定(SIR)	英字	S 又は I 又は R

JANIS側でMIC値をもとにS/I/Rを再判定

MIC値と仕切り法との組み合わせで報告してもらおう

162	A菌名	数字	別紙資料「菌名コード」参照
176	E菌	"	
182	A-1薬剤名	"	別紙資料「抗菌薬コード」参照
183	A-1検査方法	"	別紙資料「薬剤感受性検査測定法コード」参照
184	A-1仕切法	"	1:<(より小), 2:>(より大), 3:<=(より小さい又は等しい), 4:>=(より大きい又は等しい), =(等しい)は半角スペース
185	A-1MIC	数字/仕切法	□□□□□整数(右寄せ)または□.□□□□(小数点位置固定)
186	A-1阻止円径	数字	整数(mm)
187	A-1判定(SIR)	英字	S 又は I 又は R

A菌名	1301	<i>Staphylococcus aureus</i>
A-1薬剤名	1821	(ゲンタマイシン)
A-1検査方法	11	(微量液体希釈法マイクロスキャン・ウォーカーウェイ)
A-1仕切法	1	<(より小)
A-1MIC	2	MIC < 2でSと判定

CLSI2007/CLSI2012

S基準	R基準
4以下	16以上

微量液体希釈法・Etest、MRSA・VRE選択培地の結果は集計
ディスク法の結果は集計されない

ブレイクポイント変更の影響 CLSI2007⇒CLSI2012

検査部門
薬剤感受性試験の基準変更

2013年データ

	CLSI2007		⇒	CLSI2012	
	S	R		S	R
CEZ (セファゾリン)	8	32		2	8
CTX (セフォタキシム)	8	64		1	4

同じブレイクポイントでの比較が重要・変更幅が大きいと判定不能株が増える

JVARM データフォーマット (Ver0.0) の作成

No	JANIS	JANIS項目名	JVARM必要項	No	JVARM項目名	属性	項目長	開始	JVARMの仕様
1		調査	◎	1	由来	数字	1	1	1:農場、2:屠場、3:病院
2	◎	医療機関	◎	2	採材場所	数字	5	2	最初の2桁:全国地方公共団体コードの都道府県コード、残り3桁:任意のコード(別農場は別番号)
3	◎	ID	◎	3	畜種(及び個体番号)	英数記号	15	7	最初の2桁:畜種(01:牛、02:豚、03:肉用鶏、04:鶏、05:犬、06:猫、07乳牛、08その他)、残り13番号等個体識別番号を記載
5	○	性別	○	4	性別	英字	1	22	M:雄、F:雌、E:去勢、C:避妊、U:不明
7	◎	入院	◎	5	個体の健康	数字	1	23	1:健康、2:病畜、3:病畜(入院)
8	○	診療		6	診療科	数字	3	24	JANIS別紙資料「診療科コード」参照
9	○	病棟		7	病棟	英数字	15	27	自由入力(英数字のみ)
10		検査の目的	◎	8	調査の目的	数字	1	42	1:モニターリング、2:野外流行株検査、3:再評事業(畜水産安全管理課)、5:事業(消費安全課)、6その他

大腸菌の薬剤耐性の推移を比較する

- JVARM データ
 - 牛、豚、肉用鶏、採卵鶏由来大腸菌2003年~2013年、6798株の実データを受理
 - JANISプログラムでCLSI2007・JVARM基準に準じて集計
 - アンチバイオグラムを作成

集計データ・年別・畜種別、2003-2013

N=6798

JVARM・JANIS 測定抗菌薬

JVARM 測定抗菌薬	JVARM		JANIS		JANIS 345,381株のE. coliのうちMIC測定株割合
	2003-2009	2010-2013	2003-2006	2007-	
1216 ABPC (アンピシリン)	○	○	○	○	64.19%
1537 CEZ (セファゾリン)	○	○	○	○	67.44%
1636 CTX (セフトキシム)		○	○	○	54.50%
1801 KM (カナマイシン)	○	○	×	×	0.07%
1821 GM (ゲンタマイシン)	○	○	○	△	64.16%
2101 TC (テトラサイクリン)		○	×	×	0% (MINO66.99%)
2201 CP (クロラムフェニコール)	○	○	○	△	5.28%
2401 NA (ナリジクス酸)	○	○	-	-	ND
2521 CFX (シプロフロキサシン)	○	○	○	△	33.05%(LVFX65.52%)
2726 ST (スルファメトキサゾール/トリメトプリム)			○	△	54.36%
A002 BCM (ピコザマイシン)	○		×	×	
A003 CTF (セフトオフル)	○		×	×	
A005 DSM (ジヒドロステレトマイシン)	○		×	×	
A006 ERFX (エンロフロキサシン)	○		×	×	
A008 TMP (トリメトプリム)	○		×	×	

×, MICデータ無し(ヒト臨床株では測定されず); △, MICデータあり、事業としての集計無し

SIR判定基準

抗菌薬コード		CLSI2007		M31-A3/VET01-S2		CLSI2012	
		S基準	R基準	S基準	R基準	S基準	R基準
1216	ABPC (アンピシリン)	8	32				
1537	CEZ (セファゾリン)	8	32			2	8
1636	CTX (セフトキシム)	8	64			1	4
1801	KM (カナマイシン)	16	64				
1821	GM (ゲンタマイシン)	4	16				
2101	TC (テトラサイクリン)	4	16				
2201	CP (クロラムフェニコール)	8	32				
2401	NA (ナリジクス酸)	16	32				
2521	CPFX (シプロフロキサシン)	1	4				
2726	ST (スルファメトキサゾール/トリメトプリム)	2/38	8/152			2/38	4/76
A002	BCM (ピコザマイシン)				128*JVARM		
A003	CTF (セフチオフル)			2	8		
A005	DSM (ジヒドロストレプトマイシン)				32*JVARM		
A006	ERFX (エンロフロキサシン)			0.25	2		
A008	TMP (トリメトプリム)	4	16	8	16	8	16

CLSIの基準が無い場合、集計対象外とした抗菌薬
 ストレプトマイシン (SM)、オキシテトラサイクリン (OTC)、コリスチン (CL)
 アブラマイシン (APM)、セフトキシムクラブラン酸 (CTX/CVA)、スルファジメトキシ (SDMX)

主要な系統の抗菌薬について年次推移を比較

- JANIS
 - 検査部門公開情報年報の耐性率を使用
 - 2007年以降
 - 医療機関の報告したMIC値に基づきCLSI2007を用いてSIR判定
 - 2006年以前
 - 医療機関が報告したSIR (IRとRを耐性とカウント)
 - 公開情報で集計されていない抗菌薬については、2013年の値のみ、2013年1月~9月の報告データより医療機関が報告したSIRを集計
- JVARM
 - 測定抗菌薬が変更となった場合、同系統の抗菌薬の結果を使用
 - セフチオフル+セフトキシム
 - エンロフロキサシン+シプロフロキサシン
- JANISとJVARMで共通の抗菌薬が無い場合
 - 同系統の抗菌薬で比較
 - フルオロキノロン⇒ エンロフロキサシン+シプロフロキサシン (JVARM)、レボフロキサシン (JANIS)
 - テトラサイクリン (JVARM)、ミノサイクリン (JANIS)

E. coli フルオロキノロン系

- JANIS フルオロキノロン耐性率は10年で約3倍の顕著な増加
- JVARMでは2010年に測定抗菌薬変更となっている
- 肉用鶏由来株では抗菌薬変更の影響があり、推移の評価が難しい
- そのほかの畜種由来株は10年間ほぼ横ばい

E. coli セファロスポリン系

E. coli セファロスポリン系

比較結果をどう解釈するか

食用動物由来耐性菌がヒトに定着・蔓延する過程とは？

Chang Q et al. Evol Appl. 2015 Mar;8(3):240-7

■ 新型多剤耐性菌「CRE」西日本を中心に拡大か・・・検出困難、大阪医療センターでの院内感染

2か月前の投稿 0件 547 Views なんちゃって記者 約 11分

医療・科学 国内 社会

1 2 17 0 1

g+1 ツイート いいね! Pocket BI Bookmark CLIP

IncN-IMP-6-CTX-M-2
プラスミドが西日本(関西)の医療環境で広まりつつある？

↓
いつからこのプラスミドが日本に存在したのだろうか？

国立病院機構大阪医療センターで発生し、少なくとも2人が死亡した院内感染の原因となった多剤耐性菌「CRE」は検査での検出が困難で「ステルス型」と呼ばれる厄介なものだ。その為「CRE」に感染している事が分からず、治療が後手に回り手遅れになるケースがあり、専門

謝辞

(敬称略)

動物医薬品検査所

濱本修一

小池良治

川西路子

比企基高

国立感染症研究所

渡邊治雄

細菌第2部

柴山恵吾

松井真理

病原体ゲノム解析研究センター

黒田誠

関塚剛史

山下明史