

仕様書

1. 件名

農薬リスク評価に関する海外状況調査（令和5年度）

2. 調査目的

農薬の食品安全委員会における調査審議にあたり、海外のリスク評価を実施する機関である FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議（以下「JMPR」という。）、欧州食品安全機関（以下「EFSA」という。）、米国環境保護庁（以下「US EPA」という。）、カナダ保健省（以下「HC」という。）及びオーストラリア農薬・動物用医薬品局（以下、「APVMA」という。）でのこれまでのヒトの健康に関する評価に関する最新の情報は、大変有益である。このため、再評価¹対象農薬及び評価書評価²対象農薬の有効成分（以下、「農薬」は有効成分のことをいう。）について、農薬ごとに、各国/機関における登録/承認状況及びヒトの健康に関する評価書等（植物及び家畜代謝試験、哺乳類を対象とした毒性試験及び遺伝毒性試験の結果、ヒトへの影響を検討した公表文献検索を行い検討した結果等の文書を含む。）の内容を整理する。

3. 作業内容

（1）一覧表（全ての農薬）及び評価概要（評価書評価対象農薬のみ）の作成

内閣府食品安全委員会事務局（以下「事務局」という。）が指定する農薬（再評価対象農薬の A～L 及び評価書評価対象農薬の M～O の計 15 農薬）について、事務局の指示に従って収集した資料（各国/機関におけるヒトの健康に関する評価書等）を基に各種試験等の一覧表及び評価概要の草案を作成し、別添 1 に示す期限までに収集資料と合わせて提出して事務局担当官の確認を受けること。また、欧州、米国、カナダ及びオーストラリアにおける農薬登録/承認の有無を調査し、その結果を一覧表に記載すること。確認を受けた後、一覧表及び評価概要の修正や追加資料収集等の指示があった場合には速やかに対応すること。

①一覧表の作成

農薬毎に登録/承認状況、検討されている試験（入手評価書等の該当ページに関する情報を含む）及び許容一日摂取量（ADI）及び急性参考用量（ARfD）に相当する値について、別添 2 を参考に Microsoft 社 Excel を用いてまとめた一覧表（A3 サイズ）を作成する。

作成に当たっては、以下の点に留意すること。

ア. 単一の機関で、同じ毒性試験や公表文献が複数の評価書等に出てくる場合は、各評価書等における該当ページを全て記載すること。

¹ 2018 年 12 月に改正された農薬取締法に基づき、2021 年度から農薬の再評価制度が開始された。これに伴い、食品安全委員会は、リスク管理機関からの諮問を受け、評価を行うこととなっている。

² ポジティブリスト制度導入に伴い暫定基準が設定された農薬について行う、評価書評価（「農薬専門調査会における評価書評価に関する考え方」（平成 24 年 10 月 26 日農薬専門調査会決定）に基づき実施する海外評価書等を用いて行うリスク評価）による評価。

- イ. 評価書等内に記載のない試験や、情報が確認できない項目は空欄で構わない。
- ウ. 単一の機関で複数の版がある場合には、各試験について最新の評価に関する内容についてまとめること。

②評価概要の作成

評価書評価対象農薬については、①に加え、別添3を参考に試験ごとにMicrosoft社Wordを用いて評価概要（A4サイズ）を作成すること（参照した評価書等及びその頁も明記すること。評価書等内に記載のない試験や、情報が確認できない項目は空欄で構わない）。

作成に当たっては、以下の点に留意すること。

- ア. 植物代謝試験（後作物を含む。）及び家畜代謝試験は、植物名（又は家畜名）、処理条件、部位、総残留放射能及び認められた成分をそれぞれ一つの表にすること。
- イ. ラット等を用いた動物体内動態試験は、吸收・分布・代謝・排泄に関する概要をまとめること。評価機関で評価結果が異なる場合は、評価機関ごとに表を作成すること。
- ウ. 急性毒性試験は、動物種、性別、LD₅₀及び観察された症状を表にすること。
- エ. 亜急性毒性試験、慢性毒性試験、発がん性試験、神経毒性試験及び生殖毒性試験は、各種毒性試験及び無毒性量として、動物種ごとに、試験名、系統、1群当たりの性別・匹数、投与量、投与方法及び無毒性量並びに最小毒性量で認められた毒性所見を表にすること。
- オ. 遺伝毒性試験は、試験名、対象（菌株名含む。）、処理濃度・投与量及び結果を表にすること。
- カ. ウ～オの毒性試験について、有効成分の代謝物に係る試験及び評価がなされている場合は、別途表を作成すること。
- キ. 上記のうち試験条件に係る記載については、EFSAのDAR（Draft Assessment Report）又はRAR（Renewal assessment Report）も参照して記載すること。

（2）調査結果の報告会開催

- ① 本調査で得られた内容について、調査結果の報告会を開催すること。
- ② 調査結果の報告会を開催する際は、原則として事務局の会議室を使用することとし、開催日時、構成等について、事前に事務局担当官の了承を得ることとする。

（3）成果物の作成

調査報告書を作成する際には、以下の点に留意し作成すること。

- ① 調査報告書の冒頭には、調査の目的や方法、結果等について要約した、「調査の概要」を記載すること。
- ② 調査報告書には、表紙、目次、調査の目的、方法（資料入手方法の概要及び手順等）及び結果（（1）において作成した一覧表及び評価概要）を記載すること。
- ③ 調査報告書（紙媒体）は、日本産業規格A列4番（A4サイズ）で作成すること。
- ④ 調査報告書（電子媒体）及び収集した資料は、PDF形式（スキャンした場合はOCR

処理)及び編集可能な保存形式のファイル(Word、Excelファイル等)で提出すること。

⑤ 成果物(案)が出来た段階で、速やかに事務局担当官と検討・調整を行うこと。

4. 契約期間

契約締結日～令和6年3月29日

5. 作業スケジュール

作業スケジュールの目安を以下に示す。詳細は別添1を参照すること。

令和5年5月 調査方針に関する打合せ(3(1)資料入手方法の確認、一覧表及び評価概要の様式確認)

令和5年5月～令和6年2月 再評価対象農薬及び評価書評価対象農薬に関する
• 資料収集
• 一覧表及び評価概要の草案作成
• 一覧表草案及び評価概要草案の提出
• 必要に応じて一覧表及び評価概要の修正や追加
資料収集

令和6年3月
• 調査結果の最終確認
• 調査結果の報告会

令和6年3月29日までに成果物を提出すること。

6. 成果物

調査報告書(紙媒体)2部

調査報告書及び収集した資料の電子データを収納したDVD-R等の電子媒体3部

7. 納品期限

すべての成果物を契約期間の満了日までに納品すること。

8. 連絡調整

作業の実施に当たっては事前に事務局担当官と連絡を密にとることとし、作業中ににおいても、5に記載した作業スケジュールの段階ごとに、作業の進捗状況を報告すること。なお、作業の遅延、業務の実施に当たって疑義等が生じた場合には、速やかに事務局担当官の指示に従うこと。

9. 技術提案の遵守

本件は一般競争入札・総合評価落札方式(調査)の手続きを経て行うものであり、本仕様書及び技術提案書に記載した内容については誠実に履行すること。

10. その他

(1) 本業務により知り得た成果については、許可なく第三者に譲渡してはならない。

(2) 本調査を実施するに当たり、調査期間中に食品に係る緊急な危害情報を入手した場

合は、速やかに事務局へ通報すること。

- (3) 成果物のうち、調査報告書は、内閣府食品安全委員会が運営する食品安全総合情報システムにより一般公開するが、収集した文献等については、公開することにより、個人及び企業の知的財産権が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあるため、非公開とする。
- (4) 本契約を履行する過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権は、内閣府に帰属するものとする。
ただし、受注者は、本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権を自ら使用又は第三者に使用させる場合には、内閣府と別途協議することとする。
なお、受注者は、内閣府に対し、一切著作人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。
- (5) 納入成果物に第三者（又は受注者自ら）が権利を有する著作物（以下、「既存著作物」という。）が含まれている場合は、内閣府が特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必要な費用負担及び使用許諾契約（等）に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受注者は当該契約等の内容について事前に内閣府の承認を得ることとし、内閣府は、既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。
- (6) 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら内閣府の責めに帰する場合を除き、受注者の責任と負担において一切を処理することとする。この場合、内閣府は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者へ通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。
- (7) 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成27年11月2日内閣府訓令第39号）第3条に規定する合理的配慮について留意すること。

※ URL : <https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf>

1.2. 問合せ先

本仕様書に関する照会先は以下の通り。

〒107-6122 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課 栗山、糸井、高橋

電話：03-6234-1120

(別添1) 調査対象農薬と調査時点、提出期限

分類	記号	農薬	資料収集	調査時点	提出期限	
			ヒトの健康に関する評価書等	登録/承認状況	一覧表草案	評価概要草案
再評価対象農薬	A	フェンメディファム	2023年6月末までに公表されたもの	2023年6月末	2023年7月初旬	
	B	プロスルホカルブ				
	C	キノクラミン(ACN)	2023年8月末までに公表されたもの	2023年8月末	2023年9月初旬	
	D	フィプロニル				
	E	プロパモカルブ塩酸塩				
	F	エチプロール	2023年10月末までに公表されたもの	2023年10月末	2023年11月初旬	
	G	モリネート				
	H	イソプロチオラン				
	I	カルボスルファン	2023年12月末までに公表されたもの	2023年12月末	2024年1月下旬	
	J	プロピネブ				
	K	ベンゾビシクロロン				
	L	ベンフラカルブ				
評価書評価対象農薬	M	シプロコナゾール	2023年10月末までに公表されたもの	2023年10月末	2023年11月末	2023年12月末
	N	ピノキサデン				
	O	フェンプロピモルフ				

農藥名：

別添2

試験情報							海外評価書						備考	
試験項目/ 番号	試験名（供試動物）	報告年	GLP	公表文献	書誌情報	供試動物の系統又 は品種	施用方法又は 投与方法	JMPR① (2011) JMPR② (2012)	EFSA(2018)	EPA(2020)	APVMA(2014)	HC(2020)	その他	
1	2世代繁殖試験（ラット）													
2	3世代繁殖試験（ラット）													
3	発生毒性試験（ラット）													
4	発生毒性試験（ウサギ）													
遺伝毒性試験														
1	DNA修復試験					Bacillus subtilis (H17、M45 株)	in vitro							
2	復帰突然変異試験					Salmonella typhimurium (TA98、TA100、 TA1535、 TA1537 株) Escherichia coli (WP2 uvrA 株)	in vitro							
3	復帰突然変異試験					Saccharomyces cerevisiae D4	in vitro							
4	不定期DNA合成(UDS)試験					ヒト子宮頸癌由来類 上皮細胞(HeLaS3)	in vitro							
5	遺伝子突然変異試験					チャイニーズハムス ター 卵巣由来細胞(CHO) (Hprt 遺伝子)	in vitro							
6	マウスリンフォーマTK 試験					マウスリンパ腫細胞 (L5178Y TK+/-)	in vitro							
7	染色体異常試験					チャイニーズハムス ター卵巣 由来細胞(CHO)	in vitro							
8	姉妹染色分体交換(SCE)試験					チャイニーズハムス ター卵巣由来細胞 (CHO)	in vitro							
9	小核試験					ヒト末梢血リンパ球	in vitro							
10	復帰突然変異試験					ICR マウス、 S. typhimurium (G46 株)	宿主経由							
11	酸化的DNA損傷試験（臓器名）					Fischer ラット	in vivo							
12	不定期DNA合成(UDS)試験					SD ラット（肝細 胞）	in vivo							
13	遺伝子突然変異試験					トランジェニック マウス (Muta TM Mouse)	in vivo							
14	コメット試験					ddY マウス（結腸、肝	in vivo							
15	染色体異常試験					Wistar (Alpk:APfSD) ラット（骨髄細胞）	in vivo							
16	小核試験					ICR マウス（骨髄細胞）	in vivo							
17	伴性劣性致死試験					キイロショウジョウ バエ	in vivo							
18	スポット試験					雄：T系統マウス 雌：C57BL/6マウス	in vivo							
19	優性致死試験					ICR マウス（雄生殖細胞）	in vivo							
20	相互転座試験													
(代謝物OO) 1	復帰突然変異試験					Salmonella typhimurium (TA98、TA100、 TA1535、 TA1537 株) Escherichia coli (WP2 uvrA 株)	in vitro							
(代謝物OO) 2	染色体異常試験					チャイニーズハムス ター卵巣 由来細胞(CHO)	in vitro							
(代謝物OO) 3	小核試験					ICR マウス（骨髄細胞）	in vivo							

試験情報							海外評価書						備考	
試験項目/ 番号	試験名（供試動物）	報告年	GLP	公表文献	書誌情報	供試動物の系統又 は品種	施用方法又は 投与方法	JMPR① (2011) JMPR② (2012)	EFSA(2018)	EPA(2020)	APVMA(2014)	HC(2020)	その他	
急性毒性試験（経皮、吸 入等）														
1	急性毒性試験（経皮）					Wistarラット	経皮							
2	急性毒性試験（吸入）					Wistarラット	吸入							
眼・皮膚に対する刺激性 及び皮膚感作性試験														
1	眼刺激性試験（ウサギ）					NZWウサギ								
2	皮膚刺激性試験（ウサギ）					NZWウサギ								
3	皮膚感作性試験（Maximization法）（モ ルモット）					Hartley モルモット								
亜急性毒性試験（経皮、 吸入等）														
1	21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）													
2	28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）													
その他の試験														
1	腫瘍等に対するメカニズム検討試験													
2	28日間免疫毒性試験（ラット）													
3	光毒性試験													
農薬登録/承認状況								-	なし	食用なし	食用あり（ト	食用なし		
許容一日摂取量（ADI） 及び急性参照用量 (ARfD)								-	リンクを記載	リンクを記載	リンクを記載	リンクを記載		
ADI (mg/kg体重/日)								○	○	○	○	○		
ADIの設定根拠試験								2年間慢性毒性	2年間慢性毒性	2年間慢性毒性	2年間慢性毒性	2年間慢性毒性/発がん性試験	（ラット）	
ARfD (mg/kg体重)								○	○	○	○	○		
ARfDの設定根拠試験								設定せず	発生毒性試験	90日間亜急性	90日間亜急性	90日間亜急性	90日間亜急性毒性試験（ラット）②	

調査対象国の農薬登録/承認状況及び検索対象webサイト

米国	農薬毎の情報 官報検索サイト docketサイト（公表されている文書が入手できる）	https://ordspub.epa.gov/ords/pesticides/f?p=CHEMICALSEARCH:14::NO::P14 LETTER VALUE:A https://www.federalregister.gov/ https://www.regulations.gov/#!home
欧州	農薬の登録は、有効成分の認可（欧州レベル）と製品認可（加盟国レベル）の2段階制 農薬毎の情報 官報検索サイト RAR/DARサイト	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as https://eur-lex.europa.eu/homepage.html https://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations
カナダ	年毎にまとめられた公表情報	https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations.html
オーストラリア	ADI/ARfDのリスト 農薬毎の情報 年毎にまとめられた公表情報	https://apvma.gov.au/node/26581 https://apvma.gov.au/chemicals-and-products/chemical-review/listing https://apvma.gov.au/news-and-publications/public-consultations
JMPR	report（tox側）、年毎 Evaluation（tox側）、年毎 report及びevaluation（residue側）、農薬毎	https://www.who.int/groups/joint-fao-who-meeting-on-pesticide-residues-(impr)/publications/toxicological-monographs https://www.who.int/groups/joint-fao-who-meeting-on-pesticide-residues-(impr)/publications/toxicological-monographs https://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/lpe/en/
食品安全委員会	農薬評価書	https://www.fsc.go.jp/fscis/evaluationDocument/list?itemCategory=001

(別添3) 評価概要の参考様式

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺虫剤（殺線虫剤）

2. 有効成分の一般名

和名：フェナミホス

英名：fenamiphos (ISO名)

3. 化学名

IUPAC

和名：エチル 3-メチル-4-(メチルチオ)フェニル

(RS)-イソプロピルホスホロアミダート

英名：ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl

(RS)-isopropylphosphoramidate

CAS (No.22224-92-6)

和名：エチル 3-メチル-4-(メチルチオ)フェニル(1-メチルエチル)

ホスホロアミダート

英名：ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl(1-methylethyl)

phosphoramidate


4. 分子式

C₁₃H₂₂NO₃PS

5. 分子量

303.36

6. 構造式



7. 物理的化学的性状

融点	: 46.0～50.0°C
沸点	: 測定不能 (200°C以上で熱分解)
密度	: 1.19 g/cm ³ (23°C)
蒸気圧	: 6.7×10 ⁻⁵ Pa (25°C)
外観 (色調及び形状)、臭気	: 白色粉末、臭気不明
水溶解度	: 368 mg/L (20°C)
オクタノール/水分配係数	: log P _{ow} = 3.3 (20°C)
解離定数	: 解離せず

8. 作用機序・海外登録状況等

フェナミホスは、有機リン系の殺虫剤（殺線虫剤）であり、アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することにより殺虫作用を持つ。

国内では農薬として登録されておらず、海外の基準等を参照した暫定基準が設定されている。海外では、オーストラリア、ニュージーランド等で登録されている。米国及びEUでは、過去に登録されていたが、現在は登録がない。

II. 安全性に係る試験の概要

JMPR、EFSA 及び EPA の評価書等を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照 3～16）

放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からフェナミホスの濃度（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は、別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 植物、家畜等における代謝試験

(1) 植物代謝試験

① 一次作物

試験の概要及び結果については表 1 に示されている。

表 1 植物代謝試験の概要及び結果（一次作物）（%TRR）

植物名	処理条件	部位	総残留放射能 (mg/kg)	認められた成分	参照
トマト [1973 年、GLP] 【JMPR④248、 249 頁、EFSA②A-19 頁、参照 15 : 7~9 頁】	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理 10~74 日 (果実)、50 日(葉部)後採取	果実	—	フェナミホス(~8.9)、 M01(50~90)、M02(5.4~22.6)、 M12(~5.2)、M13(~7.0)	JMPR (1999)
		葉部	—	M01(50)、M02(9.1)	EFSA (2019)
にんじん [1973 年、GLP] 【JMPR④249 頁、EFSA②A-19 頁、参照 15 : 13 ~15 頁】	土壤処理 10.0 kg ai/ha 処理 53~86 日 (根部及び葉部) 後採取	根部	—	主に M12-conj ^a	JMPR (1999)
		葉部	—	主に M13-conj ^a	EFSA (2019)
キャベツ [1973 年、GLP] 【JMPR④249、 250 頁、EFSA②A-19 頁、参照 15 : 17、18 頁】	土壤処理 13 及び 34 kg ai/ha 処理 36~90 日 (外葉及び内葉)、 50 及び 61 日(結球)後採取	外葉	—	M01(0.2~1.4)、M02(0.2~0.3)、 M12(~0.6)、M13(~0.8)	JMPR (1999)
		内葉	—	M01(~0.3)、M02(0.1)、 M12(~0.01)、M13(~0.01)	EFSA (2019)
		結球	—	M01(6.1)、M02(1.1)、M12(0.4)、 M13(0.4)	
さやいんげん (snap bean) [1972 年、1973、 1977 年、GLP] 【JMPR④245~ 247 頁、EFSA②A-19 頁、参照 15 : 21~24 頁】	茎部注入 1 mg/株 処理 28 日後 採取	豆	—	M01(10.8~41.9)、 M02(9.7~23.7)、M12(~21.9)、 M13(~40.8)	JMPR (1999)
	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理 28 日後 採取			M01(34.5~39.5)、 M02(24.8~29.6)、M12(~33.5)	EFSA (2019)

植物名	処理条件	部位	総残留放射能(mg/kg)	認められた成分	参照
さやいんげん (green bean) [1977年,GLP] 【JMPR④247、 248頁、EFSA② A-19頁、参照 15：22～24頁】	茎部注入 1 mg/株 処理4及び14日後採取	可食部	—	フェナミホス(2.3～17.4)、 M01(11.1～41.6)、 M02(4.3～13.5)、M07(0.4～3.8)、 M12(～6.8)、M13(～11.1)	JMPR (1999) EFSA (2019)
	根部処理 1 mg ai/200 ml 処理7～21日後採取			フェナミホス(15.7～62.6)、 M01(15.4～26.9)、M02(～7.6)、 M07(～1.7)、M12(～10.9)、 M13(～3.2)	
パイナップル [1973年,GLP] 【JMPR④250～ 252頁、EFSA② A-19頁、参照 15：10～12頁】	茎部注入 10 mg/株 1～18日後採取	果実	—	M01(48.5)、M02(1.8)、M12(18)、 M13(4)	JMPR (1999) EFSA (2019)
	土壤処理 22 kg ai/ha 15～90日後採取			M01(0.0017～0.009 mg/kg)、 M02(0.0002～0.1 mg/kg)、 M12(～0.0002 mg/kg)、 M13(～0.0004 mg/kg)	
	葉部散布 0.89～1.1 kg ai/ha 1～30日後採取			フェナミホス (0.001～0.94 mg/kg)、 M01(0.02～2.41 mg/kg)、 M02(0.001～0.17 mg/kg)、 M12(0.001～0.05 mg/kg)、 M13(～0.03 mg/kg)	
タバコ [1971年,GLP] 【JMPR④252 頁、EFSA②A-19 頁、参照 15：15、 16頁】	定植後 土壤処理 11.2 kg ai/ha 処理後70日 採取	葉部	—	M01 (60～92) 、 M02(8～40)	JMPR (1999) EFSA (2019)

— : 記載なし

a : 水溶性画分のβ-グルコシダーゼを用いた加水分解後に分析された。

-conj : 構造未同定抱合体

② 後作物

試験の概要及び結果については表 2 に示されている。

表 2 植物代謝試験の概要及び結果（後作物） (%TRR)

植物名	処理条件	部位	総残留放射能 (mg/kg)	認められた成分	参照
小麦 [1980、1990年、 不明] 【JMPR④253～ 256 頁、EFSA② A-19、A-20 頁、 参考 16：43～48 頁】	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、31 日 後に植替え、成熟 後採取	わら	3.50	M01(4)、M02(5)、M12+M13(16)	JMPR (1999) EFSA (2019)
	土壤処理 7.6 kg ai/ha 30、120 又は 269 日間大豆生育後 に植付け、成熟時 に採取	茎葉	2.36～ 17.30	M01(19.1～31.3)、 M02(18.0～29.1)、 M09(~3.3)、M12(5.8～12.1)、 M12-glu(0.5～3.4)、 M13(10.6～24.6)、 M13-glu(0.5～5.2)、 M13-conj(0.3～1.6)、 M18(1.5～5.0)	
		わら	4.78～ 46.4	フェナミホス(<0.1)、 M01(4.5～10.4)、 M02(8.5～14.1)、M12(1.1～5.6)、 M12-glu(6.4～10.3)、 M13(2.2～6.3)、 M13-glu(9.4～13.5)、 M13-conj(1.7～3.1)、M18(~0.5)	
オーツ麦 [1980 年、不明] 【JMPR④253、 254 頁、EFSA② A-19、A-20 頁、 参考 16：43～45 頁】	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、115 日 後に植替え、成熟 後採取	穀粒	0.20～ 0.98	フェナミホス(~0.1)、 M01(1.0～4.0)、M02(1.9～7.8)、 M09(~1.9)、M12(0.2～3.8)、 M12-glu(~9.4)、 M13(1.5～15.1)、 M13-glu(5.1～15.9)、 M13-conj(~2.8)、 M18(0.6～11.2)	JMPR (1999) EFSA (2019)
		わら	1.91	M01(1)、M02(1)、M12+M13(6)	
	穀粒	0.63	M01(1)、M02(1)、M12+M13(4)		

植物名	処理条件	部位	総残留放射能(mg/kg)	認められた成分	参照
大豆 [1972年、不明] 【JMPR④252 頁、EFSA②A-20 頁、参照16：45 ～48頁】	土壤処理 11 kg ai/ha 処理後にタバコ を70日間栽培 し、土壤を3か月 間室内保存、10 か月間冷凍保存 後、未処理土壤と 混和、植付け19 日後(苗)、150日 後(葉部、茎、さ や、豆)採取	苗	—	フェナミホス(1.7 mg/kg)、 M01+M02(16.9 mg/kg)、 M13(4.8 mg/kg)	JMPR (1999) EFSA (2019)
		葉部	—	フェナミホス(2.7 mg/kg)、 M01+M02(3.5 mg/kg)、 M13(8.7 mg/kg)	
		さや	—	フェナミホス(0.3 mg/kg)、 M01+M02(0.11 mg/kg)、 M13(0.2 mg/kg)	
		豆	—	フェナミホス(0.5 mg/kg)、 M01+M02(0.19 mg/kg)、 M13(0.05 mg/kg)	
トマト [2015年、GLP] 【EFSA②11頁、 A-20頁、参照 15：66～77頁】	土壤処理 10 kg ai/ha 処理7又は60日 後に植付け、成熟 後採取	果実	—	M01(~31)、M02(~11)、 M12(~25)、M13(~44)	EFSA (2019)
てんさい [1980年、不明] 【JMPR④253、 254頁、EFSA② A-19、A-20頁、 参照16：43～45 頁】	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、31又 は115日後に植 替え、成熟後 採取	根部	~13.0	M01(3～5)、M02(4～5)、 M12+M13(1)	JMPR (1999) EFSA (2019)
		上部	~1.28	M01(2)、M02(3～4)、 M12+M13(2～4)	
レッドビート [1990年、不明] 【JMPR④254～ 256頁、EFSA② A-19、A-20頁、 参照16：45～48 頁】	土壤処理 7.6 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、30、 120又は269日 後に植替え、成熟 後採取	上部	0.36～ 7.31	フェナミホス(~0.4)、 M01(4.5～19.0)、 M02(4.6～11.1)、 M09(~13.2)、M12(0.2～2.1)、 M12-glu(4.1～10.4)、 M13(3.0～3.4)、 M13-glu(3.7～10.9)、 M13-conj(11.5～18.0)、 M18(~0.2)	JMPR (1999) EFSA (2019)
		根部	0.10～ 4.62	M01(1.7～12.4)、M02(2.1～7.3)、 M12(~4.6)、 M12-glu(5.5～10.5)、 M13(2.3～8.1)、M13-glu(~4.1)、 M13-conj(3.8～7.9)、 M18(1.0～4.6)	

植物名	処理条件	部位	総残留放射能 (mg/kg)	認められた成分	参照
マスター ^d [1980年、不明] 【JMPR④253、 254頁、EFSA② A-19、A-20頁、 参照16:43~45 頁】	土壤処理 6.7 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、31又 は115日後に植 替え、成熟後採取	—	~8.53	M01(4~5)、M02(5~8)、 M12+M13(1~2)	JMPR (1999) EFSA (2019)
スイスチャード [1990年、不明] 【JMPR④254~ 256頁、EFSA② A-19、A-20頁、 参照16:45~48 頁】	土壤処理 7.6 kg ai/ha 処理直後に大豆 を栽培し、30、 120又は269日 後に植替え、成熟 後採取	—	0.57~ 8.71	フェナミホス(~0.4)、 M01(4.1~28.1)、 M02(1.8~20.2)、 M09(13.9~37.3)、 M12(0.3~5.8)、M12-glu(~2.0)、 M13(4.5~7.2)、 M13-glu(1.0~2.8)、 M13-conj(15.7~25.0)、 M18(~1.3)	JMPR (1999) EFSA (2019)

— : 記載なし

-glu : グルコース抱合体

-conj : 構造未同定抱合体

(2) 家畜代謝試験

試験の概要及び結果については表3に示されている。

表3 家畜代謝試験の概要及び結果 (%TRR)

家畜名	投与条件	部位	総残留放射能 ^a ($\mu\text{g/g}$)	認められた成分	参照
泌乳牛 【JMPR ④239~ 240頁】	代謝物 M01 ^b 、 0.8 mg/kg 体重、 経口単回投与、 1時間間隔 (血、尿及び乳) ^c 、 投与4時間後採取 (臓器及び組織)	肝臓	0.099	フェナミホス(5.6)、M01(5.6)、 M11(29.2)、M12(21.2)	JMPR (1999)
		腎臓	1.636	フェナミホス(0.9)、M01(3.7)、 M06+M07(5.4)、M11(51.8)、 M12(22.4)、M13(3.5)	
		脳	0.013	—	
		心臓	0.037	フェナミホス(1.1)、M06+M07(2.1)、 M11(26.8)、M12(34.1)	
		筋肉 ^d	0.041	M11(~13.0)、M12(~31.7)、 M13(~5.5)	
		脂肪 ^e	0.046	フェナミホス(~25.3)、M01(~4.3)、 M11(~33.7)、M12(~22.5)	
		乳汁	0.061 ^f	M11(~21)、M12(37~40)	

家畜名	投与条件	部位	総残留放射能 ^a ($\mu\text{g/g}$)	認められた成分	参照
		血	0.24 ^g	M12(55~74)	
		尿	—	M12(60~70)	
泌乳山羊 【JMPR ④240~ 243頁】	フェナミホス、 1 mg/kg 体重 3日間連続経口 投与、初回投与 0.25~6時間後 採取(血)、1日2 回採取(乳汁及 び尿) ^h 、最終投 与15分後採取 (臓器及び組織)	肝臓	0.129	フェナミホス(6.4)、M01(31.6)、 M12(13.2)、M16(5.8)	JMPR (1999)
		腎臓	0.041	M15(14.1)、M16(22.0)、M17(14.6)	
		筋肉 ⁱ	0.015	M01(39.3~61.2)、M08(28.2)、 M12(33.7)、M16(25.0~25.7)、 M17(13.1~38.1)	
		脂肪	0.001	—	
		乳汁	—	M01(2.8)、M07(2.0)、M12(5.5)、 M15(18.5)、M16(36.4)、M17(30.0)	
		尿	—	M12(0.3)、M15(13.8)、M16(27.7)、 M17(5.2)	
産卵鶏 【JMPR ④243~ 245頁】	フェナミホス、 1 mg/kg 体重 3日間連続経口 投与、最終投与 0.25~24時間 後採取(血)、1 日2回採取(卵)、 1日1回採取(排 泄物)、最終投与 30分後採取(臓 器及び組織)	肝臓	0.613	フェナミホス(0.4)、M11(14.1)、 M12(3.4)、M13(8.7)、M15(10.3)、 M16(3.8)、M17(17.2)	JMPR (1999)
		腎臓	2.27	フェナミホス(0.4)、M11(0.9)、 M12(27.2)、M13(30.4)、M15(9.9)、 M16(9.6)、M17(4.1)	
		心臓	0.230	フェナミホス(7.7)、M12(6.7)、 M13(19.3)、M15(7.5)、M16(8.5)、 M17(7.0)	
		筋肉 ^j	0.166	フェナミホス(10.4~10.8)、 M01(15.9~17.1)、M02(~10.7)、 M11(1.6~2.0)、M12(15.4~16.4)、 M13(8.0~9.6)、M15(2.4~3.5)、 M16(4.0~4.7)、M17(5.5~8.2)	
		皮膚	0.138	フェナミホス(10.4)、M12(11.1)、 M13(13.0)、M15(12.6)、M16(16.7)、 M17(10.7)	
		脂肪	0.092 ^k	フェナミホス(16.5)、M11(31.1)、 M12(13.2)、M13(10.5)、M15(4.0)	
		卵	0.010 ~0.012	フェナミホス(12~14.1)、 M11(6.8~14.1)、M12(3.4~10.4)、 M13(8.7~10.8)、M15(10.3~12.8)、 M16(3.8~10.6)、M17(12.4~17.2)	
		砂肝	0.251	フェナミホス(30.4)、M01(2.7)、 M11(5.4)、M12(6.8)、M13(16.0)、 M15(2.4)、M16(3.0)、M17(0.9)	

— : 分析されず

^a : 乳牛の分析値は代謝物 M01 換算。

- ^b : 植物の主要代謝物であることを考慮し、代謝物 M01 を用いた試験が実施された。
- ^c : 投与放射能の約 47%TAR が第一胃内容物、39%TAR が尿中、1.4%TAR が組織中から回収された。
- ^d : Round、Flank、Loin 及び Shoulder の合計。
- ^e : Renal、Subcutaneous 及び Omental の合計。
- ^f : 投与 4 時間後に採取されたサンプルの値（ピーク値）。
- ^g : 投与 1 時間後に採取されたサンプルの値（ピーク値）。投与 4 時間後は 0.09 mg/kg まで減少した。
- ^h : 投与放射能の 61.5%TAR が尿中、3.6%TAR が糞中、0.1%TAR が乳汁中、0.3%TRR が可食の組織及び臓器中から回収された。乳汁は 1 及び 2 日目の投与後からそれぞれ 8 時間後に採取したプールサンプルを分析に用いた。
- ⁱ : Round、Flank 及び Loin の合計。
- ^j : Thigh 及び Breast の合計。
- ^k : 総残留放射能は皮下脂肪について測定された。

2. 動物体内動態試験

(1) ラット [1989 年、GLP]

標識されたフェナミホスを 0.3 mg/kg 体重若しくは 3 mg/kg 体重で単回経口投与、0.3 mg/kg 体重で静脈内投与又は非標識フェナミホスを 0.3 mg/kg 体重で 14 日間連続投与後に標識されたフェナミホスを 0.3 mg/kg 体重で単回経口投与して、動物体内動態試験が実施された。

血中薬物動態学的パラメータは表 4 に示されている。

表 4 血中薬物動態学的パラメータ

投与量	0.3 mg/kg 体重	
性別	雄	雌
C _{max} (μg/g)	0.0721	0.117
T _{max} (hr)	1.00	0.25
T _{Cmax/2} (hr)	2.3	7.2
AUC _t (hr·μg/g)	0.229	0.342
AUC (hr·μg/g)	0.249	0.360

【EFSA②A-13 頁】

フェナミホスの吸収は速やかで、投与後 24 時間以内に 92%以上のフェナミホスが吸収された。

体内に広く分布することが認められたが、骨、脊髄及び脳中には認められず、血液脳関門の通過は最小限であることが示された。生体での蓄積性は認められなかった。

吸収後は速やかに代謝、排泄された。

排泄物中の代謝物は表 5 に示されている。

表 5 排泄物中の代謝物 (%TAR)

投与方法	投与量	性別	フェナ ミホス	代謝物
単回経口 投与	0.3 mg/kg 体重	雄	ND	M07(0.2)、M11(9.6)、M12(11.8)、M13(3.8)、 M15(6.9)、M16(53.7)、M17(7.9)
		雌	ND	M01(11.6)、M07(0.1)、M11(0.8)、M12(18.5)、 M13(3.0)、M15(8.2)、M16(42.5)、M17(7.9)、 M18-sulfate(1.0)
	3 mg/kg 体重	雄	ND	M01(0.3)、M07(0.4)、M11(4.6)、M12(21.5)、 M13(10.8)、M15(6.1)、M16(43.4)、M17(10.0)
		雌	ND	M01(1.3)、M07(0.7)、M11(4.0)、M12(12.7)、 M13(6.5)、M15(5.7)、M16(40.3)、M17(11.5)、 M18-sulfate(11.3)
反復経口 投与	非標識体を 0.3 mg/kg 体 重で 14 日間 連続投与 + 標識体を 0.3 mg/kg 体重 (単回)	雄	ND	M01(2.9)、M11(5.3)、M12(4.0)、M13(1.9)、 M15(5.3)、M16(48.4)、M17(15.1)、 M18-sulfate(10.0)
		雌	ND	M07(1.7)、M11(9.8)、M12(21.8)、M13(4.9)、 M15(4.9)、M16(45.3)、M17(7.5)
静脈内 投与	0.3 mg/kg 体重	雄	ND	M01(2.3)、M11(8.4)、M12(11.8)、M13(4.5)、 M15(19.3)、M16(40.2)、M17(7.8)、 M18-sulfate(0.6)
		雌	ND	M01(6.6)、M11(3.5)、M12(19.3)、M13(2.6)、 M15(15.8)、M16(44.0)、M17(4.2)、 M18-sulfate(0.1)

【JMPR④237 頁】

投与後 4 時間以内に 40%～80%が腎臓を経由し排泄された。投与後 48 時間で尿中に 93%TAR～100%TAR、糞中に 1.5%TAR～3.8%TAR が排泄された。

[参照 JMPR (1999) 、 EFSA (2019) 、 EPA (1999)]

3. 急性毒性試験（経口投与）

(1) 原体

試験の結果については表 6 に示されている。

表 6 急性毒性試験結果概要（経口投与、原体）

動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状	参照
	雄	雌		
Wistar ラット(絶食) 【JMPR②8、10 頁】	2.4～ 6.0	2.4～ 6.1	無関心、手のひら痙攣、強制呼吸、下痢、立毛、慢性痙攣及び呼吸困難	JMPR (1997)
ラット(非絶食) 【JMPR②8 頁】	8.1～ 17.2	9.6～ 19.4	—	JMPR (1997)
ラット 【EFSA②A-13 頁】	6.0～6.1		—	EFSA (2019)
SD ラット 【EPA①20 頁】	2.7	3.0	—	EPA (1999)
マウス 【JMPR②8 頁】	22.7	—	—	JMPR (1997)
モルモット 【JMPR②9 頁】	56～ 100	—	—	JMPR (1997)
ウサギ 【JMPR②9 頁】	10～ 17.5	—	—	JMPR (1997)
イヌ 【JMPR②9 頁】	約 10	—	—	JMPR (1997)
ネコ 【JMPR②9 頁】	約 10	—	—	JMPR (1997)
ニワトリ 【JMPR②9 頁】	—	5.3～ 12	—	JMPR (1997)

—：記載なし

(2) 代謝物

試験の結果については表 7 に示されている。

表 7 急性毒性試験結果概要（経口投与、代謝物）

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状	参照
		雄	雌		
代謝物 M01	ラット(絶食) 【JMPR②9 頁】	2.4		—	JMPR (1997)
	ラット(非絶食) 【JMPR②9 頁】	—	10～25	—	JMPR (1997)
	ラット 【EFSA②A-16 頁】	<25		—	EFSA (2019)

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状	参照
		雄	雌		
代謝物 M02	ラット(絶食) 【JMPR②9 頁】	2.6	2.4	—	JMPR (1997)
	ラット(非絶食) 【JMPR②9 頁】	—	1~25	—	JMPR (1997)
	ラット 【EFSA②A-16 頁】	<25		—	EFSA (2019)
代謝物 M06	ラット(絶食) 【JMPR②9 頁】	1.4	2.1	—	JMPR (1997)
	ラット 【EFSA②A-16 頁】	<25		—	EFSA (2019)
代謝物 M07	ラット 【EFSA②A-16 頁】	<25		—	EFSA (2019)
代謝物 M08	ラット(絶食) 【JMPR②10 頁】	4.1	3.7	—	JMPR (1997)
代謝物 M09	ラット 【EFSA②A-16 頁】	>300		—	EFSA (2019)
代謝物 M11	ラット(絶食) 【JMPR②10 頁】	1,418	1,333	—	JMPR (1997)
	ラット(非絶食) 【JMPR②10 頁】	—	>2,500	—	JMPR (1997)
代謝物 M12	ラット(絶食) 【JMPR②10 頁】	1,418	1,175	—	JMPR (1997)
	ラット(非絶食) 【JMPR②10 頁】	—	500~ 1,000	—	JMPR (1997)
代謝物 M13	ラット(絶食) 【JMPR②10 頁】	1,250	1,854	—	JMPR (1997)
	ラット(非絶食) 【JMPR②10 頁】	—	>1,000	—	JMPR (1997)
	ラット 【EFSA②A-16 頁】	>1,000		—	EFSA (2019)

— : 記載なし

4. 各種毒性試験及び無毒性量

(1) 原体

① ラット

試験の概要及び無毒性量等については表 8 に示されている。

表 8 各種毒性試験の概要及び無毒性量等（ラット）

試験名	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997)	EFSA (2019)	EPA (1999、2010)
90 日間亜急性毒性試験① [不明、非 GLP] 【JMPR②12、13 頁、EPA①21 頁、参照 14 : 58 頁】	Wistar ラット 雌雄各 15 匹	混餌投与 0、4、8、16、32 ppm 0、0.2、0.4、0.8、1.6	0.4 赤血球 AChE 活性阻害		0.2 血漿 ChE 及び赤血球 AChE 活性阻害
90 日間亜急性毒性試験② [1983 年、非 GLP] 【JMPR②12 頁、EPA①21 頁、参照 14 : 61 頁】	Fischer344 ラット 雌雄各 20 匹	混餌投与 0、0.37、0.57、0.91 ppm 雄 : 0、0.03、0.045、0.072 雌 : 0、0.035、0.053、0.084	0.07 毒性所見なし		0.05 毒性所見なし
2 年間慢性毒性試験 [不明、非 GLP] 【JMPR②18 頁、EPA①23 頁、参照 14:131 頁】	Wistar ラット 雌雄各 40 匹	混餌投与 0、3、10、30 ppm 雄 : 0、0.17、0.56、1.7 雌 : 0、0.23、0.76、2.2	0.56 赤血球 AChE 活性阻害		(発がん性は認められない)
2 年間慢性毒性 /発がん性併合試験 [1985 年、GLP] 【JMPR②18~20 頁、EFSA②9、A-14 頁、EPA ①22 頁、参照 14 : 135 頁】	Fischer344 ラット 雌雄各 50 匹	混餌投与 0、1.7、7.8、37 ppm 雄 : 0、0.1、0.5、2.5 雌 : 0、0.1、0.6、3.4	0.46 脳 AChE 活性阻害、体重増加抑制、臓器比重 ¹ 増加 (発がん性は認められない)	0.1 赤血球 AChE 活性阻害 (発がん性は認められない)	(発がん性は認められない)

¹ 体重比重量のことを比重量という（以下同じ。）。

試験名	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR(1997)	EFSA(2019)	EPA(1999、2010)
急性神経毒性試験 [1994年、GLP] 【JMPR②30、31頁、EPA①25頁、EPA②2~4参照 14:175頁】	Wistar ラット 雌雄各 12 匹	強制経口投与(単回) 0、0.37、1.52、2.31	0.37 歩行異常、線維束性収縮		0.37 (LOAEL) (1999年) 血漿及び赤血球 AChE 活性阻害 0.11 [aPAD] (BMDL ₁₀) (2010年) 赤血球 ChE 活性阻害
15週間亜急性神経毒性試験 [1995年、GLP] 【JMPR②31、32頁、EFSA②9、A-14頁、EPA①25、26頁、参考 14:177頁】	Wistar ラット 雌雄各 12 匹	混餌投与 0、1、10、50 ppm 雄: 0、0.06、0.61、3.1 雌: 0、0.08、0.8、4	0.8 脳 AChE 活性阻害	0.06 脳 AChE 活性阻害、臨床症状	雄 0.06 雌 0.08 血漿 ChE 及び赤血球 AChE 活性阻害
発達神経毒性試験 [2002年、GLP] 【EFSA②9、10、A-15、16頁、参考 14:192頁、参考 17:192~196頁】	Wistar ラット 雌 30 匹	混餌投与 0、2.5、10、50 ppm (妊娠 0 日~哺育 21 日) 妊娠期: 0、0.2、0.9、4.8 哺育期: 0、0.5、2.1、10.3		母動物: 0.5 児動物: 2.1 母動物: 赤血球 AChE 活性阻害 児動物: 雌雄: 赤血球 AChE 活性阻害(生後 21 日)	

試験名	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997)	EFSA (2019)	EPA (1999、2010)
2世代繁殖試験 [1989年、GLP] 【JMPR②20～23頁、EFSA②9頁、A-15頁、EPA①24頁、参考14：145頁】	SD ラット 雌雄各30匹	混餌投与 0、2.5、10、40 ppm	親動物：0.17 体重増加抑制 児動物：0.64 体重減少	親動物：0.17 赤血球 AChE 活性阻害、体重增加抑制 児動物：0.64 体重減少、赤血球 AChE 活性阻害 繁殖能：2.8	親動物 P 雄：0.17 P 雌： <0.20 血漿及び赤血球 ChE 活性阻害 児動物：3.2 毒性所見なし
		雄：0、0.17、0.64、2.8 雌：0、0.20、0.73、3.2			
3世代繁殖試験 [不明、非GLP] 【JMPR②20頁、EPA①25頁、参考14：145頁】	FB30 ラット 雄10匹、雌20匹	混餌投与 0、3、10、30 ppm 0、0.15、0.5、1.5	毒性所見なし (繁殖能に対する影響は認められない)		親動物 F _{2b} 雄：0.5 体重増加抑制 胎児：1.5 毒性所見なし
発生毒性試験① [不明、非GLP] 【JMPR②23、24頁、参考14：154頁】	FB30 ラット 雌25匹	強制経口投与 0、0.3、1、3 (妊娠 6～15日)	母動物：1 胎児：3 母動物：死亡率增加、振戦、体重増加抑制 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)		
発生毒性試験② [不明、非GLP] 【JMPR②24、25頁、EFSA②9、A-15頁、EPA①23、24頁、参考14：156頁】	SD ラット 雌33匹	強制経口投与 0、0.25、0.85、3.0 妊娠6～15日	母動物：0.85 胎児：3 母動物：体重増加抑制、摂餌量減少 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：0.25 胎児：0.85 母動物：赤血球 AChE 活性阻害 胎児：舌骨又は舌骨弓の変異(急性でない) (催奇形性は認められない)	母動物：0.85 胎児：3.0 母動物：死亡率增加、体重増加抑制、摂餌量減少、コリン作動性兆候、血漿及び赤血球の ChE 活性阻害 胎児：毒性所見なし

—：記載なし、LOAEL：最小毒性量 (mg/kg 体重/日)、

BMDL₁₀：ベンチマークドーズの信頼下限値 (mg/kg 体重)

② マウス

試験の概要及び無毒性量等については表 9 に示されている。

表 9 各種毒性試験の概要及び無毒性量等（マウス）

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997)	EFSA (2019)	EPA (1999)
20か月間発がん性試験 [1980年、非GLP] 【JMPR②17、18頁、EFSA②9、A-14頁、EPA①23頁、参照14：140頁】	ICR マウス 雌雄各 50 匹	混餌投与 0、2、10、50 ppm 雄：0、0.3、1.4、7.4 雌：0、0.3、1.8、8.8	0.3 脾臓及び卵巢の比重量減少 (発がん性は認められない)	7.4 (発がん性は認められない)	(発がん性は認められない)

③ イヌ

試験の概要及び無毒性量等については表 10 に示されている。

表 10 各種毒性試験の概要及び無毒性量等（イヌ）

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997、2002)	EFSA (2019)	EPA (1999、2010)
90日間亜急性毒性試験 [1983年、非GLP] 【JMPR②15頁、EPA①21頁、参照 14：63頁】	ビーグル犬 雌雄各 4 匹	混餌投与 0、0.6、1.0、1.7 ppm 0、0.015、0.025、0.042	— 1.7 ppm 雄で血漿 AChE 活性阻害 (赤血球及び脳 AChE 活性阻害に影響なし)		0.025 血漿 AChE 活性阻害

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997、2002)	EFSA (2019)	EPA (1999、2010)
1年間慢性毒性試験 [1991年、GLP] 【JMPR②15、16頁、EFSA②9、10、A-14頁、EPA①22頁、EPA②4、5頁、参考14：70頁】	ビーグル犬 雌雄各4匹	混餌投与 0、1、3、12 ppm 雄：0、0.03、 0.089、0.31 雌：0、0.03、 0.083、0.35	0.083 [ADI] 脳 AChE 活性阻害(雄：12%、雌：17%)、貧血	0.083 [ADI] 赤血球 AChE 活性阻害	0.01 [cPAD] (1999年) 血漿 ChE 活性阻害(雄：25%～32%、雌：20%～26%) [最小投与群で毒性所見が確認されたため、追加試験(混餌投与、180日間、0.5 ppm、雄：0.0108、雌：0.0115)が実施された。] 0.08(全身毒性における無毒性量も算出された。) (1999年) 貧血 0.030 [cPAD] (BMDL ₁₀) (2010年) 赤血球 ChE 活性阻害
2年間慢性毒性試験 [不明、非GLP] 【JMPR②16頁、EFSA②10、A-14頁、参考14：77頁】	ビーグル犬 雌雄各4匹	混餌投与 0、0.5、1、2、5、10 ppm 雄：0、0.015、 0.029、 0.063、0.15、 0.31 雌：0、0.014、 0.036、0.06、 0.17、0.34	— 2 ppm 投与群以上で血漿 AChE 活性阻害(>20%)、5 ppm 投与群以上で赤血球 AChE 活性阻害	0.06 赤血球 AChE 活性阻害	

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997、2002)	EFSA (2019)	EPA (1999、2010)
急性神経毒性試験 [2000年、GLP] 【JMPR⑥1~3頁、EFSA②9、A-41頁、参照14：184頁】	ビーグル犬 雌雄各2匹	強制単回経口投与 0、0.063、0.125、0.25、0.5、1.0、2.0	0.25 ARfD 赤血球 ChE 活性阻害(42%、投与60分後)	0.25 ARfD 赤血球 ChE 活性阻害、臨床症状	

—：記載なし、ADI：許容一日摂取量、ARfD：急性参考用量、
BMDL₁₀：ベンチマークドーズの信頼下限値 (mg/kg 体重/日)

④ ウサギ

試験の概要及び無毒性量等については表 11 に示されている。

表 11 各種毒性試験の概要及び無毒性量等（ウサギ）

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997)	EFSA (2019)	EPA (1999)
発生毒性試験① [不明、非 GLP] 【JMPR②25、26頁、EFSA②9、A-15頁、参照14：161頁】	NZ ウサギ 雌20匹	経口投与 (妊娠6~18日) 0、0.1、0.3、1	母動物：0.1 胎児：0.3 母動物：体重増加抑制、血性鼻汁、白色粘性眼漏 胎児：胸骨分節癒合 (催奇形性は認められない)	母動物：0.1 胎児：0.1 母動物：体重増加抑制、臨床症状 胎児：体重減少、骨格変異(投与量1mg/kg 体重/日で認められた) (急性でない) (催奇形性は認められない)	
発生毒性試験② [1986年、GLP] 【JMPR②27、28頁、EPA①24頁、参照14:168頁】	チンチラ ウサギ 雌16匹	強制経口投与 (妊娠6~18日) 0、0.1、0.5、2.5	母動物：0.5 母動物：流延、呼吸困難 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)		母動物：0.5 胎児：2.5 母動物：コリン作用性症状 胎児：影響なし (催奇形性は認められない)

⑤ ニワトリ

試験の概要及び無毒性量等については表 12 に示されている。

表 12 各種毒性試験の概要及び無毒性量等（ニワトリ）

試験	系統・性別・匹数	投与方法・投与量(mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日)及び最小毒性量において認められた毒性所見等		
			JMPR (1997)	EFSA (2019)	EPA (1999)
急性遅発性神経毒性試験① [1985 年、GLP] 【JMPR②30 頁、EFSA②9 頁、参照 14:178 頁】	レグホン種 ニワトリ 雌 30 羽	強制経口投与 (2 回、21 日間隔) 25	(遅発性神経毒性を誘発しない)	(遅発性神経毒性を誘発しない)	
急性遅発性神経毒性試験② [1986 年、GLP] 【EFSA②9 頁、参照 14:180 頁】	レグホン種 ニワトリ 雌 3 羽	強制経口投与 (単回) 25		(遅発性神経毒性を誘発しない)	
急性遅発性神経毒性試験③ [不明、非 GLP] 【JMPR②29 頁、EFSA②9 頁、参照 14:182 頁】	ニワトリ (系統不明) 雌 8 羽	混餌投与 (30 日間) 0、1、3、10、30 ppm 0、2、5、16、26	(遅発性神経毒性を誘発しない)	(遅発性神経毒性を誘発しない)	
急性遅発性神経毒性試験④ [不明、不明] 【JMPR②29 頁】	ニワトリ (系統不明) 雌 10 羽	経口投与 5.0 (3 週間)	(遅発性神経毒性を誘発しない)		
急性遅発性神経毒性試験⑤ [不明、不明] 【EPA①20 頁】	白色 レグホン種 ニワトリ 雌羽数不明	経口投与 (単回) 10			(遅発性神経毒性を誘発しない)

JMPR 及び EFSA では、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験及び 2 年間慢性毒性試験を総合評価し、フェナミホス投与による無毒性量等の最小値は 0.08 mg/kg 体重/日と判断された。1 年間慢性毒性試験について、EFSA では、赤血球 AChE 活性阻害が最小毒性量における有害影響とされたが、JMPR では、赤血球 AChE 活性阻害は、対照群でも認められるとされ、脳 AChE 活性阻害が最小毒性量における有害影響とされた。2 年間慢性毒性試験について、JMPR では、2 ppm 投与群（雄：0.063 mg/kg 体重/日、雌：0.06 mg/kg 体重/日）以

上で血漿 AChE 活性阻害が認められたとされたが、当該所見での無毒性量は設定されなかった。EPA では、1999 年の評価において、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験の最小投与群で血漿 ChE 活性阻害が認められており、当該影響による無毒性量は設定できないとされ、追加で実施された 180 日間試験を基に、フェナミホス投与による無毒性量等の最小値は 0.01 mg/kg 体重/日と判断された。2010 年の評価では、ベンチマークドーズ (BMD) 法を用いて、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験での BMD の信頼区間の下限値 ($BMDL_{10}$) の 0.03 mg/kg 体重/日と判断された。そのほかに、APVMA では、イヌを用いた 2 年間慢性毒性試験での無毒性量 0.014 mg/kg 体重/日を基に ADI が設定されていることを確認した。当該試験において、最小毒性量で認められた毒性所見は血漿 ChE 活性阻害と判断されており、JMPR 及び EFSA とは異なった。また、当該試験のほかに、どのような種類の試験を基に APVMA が評価したかは明確でなかった。

フェナミホスの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量等のうち最小値は、JMPR 及び EFSA では、イヌを用いた急性神経毒性試験の 0.25 mg/kg 体重と判断された。EPA では、BMD 法を用いて、ラットを用いた急性神経毒性試験での $BMDL_{10}$ の 0.11 mg/kg 体重と判断された。そのほかに、APVMA では、イヌを用いた急性神経毒性試験の 0.25 mg/kg 体重を基に ARfD が設定されていることを確認した。当該試験において、最小毒性量で認められた毒性所見は赤血球 ChE 活性阻害と判断されており、JMPR 及び EFSA と同じであった。また、当該試験のほかに、どのような種類の試験を基に APVMA が評価したかは明確でなかった。

(参考)

・ADI 及び ARfD の比較

	JMPR (1997、2002)	EFSA (2019)	EPA (2010)	APVMA (2015) (参考 ²)
ADI (mg/kg 体重/日)	NOAEL : 0.08 1 年間及び 2 年間 慢性毒性試験(イ ヌ) SF : 100 ADI : 0.0008	NOAEL : 0.08 1 年間及び 2 年間 慢性毒性試験(イ ヌ) SF : 100 ADI : 0.0008	$BMDL_{10}$: 0.030 1 年間慢性毒性試 験(イヌ) UF : 100 FQPA SF : 10 cPAD : 0.00003	NOAEL : 0.014 2 年間慢性毒性試 験(イヌ) SF : 100 ADI : 0.0001
ARfD (mg/kg)	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験	$BMDL_{10}$: 0.11 急性神経毒性試験	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験

² APVMA の評価書では、ADI 及び ARfD の根拠試験やその無毒性量の情報に係る記載に限られ、当該試験のほかに、どのような種類の試験を基に APVMA が評価したかは明確でなかったことから、参考情報として記載した。

体重)	(イヌ) SF : 100 ARfD : 0.003	(イヌ) SF : 100 ARfD : 0.0025	(ラット) UF : 100 FQPA SF : 10 aPAD : 0.00011	(イヌ) SF : 100 ARfD : 0.003
-----	----------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

SF : 安全係数、UF : 不確実係数、FQPA SF : 食品品質保護法特別安全係数

5. 遺伝毒性試験

(1) 原体

試験の結果については表 13 に示されている。

表 13 遺伝毒性試験結果概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果	参照	
in vitro	復帰突然変異試験 [1985年、非GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、EPA①26頁、参考 14：94頁】	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537株)	①20～2,500 µg/プレート(+/-S9) ②125～2,000 µg/プレート(+/-S9)	陰性	JMPR (1997) EFSA (2019) EPA (1999)
	DNA修復試験 [不明、不明] 【EPA①26頁】	<i>Bacillus subtilis</i>	—	陰性	EPA (1999)
	遺伝子突然 変異試験 [1984年、非GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、EPA①26頁、参考 14：97頁】	チャイニーズハムス タ一卵巣由来細胞 (CHO-K ₁ -BH ₄) (Hprt 遺伝子)	①100～130 µg/mL(-S9) (5時間処理) ②170～230 µg/mL(+S9) (5時間処理)	陰性	JMPR (1997) EFSA (2019) EPA (1999)
	染色体異常試験① [1987年、GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、参考 14：99頁】	ヒトリンパ球	25～400 µg/mL(+/-S9)	陽性 a、b	JMPR (1997) EFSA (2019)
	染色体異常試験② [1988年、GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、EPA①26頁、参考 14：101頁】	ヒトリンパ球	①25～100 µg/mL(-S9) ②100～350 µg/mL (+S9)	陽性 b、c	JMPR (1997) EFSA (2019)
	UDS試験 [1988年、GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、EPA①26頁、参考 14：104頁】	ラット初代培養肝細胞	1.5～100 µg/mL	陰性	JMPR (1997) EFSA (2019) EPA (1999)
	SCE試験 [1982年、非GLP] 【JMPR②22頁、EFSA②A-14頁、参考 14：103頁】	チャイニーズハムス タ一肺由来細胞 (V79)	①2.5～20.0 µg/mL(-S9) ②10～80 µg/mL(+S9)	陰性	JMPR (1997) EFSA (2019)

試験		対象	処理濃度・投与量	結果	参照
	マウスリン フォーマ TK 試験 [2004 年、GLP] 【EFSA②A-14 頁、参考 14 : 107 頁】	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y TK ^{+/})	①10~200 µg/mL(+/-S9) (3 時間処理) ②5~100 µg/mL(-S9) (24 時間処理)	陰性	EFSA (2019)
in vivo	小核試験 [1996 年、GLP] 【EFSA②A-14 頁、参考 14 : 123 頁】	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雌雄 5 匹)	2.5 mg/kg 体重 ^d (単回腹腔内投与後、16、 24、48 時間後に標本作 成)	陰性	EFSA (2019)
	優性致死試験 [1980 年、非 GLP] 【JMPR②23 頁、 EFSA②A-14 頁、 EPA①26 頁、参考 14 : 126 頁】	NMRI マウス (雄生殖細胞) (一群雄 50 匹)	5 mg/kg 体重 (単回経口投与)	陰性	JMPR (1997) EFSA (2019) EPA (1999)

– : 記載なし、

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

a : 代謝活性化系非存在下 100 µg/mL 及び代謝活性化系存在下 400 µg/mL で有糸分裂指数の有意な増加がみられたが、細胞毒性によるものと考えられた。 (参照 6)

b : 代謝活性化系の有無にかかわらず、細胞毒性のみられる濃度で染色体異常が認められた。
(参照 12)

c : 代謝活性化系存在下 350 µg/mL でのみ有糸分裂指数の有意な増加がみられたが、細胞毒
性によるものと考えられた。 (参照 6)

d : 製剤 (10.25%粒剤) を用いて試験が行われた。

JMPR 及び EFSA では、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験において、細
胞毒性用量で軽度の染色体異常誘発性があることが認められたが、in vivo 小核
試験を含むそのほかの試験では全て陰性であったことから、フェナミホスは生体
において問題となる遺伝毒性はないものと判断された。

(2) 代謝物

試験の結果については表 14 に示されている。

表 14 遺伝毒性試験結果概要 (代謝物)

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果	参照	
代謝物 M09	in vitro	復帰突然 変異試験 [2004 年、 GLP] 【EFSA② A-16 頁、参考 14 : 198 頁】	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 uvrA 株)	①5~5,000 µg/プレ ート(+/-S9) ②50~5,000 µg/ブ レーント(+/-S9)	陰性	EFSA (2019)

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

III. 食品健康影響評価

海外の評価機関（JMPR、EFSA 及び EPA）の作成した評価書等を用いて、農薬「フェナミホス」の食品健康影響評価を実施した。

植物代謝試験の結果、主な代謝物として M01、M02、M09、M12、M12 グルコース抱合体、M13、M13 グルコース等抱合体及び M18 が認められた。

家畜代謝試験の結果、主な代謝物として M01、M02、M08、M11、M12、M13、M15、M16 及び M17 が認められた。

ラットを用いた動物体内動態試験の結果、フェナミホスの吸収は速やかであり、体内に広く分布が認められた。主に尿中に排出され、排泄物中の代謝物として M01、M07、M11、M12、M13、M15、M16、M17 及び M18 硫酸抱合体が認められた。

フェナミホス投与による、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。最小毒性量で認められた主な影響は、赤血球 ChE 活性阻害であった。

農産物及び畜産物中のばく露評価対象物質について、JMPR では、各代謝試験の結果及び分析法においてフェナミホス及び代謝物 M01 の両方が M02 に酸化されることを踏まえ、フェナミホス並びに代謝物 M01 及び M02 と設定された。EFSA では、植物代謝試験において多くの作物で代謝物 M01 及び M02 がフェナミホスより多く主成分として認められること並びに一部の作物で代謝物 M12 及び M13 も多く認められるが、これらの急性毒性はフェナミホスと比較して低いことを踏まえ、農産物中のばく露評価対象物質についてはフェナミホス並びに代謝物 M01 及び M02 と設定されたが、畜産物については設定されなかった。EPA では、ChE 活性阻害を示す代謝物として、農産物中のばく露評価対象物質についてはフェナミホス並びに代謝物 M01 及び M02、畜産物についてはフェナミホス並びに代謝物 M01、M02、M06、脱メチル M07 及び M08 と設定されたが、設定根拠に係る情報は確認できなかった。

各試験で得られた無毒性量等のうち最小値は、JMPR 及び EFSA では、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験及び 2 年間慢性毒性試験の総合評価における無毒性量の 0.08 mg/kg 体重/日と判断された。EPA では、BMD 法を用いて、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験での BMDL₁₀ の 0.03 mg/kg 体重/日と判断された。安全係数については、EPA では ChE 活性阻害の成熟動物及び幼若動物での感受性比較に係るデータの要求がなされており、現在入手可能な試験の範囲では、幼少児の感受性を考慮した追加の安全係数（FQPA 係数：10 倍）が必要と判断された。EFSA では、ラットを用いた発達神経毒性試験結果を含めて評価し、幼若動物での ChE 活性阻害の感受性は成熟動物と比較して高くないと判断され、追加の安全係数は設定されなかった。

また、フェナミホスの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量等のうち最小値は、JMPR 及び EFSA では、イヌを用いた急性神経

毒性試験の 0.25 mg/kg 体重と判断された。EPA では、BMD 法を用いて、ラットを用いた急性神経毒性試験での BMDL₁₀ の 0.11 mg/kg 体重と判断された。安全係数については、EPA では ChE 活性阻害の成熟動物及び幼若動物での感受性比較に係るデータの要求がなされており、現在入手可能な試験の範囲では、幼少児の感受性を考慮した追加の安全係数 (FQPA 係数 : 10 倍) が必要と判断された。EFSA では、ラットを用いた発達神経毒性試験結果を含めて評価し、幼若動物での ChE 活性阻害の感受性は成熟動物と比較して高くないと判断され、追加の安全係数は設定されなかった。

(参考)

・ADI 及び ARfD の比較

	JMPR (1997、2002)	EFSA (2019)	EPA (2010)	APVMA (2015)(参考)
ADI (mg/kg 体重/日)	NOAEL : 0.08 1 年間及び 2 年間 慢性毒性試験(イヌ) SF : 100 ADI : 0.0008	NOAEL : 0.08 1 年間及び 2 年間 慢性毒性試験(イヌ) SF : 100 ADI : 0.0008	BMDL ₁₀ : 0.030 1 年間慢性毒性試 験(イヌ) UF : 100 FQPA SF : 10 cPAD : 0.00003	NOAEL : 0.014 2 年間慢性毒性試 験(イヌ) SF : 100 ADI : 0.0001
ARfD (mg/kg 体重)	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験 (イヌ) SF : 100 ARfD : 0.003	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験 (イヌ) SF : 100 ARfD : 0.0025	BMDL ₁₀ : 0.11 急性神経毒性試験 (ラット) UF : 100 FQPA SF : 10 aPAD : 0.00011	NOAEL : 0.25 急性神経毒性試験 (イヌ) SF : 100 ARfD : 0.003

SF : 安全係数、UF : 不確実係数、FQPA SF : 食品品質保護法特別安全係数

・ばく露評価対象物質の比較

	JMPR(1999)	EFSA(2019)	EPA(2010) ^a
農産物	フェナミホス、 代謝物 M01 及び M02	フェナミホス、 代謝物 M01 及び M02	フェナミホス、 代謝物 M01 及び M02
畜産物	フェナミホス、 代謝物 M01 及び M02	—	フェナミホス、 代謝物 M01、M02、M06、 脱メチル M07 及び M08

— : 記載なし

^a : ばく露評価対象物質の決定に係る記載は確認できなかった。

<別紙1：代謝物/分解物略称>

記号	略称	化学名
M01	Fenamiphos-sulfoxide (FOX、FSO)	ethyl(3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl)isopropylphosphoramide
M02	Fenamiphos-sulfone (FON、FSO ₂)	ethyl(3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)isopropylphosphoramide
M03	RP36117	3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenol
M06	des-isopropyl Fenamiphos (DIF)	ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phosphoramidic acid phenyl ester
M07	des-isopropyl fenamiphos sulfoxide (DIFSO)	ethyl(3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl)phosphoramide
脱メ チル M07	—	ethyl-4-(methylsulfinyl)phenyl phosphoramide
M08	des-isopropyl fenamiphos sulfone (DIFSO ₂)	ethyl(3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)phosphoramide
M09	des-isopropylamino fenamiphos sulfoxide or desamino-fenamiphos sulfoxide (DAFSO)	ethyl(3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl)hydrogen phosphate
M11	Fenamiphos-phenol (FP)	3-methyl-4-(methylthio)phenol
M12	Fenamiphos-sulfoxide-phenol (FOXP、FSOP)	3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenol
M13	Fenamiphos-sulfone-phenol (FONP、FSO ₂ P)	3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenol
M14	Fenamiphos-sulfoneanisole (FANON、FSO ₂ A)	4-methoxy-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene
M15	Fenamiphos-phenol-sulfate (FP-sulfate)	M11 の硫酸抱合体
M16	Fenamiphos-sulfoxide-phenol-sulfate (FSOP-sulfate)	M12 の硫酸抱合体
M17	Fenamiphos-sulfone-phenol-sulfate (FSO ₂ P-sulfate)	M13 の硫酸抱合体
M18	Fenamiphos-sulfone phenol hydroxylated in the 3-methyl group (OH-FSO ₂ P)	5-hydroxy-2-(methylsulfonyl)benzenemethanol

注) 代謝物・分解物はアルファベットで記載

— : 参照した資料に記載がなかった。

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
AChE	アセチルコリンエステラーゼ
ai	有効成分量
aPAD	acute Population Adjusted Dose
APVMA	オーストラリア農薬・動物用医薬品局
AUC	薬物濃度曲線下面積
BMD	ベンチマークドーズ
BMDL ₁₀	ベンチマークドーズの95%信頼区間の下限値
ChE	コリンエステラーゼ
C _{max}	最高濃度
cPAD	chronic Population Adjusted Dose
EFSA	欧州食品安全機関
EPA	米国環境保護庁
FQPA	(米国)食品品質保護法
JMPR	FAO/WHO合同残留農薬専門家会議
LD ₅₀	半数致死量
TAR	総投与(処理)放射能
T _{Cmax/2}	C _{max} の1/2濃度に達した時間
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能

<参考>

1. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号）
2. 食品健康影響評価について（平成 21 年 3 月 24 日付け厚生労働省発食安第 0324006 号）
3. EPA① : Human Health Risk Assessment “Fenamiphos”. (1999)
4. EFSA① : Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance “Fenamiphos”. (2006)
5. JMPR① : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 1997 Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group. p89-94 (1997)
6. JMPR② : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 1997 Evaluations Part II Toxicological & Environmental. on INCHEM (1997)
7. JMPR③ : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 1999 Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group. p87-103 (1999)
8. JMPR④ : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 1999 Evaluations Part I Residues. p235-372 (1999)
9. JMPR⑤ : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 2002 Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group. p135-136 (2002)
10. JMPR⑥ : “Fenamiphos” Pesticide residues in food: 2002 Evaluations Part II Toxicological. on INCHEM (2002)
11. EPA ② : “Fenamiphos” Revised Human Health Risk Assessment for Imported Commodities. (2010)
12. EFSA② : Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance “Fenamiphos”. (2019)
13. APVMA : “Fenamiphos” Review Findings Report and Regulatory Decision. (2015)
14. Renewal Assessment Report prepared according to Regulation (EC) N° 1107/2009 “Fenamiphos” Volume 3 - B.6 (AS). Rev.2 (2018)
15. Draft Renewal Assessment Report prepared according to Regulation (EC) N° 1107/2009 “Fenamiphos” Volume 3 - B.7 (AS). (2017)
16. Draft Assessment Report (DAR) “Fenamiphos” Volume 3 Annex B, B.7 (2005)