

ばく露量算出結果の報告について

令和 8 年 7 月 29 日

推定摂取量の対 ADI 比 ($EDI^{※1}/ADI$ (%))

	農薬名 許容一日摂取量：ADI (mg/kg 体重/日)	国民全体	幼小児 (1～6 歳)	妊婦	高齢者 (65 歳以上)
1	スピロピジオン 0.047	7.1	12.0	5.6	8.8

※ 1 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定一日摂取量。

EDI 試算方法：作物残留試験成績の中央値 (STMR) 等×各食品の平均摂取量

推定摂取量の対 ARfD 比 ($ESTI^{※2}/ARfD$ (%)) の最大値

	農薬名 急性参照用量：ARfD (mg/kg 体重)	一般	幼小児 (1～6 歳)	妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14～50 歳) ^{※3}
1	スピロピジオン 0.3 (一般の集団) 0.1 (妊婦又は妊娠している可能性のある女性)	10 (すいか)	30 (すいか)	30 (すいか)

※ 2 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。

※ 3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量が設定された場合に推定。