

# トリアゾール 共通代謝物

本資料はトリアゾール系農薬の暴露評価対象物質の検討において参考資料として利用するため、現時点で得られている科学的知見のとりまとめを行ったものである。

## 目 次

|                                          | 頁     |
|------------------------------------------|-------|
| ○ 審議の経緯 .....                            | 3     |
| ○ 食品安全委員会委員名簿 .....                      | 3     |
| ○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿 .....             | 3     |
| ○ 要 約 .....                              | 5     |
| <br>I. 検討対象物質の概要 .....                   | <br>6 |
| 1. 一般名 .....                             | 6     |
| 2. 化学名 .....                             | 6     |
| 3. 分子式 .....                             | 6     |
| 4. 分子量 .....                             | 6     |
| 5. 構造式 .....                             | 7     |
| 6. 経緯 .....                              | 7     |
| <br>II. 安全性に係る試験の概要 .....                | <br>8 |
| II-1. 【1, 2, 4-トリアゾール】 .....             | 8     |
| 1. 動物体内運命試験 .....                        | 8     |
| (1) ラット① .....                           | 8     |
| (2) ラット② .....                           | 8     |
| (3) ラット③ .....                           | 9     |
| 2. 急性毒性試験 .....                          | 9     |
| 3. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 .....            | 10    |
| 4. 亜急性毒性試験 .....                         | 10    |
| (1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット） .....              | 10    |
| (2) 90 日間亜急性毒性/神経毒性併合試験（ラット） .....       | 11    |
| (3) 28 日間亜急性毒性試験（マウス） .....              | 12    |
| (4) 90 日間亜急性毒性試験（マウス） .....              | 12    |
| 5. 生殖発生毒性試験 .....                        | 13    |
| (1) 2 世代繁殖試験（ラット） .....                  | 13    |
| (2) 発生毒性試験（ラット） .....                    | 15    |
| (3) 発生毒性試験（ラット） .....                    | 15    |
| (4) 発生毒性試験（ラット） .....                    | 15    |
| (5) 発生毒性試験（ウサギ） .....                    | 15    |
| 6. 遺伝毒性試験 .....                          | 16    |
| 7. その他の試験 .....                          | 16    |
| (1) エストロゲン生合成 .....                      | 16    |
| (2) ラット培養胎児を用いた <i>in vitro</i> 試験 ..... | 16    |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| II-2. 【トリアゾール酢酸】                                         | 17 |
| 1. 動物体内運命試験                                              | 17 |
| (1) ラット①                                                 | 17 |
| (2) ラット②                                                 | 17 |
| 2. 急性毒性試験                                                | 17 |
| 3. 亜急性毒性試験                                               | 18 |
| (1) 14 日間亜急性毒性試験 (ラット)                                   | 18 |
| 4. 遺伝毒性試験                                                | 18 |
| II-3. 【トリアゾールアラニン】                                       | 18 |
| 1. 動物体内運命試験                                              | 19 |
| (1) ラット①                                                 | 19 |
| (2) ラット②                                                 | 19 |
| 2. 急性毒性試験                                                | 19 |
| 3. 亜急性毒性試験                                               | 20 |
| (1) 28 日間亜急性毒性試験 (ラット)                                   | 20 |
| (2) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット)                                   | 20 |
| (3) 2 週間亜急性毒性試験 (ラット) <参考資料>                             | 21 |
| (4) 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ)                                    | 21 |
| 4. 生殖発生毒性試験                                              | 21 |
| (1) 2 世代繁殖試験 (ラット)                                       | 21 |
| (2) 2 世代繁殖試験 (ラット) <参考資料>                                | 21 |
| (3) 発生毒性試験 (ラット)                                         | 22 |
| 5. 遺伝毒性試験                                                | 22 |
| III. 【トリアゾール系化合物】                                        | 23 |
| 1. フルコナゾールの咽頭弓異常誘発に対するレチノイン酸合成阻害剤の作用 ( <i>in vitro</i> ) | 23 |
| 2. タラロゾールのマウス胚及びニワトリ胚の形態形成に対する作用                         | 24 |
| 3. レチノイン酸の形態形成に関する CYP 酵素活性の作用                           | 24 |
| 4. トリアゾール系殺菌剤による形態異常誘発経路                                 | 25 |
| IV. まとめ                                                  | 26 |
| ・ 別紙 1 : 検査値等略称                                          | 31 |
| ・ 参照                                                     | 32 |

### <審議の経緯>

2012 年 2 月 14 日 第 14 回農薬専門調査会評価第一部会  
2012 年 3 月 7 日 第 15 回農薬専門調査会評価第一部会  
2012 年 8 月 24 日 第 85 回農薬専門調査会幹事会  
2012 年 9 月 3 日 第 445 回食品安全委員会（報告）  
2012 年 9 月 4 日 から 10 月 3 日まで 国民からのご意見・情報の募集  
2012 年 10 月 11 日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告  
2012 年 10 月 15 日 第 449 回食品安全委員会（報告）  
2013 年 5 月 31 日 第 93 回農薬専門調査会幹事会  
2013 年 7 月 25 日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告  
2013 年 7 月 29 日 第 483 回食品安全委員会（報告）

### <食品安全委員会委員名簿>

| (2012 年 6 月 30 日まで) | (2012 年 7 月 1 日から) |
|---------------------|--------------------|
| 小泉直子（委員長）           | 熊谷 進（委員長）          |
| 熊谷 進（委員長代理*）        | 佐藤 洋（委員長代理）        |
| 長尾 拓                | 山添 康（委員長代理）        |
| 野村一正                | 三森国敏（委員長代理）        |
| 畑江敬子                | 石井克枝               |
| 廣瀬雅雄                | 上安平洌子              |
| 村田容常                | 村田容常               |

\* : 2011 年 1 月 13 日から

### <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

| (2012 年 3 月 31 日まで) |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 納屋聖人（座長）            | 佐々木有  | 平塚 明   |
| 林 真（座長代理）           | 代田眞理子 | 福井義浩   |
| 相磯成敏                | 高木篤也  | 藤本成明   |
| 赤池昭紀                | 玉井郁巳  | 細川正清   |
| 浅野 哲**              | 田村廣人  | 堀本政夫   |
| 石井康雄                | 津田修治  | 本間正充   |
| 泉 啓介                | 津田洋幸  | 増村健一** |
| 上路雅子                | 長尾哲二  | 松本清司   |
| 臼井健二                | 永田 清  | 柳井徳磨   |
| 太田敏博                | 長野嘉介* | 山崎浩史   |
| 小澤正吾                | 西川秋佳  | 山手丈至   |
| 川合是彰                | 布柴達男  | 與語靖洋   |

川口博明  
桑形麻樹子\*\*\*  
小林裕子  
三枝順三

根岸友恵  
根本信雄  
八田稔久

義澤克彦  
吉田 緑  
若栗 忍

\*：2011年3月1日まで

\*\*：2011年3月1日から

\*\*\*：2011年6月23日から

(2012年4月1日から)

・幹事会

納屋聖人（座長）  
西川秋佳（座長代理）  
赤池昭紀  
上路雅子

三枝順三  
永田 清  
長野嘉介  
本間正充

松本清司  
吉田 緑

・評価第一部会

上路雅子（座長）  
赤池昭紀（座長代理）  
相磯成敏

津田修治  
福井義浩  
堀本政夫

山崎浩史  
義澤克彦  
若栗 忍

・評価第二部会

吉田 緑（座長）  
松本清司（座長代理）  
泉 啓介

桑形麻樹子  
腰岡政二  
根岸友恵

藤本成明  
細川正清  
本間正充

・評価第三部会

三枝順三（座長）  
納屋聖人（座長代理）  
浅野 哲

小野 敦  
佐々木有  
田村廣人

永田 清  
八田稔久  
増村健一

・評価第四部会

西川秋佳（座長）  
長野嘉介（座長代理）  
川口博明

代田眞理子  
玉井郁巳  
根本信雄

森田 健  
山手丈至  
與語靖洋

＜第85回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿＞

小澤正吾

林 真

＜第93回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿＞

小澤正吾

林 真

## 要 約

トリアゾール系農薬の共通代謝物である 1,2,4-トリアゾール(CAS No. 288-88-01)、トリアゾールアラニン(CAS No. 10109-05-4)及びトリアゾール酢酸(CAS No. 28711-29-7)について、JMPR 及び米国が行った評価結果等を検討したところ、食品安全委員会では、参照した資料は十分なものとは言えないが、現時点で得られている科学的知見がまとめられたものであり、トリアゾール系農薬を評価する際の参考資料としては利用可能であると判断した。

検討に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット）、急性毒性（ラット、マウス及びウサギ）、亜急性毒性（イヌ、ラット及びマウス）、2 世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。

試験結果から、1,2,4-トリアゾール投与による影響として、主に精巣（アポトーシス小体、絶対重量減少）、体重増加抑制が認められた。ラットを用いた発生毒性試験において、親動物に体重増加抑制が認められた用量において口蓋裂の発生頻度増加、骨格変異の増加が認められ、ラットを用いた 90 日亜急性毒性/神経毒性併合試験において、振戦、脳絶対重量減少、小脳組織の変性/壊死、末梢神経線維変性等が認められた。遺伝毒性は認められなかった。

トリアゾールアラニン投与による影響として体重増加抑制が認められたが、繁殖に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

トリアゾール酢酸投与においても遺伝毒性は認められなかった。

## I. 検討対象物質の概要

### 1. 一般名

和名：1,2,4-トリアゾール

英名：1,2,4-triazole

和名：トリアゾール酢酸

英名：Triazole acetic acid

和名：トリアゾールアラニン

英名：Triazole alanine

### 2. 化学名

1,2,4-トリアゾール (CAS No. 288-88-01)

IUPAC

和名：1*H*-1,2,4-トリアゾール

英名：1*H*-1,2,4-triazole

トリアゾール酢酸 (CAS No. 28711-29-7)

IUPAC

和名：1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル-酢酸

英名：1*H*-1,2,4-triazole-1-yl-acetic acid

トリアゾールアラニン (CAS No. 10109-05-4)

IUPAC

和名：1,2,4-トリアゾリル-3-アラニン

英名：1,2,4-triazolyl-3-alanine

### 3. 分子式

1,2,4-トリアゾール：C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N<sub>3</sub>

トリアゾール酢酸：C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>

トリアゾールアラニン：C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub>


### 4. 分子量

1,2,4-トリアゾール：69.07

トリアゾール酢酸：127.10

トリアゾールアラニン：172.14

## 5. 構造式



## 6. 経緯

1,2,4-トリアゾール、トリアゾールアラニン及びトリアゾール酢酸は、トリアゾール系農薬の共通代謝物であり、植物及び土壌中で生成される。トリアゾールアラニンは1989年にJMPRにおいて評価され、毒性はないと結論された。

これらの結果を受け、食品安全委員会では、トリアゾールアラニン及びトリアゾール酢酸を毒性上問題ないとしてきたところであるが、1,2,4-トリアゾール、トリアゾールアラニン及びトリアゾール酢酸について、2006年に米国で、2008年にJMPRで評価されADIが設定された。

## II. 安全性に係る試験の概要

### II-1. 【1,2,4-トリアゾール】

JMPR 資料（2008 年）及び米国資料（2006 年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照 1、2）

各種運命試験〔II-1.〕は、トリアゾール環の 3 位及び 5 位の炭素を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの（以下「 $^{14}\text{C}$ -トリアゾール」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は 1,2,4-トリアゾールに換算した。検査値等略称は別紙 1 に示されている。

#### 1. 動物体内運命試験

##### （1）ラット①

SD ラット（一群雌雄各 2 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールを 0.4、48.8、865.7 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 1 に示されている。

1,2,4-トリアゾールは速やかに吸収され、24 時間以内にほとんどが排泄された。吸収率は、尿中排泄率及び組織残留率から少なくとも 80%と推定された。（参照 1）

表 1 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率（%TAR）

| 投与量<br>(mg/kg 体重) | 0.4  |      | 48.8 |      | 865.7 |      |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|
| 性別                | 雄    | 雌    | 雄    | 雌    | 雄     | 雌    |
| 尿                 | 93.5 | 90.6 | 80.0 | 92.4 | 87.6  | 91.9 |
| ケージ洗浄液            | 0.0  | 0.5  | 0.3  | 0.8  | 1.0   | 1.2  |
| 糞                 | 8.7  | 7.4  | 19.9 | 10.4 | 6.5   | 9.2  |
| 組織残留              | 0.8  | 0.6  | 0.8  | 0.9  | 1.6   | 1.3  |
| 排泄合計              | 103  | 99.1 | 101  | 105  | 96.7  | 104  |

##### （2）ラット②

SD ラット（一群雄各 5 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールを 1.0 mg/kg 体重で単回経口投与し、0.1、1、10 若しくは 100 mg/kg 体重で静脈内投与し、動物体内運命試験が実施された。

投与後 48 時間における尿及び糞中排泄率は表 2 に示されている。

経口又は静脈内投与後 30 時間で、約 0.1%TAR が呼気中に排泄された。主要排泄経路は尿中であつた。

静脈内投与 8 時間後に体内残留濃度は 55%TAR に、3 日後に 1.9%TAR に減少した。放射能は体内に均一に分布し、投与 30 分後に筋肉及び肺で最も高く（1.2  $\mu\text{g/g}$ ）、腎脂肪で最も低かった（0.48  $\mu\text{g/g}$ ）。

表 2 投与後 48 時間における尿及び糞中排泄率 (%TAR)

| 投与経路              | 静脈内投与 |      |      |      | 経口投与 |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
| 投与量<br>(mg/kg 体重) | 0.1   | 1    | 10   | 100  | 1    |
| 尿                 | 93.9  | 92.6 | 92.1 | 93.9 | 91.9 |
| 糞                 | 3.9   | 5.0  | 5.0  | 3.6  | 5.4  |
| 排泄合計              | 97.8  | 97.6 | 97.1 | 97.5 | 97.3 |
| 組織残留              | 1.7   | 2.1  | 2.4  | 2.0  | 2.2  |
| 消化管残留             | 0.51  | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |

また、胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雄各 4 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールを 1.0 mg/kg 体重で静脈又は十二指腸内投与し、動物体内運命試験が実施された。

静脈又は十二指腸内投与後 24 時間で胆汁中に約 12%TAR、尿中に 60～65%TAR 及び糞中に 3.5～4%TAR が排泄された。また組織に 14～18%TAR、消化管に 6～9%TAR の残留が認められた。（参照 1）

### （3）ラット③

SD ラット（一群雄 10 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールを 10 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

尿中残留放射能の 95.3%は 1,2,4-トリアゾールであった。（参照 1）

## 2. 急性毒性試験

1,2,4-トリアゾールのラット及マウスを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 3 に示されている。（参照 1、2）

表 3 急性毒性試験概要（原体）

| 投与経路 | 動物種                        | LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重)            |       | 観察された症状                                                        |
|------|----------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|      |                            | 雄                                      | 雌     |                                                                |
| 経口   | SD ラット<br>一群雄 3 匹          | 500<LD <sub>50</sub> <5,000            |       | 5,000 mg/kg 体重投与群で全例死亡                                         |
|      | Wistar ラット<br>一群雌雄各 15 匹   | 1,650                                  | 1,650 | 鎮静、呼吸障害、一般状態の悪化、腹臥位又は側臥位<br>1,250 mg/kg 体重以上投与群で死亡例            |
|      | マウス<br>(性別及び匹数不明)          | 3,650                                  |       | 参照した資料に記載なし                                                    |
|      | ウサギ<br>(性別及び匹数不明)          | 666                                    |       | 参照した資料に記載なし                                                    |
| 経皮   | Wistar ラット<br>一群雌雄各 5～20 匹 | 4,200                                  | 3,130 | 鎮静、呼吸障害、一般状態の悪化、腹臥位又は側臥位<br>2,500 mg/kg 体重以上投与群で死亡例            |
|      | NZW ウサギ<br>一群雄 2 匹         | 200<LD <sub>50</sub> <5,000            |       | 腹式呼吸、透明の鼻汁、黄色い鼻汁、あえぎ、虹彩炎、瀕死、流涎、軟便、振戦<br>2,000 mg/kg 以上投与群で全例死亡 |
| 吸入   | Wistar ラット<br>一群雌雄 5 匹     | LC <sub>50</sub> (mg/ m <sup>3</sup> ) |       | 参照した資料に記載なし                                                    |
|      |                            | 2,050 mg/m <sup>3</sup>                |       |                                                                |
|      | NMRI マウス<br>一群雄 10 匹       | 2,200 mg/m <sup>3</sup>                |       | 参照した資料に記載なし                                                    |

### 3. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

1,2,4-トリアゾールの NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、眼に対して重度の眼刺激性、皮膚に対して軽度の刺激性が認められた。

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Magnusson&Kligman 法）が実施され、結果は陰性であった。（参照 1）

### 4. 亜急性毒性試験

#### （1）90 日間亜急性毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（1,2,4-トリアゾール：0、100、500 及び 2,500 ppm：検体摂取量は表 4 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 4 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 100 ppm | 500 ppm | 2,500 ppm |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 7.8     | 37.9    | 212       |
|                         | 雌 | 10.2    | 54.2    | 267       |

2,500 ppm 投与群の雌雄で痙攣（雌雄各 2 例）及び体重増加抑制、同群雄で小球性低色素性貧血及び肝実質細胞脂肪蓄積が認められたので、無毒性量は雌雄とも 500 ppm（雄：37.9 mg/kg 体重/日、雌：54.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

## （2）90 日間亜急性毒性/神経毒性併合試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌（1,2,4-トリアゾール：0、250、500、3,000 及び 1,000/4,000 ppm<sup>1</sup>：検体摂取量は表 5 参照）投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 5 90 日間亜急性毒性/神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 250 ppm | 500 ppm | 3,000 ppm | 1,000/4000 ppm |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|----------------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 16      | 33      | 183       | 210            |
|                         | 雌 | 19      | 41      | 234       | 275            |

各投与群で認められた毒性所見は表 6 に示されている。

雄の全投与群で TSH の減少が認められたが（500 ppm 以上投与群で有意差あり）、T<sub>3</sub>及び T<sub>4</sub>に投与の影響はなく、甲状腺に病理所見も認められなかったことから、毒性学的意義は低いと考えられた。

本試験において、3,000 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制、振戦、運動量減少、網膜変性、並びに末梢・中枢神経系の病理組織学的変化等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 500 ppm（雄：33 mg/kg 体重/日、雌：41mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

<sup>1</sup> 最初の 4 週間は 1,000 ppm、その後は 4,000 ppm で投与された。

表 6 90 日間亜急性毒性/神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

| 投与群                             | 雄                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 雌                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,000/4,000 ppm<br>3,000 ppm 以上 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体重増加抑制</li> <li>・ TG 及び尿酸減少</li> <li>・ 網膜変性</li> <li>・ 脳絶対重量減少</li> <li>・ 毛づくろいの減少、赤色鼻汁及び染色涙、着色尿、筋攣縮、振戦、歩行失調、オープンフィールドでの活動量減少、立ち上がり行動の減少、立ち直り反射の消失、開脚幅増大</li> <li>・ 運動量及び自発運動量減少</li> <li>・ 末梢神経線維変性（坐骨、腓腹、脛骨、脊髄神経根）</li> <li>・ 小脳組織の変性/壊死</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体重増加抑制</li> <li>・ 網膜変性</li> <li>・ 黄体のう胞 §1</li> <li>・ 脳絶対重量減少 §2</li> <li>・ 毛づくろいの減少、赤色鼻汁及び染色涙、着色尿、筋攣縮、振戦、歩行失調、オープンフィールドでの活動量減少、立ち上がり行動の減少、立ち直り反射の消失、開脚幅増大</li> <li>・ 運動量及び自発運動量減少</li> <li>・ 末梢神経線維変性（坐骨、腓腹、脛骨、脊髄神経根） §1</li> <li>・ 小脳組織の変性/壊死</li> </ul> |
| 500 ppm 以下                      | 毒性所見なし                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 毒性所見なし                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

§1：有意差はないが投与の影響と判断した。

§2：1,000/4,000 ppm 投与群では有意差がないが、投与の影響と判断した。

### （３）28 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（1,2,4-トリアゾール：0、50、250、500 及び 2,000 ppm：検体摂取量は表 7 参照）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 7 28 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm | 2,000 ppm |
|-------------------------|---|--------|---------|---------|-----------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 9      | 47      | 90      | 356       |
|                         | 雌 | 12     | 60      | 120     | 479       |

2,000 ppm 投与群の雄で精巣の変性、精細管萎縮等が認められた。雌では投与に関連した毒性所見は認められず、無毒性量は雄で 500 ppm（90 mg/kg 体重/日）、雌で本試験の最高用量 2,000 ppm（479 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

### （４）90 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌（1,2,4-トリアゾール：0、500、1,000、3,000 及び 6,000 ppm：検体摂取量は表 8 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 8 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 500 ppm | 1,000 ppm | 3,000 ppm | 6,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 80      | 161       | 487       | 988       |
|                         | 雌 | 105     | 215       | 663       | 1,350     |

各投与群で認められた毒性所見は表 9 に示されている。

6,000 ppm 投与群の雌雄で肝臓の P450 活性増加及び UDPGT 活性の僅かな増加、3,000 ppm 以上投与群の雌雄で ECOD、EROD 及び ALD 活性の増加が認められた。

本試験において、3,000 ppm 以上投与群の雄で振戦、脳絶対重量減少、精上皮細胞にアポトーシス様の変化が認められ、6,000 ppm 投与群の雌で振戦、脳絶対重量減少等が認められたので、無毒性量は雄で 1,000 ppm (161 mg/kg 体重/日)、雌で 3,000 ppm (663 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 1）

表 9 90 日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

| 投与群          | 雄                                                                                                                   | 雌                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,000 ppm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・粗毛</li> <li>・体重増加抑制、摂餌量減少</li> <li>・精巣絶対重量減少</li> <li>・プルキンエ細胞減少</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振戦</li> <li>・体重増加抑制</li> <li>・脳絶対重量減少</li> <li>・プルキンエ細胞減少</li> </ul> |
| 3,000 ppm 以上 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振戦</li> <li>・脳絶対重量減少</li> <li>・精巣アポトーシス様小体、精子細胞変性/枯渇、精細管萎縮</li> </ul>       | 3,000 ppm 以下、毒性所見なし                                                                                          |
| 1,000 ppm 以下 | 毒性所見なし                                                                                                              |                                                                                                              |

## 5. 生殖発生毒性試験

### (1) 2 世代繁殖試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（1,2,4-トリアゾール：0、250、500 及び 3,000 ppm<sup>2</sup>：検体摂取量は表 10 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。3,000 ppm 投与群では F<sub>1</sub> 児動物が十分に得られなかったため、F<sub>1</sub> 親世代は 250 及び 500 ppm 投与群のみ試験が行われた。

<sup>2</sup> 授乳期間中の 0~7 日/7~21 日は、被験物質を一定量摂取させるため、全投与群の検体混餌濃度が 139/104、278/207 及び 1,666/1,245 ppm に減じられた。

表 10 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群                     |                   |   | 250 ppm | 500 ppm | 3,000 ppm |
|-------------------------|-------------------|---|---------|---------|-----------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | P 世代              | 雄 | 15.4    | 30.9    | 189       |
|                         |                   | 雌 | 17.5    | 36.2    | 218       |
|                         | F <sub>1</sub> 世代 | 雄 | 16.0    | 32.0    |           |
|                         |                   | 雌 | 18.9    | 37.5    |           |

各投与群で認められた毒性所見は表 11 に示されている。

本試験において、親動物で 250 ppm 投与群の F<sub>1</sub> 雄で体重増加抑制が認められたので、一般毒性に対する無毒性量は親動物で 250 ppm 未満（P 雄：15.4 mg/kg 体重/日未満、P 雌：17.5 mg/kg 体重/日未満、F<sub>1</sub> 雄：16.0 mg/kg 体重/日未満、F<sub>1</sub> 雌：18.9 mg/kg 体重/日未満）、児動物ではいずれの世代においても影響が認められなかったため、無毒性量は本試験の最高用量である 500 ppm（P 雄：30.9 mg/kg 体重/日、P 雌：36.2 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雄：32.0 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雌：37.5 mg/kg 体重/日）であると考えられた。500 ppm 投与群の雄で異常精子増加、雌で黄体数減少、膣開口の遅れが認められたので、繁殖能に対する無毒性量は 250 ppm（P 雄：15.4 mg/kg 体重/日、P 雌：17.5 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雄：16.0 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雌：18.9 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

表 11 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

| 投与群 |            | 親：P、児：F <sub>1</sub>                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | 親：F <sub>1</sub> 、児：F <sub>2</sub>                                         |                                                                          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |            | 雄                                                                                                               | 雌                                                                                                                                                                               | 雄                                                                          | 雌                                                                        |
| 親動物 | 3,000 ppm  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 体重増加抑制</li><li>・ 脳絶対重量減少</li><li>・ 小脳組織の変性/壊死</li><li>・ 精子数減少</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 体重増加抑制</li><li>・ 脳絶対重量減少</li><li>・ 小脳組織の変性/壊死</li><li>・ 受胎率低下</li><li>・ 着床数減少</li><li>・ 卵巣重量増加</li><li>・ 黄体数増加</li><li>・ 子宮拡張</li></ul> |                                                                            |                                                                          |
|     | 500 ppm 以上 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 異常精子増加</li></ul>                                                        | 500 ppm 以下毒性所見なし                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 異常精子増加</li><li>・ 脳絶対重量減少</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 黄体数減少</li><li>・ 膣開口の遅れ</li></ul> |
|     | 250 ppm 以上 | 250 ppm 毒性所見なし                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 体重増加抑制</li></ul>                   | 250 ppm 毒性所見なし                                                           |
| 児動物 | 3,000 ppm  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                          |
|     | 500 ppm 以下 | 毒性所見なし                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 毒性所見なし                                                                     |                                                                          |

／：F<sub>1</sub> 児動物が十分に得られなかったため、試験群を設定せず。

## **(2) 発生毒性試験（ラット）**

Wistar ラット（一群雌 10 匹）の妊娠 7～17 日に強制経口（1,2,4-トリアゾール：0、25 及び 100 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群の母動物及び胎児にも検体投与に関連した毒性所見は認められなかったため、無毒性量は母動物及び胎児で本試験の最高用量 100 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 1）

## **(3) 発生毒性試験（ラット）**

Wistar ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（1,2,4-トリアゾール：0、10、30 及び 100 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。

100 mg/kg 体重/日投与群において、母動物で体重増加抑制、胎児で低体重及び発育不良が認められたため、無毒性量は母動物及び胎児で 30 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1）

## **(4) 発生毒性試験（ラット）**

Wistar ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（1,2,4-トリアゾール：0、100 及び 200 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。

母動物では、100 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制（100 mg/kg 体重/日では有意差なし）が認められた。

胎児では、200 mg/kg 体重/日投与群で、腹当たりの生存胎児数減少、100 mg/kg 体重/日以上投与群で胎児体重及び胎盤重量減少が認められた。また、200 mg/kg 体重/日投与群で口蓋裂及び後肢奇形の発生頻度増加、100 mg/kg 体重/日で骨格変異が増加した。

本試験における無毒性量は、母動物、胎児とも 100 mg/kg 体重/日未満と考えられた。（参照 1）

## **(5) 発生毒性試験（ウサギ）**

NZW ウサギ（一群雌 25 匹）の妊娠 6～28 日に強制経口（1,2,4-トリアゾール：0、5、15、30 及び 45 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。

45 mg/kg 体重/日投与群の母動物では、妊娠 7 日から摂餌量減少及び体重増加抑制が認められた 5 例は妊娠 16～24 日に切迫と殺された。また、同投与群では妊娠子宮重量減少、自発運動量低下、眼瞼下垂、糞量の減少、軟便、液状便、鼻汁及び流涎が認められた。

胎児では、45 mg/kg 体重/日投与群で低体重及び尿路奇形（腎小型化、腎欠損及び輸尿管欠損）が認められた。

本試験における無毒性量は、母動物、胎児とも 30 mg/kg 体重/日と考えられた。（参照 1）

## 6. 遺伝毒性試験

1,2,4-トリアゾールの細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞を用いた遺伝子突然変異試験（*Hgprt* 遺伝子）、ラットリンパ球細胞を用いた染色体異常試験が実施された。

結果は表 12 に示されているとおり、すべて陰性であった。（参照 1）

表 12 遺伝毒性試験概要

| 試験              |           | 対象                                                         | 処理濃度・投与量                                          | 結果 |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| <i>in vitro</i> | 復帰突然変異試験  | <i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535 TA1537 株) | 10~5,000 $\mu\text{g}/7^\circ\text{レ}$ ト (+/-S9)  | 陰性 |
|                 |           | <i>S.typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535 TA1537 株)          | 100~7,500 $\mu\text{g}/7^\circ\text{レ}$ ト (+/-S9) | 陰性 |
|                 | 遺伝子突然変異試験 | チャイニーズハムスター卵巣由来細胞 ( <i>Hgprt</i> 遺伝子)                      | 43.2~691 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (+/-S9)          | 陰性 |
|                 | 染色体異常試験   | ラットリンパ球細胞                                                  | 10.8~691 $\mu\text{g}/\text{mL}$                  | 陰性 |

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

## 7. その他の試験

### (1) エストロゲン生合成

1,2,4-トリアゾールのエストロゲン生合成に対する影響を検討するため、ラット顆粒膜細胞に 1,2,4-トリアゾールを  $10^{-5}$  mol/L で添加し、 $37^\circ\text{C}$  で 48 時間培養後、エストラジオール及びプロゲステロンが測定された。

その結果、1,2,4-トリアゾールはアロマターゼ活性阻害を示さなかった。（参照 1）

### (2) ラット培養胎児を用いた *in vitro* 試験

ラットの培養胎児（9.5 日齢）に 1,2,4-トリアゾールを 500 又は 5,000  $\mu\text{mol}/\text{L}$  で処理し、*in vitro* で発生毒性が検討された。

処理 48 時間後に、卵黄嚢の直径、頭臀長、頭長及び体節数の測定並びに Brown 及び Fabio の方法による形態スコアリングが実施され、5,000  $\mu\text{mol}/\text{L}$  処理群において、卵黄嚢径、頭臀長、体節数及び総スコアが有意に減少した。胎児の DNA 及びタンパク質含量に影響は認められなかった。

本試験において 5,000  $\mu\text{mol}/\text{L}$  処理群で軽度な発達遅延が認められた。（参照 1）

## II-2. 【トリアゾール酢酸】

JMPR 資料（2008 年）及び米国資料（2006 年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照 2）

各種運命試験 [II-2.] は、トリアゾール環を  $^{14}\text{C}$  で標識したもの（以下「 $^{14}\text{C}$ -トリアゾール酢酸」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合はトリアゾール酢酸に換算した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

### 1. 動物体内運命試験

#### (1) ラット①

SD ラット（一群雌雄各 2 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾール酢酸を 0.58、58.6 及び 1,030 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

トリアゾール酢酸は速やかに吸収され、24 時間以内にほとんどが排泄された。主要排泄経路は尿中で、投与後 168 時間で尿中に 87.3～103.7%TAR、糞中に 1.2～7.4%TAR が排泄され、組織中に 0.8～3.1%TAR の残留が認められた。排泄パターンに性差は認められなかった。投与後 168 時間の尿中排泄率から、ほぼ全量が吸収されたと考えられた。（参照 1）

#### (2) ラット②

ラット（一群雌雄各 2 匹）に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾール酢酸を 0.58、58.6 及び 1,030 mg/kg 体重で単回経口投与し（詳細不明）、尿中代謝物の同定・定量試験が実施された。

経口投与されたトリアゾール酢酸は、用量及び性別に関係なく 24 時間以内に尿中に排泄された。尿中の主要成分はトリアゾール酢酸であった。（参照 1）

### 2. 急性毒性試験

トリアゾール酢酸のラットを用いた急性毒性試験が実施された。

結果は表 13 に示されている。（参照 1）

表 13 急性毒性試験概要（トリアゾール酢酸）

| 投与経路 | 動物種                 | LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重) |        | 観察された症状                        |
|------|---------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|      |                     | 雄                           | 雌      |                                |
| 経口   | SD ラット<br>一群雌雄各 3 匹 | >5,000                      | >5,000 | 呼吸困難、眼球突出、立毛、<br>背彎姿勢<br>死亡例なし |

### 3. 亜急性毒性試験

#### (1) 14 日間亜急性毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（トリアゾール酢酸：0、100、1,000 及び 8,000 ppm：検体摂取量は表 14 参照）投与による 14 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 14 14 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 100 ppm | 1,000 ppm | 8,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 10.6    | 103       | 788       |
|                         | 雌 | 10.1    | 97.2      | 704       |

いずれの投与群でも投与による影響は認められなかったため、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm（雄：788 mg/kg 体重/日、雌：704 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

### 4. 遺伝毒性試験

トリアゾール酢酸の細菌を用いた復帰突然変異試験、マウスリンパ腫細胞を用いた前進突然変異試験及びヒトリンパ球細胞を用いた染色体異常試験が実施された。結果は表 15 に示されているとおり、すべて陰性であった。（参照 1）

表 15 遺伝毒性試験概要

| 試験              |           | 対象                                                                                                               | 処理濃度・投与量                  | 結果 |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| <i>in vitro</i> | 復帰突然変異試験  | <i>S. typhimurium</i><br>(TA98、TA100、TA1535<br>TA1537 株)<br><i>Escherichia coli</i><br>(WP2P、WP2P <i>uvrA</i> 株) | 20~5,120 µg/プレート          | 陰性 |
|                 | 遺伝子突然変異試験 | マウスリンパ腫細胞 (L5178Y)                                                                                               | 0.0801~1.27 mg/mL (+/-S9) | 陰性 |
|                 | 染色体異常試験   | ヒトリンパ球細胞                                                                                                         | 0.318~1.27 mg/mL (+/-S9)  | 陰性 |

注) +/- S9：代謝活性化系存在下及び非存在下

### II-3. 【トリアゾールアラニン】

JMPR 資料（2008 年）及び米国資料（2006 年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照 2）

各種運命試験〔II-3.〕は、トリアゾール環の 3 位及び 5 位の炭素を <sup>14</sup>C で標識したもの（以下「<sup>14</sup>C-トリアゾールアラニン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合はトリアゾールアラニンに換算し

た。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

## 1. 動物体内運命試験

### (1) ラット①

SD ラット(一群雌雄各 4 匹)に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールアラニンを 0.5 及び 50 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

投与後 24 時間でほとんど(雄: 96.1~97.7%TAR、雌: 92.0~99.0%TAR)が尿中に排泄された。投与後 168 時間の糞中排泄率は 3~7%TAR、呼気中への排泄は 0.5%TAR 未満であった。0.5 mg/kg 体重投与群では、投与後 168 時間で組織への残留は認められず、50 mg/kg 体重投与群では、主に肝臓、腎臓及び血液中に 0.022  $\mu\text{g/g}$  以下認められた。尿中の主要成分は未変化のトリアゾールアラニンで 86%TAR 認められた。また尿中に 2 種類の代謝物が検出され、それぞれ回収放射能の 72~86 及び 8~19%であった。

また、本試験で得られた排泄物を用いて排泄物中の代謝物同定・定量試験が実施された。

尿中代謝物の 69~89%TAR 及び糞中の 1~2%TAR はトリアゾールアラニンであり、尿中の 8~19%TAR 及び糞中の 1%未満はアセチル誘導体 (*N*-acetyl-D,L-triazole alanine) であった。(参照 1)

### (2) ラット②

SD ラット(一群雌雄各 2 匹)に  $^{14}\text{C}$ -トリアゾールアラニンを 0.56、54.4 及び 993.7 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

主要排泄経路は尿中で、投与後 48 時間で尿中に 87.4~97.4%TAR 排泄され、糞中には投与後 168 時間で 6~18%TAR 排泄された。投与 168 時間後の組織残留濃度は低かった。

また、本試験で得られた排泄物を用いて尿中の代謝物同定・定量試験が実施された。

尿中代謝物の 82~93%TAR 及び糞中の 1~2%TAR はトリアゾールアラニンであり、13~30%TAR はアセチル誘導体 (*N*-acetyl-D,L-triazole alanine) であった。(参照 1)

## 2. 急性毒性試験

トリアゾールアラニンのラット及マウスを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 16 に示されている。(参照 1)

表 16 急性毒性試験概要(原体)

| 投与経路 | 動物種 | LD <sub>50</sub> (mg/kg 体重) |   | 観察された症状 |
|------|-----|-----------------------------|---|---------|
|      |     | 雄                           | 雌 |         |

|    |                          |        |        |                          |
|----|--------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 経口 | Wistar ラット<br>一群雌雄各 10 匹 | >5,000 | >5,000 | 立毛、頻尿、呼吸切迫、運動失調<br>死亡例なし |
|    | Wistar ラット<br>一群雌雄各 5 匹  | >2,000 | >2,000 | 症状及び死亡例なし                |
|    | NMRI マウス<br>一群雌雄各 5 匹    | >5,000 | >5,000 | 症状及び死亡例なし                |

### 3. 亜急性毒性試験

#### (1) 28 日間亜急性毒性試験（ラット）

Bor:WISW 系ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いた強制経口（トリアゾールアラニン：0、25、100 及び 400 mg/kg 体重/日）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。一群各 10 匹は 28 日間の回復試験に用いられた。

400 mg/kg 体重/日投与群の雄で血中尿素及び Cre の減少並びに尿濃度の低下が認められたが、腎臓の病理組織学的検査及び他の血液生化学値に変化は認められなかったことから毒性所見とは考えられなかった。また、400 mg/kg 体重/日投与群の雌で肝絶対及び比重量<sup>3</sup>増加が認められたが、病理組織学的検査及び血液生化学値に変化は認められなかったことから、毒性所見とは考えられなかった。

投与に関連した毒性所見は認められなかったので、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 400 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1）

#### (2) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）

Bor:WISW 系ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌（トリアゾールアラニン：0、1,250、5,000 及び 20,000 ppm：検体摂取量は表 17 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 17 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 1,250 ppm | 5,000 ppm | 20,000 ppm |
|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 90        | 370       | 1,510      |
|                         | 雌 | 160       | 400       | 1,680      |

20,000 ppm 投与群の雄で TG、Bil 及び血中尿素濃度が、また、5,000 ppm 以上投与群の雌で TG が有意に減少したが、変化の程度が小さいこと、一過性のものであったこと及び体重増加抑制に起因するものであったことから、毒性所見とは考えられなかった。

本試験において、20,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制が認められ、雌では投与に関連した毒性所見は認められなかったので、無毒性量は雄で 5,000 ppm

<sup>3</sup> 体重比重量を比重量という。

(370 mg/kg 体重/日)、雌で本試験の最高用量 20,000 ppm (1,680 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 1)

### (3) 2 週間亜急性毒性試験 (ラット) <参考資料<sup>4</sup>>

Bor:WISW 系ラット (一群雄 10 匹) を用いた飲水 (トリアゾールアラニン: 0、3,000 及び 10,000 ppm: それぞれ 0、448 及び 1,490 mg/kg 体重/日に相当) 投与による 2 週間亜急性毒性試験が実施された。

投与に関連した毒性所見は認められなかったため、無毒性量は本試験の最高用量である 10,000 ppm (1,490 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 1)

### (4) 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ)

ビーグル犬 (一群雌雄各 4 匹) を用いた混餌 (トリアゾールアラニン: 0、3,200、8,000 及び 20,000 ppm: 検体摂取量は表 18 参照) 投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

20,000 ppm 投与群の雌で体重増加抑制が認められ、雄では投与に関連した毒性所見は認められなかったため、無毒性量は雄で本試験の最高用量である 20,000 ppm (850 mg/kg 体重/日)、雌で 8,000 ppm (345 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 1)

表 18 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ) の平均検体摂取量

| 投与群                     |   | 3,200 ppm | 8,000 ppm | 20,000 ppm |
|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量<br>(mg/kg 体重/日) | 雄 | 144       | 322       | 850        |
|                         | 雌 | 150       | 345       | 902        |

## 4. 生殖発生毒性試験

### (1) 2 世代繁殖試験 (ラット)

Wistar ラット (一群雄各 15 匹、雌 30 匹) を用いた混餌 (トリアゾールアラニン: 0、500、2,000 及び 10,000 ppm) 投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

親動物では投与に関連した毒性所見は認められなかった。児動物では、10,000 ppm 投与群の F<sub>1a</sub> で体重増加抑制及び同腹児重量減少、F<sub>2b</sub> で同腹児重量の減少が認められたため、無毒性量は親動物で雌雄とも本試験の最高用量である 10,000 ppm (929 mg/kg 体重/日)、児動物で 2,000 ppm (192 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照 1)

### (2) 2 世代繁殖試験 (ラット) <参考資料<sup>5</sup>>

Wistar ラット (一群雄各 6 匹、雌 12 匹) を用いた混餌 (トリアゾールアラニ

<sup>4</sup> 本試験は用量設定のための試験であり、投与期間も 2 週間と短いことから参考資料とした。

<sup>5</sup> 本試験は動物数が少ないため、参考資料とした。

ン：0、150、625、2,500 及び 10,000 ppm）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

親動物では投与に関連した毒性所見は認められなかった。10,000 ppm 投与群の児動物で低体重が認められ、同群では交尾所要日数の延長が認められたので、無毒性量は親動物で雌雄とも本試験の最高用量である 10,000 ppm（1,000 mg/kg 体重/日<sup>6</sup>）、児動物で 2,500 ppm（250 mg/kg 体重/日）、繁殖能に対して 2,500 ppm（250 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1）

### （3）発生毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 7～16 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。

母動物では投与に関連した毒性所見は認められなかった。胎児では、1,000 mg/kg 体重/日投与群で第 7 頸椎横突起骨化遅延及び第 13 胸椎骨化遅延、300 mg/kg 体重/日以上投与群で歯状突起の骨化遅延が認められた。

本試験における無毒性量は母動物で本試験の最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日、胎児で 100 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 1）

## 5. 遺伝毒性試験

トリアゾールアラニンの細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター細胞（V79）を用いた遺伝子突然変異試験、マウス線維芽細胞（BALB/3T3）を用いた細胞形質転換試験、マウス及びチャイニーズハムスターを用いた小核試験が実施された。

結果は表 19 に示されているとおり、すべて陰性であった。（参照 2）

表 19 遺伝毒性試験概要

| 試験       |          | 対象                                                                       | 処理濃度・投与量                   | 結果 |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| in vitro | DNA 修復試験 | <i>E. coli</i><br>(pol A <sup>+</sup> 、pol A <sub>1</sub> <sup>-</sup> ) | 62.5～1,000 µg/プレート (+/-S9) | 陰性 |
|          |          | <i>Bacillus subtilis</i><br>(H17、M45 株)                                  | 20～1,000 µg/ディスク (+/-S9)   | 陰性 |
|          |          | ラット肝細胞                                                                   | 80～10,000 µg/mL (+/-S9)    | 陰性 |
|          | 復帰突然変異試験 | <i>S. typhimurium</i><br>(TA98、TA100、TA102、TA1535、TA1537 株)              | 20～5,000 µg/プレート (+/-S9)   | 陰性 |

<sup>6</sup> 文献に基づく平均値から求めた検体摂取量（参照 3）。以下同じ

| 試験             |               | 対象                                                                                                             | 処理濃度・投与量                             | 結果 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
|                |               | <i>S. typhimurium</i><br>(TA98、TA100、TA1535<br>TA1537 株)<br><i>Escherichia coli</i><br>(WP2 <sub>uvrA</sub> 株) | 313~5,000 μg/プレート (+/-S9)            | 陰性 |
|                |               | <i>S. typhimurium</i><br>(TA98、TA100、TA1535<br>TA1537 株、TA1538 株)                                              | 20~12,500 μg/プレート (+/-S9)            | 陰性 |
|                | 遺伝子突然<br>変異試験 | チャイニーズハムスター細胞 (V79)                                                                                            | 500~10,000 μg/0.1mL in water (+/-S9) | 陰性 |
|                | 遺伝子突然<br>変異試験 | チャイニーズハムスター細胞 (CHO)                                                                                            | 500~10,000 μg/mL (+/-S9)             | 陰性 |
|                | 細胞形質転<br>換試験  | マウス線維芽細胞 (BALB/3T3)                                                                                            | 62.5~1,000 μg/mL (+/-S9)             | 陰性 |
| <i>in vivo</i> | 小核試験          | NMRI マウス (匹数不明)                                                                                                | 8,000 mg/kg 体重 (単回経口投与)              | 陰性 |
|                |               | CBC F1 マウス (匹数不明)                                                                                              | 2,500、5,000 mg/kg 体重 (腹腔内投与)         | 陰性 |
|                |               | チャイニーズハムスター (匹数不明)                                                                                             | 5,000 mg/kg 体重 (単回経口投与)              | 陰性 |

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

### Ⅲ. 【トリアゾール系化合物】

公表文献を基に、トリアゾール系化合物の生殖発生毒性に関して得られた情報を整理した。(参照 4~7)

#### 1. フルコナゾールの咽頭弓異常誘発に対するレチノイン酸合成阻害剤の作用 (*in vitro*)

SD ラットの培養胚 (9.5 日齢 ; 胚形成期 (1~3 体節)) にフルコナゾールを 125 µM 若しくはシトラールを 200 µM の濃度で、又は同濃度のフルコナゾール及びシトラールを併用で処理し、*in vitro* で催奇形性が検討された。

処理 48 時間後に、卵黄囊の直径、頭臀長、頭長及び体節数の測定並びに奇形の発生状況が観察された。シトラール処理群の発達の程度は対照群と同様であった。フルコナゾール処理群では頭臀長の有意な減少が認められた。フルコナゾール及びシトラールの併用処理群では、体節数の有意な減少が認められ、フルコナゾール単独処理群で認められた頭臀長の減少に対する影響はなかった。

また、培養胎児における異常の発生率は、対照群及びシトラール処理群でそれぞれ 2.7% 及び 0.0% であったのに対して、フルコナゾール処理群では 72% であった。

フルコナゾールにおける異常は主に第一及び第二咽頭弓に認められた。フルコナゾール及びシトラールの併用処理群では、フルコナゾール単独処理群で認められた異常胎児と咽頭弓の異常の発生率が減少したが、頭部と心臓異常の発生率は変化しなかった。

処理 60 時間後に脳神経の免疫染色が行われ、フルコナゾール処理群では、神経組織変化が認められたが、フルコナゾール及びシトラールの併用処理群では対照群と同等であった。（参照 4）

## 2. タラロゾールのマウス胚及びニワトリ胚の形態形成に対する作用

トリアゾール系化合物であるタラロゾール（CYP26 阻害剤）を用いてマウス胚及びニワトリ胚の形態形成に対する作用が検討されている。野生型と *Tbx1* 欠損型のマウス胚（9.5 日齢）を用いたリアルタイム PCR の結果、*Tbx1* 欠損型の *CYP26b1* 及び *CYP26c1* の発現量は野生型に比べて減少した。また、咽頭胚（9.5～10.5 日齢）を用いた *CYP26a1*、*CYP26b1* 及び *CYP26c1* の *in situ* ハイブリダイゼーション分析においても、*Tbx1* 欠損型の *CYP26a1*、*CYP26b1* 及び *CYP26c1* の発現は野生型に対して減少した。

タラロゾールを処理後、24～48 時間培養されたニワトリ胚（ステージ 10 又は 14）では、頭間充織の欠損、小耳胞、尾部そのもの及び咽頭弓の欠損、前脳組織欠損、心臓循環異常、心臓周囲浮腫等が認められた。これらの異常の多くは *Tbx1* 欠損型のマウス及び過剰なレチノイン酸で処理された胚で表現型模写された。

タラロゾール処理した胚において、レチノイン酸合成酵素の *Raldh2* の発現量が上昇した。また、レチノイン酸処理した胚において、内胚葉及び中胚葉の *Hoxb1* の発現が誘発された。

*Tbx1* 欠損マウスにおける CYP26 酵素の特異的な阻害の結果から、レチノイン酸によって調節される形態発生の異常調節は、*Tbx1* の機能表現型の損失に寄与するとの仮説が支持された。（参照 5）

## 3. レチノイン酸の形態形成に関する CYP 酵素活性の作用

C57BL/6J マウスの妊娠 9 日にレチノイン酸酢酸を強制経口（0、10、25、50 及び 100 mg/kg 体重/日；それぞれ 0、29,000、72,500、145,000 及び 290,000 IU/kg 体重/日に相当）投与し、1、2、4、6、12 及び 24 時間後に胚及び血漿を採取、若しくは妊娠 18 日にと殺して胎児を摘出し、頭蓋骨及び胸腺組織が採取された。

頭蓋顔面欠損は 25 mg/kg 体重/日以上投与群で認められ、用量に相関して異常の程度が増加し、下顎及び口蓋突起の低形成が有意に増加した。心臓の異常は 25 mg/kg 体重/日以上投与群で認められたが、各用量とも異常胎児の発生率が約 25% で、用量相関性は確認できなかった。50 mg/kg 体重/日以上投与群で小縦隔遺残が、100 mg/kg 体重/日投与群で無胸腺、又は単葉及び胸腺の低形成が認められた。（参照 6）

#### 4. トリアゾール系殺菌剤による形態異常誘発経路

トリアゾール系化合物はげっ歯類の *in vitro* 培養胚に対して催奇形性作用があり、抗真菌性のトリアゾール化合物の催奇形性作用は胚の CYP 阻害に関連し、誘発経路は、外因性の *trans*-レチノイン酸暴露によるものと同様であると考えられた。観察された異常がレチノイン酸の暴露によるものと極めて類似していたことから、レチノイン酸の代謝に関与する特定の CYP26 酵素活性がトリアゾール化合物により変化し、レチノイン酸による形態形成過程に間接的に影響したものと考えられた。  
(参照 7)

#### IV. まとめ

参照に挙げた資料を用いて、トリアゾール系農薬の共通代謝物である「1,2,4-トリアゾール、トリアゾールアラニン及びトリアゾール酢酸」について Jmpr 及び米国が行った評価結果等を検討したところ、食品安全委員会では、参照した資料は十分なものとは言えないが、現時点で得られている科学的知見がまとめられたものであり、トリアゾール系農薬を評価する際の参考資料としては利用可能であると判断した。

<sup>14</sup>C で標識した 1,2,4-トリアゾール、トリアゾール酢酸及びトリアゾールアラニンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与された 1,2,4-トリアゾール、トリアゾール酢酸及びトリアゾールアラニンは速やかに吸収され、24 時間以内にほとんどが排泄された。主要な排泄経路は尿中で、吸収率は少なくとも 80%TAR と推定された。

各種試験結果から、1,2,4-トリアゾール投与による影響として、主に精巣（アポトーシス小体、絶対重量減少）、体重増加抑制が認められた。ラットを用いた発生毒性試験において、親動物に体重増加抑制が認められた用量において口蓋裂の発生頻度増加、骨格変異の増加が認められ、ラットを用いた 90 日亜急性毒性/神経毒性併合試験において、振戦、脳絶対重量減少、小脳組織の変性/壊死、末梢神経線維変性等が認められた。遺伝毒性は認められなかった。

トリアゾールアラニン投与による影響として体重増加抑制が認められたが、繁殖に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

トリアゾール酢酸投与においては、得られた情報からは遺伝毒性も含め、影響は認められなかった。

各評価機関の評価結果及び各試験における無毒性量等は表 20 に示されている。

表 20 各試験における無毒性量 (1, 2, 4-トリアゾール)

| 動物種 | 試験                         | 投与量<br>(mg/kg 体重/日)                                                                                                                | 無毒性量(mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup>                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                               |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                                                                                    | JMPR                                                                                                                          | EPA                                                                | 食品安全委員会                                                                                                                       |
| ラット | 90 日間<br>亜急性<br>毒性試験       | 0、100、500、<br>2,500 ppm                                                                                                            | 雄：37.9<br>雌：54.2                                                                                                              | 雌雄：38                                                              | 雄：37.9<br>雌：54.2                                                                                                              |
|     |                            | 雄：0、7.8、37.9、<br>212<br>雌：0、10.2、<br>54.2、267                                                                                      | 雌雄：体重増加抑制<br>等                                                                                                                | 雌雄：体重増加抑制<br>等                                                     | 雌雄：体重増加抑制<br>等                                                                                                                |
|     | 90 日間<br>亜急性<br>神経毒<br>性試験 | 0、250、500、<br>3,000、<br>1,000/4,000<br>ppm                                                                                         | 雄：33<br>雌：41                                                                                                                  | 雌雄：16                                                              | 雄：33<br>雌：41                                                                                                                  |
|     |                            | 雄：0、16、33、<br>183、210<br>雌：0、19、41、<br>234、276                                                                                     | 雌雄：体重増加抑制<br>等                                                                                                                | 雌雄：TSH 減少等                                                         | 雌雄：体重増加抑制<br>等                                                                                                                |
|     | 2 世代<br>繁殖試験               | 0、250、500、<br>3,000 ppm*                                                                                                           | 親動物<br>P 雄：—<br>P 雌：—                                                                                                         | 親動物<br>雌雄：—                                                        | 親動物<br>P 雄：—<br>P 雌：—                                                                                                         |
|     |                            | P 雄：0、15.4、<br>30.9、<br>189<br>P 雌：0、17.5、<br>36.2、<br>218<br>F <sub>1</sub> 雄：0、16.0、<br>32.0<br>F <sub>1</sub> 雌：0、18.9、<br>37.5 | F <sub>1</sub> 雄：—<br>F <sub>1</sub> 雌：—<br><br>児動物<br>P 雄：30.9<br>P 雌：36.2<br>F <sub>1</sub> 雄：32.0<br>F <sub>1</sub> 雌：37.5 | 児動物<br>雌雄：19<br><br>繁殖能：15<br><br>親動物<br>雌雄：体重増加抑<br>制、脾臓重量減<br>少等 | F <sub>1</sub> 雄：—<br>F <sub>1</sub> 雌：—<br><br>児動物<br>P 雄：30.9<br>P 雌：36.2<br>F <sub>1</sub> 雄：32.0<br>F <sub>1</sub> 雌：37.5 |
|     |                            |                                                                                                                                    | 親動物<br>雄：異常精子増加<br>雌：黄体数減少                                                                                                    | 児動物：体重減少、<br>脾臓重量<br>減少等                                           | 親動物<br>雄：異常精子増加<br>雌：黄体数減少                                                                                                    |
|     |                            |                                                                                                                                    | 児動物：<br>毒性所見なし                                                                                                                | 繁殖能：異常精子                                                           | 児動物：<br>毒性所見なし                                                                                                                |
|     | 発 生 毒<br>性<br>試験           | 0、25、100                                                                                                                           | 母動物、胎児：100                                                                                                                    |                                                                    | 母動物、胎児：100                                                                                                                    |
|     |                            |                                                                                                                                    | 母動物、胎児：<br>毒性所見なし<br><br>(催奇形性は認めら<br>れない)                                                                                    |                                                                    | 母動物、胎児：<br>毒性所見なし<br><br>(催奇形性は認めら<br>れない)                                                                                    |

| 動物種 | 試験                         | 投与量<br>(mg/kg 体重/日)                                                                           | 無毒性量(mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup>                                   |                                                          |                                                                  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                                               | JMPR                                                             | EPA                                                      | 食品安全委員会                                                          |
|     | 発 生 毒<br>性試験               | 0、10、30、100                                                                                   | 母動物、胎児：30<br><br>母動物：<br>体重増加抑制<br>胎児：低体重<br><br>(催奇形性は認められない)   | 母動物：30<br>胎児：30<br><br>母動物：<br>体重増加抑制等<br>胎児：<br>胎児体重減少等 | 母動物、胎児：30<br><br>母動物：<br>体重増加抑制<br>胎児：低体重<br><br>(催奇形性は認められない)   |
|     | 発 生 毒<br>性試験               | 0、100、200                                                                                     | 母動物、胎児：－<br><br>母動物：<br>体重増加抑制<br>胎児：<br>胎児体重減少                  |                                                          | 母動物、胎児：－<br><br>母動物：<br>体重増加抑制<br>胎児：<br>胎児体重減少                  |
| マウス | 28 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 0、50、250、500<br>2,000 ppm<br>雄：0、9、47、<br>90、356<br>雌：0、12、60、<br>120、479                     | 雄：90<br>雌：479<br><br>雄：精巣変性<br>雌：毒性所見なし                          | 雌雄：90<br><br>雌雄：精巣変性                                     | 雄：90<br>雌：479<br><br>雄：精巣変性<br>雌：毒性所見なし                          |
|     | 90 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 0、500、1,000、<br>3,000、6,000<br>ppm<br>雄：0、80、161、<br>487、988<br>雌：0、105、<br>215、663、<br>1,350 | 雄：161<br>雌：633<br><br>雌雄：<br>脳絶対重量減少                             | 雌雄：80<br><br>雌雄：<br>精巣重量減少等                              | 雄：161<br>雌：663<br><br>雌雄：<br>脳絶対重量減少                             |
| ウサギ | 発 生 毒<br>性<br>試験①          | 0、5、15、30、45                                                                                  | 母動物：30<br>胎児：30<br><br>母動物：瀕死、体重<br>増加抑制等<br>胎児：胎児体重減<br>少、尿路奇形等 | 母動物：30<br>胎児：30<br><br>母動物：瀕死、臨床<br>症状<br>胎児：胎児体重減少      | 母動物：30<br>胎児：30<br><br>母動物：瀕死、体重<br>増加抑制等<br>胎児：胎児体重減<br>少、尿路奇形等 |

1)：最小毒性量で認められた毒性所見を記した。

－：無毒性量は設定できなかった。

\*：3,000 ppm 投与群では F<sub>1</sub> 児動物が十分に得られなかったため、F<sub>1</sub> 親は 250 及び 500 ppm 投与群のみ試験を実施した。

表 20 各試験における無毒性量（トリアゾールアラニン及びトリアゾール酢酸）

|                        | 動物種 | 試験                         | 投与量<br>(mg/kg 体重/日)                                                                                  | 無毒性量(mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup>                                                |                                                                               |                                                                               |
|------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                            |                                                                                                      | JMPR                                                                          | EPA                                                                           | 食品安全委員会                                                                       |
| トリア<br>ゾール<br>アラニ<br>ン | ラット | 28 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 雌雄：25、100、<br>400                                                                                    | 雌雄：400<br><br>雌雄：毒性所見なし                                                       | 雌雄：400<br><br>雌雄：毒性所見なし                                                       | 雌雄：400<br><br>雌雄：毒性所見なし                                                       |
|                        |     | 90 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 0、1,250、<br>5,000、20,000<br>ppm                                                                      | 雄：370<br>雌：1,680<br><br>雄：体重増加抑制<br>雌：毒性所見なし                                  | 雄：90<br>雌：160<br><br>雄：WBC 減少<br>雌 TG 減少                                      | 雄：370<br>雌：1,680<br><br>雄：体重増加抑制<br>雌：毒性所見なし                                  |
|                        |     |                            | 雄：0、90、370、<br>1,510<br>雌：0、160、<br>400、1,680                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                        |     | 2 世代<br>繁 殖 試<br>験         | 0、500、2,000<br>10,000 ppm                                                                            | 親動物：929<br><br>児動物：192                                                        | 親動物<br>雄：929<br>雌：988<br>児動物<br>雄：192<br>雌：199                                | 親動物<br>雄：929<br>雌：988<br>児動物<br>雄：192<br>雌：199                                |
|                        |     |                            | F0 雄：0、50、<br>213、1,100<br>F0 雌：0、51、<br>223、1,110<br>F1 雄：0、47、<br>192、929<br>F1 雌：0、49、<br>199、988 | 親動物：<br>毒性所見なし<br><br>児動物：<br>同腹児重量の減少                                        | 親動物：<br>毒性所見なし<br>児動物：<br>同腹児重量の減少<br><br>(繁殖能に対する<br>影響なし)                   | 親動物：<br>毒性所見なし<br>児動物：<br>同腹児重量の減少<br><br>(繁殖能に対する<br>影響なし)                   |
|                        |     | 発 生 毒<br>性 試<br>験          | 0、100、300、<br>1,000                                                                                  | 母動物：1,000<br>胎児：100<br><br>母動物：<br>毒性所見なし<br>胎児：骨化遅延<br><br>(催奇形性は認めら<br>れない) | 母動物：1,000<br>胎児：100<br><br>母動物：<br>毒性所見なし<br>胎児：骨化遅延<br><br>(催奇形性は認めら<br>れない) | 母動物：1,000<br>胎児：100<br><br>母動物：<br>毒性所見なし<br>胎児：骨化遅延<br><br>(催奇形性は認めら<br>れない) |
|                        | イヌ  | 90 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 0、3,200、<br>8,000、20,000、<br>ppm                                                                     | 雄：850<br>雌：345                                                                | 雄：850<br>雌：345                                                                | 雄：850<br>雌：345                                                                |
|                        |     |                            | 雄：0、144、322、<br>850<br>雌：0、150、<br>345、902                                                           | 雄：毒性所見なし<br>雌：体重増加抑制                                                          | 雄：毒性所見なし<br>雌：摂餌量減少                                                           | 雄：毒性所見なし<br>雌：体重増加抑制                                                          |

|                  | 動物種 | 試験                         | 投与量<br>(mg/kg 体重/日)                       | 無毒性量(mg/kg 体重/日) <sup>1)</sup> |                    |                |
|------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
|                  |     |                            |                                           | JMPR                           | EPA                | 食品安全委員会        |
| トリア<br>ゾール<br>酢酸 | ラット | 14 日間<br>亜急性<br>毒 性 試<br>験 | 0、100、1,000<br>8,000 ppm                  | 雌雄：703.5                       | 雄：788.3<br>雌：703.5 | 雄：788<br>雌：704 |
|                  |     |                            | 雄：10.6、103、<br>788<br>雌：10.1、97.2、<br>704 | 雌雄：毒性所見なし                      | 雌雄：毒性所見なし          | 雌雄：毒性所見なし      |

1)：最小毒性量で認められた毒性所見を記した。

－：無毒性量は設定できなかった。

<別紙 1：検査値等略称>

| 略称               | 名称                          |
|------------------|-----------------------------|
| ALD              | アルドリンエポキシダーゼ                |
| Bil              | ビリルビン                       |
| Cre              | クレアチニン                      |
| ECOD             | エトキシクマリン <i>O</i> -デエチラーゼ   |
| EROD             | エトキシレゾルフィン <i>O</i> -デエチラーゼ |
| FOB              | 機能観察総合検査                    |
| UDPGT            | UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ        |
| LC <sub>50</sub> | 半数致死濃度                      |
| LD <sub>50</sub> | 半数致死量                       |
| T <sub>3</sub>   | トリヨードサイロニン                  |
| T <sub>4</sub>   | サイロキシン                      |
| TAR              | 総投与（処理）放射能                  |
| TG               | トリグリセリド                     |
| TSH              | 甲状腺刺激ホルモン                   |

< 参照 >

- 1 Jmpr: “Triazole fungicide metabolites”, Pesticide Residues in food-2008 evaluations. Part II . Toxicological. p437-490(2008)
- 2 US EPA: 1,2,4-Triazole, Triazole Alanine, Triazole Acetic Acid: Human Health Aggregate Risk Assessment in Support of Reregistration and Registration Actions for Triazole-derivative Fungicide Compound (2006)
- 3 Jmpr: Guidelines for the preparation of toxicological working papers for the WHO Core Assessment Group of the Joint Meeting on Pesticide Residues (2000)
- 4 Renzo FD, Broccia ML, Giavini E, Menegola E: Citral, an inhibitor of retinoic acid synthesis, attenuates the frequency and severity of branchial arch abnormalities induced by triazole-derivative fluconazole in rat embryos cultured *in vivo*. Reproductive Toxicology, 2007;24:326-332
- 5 Roberts C, Ivins S, Cook A C, Baldini A, Scambler P J: Cyp26 genes a1, b1 and c1 are down-regulated in Tbx1 null mice and inhibition of Cyp26 enzyme function produces a phenocopy of DiGeorge Syndrome in the chick. Human Molecular Genetics, 2006; Vol.15, No.23:3394-3410
- 6 Mulder GB, Manley N, Grant J, Schmidt K, Zeng W, Eckhoff C, et al: Effects of excess vitamin A on development of cranial neural crest-derived structures: A neonatal and embryologic study. Teratology, 2000;62:214-226
- 7 Menegola E, Broccia ML,: Citral, Renzo FD, Giavini E: Postulated pathogenic pathway in triazole fungicide induced dysmorphogenic effects. Reproductive Toxicology, 2006;22:186-195