

（案）

農薬評価書

セダキサン

2014年9月11日

食品安全委員会農薬専門調査会

目次

	頁
○ 審議の経緯.....	3
○ 食品安全委員会委員名簿.....	3
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	3
○ 要約.....	5
I. 評価対象農薬の概要.....	6
1. 用途.....	6
2. 有効成分の一般名.....	6
3. 化学名.....	6
4. 分子式.....	6
5. 分子量.....	6
6. 構造式.....	7
7. 開発の経緯.....	7
II. 安全性に係る試験の概要.....	8
1. 動物体内運命試験.....	8
(1) ラット.....	8
(2) ヤギ.....	14
(3) ニワトリ.....	15
2. 植物体内運命試験.....	16
(1) とうもろこし.....	16
(2) 春小麦.....	16
(3) だいず.....	17
(4) フダンソウ.....	18
(5) カノーラ.....	19
3. 土壌中運命試験.....	19
(1) 好氣的土壌中運命試験.....	19
(2) 好氣的土壌中運命試験.....	20
(3) 好氣的土壌中運命試験.....	20
(4) 好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験.....	21
(5) 土壌吸脱着試験.....	22
4. 水中運命試験.....	22
(1) 加水分解試験.....	22
(2) 水中光分解試験.....	22
5. 土壌残留試験.....	23
6. 作物等残留試験.....	23

1	(1) 作物残留試験	23
2	(2) 畜産物残留試験	23
3	7. 一般薬理試験	24
4	8. 急性毒性試験	24
5	(1) 急性毒性試験	24
6	(2) 急性神経毒性試験（ラット）	25
7	9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	25
8	10. 亜急性毒性試験	25
9	(1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）	25
10	(2) 13 週間亜急性毒性試験（ラット）	26
11	(3) 28 日間亜急性毒性試験（マウス）	27
12	(4) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）	27
13	(5) 13 週間亜急性毒性試験（イヌ）	28
14	(6) 4 週間亜急性毒性試験（イヌ）＜参考資料＞	28
15	(7) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）	28
16	(8) 28 日間亜急性経皮毒性試験（ラット）	29
17	(9) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 AB）	29
18	11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	29
19	(1) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）	29
20	(2) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	30
21	(3) 80 週間発がん性試験（マウス）	31
22	12. 生殖発生毒性試験	32
23	(1) 2 世代繁殖試験（ラット）	32
24	(2) 発生毒性試験（ラット）	33
25	(3) 発生毒性試験（ウサギ）	34
26	13. 遺伝毒性試験	34
27	14. その他の試験	36
28	(1) 28 日間亜急性毒性試験（異性体比較試験）（ラット）	36
29	(2) 28 日間免疫毒性試験（マウス）	39
30		
31	Ⅲ. 食品健康影響評価	40
32		
33	・別紙 1：代謝物/分解物略称	45
34	・別紙 2：検査値等略称	47
35	・別紙 3：作物残留試験成績－海外	49
36	・参照	50
37		
38		

1 <審議の経緯>

2013年 10月 24日 インポートトレランス設定の要請（ばれいしょ）
2014年 1月 30日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価
について要請（厚生労働省発食安0130第2号）
2014年 2月 3日 関係書類の接受（参照1～61）
2014年 2月 17日 第503回食品安全委員会（要請事項説明）
2014年 6月 6日 第34回農薬専門調査会評価第二部会
2014年 7月 16日 第35回農薬専門調査会評価第二部会
2014年 8月 7日 第36回農薬専門調査会評価第二部会
2014年 9月 11日 第112回農薬専門調査会幹事会

2

3 <食品安全委員会委員名簿>

（2012年7月1日から）

熊谷 進（委員長）
佐藤 洋（委員長代理）
山添 康（委員長代理）
三森国敏（委員長代理）
石井克枝
上安平冽子
村田容常

4

5 <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

（2014年3月31日まで）

・幹事会

納屋聖人（座長）	上路雅子	松本清司
西川秋佳*（座長代理）	永田 清	山手丈至**
三枝順三（座長代理**）	長野嘉介	吉田 緑
赤池昭紀	本間正充	

・評価第一部会

上路雅子（座長）	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀（座長代理）	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍

・評価第二部会

吉田 緑（座長）	桑形麻樹子	藤本成明
松本清司（座長代理）	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充

・評価第三部会

三枝順三（座長）	小野 敦	永田 清
納屋聖人（座長代理）	佐々木有	八田稔久

浅野 哲	田村廣人	増村健一
・評価第四部会		
西川秋佳*（座長）	川口博明	根本信雄
長野嘉介（座長代理*； 座長**）	代田眞理子	森田 健
山手丈至（座長代理**）	玉井郁巳	與語靖洋
井上 薫**		*：2013年9月30日まで **：2013年10月1日から

1

（2014年4月1日から）

・幹事会		
西川秋佳（座長）	小澤正吾	林 真
納屋聖人（座長代理）	三枝順三	本間正充
赤池昭紀	代田眞理子	松本清司
浅野 哲	永田 清	與語靖洋
上路雅子	長野嘉介	吉田 緑
・評価第一部会		
上路雅子（座長）	清家伸康	藤本成明
赤池昭紀（座長代理）	林 真	堀本政夫
相磯成敏	平塚 明	山崎浩史
浅野 哲	福井義浩	若栗 忍
篠原厚子		
・評価第二部会		
吉田 緑（座長）	腰岡政二	本間正充
松本清司（座長代理）	佐藤 洋	根岸友恵
小澤正吾	杉原数美	山本雅子
川口博明	細川正清	吉田 充
桑形麻樹子		
・評価第三部会		
三枝順三（座長）	高木篤也	中山真義
納屋聖人（座長代理）	田村廣人	八田稔久
太田敏博	中島美紀	増村健一
小野 敦	永田 清	義澤克彦
・評価第四部会		
西川秋佳（座長）	佐々木有	本多一郎
長野嘉介（座長代理）	代田眞理子	森田 健
井上 薫	玉井郁巳	山手丈至
加藤美紀	中塚敏夫	與語靖洋

2

3

要 約

ピラゾールカルボキサミド系殺菌剤である「セダキサン」（CAS No. 87497-67-6）について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ等）、植物体内運命（春小麦、だいず等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット、マウス等）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。

各種毒性試験結果から、セダキサン投与による影響は、主に体重（増加抑制）、摂餌量減少及び肝臓（重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等）に認められた。神経毒性、催奇形性、繁殖能に対する影響、遺伝毒性及び免疫毒性は認められなかった。

ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験において子宮腺癌の発生頻度、マウスを用いた 80 週間発がん性試験において肝腫瘍の発生頻度が増加したが、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をセダキサン（親化合物のみ）と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 11 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.11 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

また、セダキサンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の 30 mg/kg 体重であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.3 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

1 **I. 評価対象農薬の概要**

2 **1. 用途**

3 殺菌剤

5 **2. 有効成分の一般名**

6 和名：セダキサン

7 英名：sedaxane (ISO 名)

9 **3. 化学名**

10 **IUPAC**

11 和名：トランス体；2'-[(1*RS*,2*SR*)-1,1'-ビシクロプロパ-2-イル]-3-(ジフルオロ
12 メチル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシアニリド

13 シス体；2'-[(1*RS*,2*RS*)-1,1'-ビシクロプロパ-2-イル]-3-(ジフルオロ
14 メチル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシアニリド

16 英名：トランス体；2'-[(1*RS*,2*SR*)-1,1'-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-
17 1-methylpyrazole-4-carboxanilide

18 シス体；2'-[(1*RS*,2*RS*)-1,1'-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-
19 1-methylpyrazole-4-carboxanilide

21 **CAS (No. 87497-67-6)**

22 和名：1*H*-ピラゾール-4-カルボキシアミド, *N*-[2-[1,1'-ビシクロプロピル]-2-イ
23 ルフェニル]-3-(ジフルオロメチル)-1-メチル

25 英名：1*H*-pyrazole-4-carboxamide, *N*-[2-[1,1'-bicyclopropyl]-2-ylphenyl]-
26 3-(difluoromethyl)-1-methyl


28 **4. 分子式**

29 C₁₈H₁₉F₂N₃O


31 **5. 分子量**

32 331.4

6. 構造式



トランス体



シス体

トランス体：シス体比 81～85：10～15

7. 開発の経緯

セダキサンは、シンジェンタ社により開発されたピラゾールカルボキサミド系殺菌剤である。コハク酸脱水素酵素阻害剤であり、TCA サイクルを阻害して殺菌効果を示すと考えられている。セダキサンはシス・トランス異性体を有し、両異性体とも殺菌効果を示す。国際基準がだいた、小麦等に、米国でトウモロコシ、ばれいしょ、小麦等に、そのほかカナダ及び豪州で基準が設定されている。

今回、インポートトレランス設定（ばれいしょ）の要請がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験〔II.1～4〕は、セダキサンのピラゾール環の5位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[pyr- ^{14}C]セダキサン」という。）及びフェニル環の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「[phe- ^{14}C]セダキサン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からセダキサンに換算した値（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）を示した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット

① 吸収

a. 血中濃度推移

Wistar ラット（一群雌雄各11匹）に、[pyr- ^{14}C]セダキサンを1 mg/kg 体重（以下〔1.〕において「低用量」という。）又は80 mg/kg 体重（以下〔1.〕において「高用量」という。）で単回経口投与して、投与後72時間の血中濃度推移が検討された。

血漿及び全血中薬物動態学的パラメータは表1に示されている。

血漿及び全血中における $T_{\max}$ 、 $C_{\max}$ 及び $T_{1/2}$ に雌雄間で顕著な差異は認められなかった。（参照2）

表1 血漿及び全血中薬物動態学的パラメータ

投与方法		単回経口			
投与量		1 mg/kg 体重		80 mg/kg 体重	
性別		雄	雌	雄	雌
血漿	$T_{\max}$ (hr)	1	1.5	5	6
	$C_{\max}$ ($\mu\text{g/g}$)	0.106	0.110	10.6	12.4
	$T_{1/2}$ 消失相 (hr)	22.7	24.9	28.8	23.3
	AUC_{0-72} (hr · $\mu\text{g/g}$)	1.66	1.63	234	192
全血	$T_{\max}$ (hr)	1	1.5	5	4
	$C_{\max}$ ($\mu\text{g/g}$)	0.071	0.075	9.04	9.60
	$T_{1/2}$ 消失相 (hr)	39.9	33.9	31.6	20.7
	AUC_{0-72} (hr · $\mu\text{g/g}$)	1.46	1.30	197	158

b. 吸収率

排泄試験〔1. (1)④c 及び d〕で得られた投与後48時間までの胆汁、尿、カーカス及びケージ洗浄液中の放射能の合計から、吸収率は、低用量群で少なくとも87.4%、高用量群で少なくとも87.1%と算出された。（参照4、5）

② 分布

a. 単回投与①

排泄試験[1. (1)④b]で得られた投与 168 時間後の臓器及び組織を試料として、体内分布が検討された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。

臓器及び組織中の残留放射能濃度は、いずれの投与群の雌雄とも肝臓で最も高かった。ほかに、高用量群の雄では、甲状腺、腎臓、脾臓及び肺で残留放射能濃度が認められたが、その他の臓器、組織及び血液中からは検出されなかった。

(参照 3)

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (μg/g)

投与量 (mg/kg 体重)	性別	投与 168 時間後
1	雄	肝臓(0.020)、腎臓(0.006)、全血(0.003)
	雌	肝臓(0.008)、腎臓(0.003)
80	雄	肝臓(1.34)、甲状腺(0.84)、腎臓(0.48)、脾臓(0.15)、肺(0.14)
	雌	肝臓(1.01)、腎臓(0.32)、全血(0.15)

b. 単回投与②

Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]セダキサンを低用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 3 に示されている。

臓器及び組織中の分布に雌雄間で顕著な差は認められず、臓器及び組織中の残留放射能は 0.1～3.2 日の半減期で減衰した。

肝臓及び腎臓で高い濃度が認められたほか、低用量群では脾臓、副腎及び脂肪に、高用量群では、脂肪、脾臓、副腎及び甲状腺に高い濃度が認められた。

(参照 6)

表 3 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (μg/g)

投与量 (mg/kg 体重)	性別	T _{max} 付近*	投与 96 時間後
1	雄	消化管(5.37)、肝臓(1.10)、副腎(0.245)、腎臓(0.208)、脾臓(0.162)、腎脂肪(0.124)、肺(0.086)、血漿(0.079)、甲状腺(0.077)、心臓(0.073)	肝臓(0.025)、消化管(0.013)、腎臓(0.006)、血漿(0.004)、肺(0.002)、脾臓(0.001)、精巣(0.001)、心臓(0.001)
	雌	消化管(5.92)、肝臓(1.03)、脾臓(0.323)、脾臓(0.317)、副腎(0.312)、腎脂肪(0.295)、腎臓(0.227)、甲状腺(0.155)、肺(0.129)、卵巣(0.120)	消化管(0.017)、肝臓(0.014)、腎臓(0.004)、全血(0.002)
80	雄	消化管(605)、肝臓(71.7)、腎脂	肝臓(2.85)、消化管(1.60)、甲

		肪(62.7)、腓臓(47.1)、腎臓(35.2)、副腎(32.4)、胸腺(28.5)、甲状腺(19.4)、心臓(18.9)、肺(18.5)	状腺(1.05)、腎臓(0.59)、全血(0.38)、肺(0.19)、心臓(0.14)、筋肉(0.06)
	雌	消化管(296)、腎脂肪(108)、甲状腺(79.0)、腓臓(65.7)、副腎(65.5)、肝臓(64.6)、卵巣(46.0)、腎臓(31.4)、子宮(24.9)、肺(23.2)	肝臓(1.42)、消化管(1.27)、腎臓(0.45)、全血(0.29)、肺(0.14)、脾臓(0.13)

*: 低用量群では雄及び雌でそれぞれ投与 1 時間後及び 1.5 時間後、高用量群では雌雄で投与 5 時間後。

c. 反復投与

Wistar ラット（雄 33 匹）に、[pyr-¹⁴C]セダキサンを低用量で 14 日間反復経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 4 に示されている。

多くの臓器・組織において最終投与 24 時間後までに定常状態に到達した。投与終了後 42 日までに肝臓、腎臓及び脾臓を除く臓器・組織で残留濃度が定量限界未満となり、蓄積性は認められなかった。（参照 7）

表 4 主要臓器及び組織における残留放射能濃度（μg/g）

投与量 (mg/kg 体重/日)	性別	投与 3 日後	投与 7 日後	投与 14 日後
1	雄	胃腸管(1.61)、肝臓(0.287)、腎臓(0.066)、血漿(0.037)、全血(0.037)、肺(0.023)、腓臓(0.018)、心臓(0.013)、脾臓(0.013)、筋肉(0.008)、精巣(0.008)	胃腸管(2.19)、肝臓(0.460)、腎臓(0.119)、全血(0.062)、血漿(0.060)、肺(0.037)、腓臓(0.032)、心臓(0.020)、脾臓(0.019)、腎脂肪(0.013)、精巣(0.013)	胃腸管(2.64)、肝臓(0.507)、腎臓(0.194)、甲状腺(0.189)、副腎(0.099)、全血(0.070)、血漿(0.066)、肺(0.044)、骨(0.032)、脾臓(0.027)

③ 代謝

[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを用いた吸収試験 [1. (1)①a～c] 及び分布試験 [1. (1)②a 及び c] で得られた血漿、尿及び糞を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

血漿、尿、糞及び胆汁中における代謝物は表 5 に示されている。

未変化のセダキサンは血漿、糞及び胆汁中に少量認められたが、尿中からは検出されなかった。主な代謝物として糞及び胆汁中に B 及び E 並びにこれらのグルクロン酸抱合体が認められたほか、20 種以上の代謝物が認められた。

標識体による代謝に顕著な違いはなく、フェニル環とピラゾール環の結合部位の開裂はほとんど認められなかった。

セダキサンは、主に N-脱メチル化、水酸化、脱メチル水酸化、グルクロン酸又は硫酸抱合化により代謝された。（参照 8）

1
2

表 5 血漿、尿、糞及び胆汁中における代謝物

標識体	投与量 (mg/kg 体重)	性別	試料	セダキ サン ¹⁾	代謝物 ¹⁾
[pyr- ¹⁴ C] セダキ サン	1	雄	血漿 ²⁾	0.022	J(0.051) 、 D(0.015)
		雌		0.018	J(0.054)、 T(0.012)
	80	雄		4.73	J(4.01) 、 G(0.933)、 D(0.536)、 C(0.496)、 E(0.417)
		雌		8.12	J(4.73)、 E(0.237)、 T(0.204)、 D(0.102)
	1	雄	尿 ³⁾	nd	B(2.58)、 M(2.11)、 E(1.46)、 Q(0.70)、 P(0.56)、 R(0.42) 、 C(0.35)、 N/O(0.30) 、 N(0.22)
			糞 ³⁾	1.71	B(26.9)、 E(10.1)、 N(5.17)、 C(5.08)、 G(5.05)、 F(2.29) 、 L(2.17) 、 D(1.32) 、 B/C/D (1.26) 、 U(1.21) 、 Q(0.88)
		雌	尿 ³⁾	nd	B(9.33)、 M(2.71)、 E(2.34)、 C(1.55)、 U(0.96)、 T(0.36)、 F(0.28)
			糞 ³⁾	1.56	B(29.2) 、 E(11.7) 、 C(9.32) 、 B/C/D (2.99) 、 U(2.10) 、 F(1.98)、 L(1.63)、 N(1.56)、 D(1.47)、 Q(0.80)
	80	雄	尿 ³⁾	nd	Q(2.02)、 E(1.70)、 B(1.68) 、 R(1.32) 、 M(1.22)、 P(0.73)、 N/O(0.40)、 H(0.25) 、 C(0.24)、 N(0.20)
			糞 ³⁾	4.25	B(15.4)、 C(3.04)、 D(2.08)、 E(16.8)、 G(9.77)、 F(4.27)、 K(0.83)、 B/C/D (2.95)、 L(0.99)、 N(5.03)、 Q(2.36)、 U(2.02)
		雌	尿 ³⁾	nd	M(4.78)、 U(3.08) 、 B (2.58)、 E(2.02)、 T(0.48)、 C(0.27)、 F(0.26)、 H(0.25)、 N(0.23)、 Q(0.19)、 N/O(0.17)
			糞 ³⁾	1.68	B(22.4)、 E(16.7)、 C(6.99)、 F(3.37)、 N(2.78)、 B/C/D (2.43) 、 L(1.84) 、 Q(1.54) 、 G(1.22) 、 D(0.96)、 K(0.75)、 U(0.73)
	1	雄	尿 (0-24h)	nd	B(3.56)、 M(2.96)、 U(1.58) 、 E(1.52)、 T(1.00) 、 N/O(0.95) 、 C(0.40)
			尿 (312-336h)	nd	M(5.76)、 U(4.29) 、 B(1.03)、 N/O(0.95)、 T(0.64)、 E(0.59)、 R(0.48)、 C(0.25)
			糞 (0-24h)	3.86	B(21.7)、 E(7.32)、 G(5.33) 、 C(5.26)
			糞 (312-336h)	nd	B(35.1)、 E(11.5)、 C(7.46)、 G(2.92)、 F(2.03)
	1	雄	尿 ⁴⁾	nd	B(1.04)、 E(0.86)、 M(0.87)、 U(0.47)、 Q(0.42)、 N/O(0.39)、 P(0.36)
			糞 ⁴⁾	6.41	nd
			胆汁 ⁵⁾	0.34	U(31.8)、 T(31.7)、 B(3.46)、 E(2.30)、 F(1.06)、 C(0.96)、 X(0.85)、 S(0.51)、 Z (0.32)、 I(0.16)
			胆汁 ⁶⁾	0.72	B(25.4)、 E(22.5)、 F(5.63)、 C(5.31)、 G(4.99)、 S(3.07)、 W(2.77)、 D(1.32)、 N(0.60)、 E/F/G(0.57)
		雌	尿 ⁴⁾	nd	B(2.36)、 M(1.66)、 E(0.62)、 C(0.50)、 U(0.47)、 P(0.23)、 O(0.22)

			糞 ⁴⁾	4.49	nd
			胆汁 ⁵⁾	0.73	T(33.6)、U(30.2)、E(3.06)、B(3.05)、X(1.25)、S(1.20)、C(1.17)、F(0.57)、I(0.84)
			胆汁 ⁶⁾	nd	B(28.8)、E(25.3)、C(6.59)、F(5.99)、S(3.03)、G(2.33)、D(1.52)
	80	雄	尿 ⁴⁾	0.05	Q(0.76)、M(0.73)、F(0.70)、P(0.49)、U(0.32)、V(0.28)、E(0.23)、B(0.22)、N/O(0.16)、T(0.09)
			糞 ⁴⁾	6.99	nd
			胆汁 ⁵⁾	1.40	U(38.9)、T(16.9)、E(5.30)、B(2.34)、F(2.19)、S(1.18)、X(1.11)、C(1.01)、I(0.96)、Z(0.61)、D(0.59)
			胆汁 ⁶⁾	0.59	E(30.9)、B(14.7)、G(9.85)、F(7.53)、S(2.59)、C(2.15)、D(1.60)、E/F/G(0.96)、N(0.74)、K(0.52)、W(0.15)
		雌	尿 ⁴⁾	nd	B(1.89)、E(1.84)、M(1.29)、S(0.90)、U(0.71)、O(0.57)、Q(0.37)、C(0.34)、P(0.34)、N/O(0.33)、T(0.20)、H(0.18)、V(0.16)
			糞 ⁴⁾	2.69	J(0.41)
			胆汁 ⁵⁾	0.98	U(43.4)、T(23.8)、E(3.15)、F(2.18)、B(1.67)、S(1.10)、C(0.85)、I(0.52)、Y(0.32)
			胆汁 ⁶⁾	nd	E(34.9)、B(20.1)、F(8.20)、C(5.09)、G(5.09)、S(3.25)、D(1.37)
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	1	雄	尿 ⁴⁾	nd	T(1.12)、B(0.86)、N/O(0.75)、E(0.46)、P(0.43)、U(0.32)、Q(0.29)
			糞 ⁴⁾	4.31	E(0.38)、M(0.38)、G(0.33)
			胆汁 ⁴⁾	1.17	T(40.2)、U(36.9)、B(1.47)、E(1.22)、F(1.19)、C(1.04)、S(1.02)
		雌	尿 ⁴⁾	nd	M(2.51)、B(1.62)、U(0.85)、E(0.64)、C(0.54)、Q(0.33)、T(0.26)、N/O(0.15)、P(0.13)
			糞 ⁴⁾	7.38	C(0.57)、E(0.27)、G(0.18)
	80	雄	胆汁 ⁴⁾	nd	T(40.9)、U(32.5)、W(2.33)、B(1.27)、E(0.79)、S(0.65)、F(0.50)
			尿 ⁴⁾	nd	N/O(0.67)、U(0.63)、T(0.58)、P(0.56)、Q(0.50)、R(0.47)、M(0.44)、B(0.31)、E(0.29)、V(0.16)
			糞 ⁴⁾	3.69	E(0.27)、M(0.23)
		雌	胆汁 ⁴⁾	0.87	U(48.8)、T(32.8)、S(2.11)、G(1.88)、E(1.55)、C(1.35)、B(0.75)
			尿 ⁴⁾	nd	B(1.30)、M(0.96)、E(0.68)、S(0.38)、N/O(0.27)、U(0.40)、C(0.21)、P(0.21)
			糞 ⁴⁾	9.60	E(0.31)、C(0.20)、J(0.19)
		雄	胆汁 ⁴⁾	nd	U(40.7)、T(39.4)、F(2.42)、S(0.86)、E(0.69)、B(0.57)、C(0.47)

1 nd: 検出されず

2 1): 表中のセダキサン及び代謝物は異性体の合計値(血漿: µg/g、血漿以外: %TAR)

3 2): 試料採取時間: 1 mg/kg 体重; 1~1.5 時間後、80 mg/kg 体重; 5~6 時間後

4 3): 試料採取時間: 0~96hr

5 4): 試料採取時間: 尿及び糞; 0~48hr、胆汁; 0.5~48hr

6 5): 加水分解前。試料採取時間: 0.5~48hr

7 6): 加水分解後。試料採取時間: 0.5~48hr

④ 排泄

a. 尿糞中排泄①

血中濃度推移試験 [1. (1)①a] で得られた投与 72 時間後の尿及び糞を試料として、排泄試験が実施された。

投与後 72 時間の尿及び糞中排泄率は表 6 に示されている。

投与放射能の排泄は速やかで、投与後 48 時間に 84%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、主に糞中に排泄された。（参照 2）

表 6 投与後 72 時間の尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与方法	単回経口			
投与量	1 mg/kg 体重		80 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
尿	11.8	16.8	13.1	17.2
糞	79.3	71.9	83.4	73.4
消化管及び内容物	1.2	0.7	1.4	0.6
カーカス ¹	0.5	0.3	0.8	0.3
ケージ洗浄液	1.7	1.8	2.3	5.1
合計	94.4	91.5	101	96.6

b. 尿糞中排泄②

Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]セダキサンを低用量又は高用量で単回経口投与して、排泄試験が実施された。

投与後 168 時間の尿及び糞中排泄率は表 7 に示されている。

投与放射能の排泄は速やかで、投与後 72 時間に大部分が排泄され、主に糞中に排泄された。排泄に顕著な性差は認められなかった。（参照 3）

表 7 投与後 168 時間の尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与方法	単回経口			
投与量	1 mg/kg 体重		80 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
尿	11.8	19.6	11.9	17.6
糞	88.4	79.4	83.1	74.9
消化管及び内容物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
臓器、組織及びカーカス	0.2	0.1	0.3	0.1
ケージ洗浄液	1.7	5.8	2.0	3.7
合計	102	105	97.2	96.3

c. 胆汁中排泄①

胆管カニューレを挿入した Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

セダキサンを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 8 に示されている。

本剤は主に胆汁に排泄された。（参照 4）

表 8 投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与方法	単回経口			
投与量	1 mg/kg 体重		80 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
尿	6.7	6.9	5.9	10.2
糞	6.6	4.7	7.1	3.3
胆汁	79.0	79.4	81.8	81.2
ケージ洗浄液	1.4	1.5	1.3	0.9
カーカス	0.3	0.1	0.5	0.2
合計	94.1	92.6	96.6	95.9

d. 胆汁中排泄②

胆管カニニューレを挿入した Wistar ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[phe-¹⁴C]セダキサンを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 9 に示されている。

本剤は主に胆汁に排泄された。（参照 5）

表 9 投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与方法	単回経口			
投与量	1 mg/kg 体重		80 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
尿	6.5	8.1	6.7	5.3
糞	5.7	8.6	4.4	10.6
胆汁	81.1	78.6	85.3	81.0
ケージ洗浄液	1.2	0.7	1.6	0.7
カーカス	0.3	0.2	0.3	0.1
合計	94.9	96.1	98.4	97.7

（2）ヤギ

泌乳ヤギ（品種不明、一群各 1 頭）に、[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンをそれぞれ平均 40.1 又は 38.8 mg/頭/日の用量で 1 日 1 回、7 日間カプセル経口投与し、最終投与 12 時間後にと殺して、動物体内運命試験が実施された。

各試料における残留放射能分布及び代謝物は表 10 に示されている。

投与放射能は主に尿又は糞中に排泄され、排泄率は尿中に 18.4～26.1%TAR、糞中に 49.4～62.1%TAR であった。乳汁中の残留放射能濃度は投与開始約 2 日

後に定常状態に達した。

腎臓の主要な残留成分は代謝物 B/C、D 及び E で、それぞれ 10.6～12.8、3.7～12.6 及び 13.5～22.3%TRR 認められた。肝臓の主要な残留成分は代謝物 E で、13.4～19.3%TRR 認められ、脂肪の主要な残留成分はセダキサン及び代謝物 J で、それぞれ 28.4～43.7 及び 16.1～17.6%TRR 認められた。乳汁では 10%TRR を超える残留成分は認められなかった。

各試料中において、標識体による代謝に顕著な違いはなく、フェニル環とピラゾール環の結合部位の開裂は認められなかった。（参照 9）

表 10 各試料における残留放射能分布及び代謝物（μg/g）

標識体	試料	総残留放射能	セダキサン	B/C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	F ¹⁾	G ¹⁾	J	抽出残渣
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	肝臓	0.268 (57.4)	0.009 (2.0)	0.014 (2.9)	nd	0.063 (13.4)	0.010 (2.2)	0.001 (0.3)	0.005 (1.0)	0.199 (42.7)
	腎臓	0.070 (88.7)	nd	0.008 (10.6)	0.003 (3.7)	0.011 (13.5)	0.002 (3.1)	0.001 (1.2)	nd	0.009 (11.3)
	脂肪	0.010 (96.2)	0.005 (43.7)	nd	nd	nd	nd	nd	0.002 (16.1)	<0.001 (3.9)
	乳汁	0.031 (97.0)	nd	0.003 (9.7)	0.001 (2.2)	0.002 (6.3)	nd	nd	0.001 (1.7)	0.001 (3.1)
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	肝臓	0.421 (68.6)	0.034 (5.5)	0.020 (3.3)	0.009 (1.5)	0.119 (19.3)	0.007 (1.2)	0.008 (1.3)	0.015 (2.4)	0.193 (31.5)
	腎臓	0.174 (91.6)	nd	0.024 (12.8)	0.024 (12.6)	0.042 (22.3)	0.002 (1.3)	0.009 (4.7)	nd	0.016 (8.5)
	脂肪	0.015 (96.0)	0.004 (28.4)	nd	nd	nd	nd	nd	0.003 (17.6)	0.001 (4.1)
	乳汁	0.044 (96.5)	nd	0.004 (8.5)	0.001 (1.7)	0.001 (2.8)	nd	nd	nd	0.002 (3.5)

1) : 抱合体を含む。

nd : 検出されず

下段 () : %TRR

(3) ニワトリ

産卵鶏（品種：イサワレーン、一群 10 羽）に、[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを平均 2.41 又は 2.30 mg/動物/日の用量で 1 日 1 回、14 日間カプセル経口投与し、最終投与 12 時間後にと殺して、動物体内運命試験が実施された。

各試料における残留放射能分布及び代謝物は表 11 に示されている。

投与放射能は、最終投与後 12 時間に 89.0～93.8%TAR が排泄物中に排泄された。卵中残留放射能は投与開始約 9 日後に定常状態に達した。

肝臓及び卵黄における主な残留成分は代謝物 E で 13.3～16.2%TRR 認められた。卵白、筋肉、腹部脂肪、皮膚及び脂肪における主な残留成分はセダキサン及び代謝物 J で、それぞれ 4.7～53.1 及び 3.6～13.7%TRR 認められた。

各試料中において、標識体による代謝に顕著な違いはなく、フェニル環とピラゾール環の結合部位の開裂は認められなかった。（参照 10）

表 11 各試料における残留放射能分布及び代謝物（μg/g）

標識体	試料	総残留放射能	セダキサン	B/C ¹⁾	E ¹⁾	F ¹⁾	J	抽出残渣
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	肝臓	0.126 (65.0)	nd	0.002 (1.2)	0.031 (16.2)	0.002 (0.9)	nd	0.067 (34.8)
	卵黄	0.055 (78.1)	0.001 (1.5)	0.001 (1.3)	0.009 (13.3)	0.001 (0.9)	0.001 (1.6)	0.015 (22.0)
	卵白	0.009 (96.8)	<0.001 (4.7)	nd	nd	nd	0.001 (7.6)	<0.001 (3.2)
	筋肉	0.004 (83.1)	<0.001 (5.8)	nd	nd	nd	<0.001 (3.6)	0.001 (16.9)
	腹部脂肪	0.007 (91.9)	0.004 (53.1)	nd	nd	nd	0.001 (7.5)	0.001 (8.1)
	皮膚及び脂肪	0.009 (77.8)	0.003 (26.9)	nd	nd	nd	0.001 (7.9)	0.003 (22.2)
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	肝臓	0.168 (64.1)	nd	0.006 (2.3)	0.036 (13.5)	0.003 (1.1)	nd	0.094 (35.7)
	卵黄	0.062 (78.5)	0.002 (2.1)	nd	0.013 (16.3)	0.001 (0.7)	0.001 (1.9)	0.017 (21.6)
	卵白	0.007 (94.1)	0.001 (12.1)	nd	nd	nd	0.001 (13.7)	<0.001 (5.9)
	筋肉	0.004 (72.9)	0.001 (12.9)	nd	nd	nd	<0.001 (8.9)	0.001 (27.1)
	腹部脂肪	0.015 (93.5)	0.007 (46.0)	nd	nd	nd	0.001 (9.3)	0.001 (6.5)
	皮膚及び脂肪	0.017 (69.7)	0.006 (24.6)	nd	nd	nd	0.001 (6.0)	0.007 (30.4)

1)：抱合体を含む。

nd：検出されず

下段（）：%TRR

2. 植物体内運命試験

(1) とうもろこし

とうもろこし（品種：Samsara）の種子に、[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを 124～131 g ai/100 kg 種子の用量で処理し、可食部を採取して、植物体内運命試験が実施された。

穀粒中の残留放射能濃度は 0.008 mg/kg 以下であった。（参照 11）

(2) 春小麦

春小麦（品種：Tybalt）の種子に[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを 41.5～42.5 g ai/100 kg 種子の用量で処理し、植物体内運命試験が実施された。

春小麦試料における放射能分布は表12に示されている。

穀粒中の残留放射能は0.008 mg/kg以下であった。

未変化のセダキサンは、青刈り、乾燥青刈り及び麦わらのいずれの試料から10%TRR以上認められ、青刈り試料で最大18.3%TRR (0.082 mg/kg)であった。代謝物では、Eがいずれの試料から10%TRR以上認められたほか、青刈り試料で代謝物G及びHが10%TRR以上認められた。また、代謝物EがN-脱メチル化した代謝物Bがいずれの試料から認められたが、10%TRR未満であった。

そのほか、アミド結合が開裂した代謝物I、AA及びABが認められたが、残留量は僅かであった。代謝物B、E、G及びHの一部はグルコシド抱合体として認められた。（参照11、12）

表12 春小麦試料における放射能分布

標識体	試料	総残留放射能 (mg/kg)	セダキサン (%TRR)	代謝物(%TRR)	抽出残渣 (%TRR)
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	青刈り	0.606	10.9	E ¹⁾ (16.4)、G ¹⁾ (9.4)、H ¹⁾ (8.8)、 B ¹⁾ (5.8)、J(3.2)、I(0.3)、AB ²⁾ (0.2)	10.4
	乾燥青刈り	1.04	15.7	E ¹⁾ (17.1)、H ¹⁾ (8.0)、G ¹⁾ (6.5)、 B ¹⁾ (6.0)、J(3.5)、I(0.3)	16.0
	麦わら	0.884	11.8	E ¹⁾ (12.6)、B ¹⁾ (5.2)、G ¹⁾ (4.7)、 H ¹⁾ (4.7)、J(3.9)、AB ²⁾ (0.5)、I(0.2)	30.5
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	青刈り	0.451	18.3	E ¹⁾ (15.8)、G ¹⁾ (12.0)、H ¹⁾ (11.2)、 B ¹⁾ (7.2)、J(5.1)	11.9
	乾燥青刈り	0.730	15.1	E ¹⁾ (9.5)、G ¹⁾ (5.9)、B ¹⁾ (5.2)、 H ¹⁾ (4.9)、J(3.5)	21.8
	麦わら	1.13	13.4	E ¹⁾ (13.2)、H ¹⁾ (5.6)、B ¹⁾ (5.0)、 G ¹⁾ (4.3)、J(2.9)	37.3

1)：抱合体を含む。

2)：代謝物AAを含む。

(3) だいず

だいず（品種：S12-C2）の種子に[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを120 g ai/100 kg 種子の用量で処理し、植物体内運命試験が実施された。

だいず試料における放射能分布は表13に示されている。

青刈り及び乾燥青刈り試料における主要な残留成分は未変化のセダキサン、代謝物AC及びADが青刈り試料で13.0～28.1%TRR、乾燥青刈り試料で12.6～~~28.1~~26.9%TRR認められた。成熟種子では代謝物AB及びその抱合体が31.4%TRR認められたが、その残留放射能は0.017 mg/kgであった。

門委員コメントに基づき事務局修文

（参照11、13）

【與語専門委員コメント】

未変化のセダキサンを含めるならば、「青刈り＝12.0～28.1」、「乾燥＝12.6～26.9」です。含めないならば、「青刈り＝13.0～28.1」、「乾燥＝12.6～26.9」です。

【事務局より】

代謝物の量を記載していますので、乾燥青刈り試料の数値を修正しました。

表 13 だいず試料における放射能分布

標識体	試料	総残留 放射能 (mg/kg)	セダキサン (%TRR)	代謝物(%TRR)	抽出残渣 (%TRR)
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	青刈り	0.123	16.5	AC(23.9)、AD(16.5)、AB(4.2)、 J(3.4)、I(2.7)、E(0.4)、G(0.3)	12.1
	乾燥青刈り	0.438	16.6	AC(22.3)、AD(22.1)、AB(3.3)、 J(5.1)、I(1.0)、E(0.6)	14.7
	成熟種子	0.055	nd	AB ¹⁾ (31.4)	8.6
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	青刈り	0.138	12.0	AC(28.1)、AD(13.0)、J(3.1)、 E(0.5)、G(0.2)	18.1
	乾燥青刈り	0.354	23.2	AC(26.9)、AD(12.6)、J(5.3)、 E(0.9)、G(0.2)	18.3
	成熟種子	0.009	—	—	16.4

1)：抱合体を含む。

—：分析せず

(4) フダンソウ

フダンソウ（品種：Fordhook Giant）の種子に、[pyr-¹⁴C]セダキサン又は [phe-¹⁴C]セダキサンを 41.6～42.4 g ai/100 kg 種子の用量で処理し、4～5 葉期（BBCH14～15）に植物体を採取して、植物体内運命試験が実施された。

フダンソウ試料における代謝物は表 14 に示されている。

[pyr-¹⁴C]セダキサン処理区における主要な残留成分は未変化のセダキサンで、代謝物 I 及び AB がそれぞれ 10%TRR を超えて認められたが、残留放射能はそれぞれ 0.007 mg/kg 以下であった。[phe-¹⁴C]セダキサン処理区における主要な残留成分は未変化のセダキサンで、10%TRR を超える代謝物は認められなかった。

（参照 14）

表 14 フダンソウ試料における放射能分布

標識体	総残留 放射能 (mg/kg)	セダキサン (%TRR)	代謝物(%TRR)	抽出残渣 (%TRR)
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	0.0556	28.5	I ¹⁾ (12.9)、AB ¹⁾ (11.5)、J(2.3)、E/G ^{1,2)} (0.9)、H ^{1,2)} (0.9)、AA ¹⁾ (0.8)	2.95
[phe- ¹⁴ C]	0.0452	52.3	J(4.5)、H ^{1,2)} (1.5)、E/G ^{1,2)} (1.1)	4.54

セダキサン				
-------	--	--	--	--

- 1) : 抱合体を含む。
2) : 代謝物 G 及び H は暫定的な同定。

(5) カノーラ

カノーラ（品種：Mozart）の種子に[pyr-¹⁴C]セダキサン又は[phe-¹⁴C]セダキサンを 9.65～9.73 g ai/100 kg 種子の用量で処理し、成熟期さや（BBCH89：成熟期）を採取して、植物体内運命試験が実施された。

成熟種子における残留放射能はいずれの標識体処理区でも検出限界（0.002 mg/kg）未満であり、処理放射能はカノーラ種子に移行しなかった。

（参照 15）

【與語専門委員コメント】

「なたね」ではないでしょうか？抄録に記載されている通りならばそのままよいです。

【事務局より】

農薬抄録では「カノーラ」と記載されております。

セダキサンの植物体における主な代謝経路は、N-脱メチル化、フェニル環及びシクロプロピル環の水酸化、脱メチル水酸化、シクロプロピル環の開環及びアミド結合の開裂、N-抱合化であった。

3. 土壤中運命試験

(1) 好氣的土壤中運命試験 上路専門委員修文

小麦（品種：Tybalt）の種子に、[pyr-¹⁴C]セダキサンを 2.94μg/種子の用量で処理し、壤土（スイス）に播種し、密閉系の好氣的条件下、20±2℃の暗所で 365 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

好氣的土壤における放射能分布及び分解物は表 15 に示されている。

セダキサンは経時的に分解し、主要分解物として AB が処理後 112 日後に最大 13.5% TAR 認められた。そのほか、分解物 J 及び AA が処理後 20～37 日後に最大となったが 5% TAR 未満であった。脱メチル水酸化セダキサン及び水酸化セダキサンと推定される分解物がそれぞれ最大で 1.9 及び 2.7% TAR 検出されたが、同定には至らなかった。

セダキサンは最終的に結合性残留物及び CO₂ に分解され、処理後 365 日後で最大となった。結合性残留物の約 65% がフミン画分に、約 35% がフルボ酸画分に分布した。

セダキサンの推定半減期は 70.6 日であった。（参照 16）

表 15 好氣的土壤中における放射能分布及び分解物 (%TAR)

処理後日数 (日)	セダキサン及び分解物				¹⁴ CO ₂	結合性 残留物
	セダキサン	J	AA	AB		
0	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
20/21	75.3	2.1	0.8	2.9	0.2	13.9
37	64.7	3.2	0.4	3.4	0.5	24.6
112	29.3	1.8	0.0	13.5	3.7	34.4
365	14.4	1.4	0.0	3.8	20.3	48.9

(2) 好氣的土壤中運命試験 上路専門委員修文

小麦（品種：Tybalt）の種子に、[phe-¹⁴C]セダキサンを 4.23 µg/種子の用量で処理し、シルト質埴土（フランス）、埴土（スイス）、埴質砂土（スイス）及び砂質埴土（英国）に播種し、密閉系の好氣的条件下、20±2℃の暗所で最長 365 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

セダキサンは経時的に分解し、分解物として J 及び P が認められたが、いずれも 6%TAR 未満であった。ほかに、~~水酸化セドロキシ~~セダキサンと推定される分解物が最大で 2.9%TAR 検出されたが同定には至らなかった。

結合性残留物は経時的に増加し、処理後最終採取日 123 又は 365 日後で最大 32.2～50.9%TAR に達した。CO₂ は徐々に増加したが、処理後123 日後で最大 3.2～9.9%TAR であった。結合性残留物は、大部分がフミン画分、そのほかフルボ酸及びフミン酸画分に分布した。

セダキサンの好氣的条件下における推定半減期は、シルト質埴土で 57.6 日、埴土で 63.7 日、埴質砂土で 77.7 日、砂質埴土で 95.0 日であった。（参照 17）

【上路専門委員コメント】

3.(1) は「水酸化セダキサン」と表示されており、統一。

(3) 好氣的土壤中運命試験

小麦（品種：Tybalt）の種子に、[pyr-¹⁴C]セダキサン若しくは[phe-¹⁴C]セダキサンをそれぞれ 4.33 µg/種子及び 5.90 µg/種子の用量で処理し、埴土（スイス）、砂土（米国）及び砂質埴土（米国）に播種し、又は、埴土（スイス）、砂土（米国）及び砂質埴土（米国）に[pyr-¹⁴C]セダキサン若しくは[phe-¹⁴C]セダキサンを 190 µg ai/kg 乾土～195 µg ai/kg 乾土となるように処理し、密閉系の好氣的条件下、20±2℃の暗所で最長 367 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

好氣的条件下の土壤中における推定半減期は表 16 に示されている。

[pyr-¹⁴C]セダキサン処理区において、セダキサンは経時的に分解し、主要な分解物として AA 及び AB がそれぞれ最大で 14.5%TAR 及び 31.9%TAR 認められた。ほかに、分解物 I 及び AE が認められたが、いずれも 6.3%TAR 未満であつ

た。CO₂ 及び結合性残留物は経時的に増加し、それぞれ最大で 11.6%TAR 及び 48.0%TAR に達した。

[phe-¹⁴C]セダキサン処理区において、セダキサンは経時的に分解し、CO₂ 及び結合性残留物は経時的に増加し、それぞれ最大で 24.5%TAR 及び 58.2%TAR に達した。分解物代謝物は同定されなかった。上路専門委員修文

種子処理では、分解物 AB、CO₂ 及び結合性残留物の残留量が土壌処理よりも多く、種子処理によるセダキサンの分解速度は土壌処理よりも速いと考えられた。

セダキサンの推定半減期は、種子処理で 78～160 日、土壌処理で 296～422 日であった。（参照 18、19）

表 16 好氣的条件下の土壌中における推定半減期

標識体	処理方法	土壌	推定半減期（日）
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	種子	砂土	77.7
		砂質埴壌土	160
	土壌	壤土	296
		砂土	343
		砂質埴壌土	377
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	種子	壤土	87.9
		砂質埴壌土	105
	土壌	砂質埴壌土	422

（４）好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験

小麦（品種：Cokker9555）の種子に、[phe-¹⁴C]セダキサンを 4.2 µg/種子の用量で処理し、シルト質壤土（スイス）に播種し、密閉系の好氣的条件下、20±2℃の暗所で 30 日間インキュベートした後、湛水状態として窒素パージし、嫌氣的条件下、20±2℃の暗所で最長 120 日間インキュベートして、好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験が実施された。

セダキサンは、好氣的条件下において処理 30 日後に 61.9%TAR に減少し、嫌氣的条件に転換した 120 日後に 46.7%TAR となった。嫌氣条件下におけるセダキサンの推定半減期は 375 日であった。

好氣的条件下において、5 種類の分解物が認められたが、いずれも 5.2%TAR 以下であった。嫌氣的条件に転換後、新たな分解物は認められなかった。分解物として、水酸化ヒドロキシセダキサン及びシクロプロピル環の開環体が推定されたが、同定には至らなかった。上路専門委員修文

結合性残留物は、嫌氣条件に転換時の 17.2%TAR から、90 日後には最大 30.6%TAR に増加し、120 日後には 27.7%TAR になった。嫌氣条件下 120 日後の結合性残留物は、フミン画分に約 45%、フルボ酸画分に約 40%、フミン酸画分に約 5%が分布した。（参照 20）

（５）土壌吸脱着試験

6 種類の海外土壌を用いたセダキサンの土壌吸脱着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数及び脱着係数は表 17 に示されている。（参照 21）

表 17 セダキサンの Freundlich 吸着係数及び脱着係数

土壌（採取地）	K_{ads_F}	$K_{ads_{Foc}}$	K_{des_F}	$K_{des_{Foc}}$
壤土（スイス）	6.82	262	9.55	367
シルト質埴土（フランス）	5.72	548	7.39	708
砂質埴壤土（英国）	16.7	602	19.9	716
砂壤土（米国）	3.06	588	3.94	758
シルト質埴土（米国）	13.1	538	18.8	769
砂土（米国）	2.00	666	2.72	907

K_{ads_F} : Freundlich の吸着係数、 $K_{ads_{Foc}}$: 有機炭素含有率により補正した吸着係数

K_{des_F} : Freundlich の脱着係数、 $K_{des_{Foc}}$: 有機炭素含有率により補正した脱着係数

4. 水中運命試験

（１）加水分解試験

pH 4（クエン酸緩衝液）、pH 5（酢酸緩衝液）、pH 7（リン酸緩衝液）及び pH 9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に、 $[phe-^{14}C]$ セダキサンを 0.0017 mg/L となるように添加し、50℃の暗条件下で 5 日間（予備試験）、又は、pH5、pH7 及び pH9 では 25℃の暗条件下で、30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

いずれの温度条件及び緩衝液中においても、セダキサンの分解はほとんど認められず、半減期は 1 年以上と推定された。未同定の分解物が 2 種類認められたが、いずれも 5.4% TAR 以下であった。（参照 22）

（２）水中光分解試験

滅菌リン酸緩衝液（pH 7）又は滅菌自然水（pH 7.37、池水）に、 $[pyr-^{14}C]$ セダキサン又は $[phe-^{14}C]$ セダキサンを約 2 µg/mL となるように添加し、25±2℃で最長 34 又は 28 日間、キセノン光（光強度：23.8～26.9 W/m²、波長：290 nm 未満をカット）を照射して、水中光分解試験が実施された。

緩衝液及び自然水中における放射能分布及び分解物は表 18 に示されている。

$[pyr-^{14}C]$ セダキサン処理区において、主な分解物は AA、AG、AF で、それぞれ最大で 25.7% TAR、13.4% TAR 及び 13.0% TAR 認められた。

$[phe-^{14}C]$ セダキサン処理区において、分解物は AG、AF で、それぞれ最大で 18.1% TAR 及び 13.0% TAR 認められた。

両標識体処理区とも、セダキサンは、自然水中において緩衝液中よりも約 3 倍の速度で光分解した。

緩衝液及び自然水中におけるセダキサンの半減期は、東京の春季の自然太陽光換算値でそれぞれ 172 日及び 48 日と推定された。（参照 23）

表 18 緩衝液及び自然水中における放射能分布及び分解物(%TAR)

標識体	水溶液	経過 日数	セダキサン及び代謝物				
			セダキサン	I	AA	AF	AG
[pyr- ¹⁴ C] セダキサン	緩衝液	0	97.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	99.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		8	92.2	0.0	1.5	1.0	0.4
		14	81.8	0.7	8.9	3.0	3.0
		34	55.8	1.4	11.7	4.3	6.0
	自然水	0	104	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	84.4	0.0	2.0	2.5	1.2
		8	57.8	1.5	10.1	7.1	6.0
		14	41.0	2.5	15.2	12.4	11.3
		28	19.5	5.4	25.7	13.0	13.4
[phe- ¹⁴ C] セダキサン	緩衝液	0	101	NA	NA	0.0	0.0
		1	98.1	NA	NA	0.0	0.0
		8	97.9	NA	NA	0.0	0.0
		14	87.1	NA	NA	1.7	2.2
		34	58.6	NA	NA	5.9	5.5
	自然水	0	103	NA	NA	0.0	0.0
		1	84.4	NA	NA	2.2	2.5
		8	57.8	NA	NA	9.0	9.9
		14	41.0	NA	NA	12.4	7.8
		28	19.5	NA	NA	13.0	18.1

NA：該当せず

5. 土壌残留試験

土壌残留試験については、参照した資料に記載がなかった。

6. 作物等残留試験

(1) 作物残留試験

海外において、ばれいしょを用いて、セダキサンを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 3 に示されている。

セダキサンの最大残留値は、ばれいしょ（塊茎）の 0.0159 mg/kg であった。
(参照 24、25、26)

(2) 畜産物残留試験

① 乳牛

ホルスタイン・フリージアン種乳牛（一群 3 頭、対照群 2 頭）にセダキサンを 1.76、8.78 及び 35.1 mg/頭/日で 28 日間カプセル経口投与し、投与開始 28 日後に乳汁、臓器及び組織（腎臓、肝臓、筋肉及び脂肪）を採取して、畜産物残留試験が実施された。セダキサン、代謝物 B 及び E が分析対象化合物とされた。

セダキサン及び代謝物 B は全ての試料で検出限界未満であり、代謝物 E の最

大残留値は肝臓で 0.03 µg/g、腎臓で 0.02 µg/g であった。（参照 27）

7. 一般薬理試験

一般薬理試験については、参照した資料に記載がなかった。

8. 急性毒性試験

（1）急性毒性試験

セダキサン（原体）のラットを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 19 に示されている。（参照 28、29、30）

表 19 急性毒性試験概要（原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口 ^a	Wistar ラット 雌 5 匹		5,000 ^d	5,000 mg/kg 体重で運動協調性の低下、腹臥位、呼吸深大、ラッセル音、流涎、緩徐呼吸 175 mg/kg 体重以上で軽度粗毛、円背位、鎮静化（投与後 30 分～5 時間） 雌：5,000 mg/kg 体重で死亡例
経皮 ^b	Wistar ラット 雌雄 5 匹		>5,000	症状及び死亡例なし
吸入 ^c	Wistar ラット 雌雄 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		緩徐呼吸、ラッセル音、自発運動の低下、円背位、粗毛 雌雄：死亡例なし
		>5.24	>5.24	

a：0.5%CMC 懸濁液にて投与

b：精製水懸濁液にて投与

c：4 時間鼻部暴露

d：推定値

／：実施せず

代謝物 AB を用いた急性経口毒性試験が実施された。結果は表 20 に示されている。（参照 31）

表 20 急性経口毒性試験概要（代謝物）

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
AB ^a	Wistar ラット 雌 5 匹		>2,000	軽度の粗毛、鎮静化、円背位 雌：死亡例なし

a：0.5%CMC 懸濁液にて投与

／：実施せず

（２）急性神経毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた単回強制経口（原体：0、30、250 及び 2,000 mg/kg 体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 21 に示されている。

神経病理組織学的検査結果に検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、250 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で自発運動量減少等が認められたことから、本試験における無毒性量は、雌雄とも 30 mg/kg 体重であると考えられた。明らかな急性神経毒性は認められなかった。（参照 32）

表 21 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000 mg/kg 体重	・切迫と殺（4 例） ・緩徐呼吸、筋緊張低下及び円背位（投与 2 及び 5 時間後） ・平均体温の低下、前肢及び後肢の平均握力の減少（投与 2 時間後） ・被毛光沢消失及び衰弱（投与 2～7 日後）	・切迫と殺（3 例） ・緩徐呼吸及び歩行異常（投与 1 及び 5 時間後） ・平均体温の低下、前肢及び後肢の平均握力の減少（投与 2 時間後） ・粗毛、活動性低下、虚脱及び円背位（投与 2～7 日後） ・体重増加抑制（投与 8 日後）
250 mg/kg 体重以上	・自発運動量減少（投与 3 時間後） ・活動性低下、立ち上がり回数減少、初期不活発、立毛及び臥位（投与 2 及び 5 時間後） ・粗毛（投与 2～7 日後） ・体重増加抑制（投与 8 日後）及び摂餌量減少（投与 1～2 日後）	・自発運動量減少（投与 3 時間後） ・活動性低下、立ち上がり回数減少、初期不活発、立毛及び筋緊張低下（投与 1 及び 5 時間後） ・衰弱及びよろめき歩行（投与 1 時間後、2～7 日後） ・摂餌量減少（投与 1～2 日後）
30 mg/kg 体重	毒性所見なし	毒性所見なし

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼・皮膚刺激性試験が実施された。眼結膜に対して軽度の刺激性が認められた。皮膚に対する刺激性は認められなかった。

CBA/Ca マウスを用いた皮膚感作性試験（局所リンパ節試験）が実施され、結果は陰性であった。（参照 33、34、35）

10. 亜急性毒性試験

（１）90 日間亜急性毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、250、1,000 及び 4,000 ppm：平均検体摂取量は表 22 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 22 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		250 ppm	1,000 ppm	4,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	18.6	72.9	300
	雌	21.4	85.7	315

各投与群で認められた毒性所見は表 23 に示されている。

本試験において、4,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制及び摂餌量減少、肝絶対及び補正重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等が、1,000 ppm 投与群の雌で肝絶対及び補正重量増加が認められたので、無毒性量は雄で 1,000 ppm (72.9 mg/kg 体重/日) 雌で 250 ppm (21.4 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 36）

表 23 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
4,000 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ PT 延長 ・ TG、TP 及び Alb 増加 ・ 尿量減少及び尿 pH 低下 ・ 肝絶対及び補正重量²増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大及び色素沈着	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ PLT 増加 ・ TG、Chol 及び TP 増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大及び色素沈着
1,000 ppm 以上	1,000 ppm 以下 毒性所見なし	・ 肝絶対及び補正重量増加
250 ppm		毒性所見なし

（2）13 週間亜急性毒性試験（ラット）

90 日間亜急性毒性試験（ラット）[10. (1)] と同系統の Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、300、2,000 及び 4,000 ppm：平均検体摂取量は表 24 参照）投与による 13 週間亜急性毒性試験が実施された。

表 24 13 週間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		300 ppm	2,000 ppm	4,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	24.8	168	325
	雌	28.3	186	350

各投与群で認められた毒性所見は表 25 に示されている。

本試験において、4,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制、肝絶対及び補正重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等、2,000 ppm 投与群の雌で体重増加抑制及び前肢握力減少が認められたので、無毒性量は雄で 2,000 ppm (168 mg/kg 体重/日) 雌で 300 ppm (28.3 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 37）

² 最終体重を共変量として共分散分析した臓器重量を補正重量という（以下同じ。）。

表 25 13 週間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
4,000 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ 円背位及び立毛 ・ PT 延長 ・ RBC 減少 ・ GGT、TG 及び TP 増加、Glu 減少 ・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大及び肝細胞色素沈着 ・ 甲状腺ろ胞上皮細胞肥大	・ 摂餌量減少 ・ 後肢握力低下(投与 12～13 週後) ・ PT 延長 ・ GGT 及び Chol 増加、Glu 減少 ・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大及び肝細胞色素沈着
2,000 ppm 以上	2,000 ppm 以下 毒性所見なし	・ 体重増加抑制 ・ 前肢握力低下(投与 12～13 週後)
300 ppm		毒性所見なし

(3) 28 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：雄；0、1,000、5,000 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 26 参照）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 26 28 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		1,000 ppm	5,000 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	178	920	1,270
	雌	248	1,150	1,800

本試験において、いずれの投与群でも毒性所見は認められなかったもので、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,000 ppm（雄：1,270 mg/kg 体重/日、雌：1,800 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 38）

(4) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：雄；0、500、3,500 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 27 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 27 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		500 ppm	3,500 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	80	567	1,170
	雌	112	810	1,460

本試験において、7,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制が認められたが、雌で

はいずれの投与群でも毒性所見は認められなかったので、無毒性量は雄で 3,500 ppm (567 mg/kg 体重/日)、雌で本試験の最高用量 7,000 ppm (1,460 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 39）

（５）13 週間亜急性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、50、150 及び 400 mg/kg 体重/日）投与による 13 週間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、400 mg/kg 体重/日投与群の雄及び 150 mg/kg 体重/日投与群の雌で体重増加抑制及び摂餌量減少が認められたので、無毒性量は雄で 150 mg/kg 体重/日、雌で 50 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 40）

（６）4 週間亜急性毒性試験（イヌ）＜参考資料³＞

ビーグル犬（一群雌雄各 1 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、50、100 及び 300 mg/kg 体重/日）投与による 4 週間亜急性毒性試験が実施された。

300 mg/kg 体重/日投与群の雄で、肝細胞肥大及び空胞化、同投与群の雌で体重増加抑制、摂餌量減少及び肝細胞空胞化が認められた。（参照 41）

（７）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、300、1,000 及び 4,000 ppm：平均検体摂取量は表 28 参照）投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 28 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		300 ppm	1,000 ppm	4,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	19.7	66.0	260
	雌	24.3	79.7	303

4,000 ppm 投与群の雌雄で自発運動量（移動距離）の減少が認められたが、これらの所見は直接的な神経毒性によるものではなく、体重増加抑制及び摂餌量減少に関連する二次的影響と考えられた。また、神経病理組織学的検査結果に検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、4,000 ppm 投与群の雌雄において体重増加抑制、摂餌量減少等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm（雄：66.0 mg/kg 体重/日、雌：79.7 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 42）

³ 本試験は動物数が少ないため、参考資料とした。

（８）28日間亜急性経皮毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた経皮（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、5 日/週）投与による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与の影響は認められなかった。無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 43）

（９）28日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 AB）

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた代謝物 AB の混餌（代謝物 AB：0、2,000、6,000 及び 12,000 ppm：平均検体摂取量は表 29 参照）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 29 28 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		2,000 ppm	6,000 ppm	12,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	175	497	1,020
	雌	176	525	1,110

本試験において、いずれの投与群においても検体投与の影響は認められなかった。無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 12,000 ppm（雄：1,020 mg/kg 体重/日、雌：1,110 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 44）

11. 慢性毒性試験及び発がん性試験

（１）1年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、15、50 及び 200 mg/kg 体重/日）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。

200 mg/kg 体重/日投与群の雄で精巣の絶対及び補正重量の減少が認められたが、背景データの範囲内であり、病理組織学的変化が認められなかったことから、検体投与による影響とは考えられなかった。

本試験において、200 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で体重増加抑制及び摂餌量減少等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 45）

表 30 1 年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 mg/kg 体重/日	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ ALP 増加	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ ALP 増加 ・ Glu 減少

	・ Glu、Chol 及びリン減少	
50 mg/kg 体重/日 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

Wistar ラット（主群：一群雌雄各 52 匹、中間と殺群：一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、200、1,200 及び 3,600 ppm：平均検体摂取量は表 31 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 31 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		200 ppm	1,200 ppm	3,600 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	11	67	218
	雌	14	86	261

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 32、子宮の腫瘍発生頻度は表 33 に示されている。

検体投与に関連した腫瘍性病変として、3,600 ppm 投与群の雌で、104 週後に子宮腺癌の発生頻度（9/52 例）が対照群（0/52 例）に比べ有意に増加した。本腫瘍の頻度は対照群で、当該試験と同時期の試験実施施設での背景データ（5 試験、0～19%）の下限であったが、3,600 ppm 群ではほぼ上限を示したことから、投与による影響であると判断した。

全投与群の雌で変異肝細胞巣（好酸性）の頻度が用量相関性はないが有意に増加した。この増加は対照群の頻度が 2/52（3.8%）と、当該試験と同時期の試験実施施設での背景データ（5 試験、7～32%）を下回っていたことに起因すると考えられることから、投与の影響でないと判断した。

本試験において、1,200 ppm 以上投与群の雄で小葉中心性肝細胞肥大、甲状腺ろ胞上皮細胞肥大等、同投与群の雌で甲状腺好塩基性コロイド及びろ胞上皮剥離等が認められたので、無毒性量は雌雄で 200 ppm（雄：11 mg/kg 体重/日、雌：14 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 46）

表 32-1 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
3,600 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ GGT 増加 ・ 肝細胞色素沈着、変異肝細胞巣（好酸性） ・ 甲状腺好塩基性コロイド ・ Alb 増加	・ TP 及び Chol 増加 ・ 肝絶対量及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大及び肝細胞色素沈着 ・ 摂餌量減少 ・ Alb 増加
1,200 ppm 以上	・ TP 増加 ・ 肝絶対量及び補正重量増加	・ 体重増加抑制 ・ 甲状腺好塩基性コロイド及びろ胞

	・小葉中心性肝細胞肥大 ・甲状腺ろ胞上皮細胞肥大	上皮剥離
200 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。

表 32-2 52 週と殺群（1 年間慢性毒性試験群）で認められた毒性所見
（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
3,600 ppm	・体重増加抑制及び摂餌量減少 ・小葉中心性肝細胞肥大及び肝細胞色素沈着	・摂餌量減少 ・Chol 増加 ・肝絶対§及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大及び肝細胞色素沈着
1,200 ppm 以上	・TP 増加 ・肝絶対及び補正重量増加 ・甲状腺ろ胞上皮細胞肥大	・体重増加抑制
200 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。

表 33 子宮の腫瘍発生頻度

投与群	0 ppm	200 ppm	1,250 ppm	3,600 ppm
検査動物数	52	52	52	52
腺腫	0	0	1	0
腺癌	0§	3 (4.7%)	2 (3.1%)	9* (17.3%)

a：試験機関背景対照発現頻度（2002～2007 年に開始した全 5 試験）：0～19%

b：RITA（Registry of Industrial Toxicology Animal -data）背景対照発現頻度（試験期間 22～25 か月間の試験）：0～28%

§：Peto 傾向検定（群 1～4）で増加傾向、 $p<0.05$

*：Fisher 直接確率検定、 $p<0.01$

（3）80 週間発がん性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌（原体：0、200、1,250 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 34 参照）投与による 80 週間発がん性試験が実施された。

表 34 80 週間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群	200 ppm	1,250 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	25	157	900
	29	185	1,000

雄の肝腫瘍の発生頻度は表 35 に示されている。

7,000 ppm 投与群雄において肝細胞腺腫及び肝細胞癌の合計の発生頻度が有

意に増加した。肝細胞腺腫の発生頻度（30%）及び肝細胞癌の発生頻度（20%）は、当該試験と同時期に同一の試験実施施設において行われた 3 試験の背景データ（腺腫：10～28%、癌：6～10%）をいずれも上回っていたことから、肝細胞腺腫及び肝細胞癌の合計の発生頻度の増加は投与による影響であると判断した。

本試験において、7,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雌雄とも 1,250 ppm（雄：157 mg/kg 体重/日、雌：185 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 47）

表 35 雄の肝腫瘍の発生頻度

投与群	0 ppm	200 ppm	1,250 ppm	7,000 ppm
検査動物数	50	50	50	50
肝細胞腺腫	7 (14%)	9 (18%)	10 (20%)	15 (30%)
肝細胞癌	5 (10%)	5 (10%)	3 (6%)	10 (20%)
肝細胞腺腫+癌	9 [§] (18%)	13 (26%)	12 (24%)	19 [*] (38%)

a：試験機関背景対照発現頻度（3 試験）：肝細胞腺腫；10～28%、肝細胞癌；6～10%

b：RITA（Registry of Industrial Toxicology Animal -data）背景対照発現頻度（試験期間 18～19 か月間の試験）：肝細胞腺腫；0～13.6%、肝細胞癌；4.0～22.0%

§：Peto 傾向検定（1～4 群）で増加傾向、 $p < 0.05$

*：Fisher 直接確率検定、 $p < 0.05$

12. 生殖発生毒性試験

（1）2 世代繁殖試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌（原体：0、200、500 及び 1,500 ppm：平均検体摂取量は表 36 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 36 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			200 ppm	500 ppm	1,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	16	41	120
		雌	18	46	143
	F ₁ 世代	雄	17	43	134
		雌	19	47	141

各投与群で認められた毒性所見は表 37 に示されている。

1,500 ppm 投与群の P 及び F₁ 世代で黄体数の減少、同投与群の P 世代で原始卵胞数の減少、F₁ 世代で発育卵胞（胞状卵胞を含む）数の減少が認められた。また同投与群の両世代では膈スミアにおいて哺育期の発情休止期を示す個体が増加した。原始卵胞数については投与期間がより長期の F₁ 世代で確認されなかったことから、偶発的なものと考えられた。黄体数の減少、発育卵胞数の減少につ

いては、哺育期の同群での児動物の体重増加抑制による授乳期間が延びたために母動物の発情周期回帰が遅延したことによるものと考えられた。対照群の性周期回帰時の黄体像に対し、1,500 ppm 投与群の大部分が妊娠黄体であったことも回帰遅延を裏付けていると考えられた。したがってこれらの変化は、児動物の体重増加抑制による間接的な変化であり、検体投与による直接的な影響ではないと考えられた。

本試験において、親動物では 1,500 ppm 投与群の P 世代雌雄及び F₁ 世代雌雄で肝絶対及び補正重量増加並びに小葉中心性肝細胞肥大等が、児動物では 1,500 ppm 投与群の F₁ 世代雌雄及び F₂ 世代雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は親動物及び児動物の雌雄とも 500 ppm（P 雄：41 mg/kg 体重/日、P 雌：46 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：43 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：47 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 48）

表 37 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親：P、児：F ₁		親：F ₁ 、児：F ₂	
		雄	雌	雄	雌
親動物	1,500 ppm	- 肝及び甲状腺絶対及び補正重量増加 - 小葉中心性肝細胞肥大[§]	- 体重増加抑制及び摂餌量減少 - 肝絶対及び補正重量増加 - 小葉中心性肝細胞肥大[§]	- 肝絶対及び補正重量増加 - 小葉中心性肝細胞肥大[§] - 甲状腺び慢性ろ胞肥大[§]	- 体重増加抑制及び摂餌量減少 - 肝絶対及び補正重量増加 - 卵巣及び子宮絶対及び補正重量減少 - 小葉中心性肝細胞肥大[§]
	500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性試験なし	毒性所見なし
児動物	1,500 ppm	体重増加抑制（哺育 14 及び 21 日）	- 体重増加抑制（哺育 14 及び 21 日） - 膈開口遅延^{§§}	体重増加抑制（哺育 14 及び 21 日）	体重増加抑制（哺育 14 及び 21 日）
	500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが毒性影響と判断した。

§§：体重増加抑制に伴う二次的な遅延であると考えられた。

（2）発生毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6～20 日に強制経口（原体：0、25、100 及び 200 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%CMC）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、100 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で体重増加抑制及び摂餌量減少が認められ、胎児ではいずれの投与群においても検体投与の影響は認

められなかったので、無毒性量は母動物で 25 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 200 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 49）

（３）発生毒性試験（ウサギ）

NZW ウサギ（一群雌 25 匹）の妊娠 7～28 日に強制経口（原体：0、25、100 及び 200 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%CMC）投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 38 に示されている。

200 mg/kg 体重/日投与群の胎児において、第 13 肋骨の発生頻度の増加が統計学的に有意に認められたが、背景データの範囲内であり検体投与による影響ではないと考えられた。

本試験において、200 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制及び摂餌量減少等が、胎児で低体重が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児とも 100 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。

（参照 50）

表 38 発生毒性試験（ウサギ）で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
200 mg/kg 体重/日	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少 ・ 糞量減少 ・ 肝絶対及び比重量⁴増加[§]	・ 低体重
100 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	毒性所見なし

§：比重量について統計学的解析はされていないが毒性影響と判断した。

1 3. 遺伝毒性試験

セダキサン（原体）の細菌を用いた復帰突然変異試験、ヒトリンパ球細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験、マウスリンフォーマ TK 試験、マウスを用いた小核試験及びラット肝細胞を用いた UDS 試験が実施された。

試験結果は表 39 に示されているとおり、全て陰性であったことから、セダキサンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 51～55）

⁴ 体重比重量のことを比重量という（以下同じ。）。

1 表 39 遺伝毒性試験概要（原体）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2、WP2 <i>uvrA</i> 株)	3~5,000 µg/7° レート (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験	ヒトリンパ球細胞	70.8~217 µg/mL (+/-S9) (4 時間処理) 23.1~70.8 µg/mL (-S9) (22 時間処理)	陰性
	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y TK ^{+/+})	①13.8~110 µg/mL (+S9) 6.9~82.5 µg/mL (-S9) ② 20~100 µg/mL (+S9)、20~90 µg/mL (-S9)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験	NMRI マウス（骨髓細胞） (一群雄 6 匹)	500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重/ 日 (強制単回経口投与)	陰性
	UDS 試験	SD ラット（肝細胞） (一群雄 4 匹)	667 及び 2,000 mg/kg 体重/日 (単回経口投与) (2 及び 16 時間 処理)	陰性

2 +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

3

4 代謝物 AB（植物及び土壌由来）の細菌を用いた復帰突然変異試験、ヒトリンパ

5 球細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験及びマウスリンフォーマ TK 試験が実施さ

6 れた。結果は表 40 に示されているとおり、全て陰性であった。

7 (参照 56~58)

9 表 40 遺伝毒性試験概要（代謝物 AB）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2、WP2 <i>uvrA</i> 株)	①3~5,000 µg/7° レート (+/-S9) (プレート法) ② 33~5,000 µg/7° レート (+/-S9) (プレインキュベーション法)	陰性

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
	染色体異常試験	ヒトリンパ球細胞	① 328.4~1,006 µg/mL (+S9) 、 575~1,760 µg/mL (-S9) (4 時間処理) ② 574.7~1,760 µg/mL (-S9) (22 時間処理) 575~1,760 µg/mL (+S9) (4 時間処理)	陰性
	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y TK ^{+/+})	55~1,760 µg/mL (+/-S9)	陰性

+/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

14. その他の試験

(1) 28 日間亜急性毒性試験（異性体比較試験）（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）を用い、等量混合物（セダキサンのトランス体：シス体＝1：1 混合物）、トランス体及びシス体を 28 日間混餌（各検体：0、500、2,000 及び 5,000 ppm：平均検体摂取量は表 41 参照）投与し、異性体間での毒性の比較試験が実施された。血漿中濃度推移の検討において、等量混合物はトランス体及びシス体を分別定量し、それぞれの血漿中薬物動態学的パラメータを算出した。

表 41 28 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
平均検体 摂取量 (mg/kg 体重/日)	等量混合物 (トランス体：シス体＝1：1)	雄	47.5	181	445
		雌	46.7	181	428
	トランス体	雄	47.0	187	438
		雌	48.4	177	384
	シス体	雄	45.9	183	438
		雌	47.6	180	436

各投与群で認められた影響は表 42 に、肝臓生化学検査結果は表 43 に、血漿中薬物動態学的パラメータは表 44 にそれぞれ示されている。

全ての検体投与群の雌雄で肝 PROD 活性及び 16β テストステロンヒドロキシラーゼ (TH) 活性の増加が認められ、セダキサンは CYP2B アイソフォームの誘導物質であると考えられた。一方、EROD 活性の増加は軽度であったことから、CYP1A アイソフォーム誘導能は低いと考えられた。

いずれの検体投与群の雌においても 16αTH 及び 2αTH が増加、又は 26TH 及び 6βTH が増加したことから、セダキサン投与によりそれぞれ CYP2C11 又は

CYP3A が誘導されると考えられた。

免疫ブロット法において、全ての検体投与群において CYP2B 及び CYP3A の増加が認められた。

血漿中濃度推移分析の結果、トランス体の C_{max} 及び AUC はシス体よりも高い値を示した。

等量混合物、トランス体及びシス体の標的臓器は肝臓であり、毒性所見の発生頻度、影響の程度及び薬物代謝酵素誘導に質的な差は認められなかった。

（参照 59）

表 42 28 日間亜急性毒性試験（異性体）（ラット）で認められた影響

	投与群	雄	雌
等量混合物 （トランス体：シス体＝1：1）	5,000 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ TP、Chol、TG 及び Ure 増加 ・ GGT 及び ALP 増加 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ T.Bil 増加 ・ ALT 及び GGT 増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加
	2,000 ppm 以上	・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大	・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ TP、Chol 及び TG 増加
	500 ppm	・ 毒性所見なし	・ TG 増加
トランス体	5,000 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ T.Bil 及び Ure 増加 ・ TP、Chol 及び TG 増加 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ T.Bil 増加 ・ ALT 及び GGT 増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加
	2,000 ppm 以上	・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大	・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ TP、Chol 及び TG 増加
	500 ppm	・ 毒性所見なし	・ TG 増加
シス体	5,000 ppm	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ Chol 及び TG 増加 ・ GGT 及び CK 増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加	・ 体重増加抑制及び摂餌量減少[§] ・ 肝絶対及び補正重量増加 ・ 子宮絶対及び補正重量増加 ・ TP 増加 ・ GGT 増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大 ・ 滑面小胞体、脂肪滴及びライソゾームの増加 ・ 濃縮細胞の増加
	2,000 ppm 以上	・ TP 増加	・ Chol 及び TG 増加
	500 ppm	・ 毒性所見なし	・ TP 及び Chol 増加

§：摂餌量について統計学的解析はされていないが毒性影響と判断した。

1

表 43 肝臓生化学検査結果

投与群		薬物代謝酵素活性（活性/mg タンパク） ¹⁾							
		PROD	EROD	7αTH	6βTH	16αTH	16βTH	2αTH	2βTH
等量混合物（トランス体：シス体＝1：1）									
5,000 ppm	雄	50*	1.0	1.6*	1.4	0.6 [§]	22.4 [§]	0.1 [§]	1.3
	雌	12*	1.7*	2.0*	10.9 [§]	18.6 [§]	19.7 [§]	2.3 [#]	13.7 [§]
2,000 ppm	雄	73*	1.5	1.6 [#]	2.2 [§]	0.9	23.4 [§]	0.4 [#]	1.2
	雌	10*	1.5 [#]	1.3	3.2	6.7	6.5	1.9	3.7
500 ppm	雄	3.5*	1.3	1.1	1.2	0.7*	4.4	0.8	1.0
	雌	2*	1.2	1.0	1.4	2.0	1.8	0.9	1.4
トランス体									
5,000 ppm	雄	118*	0.8 [#]	1.8*	1.9*	0.8	35.6 [§]	0.2 [§]	1.1
	雌	12*	1.4	1.5	3.9	13.4*	14.4*	1.0	4.1
2,000 ppm	雄	64*	1.1	1.4	1.4	0.7*	24.2 [§]	0.2 [§]	0.8
	雌	18*	1.3	1.4	2.9	13.3*	13.6*	1.0	2.9
500 ppm	雄	2*	1.1	1.3	1.1	0.7*	2.2	0.6	0.9
	雌	1.3	1.1	1.0	0.9	1.3	1.2	0.7	0.9
シス体									
5,000 ppm	雄	46*	1.4	1.2	1.7 [#]	0.6 [§]	20.7 [§]	0.2 [§]	1.8 [§]
	雌	9*	1.5 [#]	1.7 [#]	8.8 [§]	11.2*	11.9 [#]	3.4 [§]	11.8 [§]
2,000 ppm	雄	52*	1.6 [#]	1.4 [#]	2.3 [§]	0.8 [#]	20.0 [§]	0.4*	1.5*
	雌	7*	1.4 [#]	1.3	4.6	5.5	5.4	1.2	6.1 [#]
500 ppm	雄	5.5*	2 [#]	1.4	1.2	0.8 [#]	4.8	0.7	0.9
	雌	2.3*	1.5 [#]	1.3	1.2	2.1	2.0	0.8	1.3

1)：数値は対照群に対する変動倍率を示す。

#：p<0.05、*：p<0.01、[§]：p<0.001

2

3

4

5

表 44 血漿中薬物動態学的パラメータ

等量混合物（トランス体） ¹⁾						
性別	雄			雌		
投与量	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
T _{max} (hr)	17	19	23	12	16	19
C _{max} (μg/g)	0.112	1.22	1.61	0.0915	0.555	0.843
AUC (hr・μg/g)	1.42	14.3	21.2	1.23	8.48	11.4
等量混合物（シス体） ¹⁾						
性別	雄			雌		
投与量	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
T _{max} (hr)	20	19	19	—	17	19
C _{max} (μg/g)	0.0275	0.101	0.120	—	0.134	0.147
AUC (hr・μg/g)	0.320	1.42	2.03	—	1.55	1.78
トランス体						
性別	雄			雌		
投与量	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
T _{max} (hr)	12	16	19	13	13	20
C _{max} (μg/g)	0.391	4.61	3.40	0.198	2.50	3.37
AUC (hr・μg/g)	4.89	59.0	44.8	2.73	28.6	44.6

シス体						
性別	雄			雌		
投与量	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm	500 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
T _{max} (hr)	—	20	16	—	16	16
C _{max} (μg/g)	—	0.676	0.526	—	0.266	0.635
AUC (hr・μg/g)	—	5.53	6.45	—	2.63	6.38

1)：等量混合物のトランス体及びシス体を分別定量し、パラメータを算出した。

—：分析せず。

(2) 28 日間免疫毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雄 10 匹）を用いた混餌（原体：0、500、2,000 及び 5,500 ppm：平均検体摂取量は表 45 参照）投与による 28 日間免疫毒性試験が実施された。

表 45 28 日間免疫毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		500 ppm	2,000 ppm	5,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	93	367	1,080

いずれの投与群においても、脾臓及び胸腺の絶対、比及び補正重量、IgM 抗体産生脾臓細胞数に、検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、免疫毒性は認められなかった。（参照 60）

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬「セダキサン」の食品健康影響評価を実施した。

^{14}C で標識したセダキサンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与されたセダキサンの吸収率は少なくとも 87.1% TAR であり、主に糞中に排泄された。 T_{max} 付近では、主に消化管及び肝臓に高い濃度が認められたが、速やかに減少し、蓄積性は認められなかった。未変化のセダキサンは糞中に僅かに認められたのみであり、主要代謝物として、B、C、E 及び F が認められた。

^{14}C で標識したセダキサンの畜産動物（ヤギ及びニワトリ）を用いた動物体内運命試験の結果、10% TRR を超えて検出された代謝物は B、C、D、E 及び J であった。

^{14}C で標識したセダキサンの植物体内運命試験の結果、可食部においては、各試料中の残留放射能の成分として未変化のセダキサンのほか、代謝物 I 及び AB が 10% TRR を超えて認められた。

セダキサンを分析対象化合物とした海外におけるばれいしょの作物残留試験の結果、最大残留値は塊茎の 0.0159 mg/kg であった。

セダキサン、代謝物 B 及び E を分析対象化合物とした畜産物残留試験（乳牛）の結果、セダキサン及び代謝物 B は検出されず、代謝物 E の最大残留値は肝臓の 0.03 $\mu\text{g/g}$ であった。

各種毒性試験結果から、セダキサン投与による影響は、主に体重（増加抑制）、摂餌量減少及び肝臓（重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等）に認められた。神経毒性、催奇形性、繁殖能に対する影響、遺伝毒性及び免疫毒性は認められなかった。

ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験において子宮腺癌の発生頻度、マウスを用いた 80 週間発がん性試験において肝腫瘍の発生頻度が増加したが、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。

植物体内運命試験の結果、可食部において 10% TRR を超える代謝物として I 及び AB が認められたが、残留量が少なかったことから、農産物中の暴露評価対象物質をセダキサン（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 46 に、単回経口投与等により惹起されると考えられる毒性影響等は表 47 に示されている。

食品安全委員会農薬専門調査会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 11 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.11 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

また、セダキサンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の 30 mg/kg 体重であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.3 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

1

ADI	0.11 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	11 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

2

ARfD	0.3 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	急性神経毒性試験
(動物種)	ラット
(投与方法)	単回強制経口
(無毒性量)	30 mg/kg 体重
(安全係数)	100

3

1

表 46 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ¹⁾
ラット	90 日間 亜急性毒性	0、250、1,000、 4,000 ppm 雄：0、18.6、 72.9、300 雌：0、21.4、 85.7、315	雄：72.9 雌：21.4	雄：300 雌：85.7	雄：体重増加抑制、肝絶対及び補正重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等 雌：肝絶対及び補正重量増加
	13 週間 亜急性毒性	0、300、2,000、 4,000 ppm 雄：0、24.8、 168、325 雌：0、28.3、 186、350	雄：168 雌：28.3	雄：325 雌：186	雄：体重増加抑制、肝絶対及び補正重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等 雌：体重増加抑制、前肢握力減少
	90 日間亜急性神経毒性試験	0、300、1,000、 4,000 ppm 雄：0、19.7、 66.0、260 雌：0、24.3、 79.7、303	雄：66.0 雌：79.7	雄：260 雌：303	雌雄：体重増加抑制、摂餌量減少等 (神経毒性は認められない)
	2 年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	0、200、1,200、 3,600 ppm 雄：0、11、67、 218 雌：0、14、86、 261	雄：11 雌：14	雄：67 雌：86	雄：小葉中心性肝細胞肥大、甲状腺ろ胞上皮細胞肥大等 雌：甲状腺好塩基性コロイド及びろ胞上皮剥離等 (雌：子宮腺癌)
	2 世代 繁殖試験	0、200、500、 1,500 ppm P 雄：0、16、 41、120 P 雌：0、18、 46、143 F ₁ 雄：0、17、 43、134 F ₁ 雌：0、19、 47、141	親動物及び児動物 P 雄：41 P 雌：46 F ₁ 雄：43 F ₁ 雌：47	親動物及び児動物 P 雄：120 P 雌：143 F ₁ 雄：134 F ₁ 雌：141	親動物 雌雄：肝絶対及び補正重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等 児動物：体重増加抑制 (繁殖能に対する影響は認められない)
	発生毒性試験	0、25、100、200	母動物：25 胎児：200	母動物：100 胎児：－	母動物：体重増加抑制及び摂餌量減少

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ¹⁾
					胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
マウス	28日間 亜急性 毒性試験	0、1,000、 5,000、7,000 ppm 雄：0、178、920、 1,270 雌：0、248、 1,150、1,800	雄：1,270 雌：1,800	雄：－ 雌：－	雌雄：毒性所見なし
	90日間 亜急性 毒性試験	0、500、3,500、 7,000 ppm 雄：0、80、567、 1,170 雌：0、112、810、 1,460	雄：567 雌：1,460	雄：1,170 雌：－	雄：体重増加抑制 雌：毒性所見なし
	80週間 発がん性 試験	0、200、1,250、 7,000 ppm 雄：0、25、157、 900 雌：0、29、185、 1,000	雄：157 雌：185	雄：900 雌：1,000	雌雄：体重増加抑制 (雄：肝細胞腺腫、肝細胞癌)
ウサギ	発生毒性 試験	0、25、100、200	母動物：100 胎児：100	母動物：200 胎児：200	母動物：体重増加抑制及び摂餌量減少等 胎児：低体重 (催奇形性は認められない)
イヌ	13週間 亜急性 毒性試験	0、50、150、400	雄：150 雌：50	雄：400 雌：150	雌雄：体重増加抑制及び摂餌量減少
	1年間慢性 毒性試験	0、15、50、200	雄：50 雌：50	雄：200 雌：200	雌雄：体重増加抑制及び摂餌量減少等

－：最小毒性量は設定できなかった。

¹⁾：備考には最小毒性量で認められた毒性所見の概要を示した。

1 表 47 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に 関連するエンドポイント ¹⁾ (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)
ラット	急性毒性	雌：0、175、550、 1750、5000	雌：<175 雌：軽度粗毛（投与後約 30 分～5 時間）、円 背位及び鎮静化（投与後 2～3 時間）
	急性神経毒 性	0、30、250、2,000	雌雄：30 雌雄：衰弱、よろめき歩行、活動性低下等
	13 週間 亜急性毒性	0、300、2,000、4,000 ppm 雄：0、24.8、168、 325 雌：0、28.3、186、 350	雄：168 雌：186 雄：体重増加抑制（投与後 0～7 日）、摂餌量 減少（投与後 7 日） 雌：体重増加抑制（投与後 0～7 日）
マウス	90 日間 亜急性 毒性試験	0、500、3,500、7,000 ppm 雄：0、80、567、1,170 雌：0、112、810、 1,460	雄：567 雌：1,460 雄：体重増加抑制（投与後 0～7 日）、食餌効 率減少（投与後 1～4 週）
イヌ	13 週間 亜急性 毒性試験	0、50、150、400	雌雄：150 雌雄：摂餌量減少（雄：投与後 8～15 日、雌： 投与後 1～8 日）
ARfD			NOAEL：30 SF：100 ARfD：0.3
ARfD 設定根拠資料			ラット急性神経毒性

2 ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量

3 1)：最少毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

4

5

1 <別紙1：代謝物/分解物略称>

記号	略称	化学名
B	CSCD659087 デスメチルフェノール体 (トランス体)	N-[2-[(1S,2R)-2-cyclopropylcyclopropyl]-4-hydroxy-phenyl]-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
C	CSCD668404 デスメチルフェノール体 (シス体)	N-[2-[(1S,2S)-2-cyclopropylcyclopropyl]-4-hydroxy-phenyl]-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
D	CSCD659088 デスメチルヒドロキシ体 (トランス体)	3-(difluoromethyl)-N-[2-[(1S,2S)-2-(1-hydroxycyclopropyl)cyclopropyl]phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
E	CSCD658906 フェノール体 (トランス体)	N-[2-[(1S,2R)-2-cyclopropylcyclopropyl]-4-hydroxy-phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
F	CSCD659090 フェノール体 (シス体)	N-[2-[(1S,2S)-2-cyclopropylcyclopropyl]-4-hydroxy-phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
G	CSCD659089 シクロプロピル環ヒドロキシ体 (トランス体)	3-(difluoromethyl)-N-[2-[(1S,2S)-2-(1-hydroxycyclopropyl)cyclopropyl]phenyl]-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
H	CSCD668403 β-ヒドロキシカルボニル体 (トランス体)	3-(difluoromethyl)-N-[2-[(1S,2S)-2-(3-hydroxypropanoyl)cyclopropyl]phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
I	CSCC210616 ピラゾールアミド体	3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
J	CSCD667584 N-デスメチル体 (トランス体)	N-[2-[(1S,2R)-2-cyclopropylcyclopropyl]phenyl]-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
K	β-ヒドロキシカルボニルシステイン抱合体 (ラセミ体)	代謝物 H (CSCD668403) の propanoyl 基 3 位の S-システイン抱合体
L	デスメチルジヒドロキシル体	セダキサンの N-デスメチル、フェノール及びシクロプロピル環ジヒドロキシ体
M	デスメチル β-ヒドロキシカルボニル体	代謝物 H (CSCD668403) のデスメチル体
N	ジヒドロキシル体	セダキサンのジヒドロキシ体 (フェニル環ジヒドロキシ又はフェニル環及びシクロプロピル環の各ヒドロキシ体)
O	CSCD668403 β-ヒドロキシカルボニル体 (ラセミ体)	3-(difluoromethyl)-N-[2-[2-(3-hydroxypropanoyl)cyclopropyl]phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
P	カルボン酸体	セダキサンのシクロプロパンカルボン酸体
Q	ヒドロキシ β-ヒドロキシカルボニル体	代謝物 H (CSCD668403) のフェノール体
R	デスメチルヒドロキシ硫酸抱合体	セダキサンの N-デスメチル、フェノール又はシクロプロピル環ヒドロキシ体の O-硫酸抱合体
S	デスメチルグルクロン酸抱合体	セダキサンの N-デスメチル、N-グルクロン酸抱合体 (立体配置記載なし)
T	デスメチルヒドロキシ	セダキサンの N-デスメチル、フェノール又はシクロプロピル環のヒ

	シグルクロン酸抱合体	ドロキシ体の O-グルクロン酸抱合体
U	ヒドロキシグルクロン酸抱合体	セダキサンのフェノール又はシクロプロピル環ヒドロキシ体の O-グルクロン酸抱合体
V	ヒドロキシ硫酸抱合体	セダキサンのフェノール又はシクロプロピル環ヒドロキシ体の硫酸抱合体
W	ヒドロキシシステイン抱合体	セダキサンのフェノール、シクロプロピル環の S-システイン抱合体
X	ジヒドロキシグルクロン酸抱合体	セダキサンのフェノール又はシクロプロピル環のヒドロキシ体の O-グルクロン酸抱合体
Y	ヒドロキシグルタチオン抱合体	セダキサンのフェノール、シクロプロピル環 S-グルタチオン抱合体
Z	ジヒドロキシグルタチオン抱合体	セダキサンのフェノール及びシクロプロピル環のジヒドロキシ体、フェニル環 S-グルタチオン抱合体
AA	CSAA798670 (CSCD798670) ピラゾール酸	3-(difluoromethyl)-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazole-4-carboxylic acid
AB	CSCD465008 N-デスメチルピラゾール酸	3-(difluoromethyl)-1 <i>H</i> -pyrazole-4-carboxylic acid
AC	CSCD667555 N-グルコシド	N-[2-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-cyclopropylcyclopropyl]phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]pyrazole-4-carboxamide
AD	CSCD667556 N-マロニルグルコシド	3-[[[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[4-[[2-(2-cyclopropylcyclopropyl)phenyl]carbamoyl]-3-(difluoromethyl)pyrazol-1-yl]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methoxy]-3-oxo-propanoic acid
AE	CSCD728931	N-[2-(3-cyclopropyl-1-hydroxy-3-oxo-propyl)phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
AF	CSCD668094	N-[2-(3-cyclopropyl-1,3-dihydroxy-propyl)phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
AG	CSCD668095	3-[2-[[3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl]amino]phenyl]-3-hydroxy-propanoic acid

1 <別紙 2：検査値等略称>

略称	名称
ai	有効成分量 (active ingredient)
Alb	アルブミン
ALP	アルカリホスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
AUC	薬物濃度曲線下面積
Chol	コレステロール
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
Cre	クレアチニン
CK	クレアチンキナーゼ
CYP	シトクロム P450 アイソザイム
EROD	エトキシレゾルフィン <i>O</i> -デエチラーゼ
FOB	機能観察総合検査
GGT	γ -グルタミルトランスフェラーゼ [= γ -グルタミルトランスぺプチダーゼ (γ -GTP)]
Glob	グロブリン
Glu	グルコース (血糖)
Hb	ヘモグロビン (血色素量)
Ht	ヘマトクリット値 [=血中血球容積 (PCV)]
Ig	免疫グロブリン
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
Lym	リンパ球数
Mon	単球数
P	リン
PLT	血小板数
PROD	ペントキシレゾルフィン <i>O</i> -デペンチラーゼ
PT	プロトロンビン時間
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与 (処理) 放射能
T.Bil	総ビリルビン
TG	トリグリセリド
TH	テストステロンヒドロキシラーゼ

TP	総蛋白質
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能
Ure	尿素
WBC	白血球数

1 <別紙3：作物残留試験成績－海外>

作物名 (分析部位) 実施国 (実施年)	試験 ほ場数	試験条件				最大残留値 ²⁾ (mg/kg)		トランス体:シス 体 ³⁾ (mg/kg)
		剤型	使用量・使 用方法	回数	経過 日数 ¹⁾			
ばれいしょ (塊茎) 米国 (2012年)	16	45.45% 水和剤	2.5 g a.i./100 kg 種いも処 理	1		ほ場01	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 02	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 03	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 04	0.0103	0.0078 : <0.0025
						ほ場 05	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 06	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 07	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 08	0.0082	0.0057 : <0.0025
						ほ場 09	0.0085	0.0060 : <0.0025
						ほ場 10	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 11	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 12	<0.0075	<0.005 : <0.0025
						ほ場 13	0.0159	0.013 : <0.0025
						ほ場 14	<0.005	<0.0025 : <0.0025
						ほ場 15	<0.01	<0.005 : <0.005
						ほ場 16	<0.01	<0.005 : <0.005
ばれいしょ (塊茎) カナダ (2011年)	13	45.45% 水和剤	2.5 g a.i./100 kg 種いも処 理	1	95	ほ場01	<0.01	<0.005 : <0.005
					87	ほ場 02	<0.01	<0.005 : <0.005
					78	ほ場 03	<0.01	<0.005 : <0.005
					95	ほ場 04	<0.01	<0.005 : <0.005
					95	ほ場 05	<0.01	<0.005 : <0.005
					86	ほ場 06	<0.01	<0.005 : <0.005
					86	ほ場 07	<0.01	<0.005 : <0.005
					88	ほ場 08	<0.01	<0.005 : <0.005
					93	ほ場 09	<0.01	<0.005 : <0.005
					99	ほ場 10	<0.01	<0.005 : <0.005
					98	ほ場 11	<0.01	<0.005 : <0.005
					110	ほ場 12	<0.01	<0.005 : <0.005
					110	ほ場 13	<0.01	<0.005 : <0.005

1) : 経過日数が記載されていないほ場では、収穫期（成熟期）に試料を採取した。

2) : 最大条件下の作物残留試験を実施し、最終使用から収穫までの最短期間で収穫した。

3) : 試験に供した検体の異性体比：トランス体：シス体＝約 6 : 1

＜参照＞

1. セダキサン（殺菌剤）農薬等の残留基準設定に係る要請書添付資料概要：シンジェンタジャパン株式会社、2013年、一部公表
2. Pharmacokinetics in the Rat Following a Single Oral Administration of 1 mg or 80 mg [Pyrazole-5-¹⁴C]-SYN524464/kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
3. Excretion and Tissue Distribution in the Rat Following Single Oral Administration of 1 mg or 80 mg [Pyrazole-5-¹⁴C]-SYN524464/kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
4. Excretion in Bile Duct Cannulated Rats Following Single Oral Administration of 1 mg or 80 mg [Pyrazole-5-¹⁴C]-SYN524464/kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
5. Excretion in Bile Duct Cannulated Rats Following Single Oral Administration of 1 mg or 80 mg [Phenyl-U-¹⁴C]-SYN524464/kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
6. Tissue Depletion in the Rat Following Single Oral Administration of 1 mg or 80 mg [Pyrazole-5-¹⁴C]-SYN524464 /kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
7. Tissue Distribution and Elimination in the Rat Following Repeated Daily Oral Administration of 1 mg [Pyrazole-5-¹⁴C]-SYN524464/kg : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
8. Investigation of the Nature and Identity of Radiolabelled Metabolites Present in Plasma, Urine, Faeces and Bile Collected from Rats Following Oral Administration of [¹⁴C]-SYN524464 : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
9. Metabolism of [¹⁴C]-SYN524464 in the Lactating Goat : Charles River Laboratories (英国)、2009年、未公表
10. Metabolism of [¹⁴C]-SYN524464 in the Laying Hen : Charles River Laboratories (英国)、2010年、未公表
11. Translocation of Radioactive Residues in Spring Wheat, Soybean and Maize : Syngenta UK (英国)、2007年、未公表
12. [¹⁴C]SYN524464 - Metabolism in Spring Wheat (Analytical Phase Only) : Covance Laboratories Limited (英国)、2010年、未公表
13. [¹⁴C]SYN524464 - Metabolism in Soya Wheat (Analytical Phase Only) : Covance Laboratories Limited (英国)、2010年、未公表
14. [¹⁴C]SYN524464 - Metabolism in Swiss Chard : Covance Laboratories Limited (英国)、2010年、未公表
15. [¹⁴C]SYN524464 -Uptake & Translocation of Radioactive Residues in Canola :

- 1 Covance Laboratories Limited（英国）、2010年、未公表
- 2 16. Route and Rate of Degradation of ^{14}C -Pyrazole-Labelled SYN524464, Applied
- 3 as Treated Seed, in One Soil under Aerobic Laboratory Conditions at 20°C :
- 4 Syngenta（英国）、2009年、未公表
- 5 17. Route and Rate of Degradation of ^{14}C -Phenyl-Labelled SYN524464, Applied
- 6 as Treated Seed, in Four Soils under Aerobic Laboratory Conditions at
- 7 20°C : Syngenta（英国）、2008年、未公表
- 8 18. [^{14}C]-SYN524464 - Rate of Degradation in Three Soils at 20°C : Battelle UK
- 9 Ltd.（英国）、2009年、未公表
- 10 19. [^{14}C]-SYN524464 – Identification of a Metabolite formed in Study NC/07/015:
- 11 Battelle UK Ltd.（英国）、2010年、未公表
- 12 20. Metabolism of [Phenyl- $\text{U-}^{14}\text{C}$]Labeled SYN524464 Treated Seeds under
- 13 Aerobic/Anaerobic Laboratory Conditions in One Soil at 20°C : Syngenta Crop
- 14 Protection, Inc.（米国）、2007年、未公表
- 15 21. Adsorption/Desorption of [Phenyl- $\text{U-}^{14}\text{C}$]-labeled SYN524464 on six soils
- 16 (Gartenacker, Marsillargues, 18 Acresm Visalia, Washington and
- 17 Champaign) : Syngenta Crop Protection AG（スイス）、2008年、未公表
- 18 22. Hydrolysis of [Phenyl- $\text{U-}^{14}\text{C}$]-labelled Material under Laboratory Condition :
- 19 Syngenta Crop Protection AG（スイス）、2007年、未公表
- 20 23. Aqueous Photolysis in Sterile Buffer Solution and Sterile Natural Water :
- 21 Syngenta Ltd.（英国）、2007年、未公表
- 22 24. 作物残留試験成績：米国及びカナダ、試験年不明、未公表
- 23 25. SYN524464 500FS (A16148C) – Magnitude of the Residues in Potato
- 24 Following Seed Treatment Application USA 2011 : Syngenta Crop Protection,
- 25 LLC（米国）、2012年、未公表
- 26 26. Sedaxane FS (A16148C) and Diquat SN (A12872A) – Residue Levels on
- 27 Potatoes from Trials Conducted in Canada During 2011 : Syngenta Canada
- 28 Inc.（カナダ）、2012年、未公表
- 29 27. Magnitude of Residues in Milk and Tissues of Dairy Cows Following Multiple
- 30 Oral Administrations of SYN524464 : Charles River Laboratories（英国）、2009
- 31 年、未公表
- 32 28. SYN524464 - Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down
- 33 Procedure) : RCC Ltd.（スイス）、2008年、未公表
- 34 29. SYN524464 - Acute Dermal Toxicity Study in the Rat : RCC Ltd.（スイス）、
- 35 2007年、未公表
- 36 30. SYN524464 - 4-Hour Acute Inhalation Toxicity Study In Rats : RCC Ltd.（ス
- 37 イス）、2008年、未公表
- 38 31. CSCD465008 - Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down

- 1 Procedure) : RCC Ltd. (スイス)、2008年、未公表
- 2 32. SYN524464 -Acute Oral (Gavage) Neurotoxicity Study in the Rat : RCC Ltd.
- 3 (スイス)、2009年、未公表
- 4 33. SYN524464 - Primary Eye Irritation Study in Rabbits : RCC Ltd. (スイス)、
- 5 2007年、未公表
- 6 34. SYN524464 - Primary Skin Irritation Study in Rabbits (4 Hour
- 7 Semi-Occlusive Application) : RCC Ltd. (スイス)、2007年、未公表
- 8 35. SYN524464 - Local Lymph Node Assay in the Mouse : Safeparm
- 9 Laboratories Limited (英国)、2007年、未公表
- 10 36. 90 Day Dietary Toxicity Study In Rats : Syngenta Central Toxicology
- 11 Laboratory (英国)、2007年、未公表
- 12 37. SYN524464 - 13 Week Rat Dietary Toxicity Study : Charles River
- 13 Laboratories (英国)、2009年、未公表
- 14 38. SYN524464 - 4 Week Mouse Dietary Preliminary Study : Charles River (英国)、
- 15 2009年、未公表
- 16 39. SYN524464 - 90 Day Mouse Preliminary Carcinogenicity Study : Charles
- 17 River Laboratories (英国)、2008年、未公表
- 18 40. SYN524464 - 13-Week Oral (Capsule) Toxicity Study in the Beagle Dog :
- 19 Harlan Laboratories Ltd. (スイス)、2008年、未公表
- 20 41. SYN524464 - 4-Week Oral (Capsule) Toxicity Study in the Beagle Dog :
- 21 Harlan Laboratories Ltd. (スイス)、2008年、未公表
- 22 42. SYN524464 - 90-Day Neurotoxicity (Dietary) Study in the Rat : Harlan
- 23 Laboratories Ltd. (スイス)、2009年、未公表
- 24 43. SYN524464 - 28-Day Dermal Toxicity (Semi-Occlusive) Study in the Wistar
- 25 Rat : Harlan Laboratories Ltd. (スイス)、2008年、未公表
- 26 44. CSCD465008 - A 28-Day Oral (Dietary) Toxicity Study in Wistar Rats : WIL
- 27 Research Laboratories, LLC (米国)、2008年、未公表
- 28 45. SYN524464 - 52-Week Oral (Capsule) Toxicity Study in the Dog : Harlan
- 29 Laboratories Ltd. (スイス)、2009年、未公表
- 30 46. SYN524464 - 104 Week Rat Dietary Carcinogenicity Study with Combined 52
- 31 Week Toxicity Study : Charles River Laboratories (英国)、2010年、未公表
- 32 47. SYN524464 - 80 Week Mouse Dietary Carcinogenicity Study : Charles River
- 33 Laboratories (英国)、2010年、未公表
- 34 48. SYN524464 - Two-Generation Reproduction Toxicity Study in the Han Wistar
- 35 Rat : Harlan Laboratories Ltd. (スイス)、2010年、未公表
- 36 49. SYN524464 - Prenatal Developmental Toxicity Study in the Han Wistar
- 37 Rat : Harlan Laboratories Ltd. (スイス)、2009年、未公表
- 38 50. SYN524464 - A Prenatal Developmental Toxicity Study in New Zealand

- 1 White Rabbits : WIL Research Laboratories, LLC (米国)、2010年、未公表
- 2 51. SYN524464 – Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse
- 3 Mutation Assay : Harlan Cytotest Cell Research GmbH (ドイツ)、2009年、
- 4 未公表
- 5 52. SYN524464 - Chromosome Aberration Test in Human Lymphocytes In
- 6 Vitro : Harlan Cytotest Cell Research GmbH (ドイツ)、2009年、未公表
- 7 53. SYN524464 – Cell Mutation Assay at the Thymidine Kinase Locus (TK +/-) in
- 8 Mouse Lymphoma L5178Y Cells : Harlan Cytotest Cell Research GmbH (ドイ
- 9 ツ)、2009年、未公表
- 10 54. SYN524464 - Micronucleus Assay in Bone Marrow Cells of the Mouse: Harlan
- 11 Cytotest Cell Research GmbH (ドイツ)、2010年、未公表
- 12 55. SYN524464 - In vivo Liver Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Assay: Harlan
- 13 Laboratories Ltd. (英国)、2009年、未公表
- 14 56. CSCD465008 - Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse
- 15 Mutation Assay : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR) (ドイツ)、
- 16 2008年、未公表
- 17 57. CSCD465008 - Chromosome Aberration Test in Human Lymphocytes In
- 18 Vitro : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR) (ドイツ)、2008年、未
- 19 公表
- 20 58. CSCD465008 – Cell Mutation Assay at the Thymidine Kinase Locus (TK +/-)
- 21 in Mouse Lymphoma L5178Y Cells : RCC Cytotest Cell Research GmbH
- 22 (RCC-CCR) (ドイツ)、2008年、未公表
- 23 59. SYN508210, SYN508211 and SYN524464 28 Day Comparative Study in the
- 24 Rat : Syngenta Central Toxicology Laboratory (英国)、2010年、未公表
- 25 60. SYN524464 - A 28-Day Dietary Immunotoxicity Study in CD-1 Male Mice :
- 26 WIL Research Laboratories, LLC (米国)、2010年、未公表
- 27 61. 食品健康影響評価について（平成26年1月30日付け厚生労働省発食安0130第2号）