ジクロキサシリンの推定摂取量（単位：μg/人/day）

食品名	基準値 (ppm)	暴露評価に用いた値 (ppm)	国民平均 EDI	幼小児 (1～6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) EDI
牛の筋肉	0.03	0.03	0.5	0.3	0.6	0.3
牛の脂肪	0.02	0.02				
牛の肝臓	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
牛の腎臓	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
牛の食用部分	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0
豚の筋肉	0.3	0.04※1	1.7	1.3	1.7	1.2
豚の脂肪	0.3	0.04※1				
豚の肝臓	0.3	0.04※1	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の腎臓	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の食用部分	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3	0.04※1	0.1	0.0	0.1	0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3	0.04※1				
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3	0.04※1				
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3	0.3				
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3	0.3				
乳	0.01	0.01	2.6	3.3	3.6	2.2
鶏の筋肉	0.3	0.04※1	0.7	0.5	0.8	0.6
鶏の脂肪	0.3	0.04※1				
鶏の肝臓	0.3	0.04※1	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の腎臓	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の食用部分	0.3	0.3	0.6	0.4	0.9	0.4
その他の家きんの筋肉	0.3	0.04※1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の家きんの脂肪	0.3	0.04※1				
その他の家きんの肝臓	0.3	0.04※1				
その他の家きんの腎臓	0.3	0.3				
その他の家きんの食用部分	0.3	0.3				
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3	0.04※1	0.4	0.2	0.2	0.5
魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3	0.04※1	0.1	0.0	0.1	0.1
魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3	0.04※1	1.4	0.6	0.8	1.7
魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3	0.04※1	1.1	0.5	0.6	1.5
魚介類（貝類に限る。）	0.3	0.04※1	0.2	0.1	0.1	0.3
魚介類（甲殻類に限る。）	0.3	0.04※1	0.3	0.1	0.2	0.2
その他の魚介類	0.3	0.04※1	0.3	0.1	0.2	0.4
計			10.2	7.6	10.4	9.6
計（mg/kg体重/day）			0.00019	0.00046	0.00018	0.00017

EDI：推定１日摂取量（Estimate Daily Intake）

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。
※１　EUで実施されたペニシリン系抗生物質の残留試験において腎臓以外では残留濃度がいずれも定量限界未満であることから、定量限界の値を用いた。