

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」
に基づく報告について

令和2年5月29日

推定摂取量の対 ADI 比 (TMDI^{※1}/ADI×100 又は EDI^{※2}/ADI×100)

	農薬名 許容一日摂取量：ADI (mg/kg 体重/日)	国民平均	幼小児 (1～6 歳)	妊婦	高齢者 (65 歳以上)
1	カルボスルファン 0.005	29.9 ^b	46.2 ^b	19.4 ^b	36.2 ^b
2	カルボフラン 0.00015	47.3 ^b	77.1 ^b	32.3 ^b	52.2 ^b
3	ベンフラカルブ 0.0089	34.7 ^b	64.6 ^b	25.8 ^b	39.6 ^b

※1 TMDI (Theoretical Maximum Daily Intake) … 理論最大一日摂取量。各農産物等の基準値案×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

※2 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定一日摂取量。各農産物等の作物残留試験成績の平均値×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

a：推定摂取量は TMDI を使用 b：推定摂取量は EDI を使用

推定摂取量の対 ARfD 比 (ESTI^{※3}/ARfD (%)) の最大値

	農薬名 急性参照用量：ARfD (mg/kg 体重)	一般	幼小児 (1～6 歳)	妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14～50 歳) ^{※4}
1	カルボスルファン 0.005	70 (ぼんかん)	40 (ピーマン)	/
2	カルボフラン 0.00015	70 (さといも等)	70 (さといも等)	/
3	ベンフラカルブ 0.0092	40 (れんこん)	80 (さといも)	/

/：実施せず

※3 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。

※4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量が設定された場合に推定。