

ニフルスチレン酸ナトリウムの推定摂取量(単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品名	基準値 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1～6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以 上)
魚介類 (その他の魚類に 限る。)	0.05	1.4	0.6	0.8	1.9
計		1.4	0.6	0.8	1.9
計 (mg/kg体重/day)		0.000025	0.000037	0.000013	0.000033

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。

ロキサルソンの推定摂取量(単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品名	基準値 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1～6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上)
豚の筋肉	0.5	21.0	16.7	21.6	15.3
豚の脂肪	0.5				
豚の肝臓	2	0.2	1.0	0.0	0.2
豚の腎臓	2	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の食用部分	2	1.2	0.6	0.2	0.8
鶏の筋肉	0.5	9.4	6.8	9.9	7.0
鶏の脂肪	0.5				
鶏の肝臓	2	1.4	1.0	0.0	1.6
鶏の腎臓	2	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の食用部分	2	3.8	2.4	5.8	2.8
その他の家さんの筋肉	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2
その他の家さんの脂肪	0.5				
その他の家さんの肝臓	2				
その他の家さんの腎臓	2				
その他の家さんの食用部分	2				
鶏の卵	0.5	20.7	16.4	23.9	18.9
その他の家さんの卵	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
計		58.0	45.1	61.6	46.9
計 (mg/kg体重/day)		0.0011	0.0027	0.0011	0.0008

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。

各成分の推定摂取量等について

成分名	種類	推定摂取量	
		数値 (mg/kg 体重)	試算 方法
アンピシリン	抗生物質	0.00071	TMDI 幼小児
イソオイゲノール	麻酔剤	0.039	EDI 幼小児
イソシンコメロン酸二プロピル	殺虫剤	0.00037	TMDI 幼小児
イソメタミジウム	寄生虫駆除剤	0.0021	TMDI 幼小児
カルバドックス (キノキサリン-2- カルボン酸を含む)	合成抗菌剤	0 (不検出)	—
クマホス	殺虫剤	0 (不検出)	—
クロキサシリン	抗生物質	0.0021	TMDI 幼小児
ジクロキサシリン	抗生物質	0.00046	EDI 幼小児
スルファジミジン	合成抗菌剤	0.00088	TMDI 幼小児
スルファジメトキシ	合成抗菌剤	0.0030	TMDI 幼小児
スルファメトキサゾール	合成抗菌剤	0.00006	TMDI 幼小児
スルファモノメトキシ	合成抗菌剤	0.00042	TMDI 幼小児
スルフィソゾール	合成抗菌剤	0.00020	TMDI 幼小児
セフロキシム	抗生物質	0.00041	TMDI 幼小児
トリメトプリム	合成抗菌剤	0.0015	TMDI 幼小児

成分名	種類	推定摂取量	
		数値 (mg/kg 体重)	試算 方法
ナイカルバジン	合成抗菌剤 寄生虫駆除剤	0.00021	TMDI 幼小児
バシトラシン	抗生物質	0.0029	EDI 幼小児
ハロフジノン	寄生虫駆除剤 抗原虫剤	0.00011	TMDI 幼小児
フェノキシメチルペニシリン	抗生物質	0.00006	TMDI 幼小児
マデュラマイシン	寄生虫駆除剤	0.00043	TMDI 幼小児
ロベニジン	合成抗菌剤 寄生虫駆除剤	0.00018	TMDI 幼小児