

Table 1 健常児の栄養摂取法の内訳（市部）

	調整乳のみ	母乳+調整乳	母乳のみ	合計
男子	58 人	196 人	412 人	666 人
	8.7%	29.4%	61.9%	100.0%
女子	56 人	221(1)人	404 人	681 人
	8.2%	32.5%	59.3%	100.0%
合計	114 人	418 人	816 人	1348 人
	8.5%	31.0%	60.5%	100.0%

人数と割合（％）

括弧内はデータ不足の人数

Table 2 調整乳のみの乳児の 1 日一人あたりの摂取量（mL）

性別	平均±標準偏差（人数）	中央値	95 パーセンタイル
男女	908±142 (114)	900	1117
男子	937±146 (58)	950	1151
女子	878±132 (56)	880	1086

Table 3 母乳+調整乳の乳児の 1 日一人あたりの調整乳の摂取量（mL）

性別	平均±標準偏差（人数）	中央値	95 パーセンタイル
男女	361±280 (417)	300	880
男子	372±281 (196)	308	858
女子	352±280 (221)	260	880

Table 4 調整乳のみの乳児の体重あたりの摂取量（mL/kg 体重/日）

性別	平均±標準偏差（人数）	中央値	95 パーセンタイル
男女	131±21 (114)	130	162
男子	130±21 (58)	130	161
女子	132±21 (56)	129	164

Table 5 母乳+調整乳の乳児の体重あたりの調整乳の摂取量 (mL/kg 体重/体重)

性別	平均±標準偏差 (人数)	中央値	95 パーセンタイル
男女	56±44 (417)	44	140
男子	56±44 (196)	47	137
女子	56±45 (221)	43	140

Table 6 調整乳のみの乳児の月齢別 1 日一人あたりの調整乳摂取量 (mL) の変化

性別	4 か月		5か月		6か月	
	平均	中央値	平均	中央値	平均	中央値
男女	881 (19)*	880	902 (86)	900	1023 (9)	990
男子	923 (9)	880	931 (43)	950	994 (6)	945
女子	844 (10)	880	872 (43)	855	1080 (3)	1105

* ()内は人数

Table 7 調整乳のみの乳児の月齢別体重あたりの調整乳摂取量 (mL/kg 体重/日) の変化

性別	4 か月		5か月		6か月	
	平均	中央値	平均	中央値	平均	中央値
男女	129 (19)*	130	131 (86)	130	133 (9)	128
男子	133 (9)	132	131 (43)	130	121 (6)	125
女子	127 (10)	129	131 (43)	127	158 (3)	160

* ()内は人数

Table 8 栄養摂取法の内訳（郡部）

月 齢	調整乳のみ	母乳＋調整乳	母乳のみ	合計	離乳食開始
2 か月	40	166	305	511	
	7.8%	32.5%	59.7%	100.0%	
4 か月	84	171	353	608	
	13.8%	28.1%	58.1%	100.0%	
6 か月	42	62	138	242	216
	17.4%	25.6%	57.0%	100.0%	89.3%
7 か月	135	127	337	599	592
	22.5%	21.2%	56.3%	100.0%	98.8%

人数と割合（％）

Table 9 調整乳のみの乳児の月齢別 1 日一人あたりの摂取量（mL）（郡部）

月 齢	性別	平均±標準偏差（人数）	中央値	95 パーセンタイル
2 か月	男女	1018±177 (38)	960	1440
	男子	1058±185 (21)	960	1440
	女子	968±157 (17)	960	1136
4 か月	男女	1060±209 (83)	1050	1440
	男子	1073±203 (45)	1080	1440
	女子	1045±218 (38)	1000	1434
6 か月	男女	1036±194 (42)	1000	1382
	男子	1039±174 (25)	1000	1358
	女子	1032±227 (17)	1000	1360
7 か月	男女	1016±226(134)	1000	1410
	男子	1024±203(74)	1000	1340
	女子	1008±253 (60)	1000	1600

Table 10 母乳+調整乳の乳児の月齢別1日一人あたりの調整乳の摂取量 (mL)

月 齢	性別	平均±標準偏差 (人数)	中央値	95 パーセンタイル
2 か月	男女	463±338 (161)	400	1120
	男子	476±356 (95)	360	1200
	女子	443±310 (66)	480	986
4 か月	男女	528±353 (165)	480	1200
	男子	575±372 (101)	500	1200
	女子	455±311 (64)	410	1000
6 か月	男女	437±322 (62)	360	1000
	男子	507±312 (30)	470	1198
	女子	373±322 (32)	200	1070
7 か月	男女	528±341 (123)	480	1068
	男子	529±343 (71)	480	1152
	女子	527±342 (52)	550	1041

Table 11 調整乳のみの乳児の月齢別体重あたりの摂取量 (mL/kg 体重/日)

月 齢	性別	平均±標準偏差 (人数)	中央値	95 パーセンタイル
2 か月	男女	186±27 (38)	182	239
	男子	187±30 (21)	184	254
	女子	184±25 (17)	179	232
4 か月	男女	156±32 (83)	157	216
	男子	153±33 (45)	155	215
	女子	159±32 (38)	157	225
7 か月	男女	128±31 (134)	126	188
	男子	125±29 (74)	124	184
	女子	131±34 (60)	131	197

*6 か月齢は体重データがないため、計算していない

Table 12 調整乳のみの乳児の月齢別 1 日一人あたりの調整乳摂取量 (mL) の変化 (郡部)

性別	男女		男子		女子	
月 齢	平均	中央値	平均	中央値	平均	中央値
2 か月	1018	960	1058	960	968	960
4 か月	1060	1050	1073	1080	1045	1000
6 か月	1036	1000	1039	1000	1032	1000
7 か月	1016	1000	1024	1000	1008	1000

Table 13 調整乳のみの乳児の月齢別体重あたりの調整乳摂取量 (mL/kg 体重/日) の変化 (郡部)

性別	男女		男子		女子	
月 齢	平均	中央値	平均	中央値	平均	中央値
2 か月	186	182	187	184	184	179
4 か月	156	157	153	155	159	157
7 か月	128	126	125	124	131	131

*6 か月 齢は体重データがないため、計算していない

Table 14 完全人工栄養の乳児の平均推定エネルギー所要量から求めた一日あたりの調整乳量 (mL/kg 体重/日)

月 齢	男子	女子	男女
1	182	175	179
2	164	161	163
3	149	151	149
4	128	133	130
5	127	130	128
6	124	127	125

Table 15 Table 14 の調整乳量に、調整乳への添加量を乗じて算出したカラギーナンの推定摂取量

月 齢	乳児用調製粉乳へのカラギーナンの添加量： 300 mg/L			乳児用調製粉乳へのカラギーナンの添加量： 1000 mg/L		
	男子	女子	男女	男子	女子	男女
	mg/kg 体重/日*			mg/kg 体重/日*		
1	<u>55</u>	52	54	<u>182</u>	175	179
2	49	48	49	164	161	163
3	45	45	45	149	151	149
4	39	40	39	128	133	130
5	38	39	39	127	130	128
6	<u>37</u>	38	38	<u>124</u>	127	125
37 ~ 54 mg/kg 体重/日**				124 ~ 180 mg/kg 体重/日***		

* 下線は推定摂取量の最小値、二重下線は推定摂取量の最大値

** 第 79 回会合で求められた、乳児用調製粉乳へのカラギーナンの添加量が 300 mg/L の場合の推定摂取量の中央値の範囲

*** 第 79 回会合で求められた、乳児用調製粉乳へのカラギーナンの添加量が 1000 mg/L の場合の推定摂取量の中央値の範囲

Table 16 Table 14 の調整乳量に、調整乳への添加量を乗じて算出した CITREM の推定摂取量

	乳児用調製粉乳への CITREM の添加量： 2.7 g/L					
	CITREM 中のクエン酸 13% 調整乳中のクエン酸濃度：0.64 g/L CITREM 由来のクエン酸濃度：0.35g/L			CITREM 中のクエン酸 50% 調整乳中のクエン酸濃度：0.64 g/L CITREM 由来のクエン酸濃度：1.35g/L		
	男子	女子	男女	男子	女子	男女
	mg/kg 体重/日*					
月齢						
1	180	173	177	<u>362</u>	348	356
2	163	160	161	327	321	324
3	148	149	148	297	300	297
4	127	132	129	255	264	258
5	126	129	127	252	258	255
6	<u>123</u>	126	124	247	252	249
120 ～ 360 mg/kg 体重/日**						

* 下線は推定摂取量の最小値、二重下線は推定摂取量の最大値

** 第 79 回会合で求められた推定摂取量の中央値の範囲

Table 17 Table 14 の調整乳量に、調整乳への添加量を乗じて算出したペクチンの推定摂取量

	乳児用調製粉乳へのペクチンの添加量： 5 g/L		
	男子	女子	男女
	mg/kg 体重/日*		
月齢			
1	<u>0.91</u>	0.87	0.90
2	0.82	0.81	0.81
3	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>
0.75 ～ 0.91 mg/kg 体重/日**			

* 下線は推定摂取量の最小値、二重下線は推定摂取量の最大値

** 第 79 回会合で求められた推定摂取量の中央値の範囲

Table 18 Table 14 の調整乳量に、調整乳への添加量を乗じて算出した OSA-加工デンプンの推定摂取量

月 齢	乳児用調製粉乳へ OSA-加工デンプ ンの添加量： 20 g/L		
	男子	女子	男女
	mg/kg 体重/日*		
1	<u>3.6</u>	3.5	<u>3.6</u>
2	3.3	3.2	3.3
3	3.0	3.0	3.0
4	2.6	2.7	2.6
5	<u>2.5</u>	2.6	2.6
6	<u>2.5</u>	<u>2.5</u>	<u>2.5</u>
3.7 mg/kg 体重/日**			

* 下線は推定摂取量の最小値、二重下線は推定摂取量の最大値

** 第 79 回会合で求められた推定摂取量の中央値の最大値