

イソブタノールを添加物として定めることに 係る食品健康影響評価について

1. はじめに

イソブタノールは果物や野菜などの香気成分として食品に天然に含まれているほか、酒類やパン類等の加工食品にも一般に含まれている成分である¹⁾。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するため添加されている。

2. 背景等

厚生労働省は、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①JECFAで国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの指定要請を待つことなく、国が主体的に指定に向けた検討を開始する方針を示している。今般この条件に該当する香料の成分として、イソブタノールについて評価資料がまとまったことから、食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。


なお、香料については厚生労働省が示していた「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」には基づかず、「国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について」に基づき資料の整理が行われている。

3. 名称等

名称：イソブタノール

英名：Isobutyl alcohol, Isobutanol

構造式：



化学式：C₄H₁₀O

分子量：74.1

CAS 番号：78-83-1

4. 安全性

(1) 遺伝毒性

細菌を用いた復帰突然変異試験 (TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537、最高用量 5mg/plate)^{2), 3)}及びチャイニーズ・ハムスターCHL/IU細胞を用いた染色体異常試験 (最高用量 0.74mg/ml)¹⁾は、S9mixの有無にかかわらず陰性であった^{2), 3)}。

ラットへの胃内投与(用量は 1/5 LD₅₀ に相当)による骨髄細胞染色体異常 (polyploid, gap, aberration) が報告されている⁴⁾が、その詳細が報告されておらず、その実験方法及び結果の解釈には不備があると考えられるので評価の対象とすることはできないとされている。

なお、細菌を用いる復帰突然変異試験では、*E. coli* のデータがない点、*in vivo* の評価可能なデータがない点等、データセットは完全ではない。

(2) 反復投与

Wistar系雌雄ラットへの3ヶ月間反復投与試験(飲用水中0, 1000, 4000, 16000ppm)において、16,000ppm投与群の雄2匹に睾丸萎縮が観察され、2匹の動物に精細管の変性(tubular degeneration)とライジヒ細胞の過形成が報告されたが、他の雄に同様の影響がみられなかったことから、本物質とはほぼ関係のない影響であると結論づけられている⁵⁾。無毒性量(NOEL)は16,000ppm(1,450mg/kg体重/日)と推定されている。

ラットへの13週間経口反復投与試験(0, 100, 316, 1000mg/kg体重/日)において、1,000mg/kg体重/日投与群に運動失調が観察された⁶⁾。NOELは316mg/kg体重/日とされている。

(3) 発がん性

ラットへの経口投与試験(0.2ml/kg、週2回)で発がん性に言及する報告がある⁷⁾が、詳細が不明であり、かつ、コントロール群のデータや生存期間等からみて、発がん性の懸念を惹起するものではないと考えられるとされている。

International Agency for Research on Cancer (IARC)、European Chemicals Bureau (ECB)、U. S. Environmental Protection Agency (EPA)、National Toxicology Program (NTP)では、発がん性の評価はされていない。

(4) その他

内分泌かく乱性を疑わせる報告は見当たらない。

5. 摂取量の推定

本物質の年間使用量の全量を人口の10%が消費していると仮定するJECFAのPCTT法に基づく米国及び欧州における一人一日当りの推定摂取量は、それぞれ290 μ g及び530 μ g⁸⁾。正確には認可後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に許可されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報がある¹⁰⁾ことから、我が国での本物質の推定摂取量は、290 μ g~530 μ gと想定される。なお、米国では、食品中にもともと存在する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添加された本物質の600倍との報告もある⁹⁾。

6. 安全マージンの算出

13週間反復投与試験のNOEL316mg/kg体重/日と、想定される推定摂取量(290 μ g~530 μ g/人/日)を日本人平均体重(50kg)で割ることで算出される推定摂取量(0.0058~0.011mg/kg体重/日)と比較し、安全マージン28,727~54,483が得られる。

7. 構造クラスに基づく評価

本物質の代謝産物は生体成分であり、それらは二酸化炭素と水に代謝され、尿中及び呼気中に比較的速やかに排出されることから、クラスIに分類される⁸⁾。

8. JECFAにおける評価

JECFAでは、1997年に飽和脂肪族非環式分岐鎖一級アルコール類、アルデヒド類、酸類のグループとして評価され、クラスIに分類されている。想定される推定摂取量(290~530 μ g/人/

日)は、クラス I の摂取許容量 (1,800 μ g/人/日) を下回ることから、香料としての安全性の問題はないとされている⁸⁾。

9. 「国際的に汎用されている香料の我が国における安全性評価法」に基づく評価

本物質は、クラス I に分類され、生体内において特段問題となる遺伝毒性はないと考えられ、13 週間反復投与試験の無毒性量から計算した安全マージン (28,727~54,483) は、適切な安全マージン 1000 を大幅に上回り、想定される推定摂取量 (290~530 μ g/人/日) はクラス I の摂取許容値 (1,800 μ g/人/日) を超えていない。


【引用文献】

- 1) TNO (1996) Volatile compounds in food. Ed. By L.M.Nijssen et.al. 7th.ed. Index of compounds. TNO Nutrition and Food Research Institute. Zeist.
- 2) Zeiger E, Anderson B, Haworth S, Lawlor T, Mortelmans K. Salmonella mutagenicity tests:IV. Results from the testing of 300 chemicals. *Environ. Mol. Muagent.* (1988) 11(supp.12): 1-158.
- 3) Shimizu H, Takemura N, Goto S, Matsushita H. The results of microbial mutation test for forty-three industrial chemicals. *Jpn. J. Ind. Health.* (1985) 27: 400-419.
- 4) Barilyak IR, Kozachuk SY. Investigation of the cytogenetic effect of a number of monohydric alcohols on rat bone marrow cells. *Cytol. Genet.* (1988) 22: 51-54.
- 5) Schilling K, Kayser M, Deckardt K, Kuttler K, Klimisch HJ. Subchronic toxicity studies of 3-methyl-1-butanol and 2-methyl-1-propanol in rats. *Hum. Exp. Toxicol.* (1997) 16: 722-726.
- 6) U.S. Environmental Protection Agency Integrated Risk Information System :Isobutyl alcohol.
- 7) Gibel W, Lohs Kh, Wildner GP. Experimental study on carcinogenic activity of propanol-1, 2-methylpropanol-1, 3-methylbutanol-1. *Arch. Geschwulstforsch.* (1975) 45: 19-24.
- 8) 第 49 回 JECFA WHO Food Additives Series 40.
- 9) Stofberg J, Grundschober F. Consumption ratio and food predominance of flavoring materials. *Perf. Flav.* (1987) 12: 27-56.
- 10) 平成 14 年度厚生労働科学研究報告書「日本における食品香料化合物の使用量実態調査」、日本香料工業会
- 11) イソブタノールのチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験 財団法人食品薬品安全センター秦野研究所

香料構造クラス分類 (イソブタノール)

YES : → , NO :→

START



Q19

単純 ester が加水分解されるとき、芳香族は Q18

Q22