

添加物 亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に係る食品健康影響評価について

1 はじめに

亜塩素酸ナトリウムは、わが国において食品添加物として指定されている漂白剤の一つであり、食品衛生法に基づく現行の使用基準では、「かんきつ類果皮（菓子製造に用いるものに限る。）、さくらんぼ、生食用野菜類、卵類（卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。）、ふき、ぶどう及びもも以外の食品に使用してはならない。亜塩素酸ナトリウムの使用量は、亜塩素酸ナトリウムとして、生食用野菜類及び卵類にあっては浸漬液 1 kg につき 0.50 g 以下でなければならない。また、使用した亜塩素酸ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならない。」とされている。

米国においては、殺菌料として亜塩素酸ナトリウム溶液と一般に安全とされる酸（GRAS 物質）を混合させた酸性化亜塩素酸ナトリウム溶液の畜肉・畜肉製品、農産物への使用のほか、水産物の洗浄、解凍、輸送及び保存などの目的に使用が許可されている。また、米国では、二酸化塩素についても、殺菌料として鶏肉加工や生食用以外の果物や野菜への使用が認められている。EU では、亜塩素酸ナトリウム及び二酸化塩素の使用は許可されていない。

なお、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）において、本物質の評価は行われていない。

2 背景等

食品安全基本法に基づき、厚生労働省から食品安全委員会に対し、亜塩素酸ナトリウムの使用基準の改正に係る食品健康影響評価が依頼されたものである（平成 15 年 10 月 20 日、関係書類を接受）。

3 使用基準改正の概要

カズノコは加熱等の殺菌処理を行うことは困難であることから、現在、味付けカズノコは加工段階で特別な殺菌処理を施すことなく生産されており、今般、亜塩素酸ナトリウムをカズノコの殺菌料として使用できるよう、現行の使用基準の対象食品に「カズノコ（調味加工品に限る）」を追加し、使用される浸漬液については、現行の 1 kg につき 0.50 g 以下との規定を適用するよう使用基準を改正しようとするものである。

4 名称等

名称：亜塩素酸ナトリウム

英名：Sodium Chlorite

化学式：NaClO₂

分子量：90.44

5 安全性に関する検討

1) 体内動態及び代謝

亜塩素酸イオンはラットへの経口投与後直ちに吸収され、各組織に分布した¹²⁾。ラットへの経口投与において、亜塩素酸は体内で主に塩化物 (chloride) になり、少量は亜塩素酸イオンのまま変化しなかった。排泄は主に尿を介し、糞中にも排泄された¹³⁾。

2) 毒性

(1) 急性毒性試験

ラット²³⁾及びウズラ²⁴⁾の経口投与試験による LD₅₀ は、亜塩素酸イオンとしてそれぞれ 105 mg/kg 体重、493 mg/kg 体重と報告されている。

(2) 短期毒性試験

ラット (雌雄各群 15 匹) を用いた亜塩素酸ナトリウムの 13 週間強制経口投与試験 (0、10、25、80 mg/kg 体重/日、亜塩素酸イオンとして 0、7.4、18.6、59.7 mg/kg 体重/日相当) において、80 mg/kg 体重/日投与群で多くの死亡、赤血球の形態の変化及びヘモグロビン濃度の著しい減少が認められ、雄では赤血球数の減少が認められた。25 mg/kg 体重/日投与群以上の雌で赤血球数の著しい減少、脾臓重量、副腎重量の増加が認められた。病理組織検査では、80 mg/kg 体重/日投与群の雄 15 例中 7 例及び雌 15 例中 8 例に、胃の扁平上皮過形成、角化、潰瘍形成、慢性炎症及び浮腫が認められた。このような影響は 25 mg/kg 体重/日投与群では 15 例中 2 例のみに認められ、10 mg/kg 体重/日投与群では認められなかった。鏡検での評価が追加で行われたが、投与に起因する異常は認められなかった^{*26)}。

著者及び WHO は、無毒性量 (NOAEL) は、亜塩素酸イオンとして 7.4 mg/kg 体重/日としている。

ラットに亜塩素酸イオンを 30 ~ 90 日間飲水投与 (0、10、50、100、250、500 mg/L、それぞれ 0、1、5、10、25、50 mg/kg 体重/日相当) したところ、血液学的検査の結果、100 mg/L 投与群以上で一時的な貧血が認められた。90 日後には 100 mg/L 投与群で赤血球グルタチオン濃度が対照群よりも 40% 減少し、50 mg/L 投与群では 20% 以上減少した²⁵⁾。

WHO は、NOAEL を亜塩素酸イオンとして 1 mg/kg 体重/日としている。また、この試験は亜塩素酸の毒性について有用な情報を提供してはいるが、この試験デザインは飲料水のガイドライン値設定の根拠とするには適したものではなかったと判断している^{注)}

注) 引用文献 25)では、いくつかの実験結果が 1 つの文献に記載されており、その個々の実験についての詳細な記載が省略されている。WHO の文書には記載はされていないが、試験デザインが不適當であると判断した理由の一つと推定される。

ネコに亜塩素酸ナトリウムを単回投与 (亜塩素酸イオンとして 20、64 mg/kg 体重) したところ、両投与群でメトヘモグロビン血症がみられた²⁵⁾。20 mg/kg 体重での投与で 32%のヘモグロビンがメトヘモグロビンの状態になるとされている。

アフリカミドリザル (12 匹) への rising dose 法による亜塩素酸ナトリウムの 30 ~ 60 日間飲水投与 (亜塩素酸イオンとして 0、25、50、100、400 mg/L、約 0、3、6、13、50 mg/kg 体重/日に相当) において、メトヘモグロビン血症と貧血が用量依存的に認められた¹¹⁾。

(3) 長期毒性試験

ラット (雌雄各群 7 匹) に亜塩素酸ナトリウムを 2 年間飲水投与 (亜塩素酸イオンとして 0、1、2、4、8、100、1,000 mg/L) したところ、全ての投与群でラットの生存期間に変化は認められず、8 mg/L (0.7 mg/kg 体重/日相当) 投与群以下では投与による影響はみられなかった。100 及び 1,000 mg/L (それぞれ 9.3、81 mg/kg 体重/日相当) 投与群では、投与に起因した腎における病変が認められたが、著者はこれは塩による非特異的影響であると結論している¹⁷⁾。

(4) 生殖・発生毒性試験

雌マウス (各群 10 匹) に亜塩素酸ナトリウム (亜塩素酸イオンとして 0、100 mg/L (0、22 mg/kg 体重/日相当))^{*14)}を妊娠 1 日から授乳終了まで飲水投与したところ、受胎率は対照群で 56%、投与群で 39%であり、児動物の離乳時の体重は対照群より 14%減少した。

この実験における最低毒性量 (LOAEL) は、亜塩素酸イオンとして 22 mg/kg 体重/日と考えられている¹⁴⁾。

雄ラット (各群 12 匹) への亜塩素酸ナトリウム (0、1、10、100、500 mg/L (0、0.1、1、10、50 mg/kg 体重/日相当)) の 66 ~ 76 日間飲水投与において、病理組織検査では投与に起因する異常は認められなかった。精子の形態異常及び精子運動能の低下が 100 mg/L 投与群以上で認められた。

WHO は、精子への影響について、NOAEL は亜塩素酸ナトリウムとして 1 mg/kg 体重/日（亜塩素酸イオンとして 0.75 mg/kg 体重/日）としている。米国 EPA は、他の研究^{*28)}において、より高用量まで精子の影響がみられていないとしている。

この試験の別の部分では亜塩素酸ナトリウム投与（0、0.1、1.0、10 mg/kg 体重/日）の雌雄のラットを交配した。交配前の投与期間は雄が 56 日間、雌が 14 日間で、続く 10 日間の交配期間中も継続して投与し、さらに雌には妊娠期間中及び分娩後 21 日の離乳時まで投与した。受胎率、同腹児数、開眼日、膈開口日における明らかな毒性は認められなかった。100 mg/L 投与群において出生児の雌雄の血中トリヨードチロニン（T3）及びチロキシン（T4）濃度の低下が出生後 21 日及び 40 日に認められたが、著者はこの影響が児への母乳暴露によるものか、飲水瓶から直接飲水したことによる影響か、分離できないとしている²⁶⁾。

WHO は、NOAEL は亜塩素酸ナトリウムとして 10 mg/kg 体重/日（亜塩素酸イオンとして 7.5 mg/kg 体重/日）であると結論している。

雌ラット（各群 6-9 匹）に亜塩素酸ナトリウム（亜塩素酸イオンとして 1 及び 10 mg/L）を交配前と妊娠中の 2.5 ヶ月間飲水投与したところ、両投与群で奇形発生率が増加したが、投与群の匹数が少ないため、統計学的に有意とはみなされなかった²⁷⁾。

雌ラット（各群 12 匹）への亜塩素酸ナトリウム（0、20、40 mg/L、亜塩素酸イオンとして 0、3、6 mg/kg 体重/日相当）の 9 週間（交配 10 日前～受胎後 35～42 日）飲水投与では、6 mg/kg 体重/日投与群の児の探索行動において、受胎後 36～39 日に一貫した顕著な減少が認められたが、40 日には認められなかった。探索行動は受胎後 39 日より後では対照群と投与群では同程度であった。

WHO は、行動影響から NOAEL は、亜塩素酸イオンとして 3 mg/kg 体重/日であると判断している^{*27)}。

ラット（雌雄各群 30 匹）を用いた亜塩素酸ナトリウム（0、35、70、300 mg/L）の飲水投与による二世世代試験が報告されている。雄は交配前 10 日間及び交配期間中、雌は交配前 10 日間、交配、妊娠、授乳期間投与した。1 群あたり初産の 25 腹からの出生児を、離乳後に各群雌雄 25 匹ずつ選択し、F1 世代とした。F1 世代にも親世代と同様に投与し、約 14 週齢で交配して得た児を F2a 世代とした。70 mg/L 投与群で、F1 の F2a 分娩時に一腹の児数が減少したため、F1 は F2a の離乳後に再交配し、得られた児を F2b とした。用量は亜塩素酸イオンとして F0 の雄が 0、3.0、5.6、20.0 mg/kg 体重/日、雌が 0、3.8、7.5、28.6 mg/kg 体重/日、F1 の雄が 0、2.9、5.9、22.7 mg/kg 体重/日、雌が 0、3.8、7.9、28.6 mg/kg 体重/日と算出された。両性で試験期間中の不定期に飲水量、飼料摂取量、

体重増加の減少が認められたが、これらは主として 70 及び 300 mg/L 投与群で認められ、水の味の変化によると考えられた。300 mg/L 投与群の F1、F2 の生存率低下、出生時及び授乳期間中の体重減少が認められ、両世代の胸腺重量及び脾臓重量の低下、正常な立ち直り反応を示す率の低下、雌雄の性成熟の遅延、F1 の赤血球検査値の低下が認められた。また 70 及び 300 mg/L 投与群で F0 の雌及び F1 の雌雄の肝の絶対重量及び相対重量の有意な減少、F1、F2 の脳重量の減少、分娩後 24 日の聴覚性驚愕刺激に対する最大応答の減少が認められた（分娩後 60 日には認められず）。35 及び 70 mg/L 投与群の F1 では赤血球検査値の軽微な変化がみられたが、背景データにおける正常範囲内の変化であった^{*28),*29)}。

著者は、300 mg/L 投与群における弱い溶血性貧血及びメトヘモグロビン血症を示唆する血液学的変化を根拠に NOAEL は 70 mg/L（亜塩素酸ナトリウムとして 8 mg/kg 体重/日）としている^{*28)}。

WHO 及び米国 EPA は、70 mg/L 投与群における驚愕反応の低下、F1 及び F2 世代における脳重量及び肝重量の減少を根拠に NOAEL は 35 mg/L（亜塩素酸イオンとして 2.9 mg/kg 体重/日）している。

ウサギ（1 群 16 匹）に亜塩素酸ナトリウム（0、200、600、1,200 mg/L、亜塩素酸イオンとして 0、10、26、40 mg/kg 体重/日相当）を妊娠 7 日から 19 日まで飲水投与したところ、飲水量は全ての投与群で減少したが、特に 600 mg/L 投与群以上で顕著であった。600 mg/L 投与群以上では、摂餌量の減少がみられ、また、平均胎児重量がわずかに減少したことに伴い化骨遅延の発生がわずかに増加したが、用量反応関係は認められなかった。用量の増加に伴う軽度の骨格異常、母動物の飼料摂取量の抑制が認められた^{*30)}。

著者は、NOAEL を 200 mg/L（亜塩素酸イオンとして 10 mg/kg 体重/日）としている。

（5）発がん性試験

マウスに 250、500 mg/L の亜塩素酸ナトリウム（亜塩素酸イオンとして約 36、71 mg/kg 体重/日相当）を 85 週間飲水投与したところ、投与群の雄には肺及び肝腫瘍が認められたものの、対照群の背景データの正常範囲内であった。また、肝腫瘍の増加に典型的な用量反応関係は認められず、良性腫瘍の発生にのみ有意な増加が認められた。ラットに 300、600 mg/L の亜塩素酸ナトリウム（亜塩素酸イオンとして、雄で 18、32 mg/kg 体重/日、雌で 28、41 mg/kg 体重/日相当）を 85 週間飲水投与したところ、有意な腫瘍の増加は認められていない²⁸⁾。

ラットへの亜塩素酸ナトリウムの 2 年間飲水投与試験において腫瘍はみられていない¹⁷⁾。

(6) 遺伝毒性

細菌を用いた復帰突然変異試験 (TA92, TA94, TA98, TA100, TA1535, TA1537, 0.3 mg/plate) では、S9mix 存在下において TA100 で陽性であった^{36*)}。また、ほ乳類培養細胞 (CHL) を用いた染色体異常試験 (最高用量 0.02 mg/l) において、陽性であった。

単回経口投与による ddY マウスを用いた小核試験 (37.5-300 mg/kg 体重)^{d)} 及び強制経口投与による CD-1 マウスを用いた小核試験 (0, 8, 20, 40 mg/kg 体重/日)²²⁾ において陰性であった。また、腹腔内投与による ddY マウスを用いた小核試験 (7.5-60 mg/kg 体重) において陽性の報告がある^{d)}。

Swiss CD-1 マウスを用いた骨髄染色体異常試験及び B6C3F1 マウスを用いた精子形態異常試験では陰性であった²²⁾。

(7) ヒトへの影響

10 人の男性 (21 ~ 35 歳) ボランティアに飲料水中の亜塩素酸ナトリウム (亜塩素酸イオンとして 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 1.8, 2.4 mg/L, 1 L/日) を rising dose 法で単回投与した結果、血清中の尿素窒素、クレアチニン及びその両者の割合 (群平均値) の変化が認められたが、著者はこの変化の生理学的意義はないと結論付けている³³⁾。

WHO は、単回投与での NOAEL は、2.4 mg/L (亜塩素酸イオンとして 0.034 mg/kg 体重/日) とすることが可能であると判断している。

同じ男性ボランティアに、亜塩素酸ナトリウム (亜塩素酸イオンとして飲水中 5 mg/L, 0.5 L/日) を約 12 週間摂取させたところ、平均赤血球ヘモグロビン量 (群平均値) の変化が認められたが、時間経過との関連が無く、数値は正常範囲内にあり、著者はこの変化の生理学的意義を否定している³³⁾。

WHO は、長期投与による NOAEL は、亜塩素酸イオンとして 36 µg/kg 体重/日相当としている。

6 国際機関等における評価

JECFA においては、亜塩素酸ナトリウムについて評価されていない。

国際がん研究機関 (IARC) では、二酸化塩素は、水溶液中で急速に加水分解され亜塩素酸となるという性質から考えて、飲水投与試験で体内に取り込まれた後は、亜塩素酸としての毒性が現れると考えられるとしている。IARC は、亜塩素酸ナトリウムについて Group3 (ヒトへの発がん性について分類できない) としている³⁵⁾。

WHO 飲料水質ガイドライン、米国 EPA 及び米国 FDA における評価 (水質基準) は以下のとおり。

(1) WHO 飲料水質ガイドラインにおける評価^{a)}

亜塩素酸の暴露による一番重要な影響は、その酸化力による赤血球の変化である。慢性毒性試験及び2世代繁殖試験を含め、亜塩素酸のヒトの耐用一日摂取量 (TDI) を評価するための十分なデータが存在する。

ラットにおける2世代繁殖試験では、驚愕反応の低下、F1 及び F2 世代における脳重量の減少及び肝重量の変化から NOAEL は 2.9 mg/kg 体重/日とされている^{*29)}。この NOAEL に不確実係数として 100 (個体差及び種差に各 10) を用い、耐容一日摂取量 (TDI) は亜塩素酸イオンとして 30 µg/kg 体重/日とされている。

(2) 米国 EPA における評価^{b)}

亜塩素酸及び二酸化塩素について、米国 EPA は、二酸化塩素は亜塩素酸として毒性を発現すると考え、両化合物の神経行動学的影響や発達毒性の知見から、二酸化塩素について NOAEL は設定せず、亜塩素酸イオンの NOAEL を設定することで十分に安全を確保できるとしている。

ラットを用いた2世代繁殖試験の結果から、NOAEL を 3 mg/kg 体重/日、不確実係数を 100 として参照用量 (RfD) を亜塩素酸イオンとして 0.03 mg/kg 体重/日としている。

(3) 米国 FDA における評価

酸性化亜塩素酸ナトリウムについて、米国の申請者が FDA に提出した資料において、亜塩素酸ナトリウム及び二酸化塩素の安全性評価は米国 EPA の評価を引用している。

7 1日摂取量の推計等

亜塩素酸ナトリウムの使用が認められている食品は、生食用野菜類、かんきつ類果皮 (菓子製造に用いるものに限る)、さくらんぼ、ふき、ぶどう、ももであり、それらの1日摂取量について、過剰な見積もりとなることを前提に「平成13年度統計局食糧需給」^{c)}の果実、野菜の値をもとに推定し、カズノコ (調理加工品) については、国内生産量をもとに推定した (0.2 g/日) ところ、対象食品の1日摂取量は、398 g/日と推定された。

過剰な見積もりではあるが、日本人の平均体重を 50 kg とし、対象食品に現公定法における検出限界 (1 mg/kg) 程度の亜塩素酸ナトリウムが含まれていたと仮定した場合、1日に摂取される亜塩素酸ナトリウムの量は 0.00796 mg/kg 体重/日 (亜塩素酸イオンとして 0.00594 mg/kg 体重/日) と推定される。

8 その他

亜塩素酸イオンは、二酸化塩素が水溶液中で急速に加水分解された際に生成する

主要な分子種と考えられている^{a)}。

二酸化塩素について、WHO 飲料水質ガイドラインにおいては、亜塩素酸の暫定ガイドライン値が二酸化塩素の潜在的毒性に対し十分保護を与えると考えられることから、二酸化塩素のガイドライン値は設定されていない。また、米国 EPA の評価では、これまでに得られている情報から、亜塩素酸の毒性は二酸化塩素と同程度であると考えられるとしている。

なお、WHO 飲料水質ガイドラインにおける評価において、二酸化塩素の飲水投与試験のうち、亜塩素酸の NOAEL より低い NOAEL を示すと考えられる試験は以下のとおり。

ラット（雌雄各群 10 匹）に二酸化塩素水溶液を 90 日間飲水投与（0、25、50、100、200 mg/L、雄：0、2、4、6、12 mg/kg 体重/日相当、雌：0、2、5、8、15 mg/kg 体重/日相当）したところ、200 mg/L 投与群において摂餌量の減少が認められ、100 mg/L 投与群以上の雌で鼻甲介の杯細胞の過形成増加が認められた。また、50 mg/L 投与群以上で水の味の変化に起因すると考えられる飲水量の減少、25 mg/L 投与群以上で雌雄で鼻腔の炎症、雄で鼻甲介の杯細胞の過形成増加が認められた。

WHO は、著者の判断¹⁶⁾として、最低毒性量（LOAEL）を 2 mg/kg 体重/日としている。米国 EPA は、同様の影響は他の試験では報告されていないとしている。

ラット（各群 7 匹）を用いた 2 年間飲水投与試験（0、0.5、1、5、10、100 mg/L、最高用量は 13 mg/kg 体重/日に相当）において、100 mg/L 投与群の雌雄で生存率の大きな低下がみられ、対照群に比べ平均生存期間が減少した。しかしながら、病理組織学的な所見との明らかな相関関係は認められなかった。

NOAEL は 10 mg/L（1.3 mg/kg 体重/日相当）とされている¹⁷⁾。

WHO は、1947 年に行われた試験であるため現在の評価より限定的である（1947 study has serious limitations）としている。米国 EPA は、供試動物数が少なく、感受性の高いエンドポイントが限られており十分でないことから、本試験の解釈は困難であるとしている。

雌ラットに交配前 2.5 ヶ月から妊娠期間中まで、二酸化塩素を 0、1、10、100 mg/L（0、0.1、1、10 mg/kg 体重/日相当）飲水投与したところ、100 mg/L 投与群で母動物あたりの着床数及び出生児数にわずかな減少が認められた。10 mg/L 投与群では、投与による影響は認められなかった²⁷⁾。

WHO は、NOAEL を 1 mg/kg 体重/日であるとしている。

注）引用文献*29)では、雄の繁殖毒性に付随する機能のエンドポイントがないので、リスク評価には特に用いないとしている。

要請者は、上記の二酸化塩素を用いたラット 2 年間飲水投与試験及びラット繁殖試験について、NOAEL とされた濃度より一段階高い濃度は 10 倍の濃度であるため、WHO の推定した NOAEL (2.9 mg/kg 体重/日) を否定するものではないとしている。

【引用文献】(番号は参考資料その 2 - (1) - 1) の文献 No に基づいて記載)

- 11) Bercz JP, Jones L, Garner L, Murray D, Ludwig DA, Boston J. Subchronic toxicity of chlorine dioxide and related compounds in drinking water in the nonhuman primate. *Environ. Health Perspect.* (1982) 46: 47-55.
- 12) Abdel-Rahman MS, Couri D, Bull RJ. Metabolism and pharmacokinetics of alternate drinking water disinfectants. *Environ. Health Perspect.* (1982) 46: 19-23.
- 13) Abdel-Rahman MS, Couri D, Bull RJ. The kinetics of chlorite and chlorate in rats. *J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol.* (1985) 6: 97-103.
- 14) Moore GS, Calabrese EJ. Toxicological effects of chlorite in the mouse. *Environ. Health Perspect.* (1982) 46: 31-37.
- *14) U.S. EPA. Toxicological Review of Chlorine Dioxide and Chlorite, In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS), September 2000, EPA/636/R-00/007.
- 16) Daniel FB, Condie LW, Robinson M, Stober JA, York RG, Olson GR, Wang SR. Comparative subchronic toxicity studies of three disinfectants. *J. Am. Water Works Assoc.* (1990) 82:61-69.
- 17) Haag HB. The effect on rats of chronic administration of sodium chlorite and chlorine dioxide in the drinking water. *Report to the Mathieson Alkali Works from the Medical College of Virginia* (1949). (Cited in a))
- 22) Meier JR, Bull RJ, Stober JA, Cimino MC. Evaluation of chemicals used for drinking water disinfection for production of chromosomal damage and sperm-head abnormalities in mice. *Environ. Mutagen.* (1985) 7: 201-211.
- 23) Musil J, Knotek Z, Chalupa J, Schmidt P. Toxicologic aspects of chlorine dioxide application for the treatment of water containing phenols. *Technol. Water* (1964) 8: 327-346.
- 24) Fletcher D. Acute oral toxicity study with sodium chlorite in bobwhite quail. *Industrial Bio-Test Laboratory's report to Olin Corporation* (1973) (IBT No. J2119). (Cited in a))
- 25) Heffernan WP, Guion C, Bull RJ. Oxidative damage to the erythrocyte induced by sodium chlorite, in vivo. *J. Environ. Pathol. Toxicol.* (1979) 2: 1487-1499.
- 26) Carlton BD, Habash DL, Basaran AH, George EL, Smith MK. Sodium chlorite administration in Long-Evans rats: reproductive and endocrine effects. *Environ. Res.*

- (1987) 42: 238-245.
- *26) Harrington RM, Romano RR, Gates D, Ridgway P. Subchronic toxicity of sodium chlorite in the rat. *J. Am. Coll. Toxicol.* (1995) 14: 21-33.
- 27) Suh DH, Abdel-Rahman MS, Bull RJ. Effect of chlorine dioxide and its metabolites in drinking water on fetal development in rats. *Journal of applied toxicology* (1983) 3: 75-79.
- *27) Mobley SA, Taylor DH, Laurie RD, Pfohl RJ. Chlorine dioxide depresses T3 uptake and delays development of locomotor activity in young rats. In: Jolley RL, Condie LW, Johnson JD ed. *Water chlorination: Chemistry, environmental impact and health effects.* Ann Arbor, Michigan, Lewis Publishers, Inc. (1990) vol 6, pp 347-360.
- 28) Kurokawa Y, Takayama S, Konishi Y, Hiasa Y, Asahina S, Takahashi M, Maekawa A, Hayashi Y. Long-term in vivo carcinogenicity tests of potassium bromate, sodium hypochlorite and sodium chlorite conducted in Japan. *Environ. Health Perspect.* (1986) 69: 221-235.
- *28) Gill MW, Swanson MS, Murphy SR, Bailey GP. Two-generation reproduction and developmental neurotoxicity study with sodium chlorite in the rat. *J. Appl. Toxicol.* (2000) 20: 291-303.
- *29) TERA Toxicology excellence for risk assessment - Health risk assessment/ characterization of the drinking water disinfection by-products chlorine dioxide and chlorite (8W-0766-NTLX). Cincinnati, Ohio (1998).
- *30) Harrington RM, Romano, RR, Irvine, L. Developmental toxicity of sodium chlorite in the rabbit. *J. Am. Coll. Toxicol.* (1995) 14: 108-118.
- 33) Lubbers JR, Chauhan S, Bianchine JR. Controlled clinical evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man. *Fundam. Appl. Toxicol.* (1981) 1: 334-338.
- 35) International Agency for Research on Cancer. Chlorinated drinking-water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds. Lyon (1991) 145-139 (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human, Volume 52).
- 36*) Ishidate M, Sofuni T, Yoshikawa K, Hayashi M, Nohmi T, Sawada M, Matsuoka A. Primary mutagenicity screening of food additives currently used in Japan. *Food Chem. Toxicol.* (1984) 22: 623-636.
- a) WHO/Guidelines for drinking water quality, third edition, 2003; Draft documents on chemicals; Chlorinedioxide, chlorite and chlorate. (= 参考資料 その 1 - 2)
- b) U.S. EPA, Toxicological review of chlorine dioxide and chlorite, in support of summary information on the integrated risk information system (IRIS), September 2000, EPA/635/R-00/007. (= 参考資料 その 1 - 1 2)
- c) 平成 13 年度 食糧需給 (総務省統計局 日本の統計 2004 第 7 章 農林水産業

7-41)(= 参考資料 その 1 - 1 3)

- d) Hayashi M, Kishi M, Sofuni T, Ishidate M Jr. Micronucleus tests in mice on 39 food additives and eight miscellaneous chemicals. *Food Chem. Toxicol.* (1988) 26: 487-500.
(= 追加関連論文 8)

亜塩素酸ナトリウム安全性試験結果


試験種類	投与期間	投与経路	動物種・動物数・群	投与物質及び投与量又は濃度	結果 NOAEL 又は LOAEL	文献 No.
急性 毒性	単回	経口	ラット		LD ₅₀ : (ClO ₂ ⁻ として) 105 mg/kg 体重	23
	単回	経口	ウズラ		LD ₅₀ : (ClO ₂ ⁻ として) 493 mg/kg 体重	24
短期 毒性	13週間	経口	ラット 雌雄各 15匹	亜塩素酸ナトリウム 0、10、25、80 mg/kg 体 重/日 (ClO ₂ ⁻ として 7.4、 18.6、59.7 mg/kg 体重/日)	80 mg/kg 投与群で、多くの死亡、赤血球の形態 の変化及びヘモグロビン濃度の著しい減少、雄 では赤血球数の減少。25 mg/kg 投与群以上の雌 で赤血球数が著しい減少、脾臓重量及び副腎重 量の増加。80 mg/kg 投与群の雄 15 例中 7 例及び 雌 15 例中 8 例に、胃における扁平上皮過形成、 角化、潰瘍形成、慢性炎症及び浮腫。このよう な影響は 25 mg/kg 投与群では 15 例中 2 例のみ に認められ、10 mg/kg 投与群では全く認められ なかった。 NOAEL : (ClO ₂ ⁻ として) 7.4 mg/kg 体重/日	*26
	30-90日間	飲水	ラット	亜塩素酸イオン 0、10、50、100、250、 500 mg/L (0、1、5、10、 25、50 mg/kg 体重/日)	血液学的検査の結果、100 mg/L 投与群以上で一 時的な貧血が発生。90 日後には 100 mg/L 投与群 で赤血球グルタチオン濃度が対照群よりも 40% 減少し、50 mg/L 群では 20% 以上減少。 NOAEL : (ClO ₂ ⁻ として) 1 mg/kg 体重/日	25
	単回	経口	ネコ	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ ⁻ として 20、64 mg/kg 体重	両投与群でメトヘモグロビン血症がみられ、20 mg/kg 体重での投与で 32%のヘモグロビンがメ トヘモグロビンの状態になった。	25
	30-60日間 (rising dose 法)	飲水	サル 12匹	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ ⁻ として 0、25、50、 100、400 mg/L (約 0、3、 6、13、50 mg/kg 体重/日)	メトヘモグロビン血症と貧血が用量依存的に認 められた。	11
長期 毒性	2年間	飲水	ラット 雌雄各 7 匹	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ ⁻ として 0、1、2、4、 8、100、1,000 mg/L	全ての投与群でラットの生存期間に変化は認め られず、8 mg/L (0.7 mg/kg 体重/日) 投与群以下 では投与による影響はみられなかった。100 及 び 1,000 mg/L (9.3、81 mg/kg 体重/日) 投与群で は、投与に起因した腎における病変が認められ た。	17
生殖・ 発生 毒性	妊娠 1 日 ~ 授乳終了	飲水	雌 マウ ス 10匹	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ ⁻ として 0、100 mg/L (0、22 mg/kg 体重/日)	受胎率は対照群で 56%、投与群で 39% であり、 児動物の離乳時の体重は対照群より 14% 減少し た。 LOAEL : (ClO ₂ ⁻ として) 22 mg/kg 体重/日	14 *14
	66-76日間	飲水	雄 ラッ ト 12匹	亜塩素酸ナトリウム 0、1、10、100、500 mg/L (0、0.1、1、10、50 mg/kg 体重/日)	病理組織検査では投与に起因する異常は認めら れなかった。精子の形態異常及び精子運動能の 低下が 100 mg/L 投与群以上で認められた。 NOAEL : (NaClO ₂ として) 1 mg/kg 体重/日 (ClO ₂ ⁻ として) 0.75 mg/kg 体重/日	26
	雄 : 交配前 56 日間及 び交配期間 雌 : 交配前 14 日間、交 配、妊娠、 授乳期間	飲水	雌雄ラ ット	亜塩素酸ナトリウム 0、0.1、1、10、100 mg/L (0、0.1、1.0、10 mg/kg 体重/日)	100 mg/L 投与群において出生児の雌雄の血中トリ ヨードチロニン及びチロキシン濃度の低下が 出生後 21 日及び 40 日に認められた。 NOAEL : (NaClO ₂ として) 10 mg/kg 体重/日	
	2.5 ヶ月間 (交配前と 妊娠中)	飲水	雌 ラッ ト 6-9匹	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ ⁻ として 1、10 mg/L	両投与群で奇形発生率が増加したが、投与群の 匹数が少ないため、統計学的に有意とはみなさ れなかった。	27

試験種類	投与期間	投与経路	動物種・動物数/群	投与物質及び投与量又は濃度	結果 NOAEL 又は LOAEL	文献 No.
生殖・発生毒性	9 週間 (交配 10 日前 ~ 受胎後 35~42 日)	飲水	雌 ラット 12 匹	亜塩素酸ナトリウム 0、20、40 mg/L (ClO ₂ として) 0、3、6 mg/kg 体重/日)	6 mg/kg 投与群の児の探索行動において、受胎後 36~39 日に一貫した顕著な減少が認められたが、40 日には認められなかった。探索行動は受胎後 39 日より後では対照群と投与群では同程度であった。 NOAEL : (ClO ₂ として) 3 mg/kg 体重/日	*27
	雄 : 交配前 10 日間、交配期間中 雌 : 交配前 10 日間、交配、妊娠、授乳期間	飲水	ラット 雌雄各 30 匹	亜塩素酸ナトリウム 0、35、70、300 mg/L ((ClO ₂ として) F0 : 雄 : 0、3.0、5.6、20.0、 雌 : 0、3.8、7.5、28.6 F1 : 雄 : 0、2.9、5.9、22.7、 雌 : 0、3.8、7.9、28.6 mg/kg 体重/日)	300 mg/L 投与群の F1、F2 の生存率低下、出生時及び授乳期間中の体重減少が認められ、両世代の胸腺重量及び脾臓重量の低下、正常な立ち直り反応を示す率の低下、雌雄の性成熟の遅延、F1 の赤血球検査値の低下が認められた。70 及び 300 mg/L 投与群で F0 の雌及び F1 の雌雄の肝の絶対重量及び相対重量の有意な減少、F1、F2 の脳重量の減少、分娩後 24 日の聴覚性驚愕刺激に対する最大応答の減少が認められた (分娩後 60 日には認められず)、35 及び 70 mg/L 投与群の F1 では赤血球検査値の軽微な変化が認められたが、背景データにおける正常範囲内の変化であった。 (NOAEL : (ClO ₂ として) 2.9 mg/kg 体重/日)	*28 *29
	妊娠 7-19 日	飲水	ウサギ 16 匹	亜塩素酸ナトリウム 0、200、600、1,200 mg/L ((ClO ₂ として) 0、10、26、40 mg/kg 体重/日)	飲水量は全ての投与群で減少したが、特に 600 mg/L 投与群以上で顕著であった。600 mg/L 投与群以上では、摂餌量の減少がみられ、平均胎児重量がわずかに減少したことに伴い化骨遅延の発生がわずかに増加したが、用量反応関係は認められなかった。用量の増加に伴う軽度の骨格異常、母動物の飼料摂取量の抑制が認められた。 (NOAEL : (ClO ₂ として) 10 mg/kg 体重/日)	*30
発がん性	85 週間	飲水	マウス	亜塩素酸ナトリウム 250、500 mg/L ((ClO ₂ として) 約 36、71 mg/kg 体重/日)	投与群の雄には肺及び肝腫瘍が認められたものの、対照群の背景データの正常範囲内であった。肝腫瘍の増加に典型的な用量反応関係は認められず、良性腫瘍の発生にのみ有意な増加が認められた。	28
	85 週間	飲水	ラット	亜塩素酸ナトリウム 300、600 mg/L ((ClO ₂ として) 雄 : 18、32、雌 : 28、41 mg/kg 体重/日)	有意な腫瘍の増加は認められなかった。	
	2 年間	飲水	ラット 雌雄各 7	亜塩素酸ナトリウム 0、1、2、4、8、100、1,000 mg/L	腫瘍はみられなかった。	17
遺伝毒性	復帰突然変異試験		TA92、 TA94、 TA98、 TA100、 TA1535、 TA1537	0.3 mg/plate	S9mix の存在下において TA100 で陽性であった。	36*
	染色体異常試験		CHL 細胞	最高用量 0.02 mg/l	陽性	
	小核試験	経口	マウス	37.5-300 mg/kg 体重	陰性	d
	小核試験	経口	マウス	8、20、40 mg/kg 体重/日	陰性	22
	小核試験	腹腔内	マウス	7.5-60 mg/kg 体重	陽性	d
	骨髓染色体異常試験	経口	マウス	8、20、40 mg/kg 体重/日	陰性	22

試験種類	投与期間	投与経路	動物種・動物数/群	投与物質及び投与量又は濃度	結果 NOAEL 又は LOAEL	文献 No.
	精子形態異常試験	経口	マウス	8、20、40 mg/kg体重/日	陰性	22
ヒトへの影響	単回 (rising dose 法)	飲水	男性ボランティア 10名	亜塩素酸ナトリウム ClO ₂ として 0.01、0.1、0.5、1.0、1.8、2.4 mg/L、1 L/日	血清中の尿素窒素、クレアチニン及びその両者の割合（群平均値）の変化が認められた。 NOAEL : (ClO ₂ として) 0.034 mg/kg 体重/日	33
	約12週間	飲水	男性ボランティア 10名	亜塩素酸ナトリウム 5 mg/L、0.5 L/日	平均赤血球ヘモグロビン量（群平均値）の変化が認められたが、時間経過との関連が無く、数値は正常範囲内にあった。 NOAEL : (ClO ₂ として) 0.036 mg/kg 体重/日	33

(参考)

塩素系化合物の関係図



参考資料 : U.S.FDA Environmental Assessment (1999): 64 Federal Register (1999) Sep.15
p.49982