

ニトロフラン類の食品健康影響評価について(案)

1. はじめに

ニトロフラン類はフラン系の合成抗菌剤の総称であるが、食品衛生法においてはいわゆるポジティブリスト制度の導入に伴い、『食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質』に指定され、フラゾリドン、ニトロフラントイン、フラルタドン、ニトロフラゾンがその対象とされている。具体的には、これらの代謝物である 3-アミノ-2-オキサゾリドン(AOZ)、1-アミノヒダントイン(AHD)、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン(AMOZ)及びセミカルバジド(SEM)を分析対象化合物とした分析法が告示により規定され、これらの規制が実施されているところである。


削除: AOMZ

ニトロフラン類の食用動物への使用は国内及び諸外国においても多くで禁止されている。フラゾリドンとニトロフラゾンについて平成 15 年に過去に厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会(以降薬食審)において評価され(薬食審)、フラゾリドンについては遺伝毒性発がん性物質である可能性が高く、その代謝物である AOZ については *in vivo* 及び *in vitro* の遺伝毒性が陽性であり発がん性を有する可能性が極めて高いと考えられることから、1 日摂取許容量(ADI)を設定することは適当でない、ニトロフラゾン及びその代謝物である SEM については発がん性を示した動物試験の結果があり、メカニズムは明らかでないものの ADI を設定することは適当でないとされている。ニトロフラントイン、フラルタドンについては国内で評価された事例はない。

国際的には JECFA においてフラゾリドンについては遺伝毒性発がん性が否定できないこと、ニトロフラゾンについては発がん性に関する NOEL が得られていないことから ADI は設定されていない(JECFA1,2)。EMEA においてはニトロフラゾン、ニトロフラントインについては ADI、MRL を設定するための情報が不十分、フラルタドンについては情報がなく、フラゾリドンについては NOEL が得られないこと及び遺伝毒性が認められることからいずれも Annex IV(食用動物への使用を認めない動物用医薬品)該当物質と評価され(EMEA1,2)、 $1\mu\text{g}/\text{kg}$ の MRPLs (Minimum Required Performance Limits) が、鶏肉及び水産製品について設定されている(EU 委員会決定)。一方、SEM については近年ニトロフラゾンに由来するものだけではなく、アゾジカルボンアミドを使用したプラスチックガasketや、カラゲニン、ゼラチン、粉卵等の食品あるいは食品原料を次亜塩素酸塩で処理した際、あるいは詳細な生成機構は不明であるが、自然にも生じることが明らかとなり、2003 年 10 月及び 2005 年 7 月に EFSA が評価を実施している(EFSA2003, 2005)。また、国内においても複数の *in vivo* 遺伝毒性試験が新たに実施されている。

このため、今般厚生労働省より、ニトロフラン類及びその代謝物についての暫定基準の評価に当たり、特に SEM の遺伝毒性及び現時点におけるリスクを含めた食品健康影響評価を行うことが食品安全委員会に依頼されたものである。

2. フラゾリドン及び AOZ について(薬食審、JECFA2、EMEA1,2)



フラゾリドン及びその主要な代謝物である AOZ については、過去に薬食審において JECFA あるいは

1 EMEA において評価された試験成績の総括がなされており、その概要は次の通りである。

2 3 ○フラゾリドン


4 発がん性については、SwissMBR/ICR マウスを用いた混餌投与による試験において、24mg/kg 体重/日以上
5 上の投与群の雌雄で気管支腺がん、雄でリンパ肉腫の増加、Fischer ラット又は Sprague-Dawley ラットを用
6 いた混餌投与による試験において、Fischer ラットでは 12.5mg/kg 体重/日投与群の雌で良性又は悪性の乳
7 腺腫瘍の増加、25mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で皮脂腺腺種及び甲状腺腺腫、雄で基底細胞腫及び
8 基底細胞がんの増加、50mg/kg 体重/日投与群の雌で乳腺腫瘍の増加、Sprague-Dawley ラットでは
9 50mg/kg 体重/日投与群の雌で乳腺腫瘍の増加、雄で中枢神経系の星状膠細胞腫の増加が認められた。
10 遺伝毒性については、*in vitro* の DNA 修復試験、AMES 試験、ほ乳類培養細胞を用いた UDS 試験、遺伝
11 子突然変異試験、SCE 試験、及び染色体異常試験等が実施されほとんどの試験において陽性反応が認め
12 られ、*in vivo* ではキイロショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験で陽性、マウスを用いた小核試験は
13 不明瞭であった。これらのことから、フラゾリドンは遺伝毒性を有する発がん物質である可能性が高い。

14 15 ○AOZ


16 発がん性については評価されていないが、遺伝毒性について *in vitro* の Ames 試験(-S9 の *Salmonella*
17 *typhimurium* TA100, TA1535, TA98, TA1537 及び±S9 の *E. coli* WP2uvrA)、ヒトの末梢リンパ球を用いた
18 染色体異常試験(-S9)、*in vivo* のマウスを用いた小核試験で陽性を示したことから、発がん性を有する可
19 能性は極めて高い。

20
21 これらのことから、フラゾリドン及びAOZについては入手された資料から見る限り、ADIを設定することは適
22 当でないと考えられると評価している。この評価は現時点のJECFA、EMEAの評価とも矛盾が無く、今般の評
23 価依頼に当たって、これらの結論を変更するに足る新たな知見は提出されていないことから、この評価結
24 果を見直す必要はないものと考えられる。

25 26 3. ニトロフラントイン及びAHDについて(NTP、JECFA1、EMEA1)



27
28
29
30
31
32
33
34 ニトロフラントイン



35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 AHD

40 ニトロフラントイン及びその主要な代謝物であるAHDについては、国内における評価はない。ニトロフラン
41 トインについては米国 NTP において B6C3F₁ マウス及び F344/N ラットを用いた 2 年間の発がん性試験が実
42 施されており、その結果 B6C3F₁ マウスの雄及び F344/N ラットの雌では発がん性を示す証拠はない(no
43 evidence of carcinogenic activity)が、B6C3F₁ マウスの雌では卵巣で管状腺腫(tubular adenoma)、良性混合腫
44 瘍(mixed tumor)、顆粒膜細胞腫(granulosa cell tumor) の増加 (clear evidence of carcinogenic activity)、及び F344/N
45 ラットの雄ではまれにしか認められない腎臓の尿細管上皮由来の腫瘍(tubular cell neoplasms)の増加 (some
evidence of carcinogenic activity) が示されたとしている。また、JECFA のニトロフラゾンの評価書中でニトロフラン
トインはマウスにおいて卵巣で良性腫瘍が増加し、卵巣の萎縮に伴う二次的影響と思われるものの、ニトロ
フラン類の影響は否定できず、NOEL も求められないと記載されている。EMEA ではニトロフラントインにつ
いては情報が不足しており、ADI 及び MRL を設定せず食用動物への使用を認めない動物用医薬品リストに

削除: 明らかな

削除: が示された

削除:

削除: 細胞

削除: が示された


1 掲載している。また、2006年のBig Blueマウスの種々の臓器における導入*c II*遺伝子の突然変異試験の論
2 文報告では、腎臓において弱いながら有意な変異ブランク数の増加が認められたとされている(Philippe)。

3 **AHD**については情報が得られていない。

4
5 今般の評価依頼に当たって、これらの結論を変更するに足りる新たな知見は提出されておらず、発がん性
6 が否定できず及びそのメカニズムも明確でないことから、ニトロフランイン及びAHDについてADIを設定す
7 ることは適当でないと考えられる。

4. フラルタドン及び~~A~~MOZについて(EMEA1)

削除: AOMZ



フラルタドン

~~A~~MOZ

削除: AOMZ


18
19
20 フラルタドン及び~~A~~MOZについては、国内やJECFAにおける評価、NTPによる発がん性試験等の情報は
21 得られていない。EMEAにおいてはフラルタドンについては情報がなく、ADI及びMRLは設定せず食
22 用動物への使用を認めない動物用医薬品リストに記載するとしている。

削除: AOMZ

23
24 このように、フラルタドン及び~~A~~MOZについては、ほとんど情報が得られていない状況にあり、評価を行う
25 ことは出来ない。EMEAでADI及びMRLを設定せず、食用動物への使用を禁じていること、ニトロフラン類
26 の多くが発がん性を疑われる物質であることを考慮すると、必要な科学的知見が得られるまで、ADIを設定
27 することは適当でない判断するのが適当であると考えられる。

削除: AOMZ

5. ニトロフラゾン及びSEMについて(薬食審、EMEA1、JECFA1)



ニトロフラゾン

SEM

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ニトロフラゾン及びその主要な代謝物であるSEMについては、過去に薬食審においてJECFAあるいは
40 EMEAにおいて評価された試験成績の総括がなされており、その概要は次の通りである。

○ニトロフラゾン

41
42
43 発がん性については、B6C3F₁マウスを用いた混餌投与による試験において、14mg/kg体重/日以上
44 の投与群の雌で**卵巣萎縮**、**尿細管上皮過形成**、**卵巣顆粒膜細胞腫**、**卵巣の良性混合腫瘍**の増加、Holtzman雌
45 ラットを用いた混餌投与による試験において36週間の150mg/kg体重/日の投与、あるいは53週間の

削除: 子宮

75mg/kg 体重/日以上投与で良性乳腺腫瘍の増加、CFE ラットを用いた混餌投与(50-55mg/kg 体重/日)による試験において、雌で良性の乳腺腫瘍の増加、F344/N ラットを用いた混餌投与による試験において、11mg/kg 体重/日以上投与群の雌で乳腺線維腺腫の増加(腺がんは増加せず)が認められた。遺伝毒性については、*in vitro* の DNA 損傷試験、Ames 試験、ほ乳類培養細胞を用いた復帰突然変異試験、SCE 試験及び染色体異常試験が実施され全てにおいて陽性反応が認められているが、*in vivo* では染色体異常試験、小核試験では陰性であった。

OSEM

発がん性については、Swiss マウスの 0.0635%SEM・HCl の飲水投与^aによる試験において、雌雄に血管由来の腫瘍の増加、雌で肺腫瘍の増加、dd マウスの雌を用いた7ヶ月の混餌投与(0.1%SEM・HCl)試験で肺腫瘍の増加が認められた。ラットにおいては発がん性は認められない、あるいは評価するのに不十分な報告であった。遺伝毒性については *in vitro* の Ames 試験では *S. typhimurium* TA1535 の-S9 条件下で弱い陽性反応が認められたが、TA1537、1538、98、100 では陰性であった。*in vitro* では ³²P ポストラベル試験において Cu(II)存在下で DNA 付加体の形成が認められた。*in vivo* では雄 Swiss マウスにおける肝及び肺の DNA アルカリ溶出法では陰性であった。

削除: ついて

削除: vivo

削除: を用いた

削除: 抽出法

これらのことから、「ニトロフラゾン及び SEM については発がん性を示した試験結果があり、発がん物質であると考えられる。発がん性のメカニズムは明らかでないものの、入手された資料から見る限り、ADI を設定することは適当でないと考えられる」と評価している。なお、SEM の IARC における評価はグループ 3 「人に対する発がん性について分類できない(Not classifiable as to its carcinogenicity to humans)」である。(IARC)

ニトロフラゾンについては、今般の評価依頼に当たって、これらの結論を変更するに足る新たな知見は提出されていないことから、この評価結果を見直す必要はないものと考えられる。

一方、SEM については、ニトロフラゾンの使用以外に、アジカルボンアミドを使用したプラスチックガスケットや、カラゲニン、ゼラチン、粉卵等の食品あるいは食品原料を次亜塩素酸塩で処理した際、あるいは詳細な生成機構は不明であるが、自然にも生じることが明らかとなり、新たに EFSA 等でより詳細なリスク評価が実施されている。また、国内においても *in vivo* の遺伝毒性試験が新たに実施され、その結果が報告されている。これらの知見に基づき SEM については従前の評価を変更する必要があるかについても評価を行う必要性があると考えられることから、毒性知見、ニトロフラゾンに由来しない SEM の生成機構及び汚染状況に関する知見等について以下にとりまとめを行った。

6. SEM に関する毒性知見について

6-1. 遺伝毒性について

これまでに報告されている遺伝毒性に関する主な報告は次の通りである。

In vitro 試験

試験	対象	投与量	結果
Ames	<i>S. typhimurium</i> TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100	623~9988 µg/plate(±S9)	TA1535 で陽性 (Parodi)
	<i>S. typhimurium</i> TA1535, TA1537, TA98, TA100, <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	62~5000 µg/plate(±S9)	TA1535,TA100 で陽性(TNOa)
染色体異常	チャイニーズハムスター卵巣 (CHO) 細胞(試験1)	75~600 µg/ml (+S9; 4~14hr)	陰性(TNOc)

削除: lv18

^a SEM 摂取量は雄 3.3mg/匹/日、雌 4.8mg/匹/日と推測されており、雌の体重を 25~35g、雄の体重を 30~40g とした場合おおよそ 94~130mg/kg 体重/日、120~160mg/kg 体重/日

		75~1115 µg/ml (-S9; 4+14hr)	陰性	削除: h/18
		75~600 µg/ml (-S9; 4+14hr)	陰性	削除: h/18
	チャイニーズハムスター卵巣 (CHO) 細胞 (試験2)	200~900 µg/ml (-S9; 18hr)	陰性	削除: h/18
		200~900 µg/ml (-S9; 32hr)	陰性	削除: h/32
		200~900 µg/ml (+S9; 4+14hr)	陰性	削除: h/18
		200~900 µg/ml (+S9; 4+28hr)	陰性	削除: h/32
前進突然変異 (MLA)	L5178Y マウスリンパ腫細胞	0.013~10 mmol/L(-S9)	陽性(TNOb)	削除: 分析
		0.013~10 mmol/L(+S9)	陽性	
³² P-DNA 損傷試験	ヒト c-Ha-ras-1、p53、(Cu(II)存在下)	10~100µmol/L	損傷陽性 (Hirakawa)	削除: ポストラベル

1
2 *in vivo* 試験

試験系	試験対象	投与量	結果
不定期 DNA 合成	ラット肝	500, 2000 mg/kg 単回経口投与	陰性(国衛研 a)
小核	マウス骨髄	62.5, 125, 250 mg/kg/日, 2 日間	陰性(国衛研 b)
突然変異試験 (lacZ 導入遺伝子)	雄 Muta™ Mouse 肝臓、肺	0, 12.5, 25.0, 50.0, 100mg/kg/日 28 日間強制経口	陰性(国衛研 c)

3
4 ① Ames 試験

5 Ames 試験は、先に薬食審においても評価されたヒドラジン誘導体 16 種についての Parodi らの論文(Parodi)
6 及び EFSA より公表された試験報告(TNOa)が存在している。

7 Parodi らの論文では、*S. typhimurium* TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100 の 5 菌株について、8.3, 17, 43,
8 67, 133µmol/plate(623, 1277, 2553, 5032, 9988µg/plate に相当)の用量で S9 代謝活性化系存在下及び非存在
9 下の試験が行われ、TA1535 の S9 非存在下で陽性であったと報告されている。得られた復帰変異株数につ
10 いては、対照群(H₂O)の 11±2 に対し、67µmol/plate(5031µg/plate)の SEM で 61±28 であった。同報告中の他
11 のヒドラジン誘導体では、Nialamide では 4.2µmol/plate で 2586±203、ヒドラジン水和物では 10µmol/plate で
12 74±19、Isoniazid では 146µmol/plate で 61±15 と報告されている。なお、この復帰変異株数はラット肝臓ある
13 いはマウス肝臓の S9 存在下では減少した。また、133µmol の処理は細胞毒性を示した。

14 EFSA の報告では、*S. typhimurium* TA1535, TA1537, TA98, TA100 及び *E. coli* WP2 *uvrA* の 5 菌株について、
15 62, 185, 556, 1667, 5000µg/plate の用量で S9 代謝活性化系存在下及び非存在下の試験が行われており、S9
16 非存在下において、TA1535 の 556µg 以上、TA100 の 1667µg 以上で陽性であったと報告されている。これら
17 で認められた復帰変異株数については、最大で TA1535 では対照群(34±1)の 16 倍(548±131)、TA100(215
18 ±39)で 3 倍(624±44)であり、WP2 *uvrA* (40±5)は 2 倍に達していなかった(72±9)。この復帰変異株数はい
19 ずれも S9 存在下では減少した。なお、陽性対照群は TA1535、TA100 では sodium azide 1.0µg/plate で 525±
20 39, 733±27、WP2*uvrA* では N-ethyl-N-nitrosourea 100µg/plate で 192±6 であった(いずれも-S9)。また、S9 存
21 在下の 5000µg の処理は TA1537, TA100, WP2 *uvrA* について細胞毒性を示した。2005 年の EFSA の評価で
22 はこの他に 4 つの報告が紹介されているが、いずれも陰性である。

23 このことから、SEM はその程度は弱いものの、Ames 試験では特定の細菌株に対し陽性を示すと考えられ

- 削除: h/18
- 削除: h/18
- 削除: h/18
- 削除: h/32
- 削除: h/18
- 削除: h/32
- 削除: 分析
- 削除: ポストラベル

- 削除: 肝臓、肺
- 削除: 遺伝子突然変異試験
- 削除: DNA

- 削除: -
- 削除: 条件下

- 削除: -
- 削除: 条件下
- 削除: WP2 *uvrA* の 5000µg
- 削除: 2
- 削除: 422
- 削除: 41

- 削除: 特定の細菌株に対する

る。なお、復帰変異が認められたのはいずれも点変異型の栄養要求性変異株^b (TA1535, TA100, WP2 *uvrA*)であり、フレームシフト型の変異株^c(TA1537, TA98)についてはいずれも陰性であった。

②染色体異常試験

染色体異常試験は、EFSA より公表された試験報告(TNOc)が存在している。

チャイニーズハムスター卵巣 (CHO) 細胞を用いた2つの独立した試験が行われ、試験1では75, 150, 300, 600 μ g/mLの用量、試験2では200, 400, 600, 700, 800, 900 μ g/mLの用量で、S9代謝活性化系存在下及び非存在下の試験が実施されているが、いずれも陰性であったと報告されている。また、本試験に先立って実施された用量設定試験においてS9非存在下の1115 μ g/mLの処理はmitotic index(分裂指数)^dを著しく低下させることが確認されている。

なお、試験1、試験2を通じて、S9存在下の300 μ g/mL以上の用量の短時間処理(4時間被験物質処理+14時間培養)では、endoreduplication^eが認められていた。ただし、これは4時間処理+28時間培養では認められなかった。

このことから、SEMはCHO細胞に染色体異常を示さないと考えられる。

③前進突然変異 (MLA)

MLAはEFSAより公表された試験報告(TNOb)が存在している。

L5178Yマウスリンパ腫細胞のTk-locusを用い、0.013, 0.026, 0.053, 0.11, 0.21, 0.42, 0.84, 1.7, 2.4, 3.4, 4.9, 7.0, 10mmol/Lの用量でS9代謝活性化系存在下及び非存在下の試験が行われており、S9非存在下の1.7, 4.9, 7.0, 10mmol/L、S9存在下の10mmol/Lの用量で陽性であったと報告されている。この陽性所見は4.9mmol/L以上では用量依存的であった。

本報告において陽性の判定は変異の発生が、①対照群と比較して細胞1,000,000あたり50以上増加し、②用量依存的な反応が認められるか、再現性が認められる場合、とされている。S9非存在下では4.9, 7.0, 10mmol/Lで用量依存的に、62, 106, 262の変異の増加が認められており、この判定条件に合致していた。なお、1.7, 2.4, 3.4mmol/Lにおける変異頻度の増加は56, 48, 41であり、この用量では用量依存性は認められなかった。また、変異コロニーサイズの割合では、特に小コロニーの増加は認められず、染色体異常誘発性を示唆する所見は認められなかった。

このことから、SEMはMLAにおいて陽性を示すと考えられる。

④DNA損傷試験

DNA損傷試験は、先に薬食審においても評価されたHirakawaらの論文がある(Hirakawa et al.)。

³²Pで5'末端をラベルしたヒトc-Ha-ras-1またはp53遺伝子のフラグメントを10, 20, 50, 100 μ mol/LのSEMとインキュベートし、ゲル電気泳動によりDNA断片化の有無が検討され、Cu(II)存在下で、DNAの断片化が検出されたとしている。断片化はインキュベート後のピペリジン処理の有無にかかわらず検出されたが、処理により断片化の度合いは進行した。ピペリジン処理の有無にかかわらずDNA断片化が起こったことか

削除: 分析

削除: ³²Pポストラベル

削除: ³²Pポストラベル

削除: が存在している

削除: また、Cu(II)の代わりにFe(III)、Co(II)、Ni(II)、Mn(II)を用いても断片化は起こらなかった。一方、エタノール、マンニトール、蟻酸ナトリウム、DMSO^f、SOD^gは断片化を阻害せず、メチオナル^h、カタラーゼ、bathocuproineⁱは断片化を部分的に阻害した。

^b 基本的にDNAの1塩基対の変異により栄養要求性となった変異株。

^c DNAの塩基対に欠失あるいは挿入の変異が起こり栄養要求性となった変異株。遺伝暗号は3塩基対で1アミノ酸を指すことから、塩基対数の変化は変異部位以降の遺伝情報を大幅に書き換えることになる。

^d ある細胞集団の中で、細胞分裂を行っている細胞の割合のこと。この場合の分裂指数の低下は細胞に毒性影響があることを示唆している。

^e 全ての染色体が倍加(2本ずつ並ぶ)した状態をいう。

^j 臓器特異的に突然変異を検出可能

削除: より

1 ら、Cu(II)依存性のSEMに、よる DNA 損傷はDNA鎖のバックボーンの切断を起こしていることが示唆され、
2 また、同処理によって切断が促進されたことから塩基の修飾も同時に起こしていると考えられる。また、水酸
3 化ラジカルスカベンジャーは断片化を阻害せず、メチオナール、カタラーゼ、bathocuproine により断片化が部
4 分的に阻害されたことから、過酸化水素とCu(I)がDNA損傷に関与していることが示唆された。

5 このことから、SEMは*in vitro*のCu(II)存在下においてDNAに損傷を与えると考えられる。しかしながら、
6 通常Cuは*in vivo*では染色体に強固に結合しており、イオンとしては存在しないことから、この現象の重要性
7 は不明である。

9 ⑤ *in vivo* 不定期DNA合成試験(UDS試験)

10 UDS試験は国立医薬品食品衛生研究所委託事業における試験報告(国衛研 a)が存在している。

11 本試験に先立って毒性予備試験が実施され、被験物質の推定最大耐量が^g 2000mg/kg、雌雄間で毒性影響
12 に差が認められなかったとされている。このことから本試験は、最大投与量 2000mg/kg、雄ラットのみを対象
13 として実施された。

14 雄SDラットに500、2000mg/kgの用量で単回経口投与し、投与後2~4時間(短時間処理)又は12~16時間
15 (長時間処理)後に単離した肝細胞を用いたUDS試験が行われ、いずれも陰性であった。長時間処理では陽
16 性対照群で15.5±7.1/100に対し2000mg/kgで0.0±0.8/100、短時間処理では陽性対照群で15.5±7.1/100
17 に対し2000mg/kgで0.0±0.8/100と報告されている。

18 2005年のEFSAの評価でも類似の試験報告が紹介されているが陰性である。

19 このことから、SEMはラットを用いた*in vivo*のUDS試験において陰性であると考えられる。

21 ⑥ *in vivo* 小核試験

22 小核試験は国立医薬品食品衛生研究所委託事業における試験報告(国衛研 b)が存在している。

23 本試験に先立って毒性予備試験が実施され、被験物質の推定最大耐量が^g 250mg/kg、雌雄間で毒性影響に
24 差が認められなかったとされている。このことから本試験は、最大投与量 250mg/kg、雄ラットのみを対象とし
25 て実施された。

26 雄ICR系マウスに62.5、125、250mg/kg/dayの用量を24時間感覚で2回強制経口投与し、最終投与約24
27 時間後に採取した骨髄について観察が行われ、いずれも陰性であった。なお、試験期間中に実験動物の死
28 亡や一般状態の異常は認められなかった。

29 このことから、SEMはマウスを用いた*in vivo*の小核試験において陰性であると考えられる。

31 ⑦トランスジェニックマウスを用いた遺伝子突然変異試験

32 トランスジェニックマウス(Muta™ Mouse^l)を用いた遺伝子突然変異試験は国立医薬品食品衛生研究所委
33 託事業における試験報告(国衛研 c)が存在している。

34 SEMについては、マウスの混餌投与試験において肺腫瘍が認められているため、Muta™ Mouse(雄各6
35 匹/群^k)にSEM・HCl溶液を28日間強制経口(0、12.5、25.0、50.0、100mg/kg体重/日)投与し、肝臓及び肺にお
36 ける導入lacZ遺伝子の突然変異試験が実施されている。肝臓、肺抽出DNAともにいずれの用量においても
37 変異プラーク数の増加は認められなかった。一方、陽性対照である7,12-ジメチルベンズ[α]アントラセンで
38 は変異プラーク数の優位な増加が認められた。これらのことから、100mg/kg体重/日までのSEMの経口投与
39 はMuta™ Mouseの肝臓及び肺に対して遺伝子突然変異を誘発しなかった。

41 以上のように、SEMは*in vitro*のいくつかの試験において弱い陽性結果を示すものの、*in vivo*の複数の
42 試験においていずれも陰性であった。これらの結果を総合的に考慮すると、SEMが*in vivo*において遺伝毒
43 性を示す可能性は低く、マウスで認められたいくつかの腫瘍の増加は遺伝毒性に起因しないものと考えられ

削除: り、特に標的臓器であるマウス
の肺において100mg/kg体重/日の用量
においても遺伝子突然変異の誘発を
認めなか

^k 解析は各5匹について実施

1 る。

2

3 6-2. SEMに係るその他の毒性知見について

4 遺伝毒性、発がん性の他に、¹⁴C-標識 SEM のラットにおける吸収・排泄試験、不完全であるが SD ラットに
5 における催奇形性に関連した知見が得られている。

6 吸収・排泄については 2004 年に Crj:CD(SD)IGS 系雄ラットに ¹⁴C-標識 SEM を 0.1、1、10mg/kg を単回強
7 制経口投与した試験が実施されている。C_{max} は 86.1、832、8049ng-eq/mL、T_{max} は 0.67、1.0、1.0 時間、T_{1/2}
8 は 16、21、17 時間であった。排泄は主として尿中で投与後 168 時間までに 84.3、81.7、87.1%、糞には 6.9、9.4、
9 3.7%、呼気には 4.7%、4.3%、4.1% が排泄され、体内には 2.0、1.1、1.3% が残存していた。投与後 30 分の全身
10 オートラジオグラムからは、消化管内容物、腎臓、大動脈、胃及び肝臓で血液より高い放射能が認められた
11 他は、いずれも血液と同程度か低い放射能を示した。放射能はその後経時的に低下し、72 時間後には靱帯、
12 大動脈で認められ、小腸、褐色脂肪、皮膚、肺、腎臓、骨髄、血液及び精巣で痕跡程度認められたのみで、
13 特に特定臓器への蓄積などは認められていない。(国衛研¹)

14 SD ラットにおける催奇形性に関連した知見は、1972 年にラチロゲン¹について実施された試験に含まれて
15 いる。SD ラットに 5、10、25、50 あるいは 100mg/日の SEM・HCl を妊娠 10-16 日あるいは 12-15 日に強制経
16 口投与し、出産予定 1 日前に剖検し、胚吸収及び先天性口蓋裂の有無が確認されている。胚吸収の発生率
17 は 3、0、3、38、56%、生存胎児の口蓋裂発生頻度は 0、0、43、95、100% であった。この試験における NOAEL
18 は 10mg/kg/日(約 30-40mg/kg 体重/日)であった。ただし、この試験は投与期間が胚形成の全期間をカバーし
19 ておらず、内臓、骨奇形は評価されていない等、限定的である。(Steffek、EFSA2005)

削除: 塩酸

21 6-3. ニトロフラゾンに由来しない SEM 生成機構及び汚染状況に関する知見

22 SEM は動物用抗菌剤であるニトロフラゾンの代謝物として生成することが確認されており、EU では畜水産
23 食品中の SEM を指標として、ニトロフラゾンの使用の有無の判断材料としている。

24 一方、近年になってプラスチックガasket を使用した容器中の食品から SEM が検出されることが明らかと
25 なり、その後の調査でこれはニトロフラゾンではなく、プラスチックガasket の製造工程で発泡剤として使用
26 されるアゾジカルボアミド(azodicarbonamide)に由来すると考えられることが報告されている(EFSA2003)。食
27 品中に検出される量は瓶詰めのベビーフードで高く、EFSA の 2005 年に報告によると、オランダでは 40 検体
28 の調査で平均 13ppb(3-26ppb)、スペインでは 88 検体の調査で平均 16ppb(1-87ppb)、フランスでは 10 以上の
29 検体の調査で 6-15ppb の範囲、ドイツでは 133 検体の調査で平均 13ppb(<0.5-140ppb)、フィンランドでは 15
30 検体の調査で平均 11ppb(<1-28ppb)、アイルランドでは 50 検体の調査で平均 7ppb(<1-42ppb)、スロベニアで
31 は 12 検体の調査で 1-17 の範囲、工業界の報告では 63 検体の調査で平均 11ppb(0.1-27ppb)であった。試験
32 法の差はあるが、これらベビーフードについての結果を平均すると 385 検体の調査で平均 13ppb であった。
33 一方、その他の種々の食品についての結果を平均すると 121 検体の調査で平均 1.0ppb であった。
34 (EFSA2005)

削除: プラスチックパッキン

削除: 範囲として


削除: が最も高いとされ

35 国内については、平成 15 年に厚生労働省の委託事業によってベビーフードについて瓶詰め 38 検体、凍結
36 乾燥食品 4 品目、レトルト 4 品目について実施され、瓶詰め食品から平均 17ppb(6-42ppb)の SEM が検出さ
37 れている。凍結乾燥、レトルト食品については定量限界(5ppb)未満であった。(SEM 実態調査)

38 さらに、最近になって、食品の加工処理あるいは自然にも微量であるが SEM が生成し、食品中に残留する
39 可能性のあることが示唆されてきている。例えば、カラゲニンについては実験的に原材料の海草(Red
40 seaweed)で 0.2ppb、これを乾燥させると 2ppb、粗精製処理で 6.5ppb、漂白処理で 68ppb、最終的なカラゲニン
41 で 0.6ppb の SEM が検出されたとしている。また、凍結乾燥した海草(Black seaweed)から 1.1ppb、加熱処理し
42 たエビ(prawns)から 1.6ppb、小エビ(shrimps)から 0.9ppb、卵から 0.6ppb、粉乳から 0.2ppb の SEM が検出され

¹ ラチリスム(Lathyrus sativus を主食とする地域に流行する疾患で、実験的には被験物質の投与により、実験動物に骨疾患型が生じる)を誘発できる物質

1 ている。さらには、実験的には、食品あるいは食品原料を次亜塩素酸塩で処理した際にはより多くの
 2 SEM(0-450ppb)が生じることが示唆されている。これらのように、いずれも微量ではあるが、SEM は天然に
 3 含有され、あるいは通常の食品の加工処理によっても生じている可能性が高い。(K. Hoenicke)



22 **7. 食品健康影響評価について**

23 **【ニトロフラン類の ADI の設定について】**

24 ニトロフラン類は現在フラゾリドン、ニトロフラントイン、フラルタドン、ニトロフラゾンを対象として、『食品にお
 25 いて「不検出」とされる農薬等の成分である物質』に指定され、これらの代謝物である AOZ、AHD、**AMOZ** 及
 26 び SEM を分析対象化合物として規制が実施されている。

削除: AOMZ

27 今般提出された資料からは、フラゾリドン及びAOZ については遺伝毒性発がん性を否定できず、ADI を設
 28 定することは適当でないとする薬食審の評価を変更する根拠は認められない。

29 ニトロフラントイン及びAHD については、NTP の報告においてマウス、ラットで発がん性が認められてい
 30 が、そのメカニズムに関する情報は全く得られていないため、ADI の設定が可能であるかどうかは判断でき
 31 ない。JECFA においてはニトロフラゾンの評価書中でニトロフラントインはマウスにおける良性腫瘍の増加に
 32 対する影響は否定できず、NOEL も求められないと評価され、EMEA においてもADI 及びMRL を設定せず、
 33 食用動物への使用を禁じていることを考慮すると、現時点において、ADI を設定することは適当でないと思
 34 われる。

35 フラルタドン及び**AMOZ** については、ほとんど情報が得られていない状況にあり、評価を行うことは出来な
 36 い。これらについてEMEA では、ADI 及びMRL は設定せず、食用動物への使用を禁じている。ニトロフラン
 37 類の多くが発がん性を疑われる物質であることを考慮すると、必要な科学的知見が得られるまで、ADI を設
 38 定することは適当でない判断するのが適当であると考えられる。

削除: AOMZ

39 ニトロフラゾンについては、従前の、発がん性のメカニズムは明らかでないものの、入手された資料から
 40 見る限り、ADI を設定することは適当でないとする薬食審の評価を変更する根拠は認められない。SEM につ
 41 いては、新たに in vivo の UDS、小核及びトランスジェニックマウスを用いた突然変異試験が報告され、い
 42 ずれも陰性の結果であった。このことから**従来の薬食審の評価を改め**、SEM には生体にとって問題となる遺伝
 43 毒性はなく、本質的には閾値が設定でき、ADI の設定が可能な物質であると判断された。しかしながら、現在
 44 得られている情報は発がん性試験と催奇形性試験の限定的な知見に限られており、ADI を設定するには不
 45 足している。

削除: いと考えられ、

【SEMについて】

上記の通り、現時点において入手された科学的知見からは、ニトロフラゾンについてはADIの設定は適当でないと判断されるが、SEMについては本質的にはADIが設定でき、閾値が設定できる物質であると考えられる。ニトロフラゾンとSEMの毒性が同等と判断できないことから、**分析対象からSEMを除く**とする場合、SEM自体の残留リスクについての懸念が生じるが、SEMについてADIあるいはTDIの設定という定量的評価を実施するためには情報が不足している。

削除: 残留マーカー

しかしながら、SEMは**非意図的に食品から暴露されることが想定され、厚生労働省からの意見聴取要請にあたってSEMについての評価を求められていることから、現時点で可能な範囲で評価を実施するとすれば、動物実験で認められた各種の知見と、想定される暴露量との比較となる。同様の評価は2005年にEFSAにおいて実施された例がある。**

削除: なものを含め

SEMについては、一部のガスケット、食品の殺菌、漂白、加熱、乾燥等の処理、あるいは詳細な生成機構は不明であるが、自然にも生じることが明らかとなっている。EFSAの2005年の評価によれば、9ヶ月の乳幼児(体重8.8kg)が13μg/kgのSEMを含有した食品や飲料を摂取した場合の暴露量の試算値は、0.35μg/kg体重/日(平均的な234g/日の摂取)、0.69μg/kg体重/日(95%上限値である464g/日の摂取)であり、体重4.5kgの乳児が9μg/kgのSEMを含有した包装済みの瓶詰めミルクを700mL摂取した場合の暴露試算値は1.4μg/kg体重/日とされており、また成人の体重当たり暴露量は、暴露源の種類は増えるものの、摂取する食品の種類や摂取形態からこれらに比べて低い(0.02μg/kg体重/日)としている。一方、動物実験において影響が認められている用量は、発がん性について100mg/kg体重/日程度であり、動物実験において発がん性が認められた用量と、乳幼児を含めたヒトの暴露との間には、少なくとも5桁のマージンがあるとし、**食品中に検出されるSEMの発がん性によるヒトの健康影響は重要でないと評価している。また、催奇形性についても3桁もしくはそれ以上のマージンがあると記載している。低用量での影響が懸念される慢性暴露による発がん性と催奇形性に関連する知見が限定的であるが得られているものの、詳細な毒性情報が得られていないと言う状況において実施するものとしては、EFSAが実施した保守的な試算暴露量と、得られている範囲での動物における毒性発現用量との比較をもってリスクの程度を判断する手法は合理性があり、また一定の科学的根拠があるリスク評価であると考えられる。**

削除: この

削除: の、

削除: 、特に低用量での影響が懸念される慢性暴露による発がん性と催奇形性に関連する知見が限定的であるが得られているものの、詳細な毒性情報が得られていないと言う状況において実施するものとしては

国内の状況については、平成15年度の国内におけるベビーフード中のSEM含有量実態調査によれば、試買された瓶詰め食品38品目から検出されたSEMの平均含有量は約17ppb(6-42ppb)であり、EFSAの知見(平均13ppb)とほぼ同様となっている。

・SEMの推定暴露量と動物における毒性発現用量の間には相当の暴露量のマージンがあるとするEFSAと同様の判断を暫定的評価とすることは可能か。

・SEMの暴露量のマージンがあると評価したとして、SEMではなくニトロフラゾンそのものを測定対象に変更するということも考えられるが、検出間度等から付随して起こると想定される問題があるか。

・SEMはニトロフラゾン以外に通常の食品の製造・加工の過程で生じることが分かっている。これらの想定されるSEMの暴露について情報収集、低減措置、代謝・毒性等の知見収集の必要性についてどう考えるか。

【食品健康影響評価について】

今般提出された資料からは、フラゾリドン及びAOZについては遺伝毒性発がん性を否定できず、従前の、ADIを設定することは適当でないとする評価を変更する根拠は認められない。ニトロフラントイン及びAHDについては、**ニトロフラントイン**でマウス、ラットで発がん性を示唆する報告があり、そのメカニズムに関する情報は得られていないことから、現時点においてADIを設定することは適当でないと考えられる。フラルタドン及び**AMOZ**については、評価に足る科学的知見を欠いており、EMEAにおいてそれを根拠としてADI及び

削除: AOMZ

1 MRL を設定していないこと、ニトロフラン類の多くが発がん性を疑われる物質であることを考慮すると、必要
2 科学的知見が得られるまで、ADI を設定することは適当でないと判断するのが適当であると考えられる。
3 ニトロフラゾンについては、従前の、発がん性のメカニズムは明らかでないものの、入手された資料から見る
4 限り、ADI を設定することは適当でないとする評価を変更する根拠は認められない。

5
6 ・SEM の評価については前段に習って記載

7
8 以上のことから、ニトロフラン類(フラゾリドン、ニトロフラントイン、フラルタドン、ニトロフラゾン) にADI を設
9 定することは適当でない。

10
11 暴露量については、当評価結果を踏まえ暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。
12
13
14

1 <参考文献>
2 薬食審；薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会取りまとめ(平成15年6月27日)
3 JECFA1；Nitrofurazone (Nitrofurazone) (WHO Food Additives Series 31)
4 JECFA2；Furazolidone (WHO Food Additives Series 31)
5 EMEA1；COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS；NITROFURANS SUMMARY REPORT
6 EMEA2；COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS；FURAZOLIDONE SUMMARY REPORT
7 EU委員会決定；COMMISSION DECISION of 13 March 2003；amending Decision 2002/657/EC as regards the setting of
8 minimum required performance limits (MRPLs) for certain residues in food of animal origin
9 EFSA2003；Statement of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food
10 updating the advice available on semicarbazide in packaged foods (Adopted on 1 October 2003)
11 EFSA2005；Opinion of the AFC Panel related to Semicarbazide in food
12 NTP；Toxicology and Carcinogenesis Studies of Nitrofurantoin (CAS No. 67-20-9) in F344/N Rats and B6C3F₁ Mice (Feed Studies)
13 Philippe；Quillardet P et al；Organ-targeted mutagenicity of nitrofurantoin in Big Blue transgenic mice.；Mutagenesis. 2006
14 Sep;21(5):305-11
15 IARC；IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (1976)
16 Parodi；Parodi S., et al.；DNA-damaging Activity *in vivo* and Bacterial Mutagenicity of Sixteen Hydrazine Derivatives as
17 Related Quantitatively to their Carcinogenicity；Cancer Res. 1981(41), 1469-1482
18 TNOa；Bacterial reverse mutation test with Semicarbazide；TNO report V 5005/11 (2004)
19 TNOc；Chromosomal aberration test with Semicarbazide in Chinese Hamster Ovary(CHO) cells；TNO report V 5002/09 (2004)
20 TNOb；Gene mutation test at the TK-locus of L5178Y cells with Semicarbazide；TNO report V 5003/09 (2004)
21 Hirakawa；Hirakawa K., et al.；Carcinogenic semicarbazide induces sequence-specific DNA damage through the generation of
22 reactive oxygen species and the derived organic radicals；Mut. Res. 2003(536), 91-101
23 国衛研 a；平成15年度セミカルバジドの調査及び毒性試験；セミカルバジドの *in vivo* ラット肝不定期 DNA 合成試験
24 国衛研 b；平成15年度セミカルバジドの調査及び毒性試験に係る試験等；セミカルバジドのマウスを用いる小核試験
25 国衛研 c；平成15年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等；セミカルバジドのトランスジェニックマウスを用
26 いる遺伝子突然変異試験
27 国衛研 d；塩酸セミカルバジドの動態試験；ラットにおける ¹⁴C-塩酸セミカルバジド単回経口投与時の吸収、分布及び
28 排泄
29 Steffek；Steffek AJ et al；Cleft palate in rodents after maternal treatment with various lathyrogenic agents.；Teratology. 1972
30 Feb;5(1):33-8.
31 SEM 実態調査；平成15年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等の実施について；ベビーフード中のセミカル
32 バジド含有量実態調査
33 Hoenicke；Hoenicke K et al；Formation of semicarbazide (SEM) in food by hypochlorite treatment: is SEM a specific marker for
34 nitrofurazone abuse?；Food Addit Contam. 2004 Jun;21(6):526-37.
35
36
37

書式変更：下付き