

ビスフェノールAの低用量毒性知見

動物種・系統・性・動物数/群	投与方法	投与期間	投与量 (mg/kg体重/日)	結果 〔生殖・発達に関するエンドポイント〕	文献
マウス (DBA/1J 雌 7-9)	強制経口	雌に17日間投与し、交配させ、児を観察。	0.003、 0.03、0.3、3	・影響なし(妊娠動物数、児の性比、児の体重) ・児の免疫系におけるTh1反応の亢進(0.03mg以上の投与群)	Yoshino et al. 2004
マウス(ICR)	飲水(溶媒:1%エタノール)	4週間	0.015、1.5、 30mg/mL	・ConA刺激脾細胞の増殖活性を亢進 ・脾細胞RT-PCRでIL-4が抑制、IFN- γ の亢進	Youn et al. 2002
マウス(Swiss雄 10)	強制経口	雄に30日間投与し、未投与の雌と交配。	0.005、 0.025、0.1	・用量依存性のない体重減少(全投与群) ・精嚢の絶対重量の減少(0.005、0.025mg投与群)、比重量の減少(0.025mg投与群) ・両精巣の絶対重量の減少(0.005 mg)、比重量の増加(0.025mg投与群) ・左精巣の絶対重量の増加(0.1mg投与群) ・用量依存性の精巣の精子の絶対数・相対数の減少[総数/精巣、精子数/mg精巣、精子数/精巣/日、精子数/mg精巣/日]の減少(0.025mg以上の投与群) ・精巣上体の絶対・相対精子数の減少、精巣上体あたりの総精子の減少(全投与群) ・精子/mg精巣上体の減少(0.025mg以上の投与群) ・雌の妊娠率の低下(0.025mg以上の投与群) ・吸収数及び吸収率の増加(全投与群) ・精巣上体、包皮腺及び精嚢の重量影響なし。 ・着床数及び生存胎児数は影響なし。	Al-Hiyasat et al. 2002
マウス(Swiss雌 15)	強制経口	雌に28日間投与し、未投与の雄と交配。	0.005、 0.025、0.1	・体重減少(全投与群、用量依存性なし) ・卵巣の比重量の増加(0.1mg投与群) ・子宮の比重量の増加(0.025mg以上の投与群) ・吸収数及び吸収率の増加(0.025mg以上の投与群) ・生存胎児数は影響なし。 ・受精能に影響なし。	Al-Hiyasat et al. 2004
マウス(CD-1)	強制経口	妊娠6-15日間	640、1,000	・胎児への影響なし(胎児の体重、先天性異常など)	Morrissey et al.1987
マウス(CF-1雌 3)	強制経口	妊娠10-17日。雄の児(各群4-5匹)を試験。	1、10、100	・60日及び120日齢の雄の児の精巣の精細管の異常[細管の管腔の空間の欠如、成熟した細長い精細胞の減少、上皮内の精子形成細胞の異常な分布、細管に無定形な物質の蓄積、細管の中間に濃密細胞の沈着](全投与群) ・胎児体重に影響なし。	Iida et al. 2002

マウス(CF-1)	経口	妊娠11-17日	0.0002、0.002、0.02、0.2	・体重増加 ・精巣の絶対重量の増加(0.002, 0.02mg投与群)※比重量は増加せず。 ・一日精子産生量の増加(0.002,0.02mg投与群)※精巣の重量が増加したので、精子産生の効率は増加せず。 ・前立腺重量に影響なし(0.002, 0.02mg投与群)	Ashby et al. 1999
マウス(CF-1)	経口	妊娠11-17日	0.0002、0.002、0.02、0.2	・精巣重量に影響なし(精巣重量、受胎能、包皮分離、前立腺重量)	Cange et al. 1999b
マウス(雌CF-1)	強制経口	妊娠11-17日 妊娠19日目に帝王切開し、無処置の親に育成	0.0024	・F₁で離乳日体重の減少、膣開口日と性周期発現日数の短縮化(隣に雄胎児が位置しない場合が強い。雄に挟まれた場合は、見られていない。)	Howdeshell et al. 1999
マウス(CD-1 雌 7-9)	経口(マイクロピペット)	妊娠11-17日	0.002、0.02	・精巣の比重量の減少(0.002mg投与群:8,12週齢、0.02mg投与群:12週齢)[最終調査日の16週齢では、影響なし。] ・胎児体重に影響なし。	Kawai et al. 2003
マウス(雌)	混餌	妊娠11-17日	0.002、0.02	・体重減少 ・精巣重量に影響なし ・精子の効率の減少	vom Saal et al. 1998
マウス(CD-1 雌 10-12)	経口(マイクロピペット)	妊娠11-18日にBPAを1回投与し、続けてD-アンフェタミンを投与。	0.01	・影響なし(児の体重、性比)	Laviola et al. 2005
マウス(CD-1 雌 4-6)	経口(マイクロピペット)	妊娠14-18日投与後、雄の児を試験。	0.01	・児の前立腺肥大(高濃度の女性ホルモン摂取時には見られない) ・児のproliferating cell nuclear antigen染色部分の大きさ、数に有意な増大 ・児の尿道の奇形	Timms et al. 2005
マウス(CD-1 雌)	経口(溶媒:10%エタノールを含むコーンオイル)	妊娠16-18日に投与後、雄の児を3, 21,60日に試験。	0.05	・肛門性器官距離の増加(0.05mg投与群) ・前立腺重量増加(0.05mg投与群) ・精巣上体重量減少(0.05mg投与群) ・前立腺のandrogen結合能の増加(0.05mg投与群)	Gupta 2000
マウス	混餌	妊娠期間	0.002、0.02	・前立腺肥大	Nagel et al. 1997
マウス(CD-1 雌)	経口	胎生期(妊娠14-18日)及び妊娠期(妊娠14-18日)、または両期間投与し、育児行動への影響を調査。児についても試験。	0.01	・胎生期のみ暴露:哺乳(減)、巣作り(増)、休憩(増)、身づくろい(増)。 ・妊娠期のみ暴露:哺乳(減)、巣作り(増)、休憩(増)、身づくろい(増)、巣外活動(増)。 ・胎生期及び妊娠期暴露:休憩(増) ・児への影響なし(テーブルの端に身を乗り出させその状態から落下を回避する能力、仰向けからうつぶせる能力)	Palanza et al. 2002
マウス(ICR 雌 6)	飲水	妊娠から授乳期間投与し、雄の児を試験。	5μg/mL(= ~1)、10μg/mL(= ~2)	・雄の児の脳・精巣重量の減少(両投与群) ・胎児体重に影響なし。 ・児の数に影響なし。	Kabuto et al. 2004
マウス(雌)	経口	20~22日齢の雌に6-8日間投与後、卵母細胞を摘出し、検査。	0.02、0.1、0.1	・卵母細胞の減数分裂における誤った集合の出現率増加	Hunt et al. 2003
マウス(NZB/NZW、C57BL/6)	混餌	5週齢に7日間投与	0.0025	・ConA刺激脾細胞分泌IFN-γ量が減少(C57BL/6マウス) ・糸球体腎炎発症遅延(NZB/NZW)	Sawai et al.2003

マウス (C57BL/6 雄 7)	飲水	3週齢の雄に8週間 投与	～0.1、～10	・影響なし(体重、精巢の絶対・比重量)	Takao et al. 2003
マウス(CD- 1、C57 雄 8)	混餌	4週齢の雄に8週間 投与	400 ppm/日	・影響なし(一般的な生殖毒性、精子数の減少)	Takahashi and Oishi 2003
マウス(CD-1 雄雌)	経口	2世代 (F0 6週間目から F2離乳まで?)	0.003、 0.03、0.3、 5、50、600	・肝臓に影響(50mg以上の投与群) ・発達毒性(600mg投与群) ・生殖影響なし	Tyl et al. 2007(draft 2006)
マウス(CD-1)	飲水	3世代試験	～0.0004、 ～0.004	・アクロソームの損傷(全ての世代の～ 0.0004mg投与群、第2及び第3世代の～ 0.004mg投与群)、児の数(大きさ?)の減少 (第1及び第2世代の～0.0004mg投与群) ・精細管の損傷(第1及び第2世代の～ 0.0004mg投与群) ・3世代で体重変化なし。 ・精巣重量に影響なし。	Peknicova et al. 2002
マウス (C57BL/6N、 ICR)	経口		0.002、 0.02、0.2	・影響なし(体重、睪丸・副睪丸・精嚢重量、精 巢上体尾部精子密度、前立腺組織)	Nagao et al. 2002
マウス(雌 11-12)	経口		0.5、1、5、 10、50、 100、200、 300	・broomdeoxyuridineでラベルされた子宮増加 (200mg以上の投与群)	Tinwell et al. 2000

ラット(Wistar 雌)	飲水	交配2週間前、同 居中2週間、妊娠 中21-22日間、哺 乳中22日間の計10 週間	0.01、0.1、 1.0、10ppm	・精巣重量に影響なし ・精子数及び精巢の組織学的検査において、 影響なし	Cagen et al. 1999a
ラット (Sprague- Dawley 雌)	経口(マイ クロピペッ ト、溶媒; ピーナッツ 油)	交配から離乳期ま で投与し、出生後 35-45日の児にお ける新しいことへの チャレンジ能の実 験。また、出生後 70日の児に行動の 実験。	0.04	・新しいことへのチャレンジ能の低下、衝撃行 動能の低下、雄の女性化、覚せい剤への反応 低下(0.04mg投与群)	Adriani et al. 2003
ラット(CD)	強制経口	妊娠6-15日	640、1,000	・胎児への影響なし(胎児の体重、先天性異常 などなし)	Morrissey et al.1987
ラット (Sprague- Dawley 雌: 数不明)	強制経口 (コーンス ターチ)	妊娠6-21日 試験は、発情期ま はた発情間期にと 殺された雌の児 (各群5-22匹)	0.1、50	・児の膣の上皮表面の角質化の減少(0.1mg投 与群のみ) ・児の膣の全体の厚さの減少(0.1mg投与群の み)	Schönfelder et al. 2002
ラット (Sprague- Dawley 雌: 数不明)	強制経口 (コーンス ターチ)	妊娠6-21日 試験は、発情期ま はた発情間期にと 殺された雌の児 (各群6匹)	0.1、50	・子宮上皮の分化及び層形成の形態変化(発 情期にと殺された両投与群) ・子宮上皮の厚さの減少(発情期の50mg投与 群)	Schönfelder et al. 2004

ラット (Sprague-Dawley 雌、 数不明)	強制経口	妊娠6-21日	0.1、50	<雌の児> ・膣口の遅延(0.1mg投与群)、早期の膣口(50mg投与群) ・1日の発情時期の長さは、0.1mg投与群においても、雌の比率では減少したが、総計における発情周期の割合で評価した時は、50mg投与群のみ対照群と相違。 ・周期の割合を評価したときの生殖周期の長さの増加(50mg投与群)。「雌の比率では、両投与群ともに影響なし。」 ・膣の上皮の角質層と幅の減少 <雄の児> ・精巣下垂(testes descent)の平均齢の遅延(0.1mg投与群) ・精子数の増加(0.1mg投与群:出生後70日及び170日)、精子細胞及び一日精子産生量の減少(0.1mg投与群:出生後170日)。 ・精子数、精子細胞及び一日精子産生量の有意な減少(50mg投与群:出生後70日)、精子数の増加(50mg投与群:出生後170日)。	Talsness et al. 2000
ラット (Sprague-Dawley、AP)	経口	妊娠6-21日	0.02、0.2、50	・一日精子産生量の減少(APのみ) ・膣開口時期の遅延(APのみ) ・SDラットに影響なし(出生数、体重、出生時肛門性器間距離、膣開口時期、性周期発動時期、包皮分離時期、次世代個体[雄生後90日、雌生後98日]の肝臓・生殖臓器重量、一日精子産生量の減少)	Tinwell et al. 2002
ラット (Sprague-Dawley 雌 5 または15)	強制経口	妊娠6-21日 雄の児は、290日 齢以上試験。	0.1、50	・精巣あたりのセルトリ細胞数の増加(両投与群)。 「精巣のgあたりでは増加みられず。」 ・9ヶ月から12ヶ月でと殺されたラットの精子の形態学的に影響なし。	Wistuba et al. 2003
ラット (Sprague-Dawley 雌 最少10)	強制経口	妊娠7-17日	0.002、0.02、0.2、2、20	・妊娠期間中の母体重増加(0.2mg投与群)、妊娠21日の母体重増加(2、20mg投与群) ・母動物の子宮重量増加(0.2mg投与群のみ) ・発情周期の異常が一部の母動物にみられた(0.2,2,20mg投与群、それぞれ、2/7匹,1/6匹,2/8匹:p420右)が、統計学的分析なし。 ・分娩後の少なくとも1日、児の体重増加(全投与群:0.2mg投与群の雄の児以外) ・雄の児の右精巣上体の重量増加(20mg投与群) ・前立腺重量、左右の精巣重量及び左の精嚢重量の減少(0.02mg投与群のみ) ・左の精巣重量の増加(2mg投与群)	Kim et al. 2003a
ラット(雌)	飲水	妊娠1日から出産まで	0.00125、0.0125、0.125、1.25	・通常出産で生まれた雄の児のテストステロン濃度減少(1.25投与群)	Tanaka et al. 2006
ラット(Wistar雌)	飲水	妊娠13日から出産まで投与し、6-9週齢の雌雄の児を試験	0.015、0.045	・児の雄でオープンフィールド試験での性差消滅、Forced swimming test による性差消失	Fujimoto et al. 2006

ラット (Sprague-Dawley 雌)	強制経口	妊娠14日から出産まで投与	0.1、1、10、200	・生後3日の雄の児のmRNAのレベル上昇	Wang et al. 2004
ラット (Sprague-Dawley)	経口	妊娠から授乳期間	0.04	・母動物が児にとる母子行動(舐める、身づくろいする行動)の有意な減少	Della et al. 2005
ラット(Wistar 雌8-11)	飲水	妊娠から授乳期間	2.5	・前部および後部BSTのコルチコトロピン産生神経細胞数の性差消失	Funabashi et al. 2004
ラット (Sprague-Dawley 雌17)	経口(マイクロピペット)	妊娠から授乳期間。 児は、出生後2日に雌雄4匹ずつ、同じ投与群の母獣で交	0.04	・影響なし(雌雄の児の体重、出生後7及び21日の児の性比)	Seta et al. 2005
ラット(F344 雌 19-22 8-15?)	強制経口 (溶媒: 0.5%カルボキシルメチルセル ロースナトリウム)	妊娠後から授乳中	7.5、120	・母動物に影響なし(体重、妊娠期間の変化) ・雄の児の副性器形態異常はなし ・精子数の減少(120mg投与群)[再現性なし]	Yoshino et al. 2002
ラット (Sprague-Dawley 雌9)	混餌	妊娠から授乳期間に投与 妊娠8日から出産時	1、10、50	・母獣の体重増加抑制(全投与群) ・児の数及び体重に影響なし ・出生15日後の血漿中T4濃度の上昇、海馬RC3/ニューログラーニン発現上昇(全投与群)	Zoeller et al. 2005
ラット(Wistar)	飲水	妊娠0日から授乳21日まで	1.5	・精巣重量に影響なし ・発情周期に影響なし ・性差(雄の高い運動量、低い忌避行動記憶、大きな青斑)が認められず	Kubo et al. 2001
ラット (Sprague-Dawley 雌)	経口	妊娠0日から生後21日(離乳)まで	0.04	・児の雌の探索行動の増加、雄と接触する頻度減少、他個体への身づくろい行動の減少	Porrini et al. 2005
ラット(F344 雌 8-15)	強制経口 (溶媒: 0.5%カルボキシルメチルセル ロースナトリウム)	妊娠1日から出生後21日まで投与。 出生後4日に、児を8匹ずつ選別。5週齢の雄の児に、発がん物質DMABまたはコーン油を10回皮下注射	0.05、7.5、30、120	・雄の児の体重増加(0.05mg投与プラスDMAB群) ・単独投与では、影響なし。(妊娠数、妊娠期間、平均着床数、新生児数及び性比、雄の児:体重、前立腺重量、精巣重量、精巣上体重量) ・DMAB誘発がんを引き起こさず。	Ichihara et al. 2003
ラット(Wistar 雌 5-6)	飲水(溶媒:0.01%エタノール)	妊娠1日から出生後21日まで投与。 出生後1日に、雌雄5匹ずつ選別。	0.03、0.3	・膣開口日の雌の児の体重増加。 ・雄の児の精巣重量増加(0.3mg投与群) [・雄の児の精子数及び精子運動に影響なし。G-416左] [・膣口齢の影響なし。G-418左] [・発情周期に影響なし。G-420右] ・通常雌雄差がみられるオープンフィールド行動試験の雌雄差なし(0.03mg以上の投与群)。 ・性行為頻度の低下(0.3mg投与群) ・前頭葉前二対の青斑核(LC)容積、LC内のニューロン数の雌雄差逆転現象(0.03mg以上の投与群)	Kubo et al. 2003

ラット (Donryu 雌 12-19)	強制経口	妊娠2日から出生後21日 飲水用の容器及び餌用固形飼料にBPAが検出された。 児は、出生後4または6日に8-10匹ずつ選別	0.006、6	・影響なし(母動物:着床数。 雌の児:体重、子宮重量、形態〔子宮腺の数・子宮細胞増殖〕、発達、排卵、膣口齢、発情周期。)	Yoshida et al. 2004
ラット (F344)	経口	妊娠3日から出生後20日(離乳)投与。雄の児を試験	0.1	・雄の児におけるオープンフィールド試験、自発運動量、受動的学習能力試験には影響なし ・雄の児の学習能力低下 (モノアミン系の障害を示唆)	Negishi et al. 2004
ラット (Crj:CD [SD]TGS種、雌、6)	強制経口	妊娠6日から出生後20日まで投与。出生後7日に児を10匹ずつ選別。	4、40、(400)	・影響なし(体重、精巣重量、肛門性器間距離、胎児生存) ・400mg投与群の4匹(6匹中)が死亡し、また、残りの母獣の1匹のすべての児が死亡したため、この投与群は、分析から除外。 ・40mg投与群で、出生後2日に、ある一匹の母獣から生まれた児のすべてが死亡。	Kobayashi et al. 2002
ラット (Sprague-Dawley 雌 6)	飲水	妊娠6日から授乳中投与し、児(各群12-28匹)を試験。	0.1、1.2	・出生直後から胎児体重増加(0.1mg投与群) ・雌の児の性周期変化(1週間の延長)、黄体ホルモンの減少(1.2mg投与群)	Rubin et al. 2001
ラット (Sprague-Dawley 雌)	強制経口	妊娠6日から授乳20日まで投与し、雄の児を試験。	4、40、400	・児(9週齢)の血漿中テストステロン濃度上昇(全投与群)	Watanabe et al. 2003
ラット	経口	妊娠7日から出生後18日	0.002、0.02、0.2	・影響なし	Howdeshell et al. 2007
ラット (F344/N 雌 8-9)	強制経口	妊娠10日から出生後20日。 児は、可能な限り性比を同等にし一腹あたり8匹に減らした。	4、40、400	・妊娠中及び授乳中の体重増加の有意な減少(40mg以上の投与群) ・雄の児の体重減少(40mg投与群:出生後7,28日、400mg投与群:出生後7,21,28,56日) ・雌の児の体重減少(4mg投与群:出生後7,28日、40mg投与群:出生後7,21,28,56日) ・影響なし(性比・児の数)	Negishi et al. 2003
ラット (Sprague-Dawley 雌)	経口	妊娠11日から出生後20日	3.2、32、320	・母動物に影響なし(体重、離乳時〔生後21日〕の母体臓器重量、出生数)。 ・児に影響なし(出生後1、7日の体重、出生後10日の雌の性的二型核の体積、膣開口日及びその日の体重、性周期開始日、4ヶ月齢の性周期、6ヶ月齢の性行動、6ヶ月齢の雄の生殖器重量)	Kwon S et al. 2000
ラット(雌)	混餌	妊娠15日から出生後10日まで投与し、児の生殖機能を試験	60、600、3,000ppm	・影響なし(下垂体ホルモンのLH、FSH、PRL〔プロラクチン〕)	Masutomi et al.2004
ラット (Sprague-Dawley 雌5-6)	経口	妊娠15日から出産後10日	5、50、250	母動物の体重減少と児の成長遅延(250mg投与群) ・生殖には影響なし(肛門性器間距離、性的成熟前の臓器重量など)	Takagi et al. 2004

ラット (Long-Evans 雌及び雄の児 7-16)	強制経口	妊娠12日から出生後21日雄の児について試験	0.0024	- 雄の児の体重増加〔10%〕 - 出生後90日の精嚢及び精巣比重量の減少 - 出生後90日の精巣間質液のテストステロン(T)レベルの減少	Akingbemi et al. 2004
		21-90日齢	0.0024	・精嚢の絶対・比重量の減少	
	経口	21-35日齢	0.0024、0.01、100、200	・血清LH・Tレベルの減少、下垂体におけるLH β ・m-RNAレベルの減少及びEr β のm-RNA増加(0.0024)	
ラット	強制経口 (子宮増殖アッセイ)	18日齢に3日間投与	40、160、800	・子宮重量の増加(160mg以上の投与群)	Yamasaki et al. 2000
ラット (Alpk: ApfSD〔Wistar由来〕雌 10)	強制経口	20日齢に単回または4日間投与	0.002、0.02、0.2、2、20、200、400、800	・体重および子宮重量の増加(200mg以上の投与群)	Ashby and Odum. 2004
ラット (Sprague-Dawley 雄? 12)	強制経口	23日齢から52(or53)日齢まで	100	- 性的成熟の遅延 - 睾丸への障害による精子形成障害 - 腎臓肥大、水腎症	Tan et al. 2003
ラット (Wistar、SD 雄 8)	混餌	28日齢から8週間投与	210 ppm/日	・影響なし(一般的な生殖毒性、精子数の減少)	Takahashi and Oishi 2003
ラット (F344 雄 数不明)	飲水	4週齢から14週間投与	0.01、0.1、1、110	・影響なし(体重、精巣上体重量、腹側前立腺重量、背側前立腺重量、精嚢重量、精巣重量、生殖臓器の形態、一日精子産生量、精巣上体の精子密度)	Kim et al. 2002b
ラット (Sprague-Dawley 雌雄 7-10)	強制経口	7週齢に28日間投与	40、200、1,000(2週目から600)	- 雌で体重減少、心臓の比重量減少(200mg以上の投与群) - 発情期の長期化(最高用量群)	Yamasaki et al. 2002
ラット (Wistar 雄 6)	強制経口	45日齢から45日間投与	0.0002、0.002、0.02	- 精巣上体及び精巣の絶対・比重量の減少(全投与群) - 前立腺の絶対・比重量の増加(全投与群) - 精巣上体の精子運動の減少(全投与群) - 精子数の減少(0.002mg以上の投与群) - 前立腺肥大、酵素活性の低下、H₂O₂の増加、過酸化脂質量の増加(全投与群)	Chitra et al. 2003a
ラット (Wistar 雄 4)	強制経口 (溶解:オリーブ油)	45日齢から60日間投与	0.0002、0.002、0.02	106日にと殺された動物の精巣上体上皮の変性(全投与群) - 精巣上体の精子数の減少(0.002mg以上の投与群) - 精巣上体の精子運動の減少(全投与群)	Chitra et al. 2003b
ラット (Sprague-Dawley 雄 10)	強制経口 (溶媒: 6.5%エタノールを含むコーンオイル)	91日齢から6日間投与	0.02、2、200	・影響なし(体重、精巣上体重量、腹側前立腺、精嚢重量、精巣重量、一日精子産生量、精子数)	Ashby et al. 2003

ラット (Sprague-Dawley 雄 5)	強制経口 (エタノール・コーン油)	91日齢から6日間投与	0.02、0.2、2、20、200	・一日精子産生量の減少(全ての投与群)	Sakaue et al. 2001
ラット (Sprague-Dawley)	経口	2世代試験 F ₀ の交配前(雄:交配10週前、雌:交配5週前)からF ₂ の離乳まで投与	0.0002、0.002、0.02、0.2	・影響なし(体重、生殖臓器重量、前立腺の形態学的影響、精巣上体尾部の精子数、発情周期)	Ema et al. 2001
ラット (Sprague-Dawley)	経口	3世代試験	0.001、0.02、0.3、5、50、500	・精巣重量の減少(0.001mg投与群:F3世代、0.02,50mg投与群:F2,F3世代、500mg投与群:F1-F3世代)[用量相関性なし] ・前立腺の形態学的影響 ・精子産生に影響なし ・雌の児の肛門性器間距離(AGD)の増加(F2世代)[F3世代には見られず、世代を超えが一貫してないことから、BPA投与との関連せずと ・腔開口の遅延(高用量50mg以上の投与群)	Tyl et al. 2002
ラット(Wistar 3-4週齢の雄 13)	強制経口	睾丸を摘出した4週齢の雄に1日1回の7日間投与	3、50、200、500	・前立腺の上皮の高さの増加(3、50mg投与群)または減少(500mg投与群)、精囊上皮の高さの増加(3、50mg投与群):去勢した対照動物との比較 ・前立腺(3、50、200mg投与群)及び精囊(3、50mg投与群)の腺エリアの増加	Nishino et al. 2006
ラット (Sprague-Dawley 雄 10)	経口	去勢した5-6週齢に、7日間投与	10、50、100、250、500、1000	・アンドロジェン及び抗アンドロジェン作用ともに影響なし(男性ホルモンを使用したポジコンでは、陰茎龟头、精囊および腹側前立腺等の重量増加。抗アンドロジェン作用を有する陽性コントロールflutamide投与では、テストステロン誘発の各臓器重量増加を抑制)	Kim et al. 2002a
ラット (DA/Han, Sprague-Dawley, Wistar 雌 5-7)	強制経口	内因性ホルモンの減少した14日後の成獣に3日間投与	5、50、200	・ゲニステイン及びp-tert-octylphenol(オクチルフェノール)と比較し、最も弱い ・子宮重量の増加(200mg投与群:DA/Han、SDラット)	Diel et al. 2004
ラット(雌)	飲水	卵巣摘出した雌に3日間投与	0.1、1.2、12	・子宮に影響なし	Rubin et al. 2001
ラット(Wistar 雌)	経口	卵巣を切除した雌に7日間投与。	11、78、128、250	・子宮重量増加(11mg以上の投与群) ・下垂体腺の重量増加、血清プロラクチン濃度の上昇(128mg以上の投与群)	Goloubkova et al. 2000
ラット (Sprague-Dawley 雌 12)	混餌	3ヶ月齢の卵巣摘出3ヶ月後すぐに投与 食物は、大豆フリー(soy free)	0.037、0.37	・子宮内膜の厚さの減少(0.037mg投与群) ・子宮上皮の厚さの増加(0.37mg投与群) ・子宮筋層の厚さの減少(0.37mg投与群)	Seidlová-Wuttke et al. 2004
ラット (Sprague-Dawley 雌 12)	混餌	卵巣摘出後すぐに投与 食物は、大豆フリー	0.033、0.33	・影響なし(体重)	Seidlová-Wuttke et al. 2005
ラット	経口		60、200、375、600、1,000	・子宮重量の増加(375mg)	Kanno et al. 2003

ラット(雌 9-10)	経口		0.002、0.02、0.2、1、10、100、200、800	・子宮重量増加(200mg以上の投与群)	Mathews et al. 2001
ラット	経口？ 皮下？		0.5	・セルトリル細胞ユニットあたりの精母細胞核体積の増加 ・精巣重量の増加 ・交配及び繁殖には影響なし	Atanassova et al. 2000

アレチネズミ	経口	ペア形成後3週間	0.002、0.02	・雌と雄の社交行動の増加 ・自由探索行動の低下	Razzori et al. 2005
--------	----	----------	------------	----------------------------	---------------------

●厚生労働科学研究

ラット(SD 雌 10)	強制経口	妊娠6日から出生後20日	0.005、0.05、40、400 mg/kg 体重/日	7ヶ月齢時における性周期の異常(0.005mg/kg以上)	平成16年度厚生労働科学研究 主任研究者：小野 宏 分担研究者：菅野 純
ラット(SD 雌 10)	強制経口	妊娠6日から出生後20日	0.5、5、50 μ g/kg体重/日	6ヶ月齢時における性周期の有意な異常なし	平成17年度厚生労働科学研究 主任研究者：小野 宏 分担研究者：菅野 純
ラット(SD 雌 10)	強制経口	妊娠6日から出生後20日	0.5、5、50 μ g/kg体重/日	性周期の異常(0.5 μ g/kg投与群：9ヶ月齢・10ヶ月齢・12ヶ月齢、5 μ g/kg投与群：6ヶ月齢・12ヶ月齢、50 μ g/kg投与群：7ヶ月齢・8ヶ月齢・10ヶ月齢・12ヶ月齢)	平成18年度厚生労働科学研究 (試験は平成17年度試験を検討) 主任研究者：小野 宏 分担研究者：菅野 純
マウス(C57BL /6J 雌 17-18)	混餌投与	妊娠6日から出生後22日 12週齢の児を検査	0.33、3.3、33 ppm (0.05～5 mg/kg体重/日相当)	児の認知機能(学習習得・短期記憶保持)に影響なし	平成18年度厚生労働科学研究 主任研究者：小野 宏 分担研究者：宮川 宗之
ラット(SD 雌 12)	混餌投与	妊娠6日から出生後22日 8週齢の児を検査	0.33、3.3、33 ppm (0.025～2.5 mg/kg体重/日相当)	児のDRO反応率の上昇、訓練進行の遅延(0.025mg/kg以上) ※DRO反応：10秒間無反応で待機することで報酬が与えられる他反応分化強化	平成19年度厚生労働科学研究 主任研究者：小野 宏 分担研究者：宮川 宗之