

(案)

動物用医薬品・飼料添加物評価書

オキシテトラサイクリン、クロルテトラ
サイクリン及びテトラサイクリン

2012年2月

食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会

目次

	頁
○審議の経緯	5
○食品安全委員会委員名簿	5
○食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会専門委員名簿	5
○要約	6
I. 評価対象動物用医薬品及び飼料添加物の概要	7
1. 用途	7
2. 有効成分の一般名	7
3. 化学名	7
4. 分子式	7
5. 分子量	7
6. 構造式	8
7. 使用目的及び使用状況等	8
II. 安全性に係る知見の概要	9
1. 薬物動態試験（吸収、分布、代謝、排泄）	9
(1) 薬物動態試験（マウス、OTC）	9
(2) 薬物動態試験（マウス、CTC）	9
(3) 薬物動態試験（ラット、TC）	9
(4) 薬物動態試験（ラット、CTC）	10
(5) 薬物動態試験（ラット及びモルモット、CTC）	12
(6) 薬物動態試験（ラット及びイヌ、TC）	12
(7) 薬物動態試験（ラット及びイヌ、CTC）	12
(8) 薬物動態試験（ウサギ、OTC）	12
(9) 薬物動態試験（ウサギ、CTC）	13
(10) 薬物動態試験（イヌ、OTC）	13
(11) 薬物動態試験（イヌ、TC）	13
(12) 薬物動態試験（イヌ、CTC）	14
(13) 薬物動態試験（牛、OTC）	14
(14) 薬物動態試験（牛、CTC）	16
(15) 薬物動態試験（豚、OTC）	16
(16) 薬物動態試験（豚、TC）	17
(17) 薬物動態試験（豚、CTC）	18
(18) 薬物動態試験（鶏、OTC）	18
(19) 薬物動態試験（鶏、CTC）	18
(20) 薬物動態試験（魚介類、OTC）	19
(21) 薬物動態試験（魚類、CTC）	21
(22) 骨と歯に対する影響	21

(23) ヒトにおける知見	22
2. 残留試験	24
(1) 残留試験 (牛、OTC)	24
(2) 残留試験 (乳汁、OTC)	27
(3) 残留試験 (牛、TC)	27
(4) 残留試験 (牛、CTC)	28
(5) 残留試験 (乳汁、CTC)	30
(6) 残留試験 (豚、OTC)	31
(7) 残留試験 (豚、TC)	34
(8) 残留試験 (豚、CTC)	34
(9) 残留試験 (羊、CTC)	35
(10) 残留試験 (鶏、OTC)	35
(11) 残留試験 (卵、OTC)	37
(12) 残留試験 (鶏、TC)	37
(13) 残留試験 (鶏、CTC)	37
(14) 残留試験 (卵、CTC)	40
(15) 残留試験 (七面鳥、CTC)	42
(16) 残留試験 (魚介類、OTC、CTC)	42
3. 遺伝毒性試験	46
4. 急性毒性試験	49
(1) マウス及びラットにおける急性毒性試験	49
5. 亜急性毒性試験	51
(1) 90 日間亜急性毒性試験 (マウス、OTC)	51
(2) 13 週間亜急性毒性試験 (マウス、OTC)	51
(3) 6 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)	52
(4) 12 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)	52
(5) 14 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)	52
(6) 6 週間亜急性毒性試験 (マウス、TC)	52
(7) 13 週間亜急性毒性試験 (マウス、TC)	53
(8) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット、OTC)	53
(9) 13 週間亜急性毒性試験 (ラット、OTC)	54
(10) 30 日間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)	54
(11) 12 週間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)	54
(12) 3 ヶ月間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)	55
(13) 14 週間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)	55
(14) 6 ヶ月間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)	55
(15) 13 週間亜急性毒性試験 (ラット、TC)	55
(16) 31 日間亜急性毒性試験 (イヌ、CTC)	56
(17) 9~15 週間亜急性毒性試験 (イヌ、CTC)	56
(18) 98 又は 121 日間亜急性毒性試験 (イヌ、CTC)	56

(19) 3ヶ月間亜急性毒性試験 (イヌ、TC)	56
(20) 98日間亜急性毒性試験 (イヌ、TC)	56
(21) 12週間亜急性毒性試験 (マウス、ラット及びイヌ、CTC)	57
6. 慢性毒性及び発がん性試験	58
(1) 24ヶ月間慢性/発がん性併合毒性試験 (マウス、OTC)	58
(2) 103週間慢性毒性/発がん性併合試験 (マウス、OTC)	58
(3) 12ヶ月間発がん性試験 (マウス、CTC)	59
(4) 103週間慢性毒性/発がん性併合試験 (マウス、TC)	59
(5) 60週間発がん性試験 (ラット、OTC)	59
(6) 24ヶ月間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、OTC①)	60
(7) 24ヶ月間慢性/発がん性併合毒性試験 (ラット、OTC②)	60
(8) 103週間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、OTC)	61
(9) 52週間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC)	61
(10) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC)	62
(11) 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC、投与期間未記載)	62
(12) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、TC)	63
(13) 12ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、OTC①)	63
(14) 12ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、OTC②)	64
(15) 24ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、OTC)	64
(16) 54週間慢性毒性試験 (イヌ、CTC)	64
(17) 24ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、TC)	65
7. 生殖発生毒性試験	65
(1) 生殖発生毒性試験 (マウス、OTC①)	65
(2) 生殖毒性試験 (マウス、CTC)	66
(3) 2世代生殖毒性試験 (ラット、OTC①)	67
(4) 2世代生殖毒性試験 (ラット、OTC②)	67
(5) 発生毒性試験 (ラット、OTC①)	68
(6) 発生毒性試験 (ラット、OTC②)	68
(7) 発生毒性試験 (ラット、OTC③)	68
(8) 発生毒性試験 (ラット、OTC④)	68
(9) 2世代生殖毒性試験 (ラット、CTC)	69
(10) 生殖毒性試験 (ラット、CTC①)	69
(11) 生殖毒性試験 (ラット、CTC②)	69
(12) 生殖発生毒性試験 (ラット、TC)	70
(13) 発生毒性試験 (ラット、TC)	70
(14) 発生毒性試験 (ラット、TC、投与経路未記載)	70
8. その他の試験	71
(1) 眼刺激性及び感作性試験	71
(2) 皮膚刺激性及び感作性試験	71
(3) 心臓血管系への影響	71

(4) 肝毒性に関する試験	72
(5) 腎毒性に関する試験	72
(6) その他の薬理試験	72
9. ヒトにおける知見	72
(1) 投与後の影響	73
(2) 過敏性	74
10. 微生物学的影響に関する試験	74
(1) <i>in vitro</i> 試験	74
(2) <i>in vivo</i> 試験	79
(3) ヒトの知見	81
III. 食品健康影響評価	83
1. 国際機関における評価	83
(1) JECFA における評価	83
(2) EMEA における評価	84
2. 毒性学的 ADI について	84
3. 微生物学的 ADI について	85
4. ADI の設定について	85
表 30 JECFA における各種試験の無毒性量等の比較	87
▪ 別紙：検査値等略称	92
▪ 参照	93

1 <審議の経緯>

- 2005年 11月 29日 暫定基準告示（参照1）
2011年 11月 15日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について
要請（厚生労働省発食安第1115第13号）
2012年 1月 10日 関係資料の接受
2012年 1月 12日 第414回食品安全委員会（要請事項説明）
2012年 1月 24日 第52回肥料・飼料等専門調査会
2012年 2月 21日 第53回肥料・飼料等専門調査会

2

3 <食品安全委員会委員名簿>

（2011年1月7日から）

小泉 直子（委員長）
熊谷 進（委員長代理*）
長尾 拓
野村 一正
畑江 敬子
廣瀬 雅雄
村田 容常

*：2011年1月13日から

4

5 <食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会専門委員名簿>

（2011年10月1日から）

唐木 英明（座長）*
津田 修治（座長代理）*
青木 宙 舘田 一博
秋葉 征夫 戸塚 恭一
池 康嘉 細川 正清
今井 俊夫 宮島 敦子
江馬 眞 山中 典子
桑形 麻樹子 吉田 敏則
下位 香代子
高橋 和彦

*：2011年11月2日から

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

要 約

テトラサイクリン系の抗生物質である「オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン」について、各種評価書等（JECFA レポート、EMEA レポート等）を用いて食品健康影響評価を実施した。

[以下、調査会終了後作成。]

DRAFT

1 I. 評価対象動物用医薬品及び飼料添加物の概要

2 1. 用途

3 抗菌剤

4

5 2. 有効成分の一般名

6 和名：オキシテトラサイクリン

7 英名：Oxytetracycline

8

9 和名：クロルテトラサイクリン

10 英名：Chlortetracycline

11

12 和名：テトラサイクリン

13 英名：Tetracycline

14

15 3. 化学名

16 オキシテトラサイクリン：

17 CAS(79-57-2)

18 英名：[4S-(4 α ,4 α ,5 α ,5 α ,6 β ,12 α)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,-
19 5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-
20 methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenicarboxamide

21

22 クロルテトラサイクリン：

23 CAS(57-62-5)

24 英名：[4S-(4 α ,4 α ,5 α ,6 β ,12 α)]-7-Chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,-
25 5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,-
26 11-dioxo-2-naphthacenicarboxamide

27

28 テトラサイクリン：

29 CAS(60-54-8)

30 英名：[4S-(4 α ,4 α ,5 α ,6 β ,12 α)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6-
31 11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-
32 dioxo-2-naphthacenicarboxamide

33

[THE MERCK INDEX]

34 4. 分子式

35 オキシテトラサイクリン： $C_{22}H_{24}N_2O_9$

36 クロルテトラサイクリン： $C_{22}H_{23}ClN_2O_8$

37 テトラサイクリン： $C_{22}H_{24}N_2O_8$

38

[THE MERCK INDEX]

39 5. 分子量

40 オキシテトラサイクリン：460.43

1 クロルテトラサイクリン：478.89

2 テトラサイクリン：444.43



3

[THE MERCK INDEX]

4 6. 構造式


5 オキシテトラサイクリン：

クロルテトラサイクリン：



6

7 テトラサイクリン：



8

[THE MERCK INDEX]

9 7. 使用目的及び使用状況等

10 オキシテトラサイクリン（以下「OTC」という。）、クロルテトラサイクリン（以下「CTC」という。）及びテトラサイクリン（以下「TC」という。）は、
11 テトラサイクリン系の広域スペクトラム抗生物質である。OTC 及び CTC は
12 それぞれ *Streptomyces rimosus* 及び *Streptomyces aureofaciens* によって
13 産生される。TC は CTC の脱クロル体であり、CTC から半合成的に作られる。
14 OTC、CTC 及び TC は世界各国でヒト用及び動物用医薬品として長い使用経
15 験を有する。（参照 2、3、4）[\[薬理書下 p1573\]](#)、[\[CTC 抄録 1\]](#)、[\[FAS36,41\]](#)

16
17 日本では、動物用医薬品としては、牛、豚、鶏、魚類等を対象に塩酸 OTC
18 （以下「OTC-HCl」という。）、塩酸 CTC（以下「CTC-HCl」という。）等の
19 飼料添加剤、注射剤等が承認されており、飼料添加物としてはアルキルトリ
20 メチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン（以下「OTC-Q」と
21 いう。）及び CTC が指定されている。また、ヒト用医薬品として、OTC-HCl
22 及び TC 塩酸塩（以下「TC-HCl」という。）の外用剤、経口投与剤等が使用
23 されている。

24 なお、ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準値¹が設定されている。

25

¹ 平成 17 年厚生労働省告示第 499 号によって新たに定められた残留基準値

1 II. 安全性に係る知見の概要

2 本評価書では、JECFA レポート、EMEA レポート及び飼料添加物の指定時
3 の試験成績等の抄録等をもとに、OTC、CTC 及び TC の毒性等に関する主な知
4 見を整理した。

5

6 1. 薬物動態試験（吸収、分布、代謝、排泄）

7 (1) 薬物動態試験（マウス、OTC）

8 マウスを用いた ¹⁴C-OTC-HCl の単回経口投与（47.6 mg/kg 体重）試験が
9 実施された。投与 2 時間後に投与量の 72 %が大腸で見られ、吸収されたのは
10 わずか 5 %であった。その大部分（3.6 %）は尿中に排泄された。肝臓では、
11 投与 1 及び 2 時間後に投与量のそれぞれ 1.9 及び 1.1 %が回収された。（参照
12 5） [FAS27 2.1.1.1]

13

14 (2) 薬物動態試験（マウス、CTC）

15 マウスを用いた CTC の経口投与（100 mg/kg 体重）試験が実施された。血
16 中及び組織中濃度は投与 3 時間後に最高値を示し、肝臓及び肺で高値（い
17 ずれも 120 mg/kg）であった。血中では、投与 16 時間後以降検出されず、投与
18 24 時間後には、肝臓で 7.5 mg/kg（最高値の 1/16）を示した他はいずれの組
19 織中濃度も 1 mg/kg 以下であった。（参照 3、6） [CTC 申請時抄録 p10]、[CTC 再
20 評価申請時概要 p24]

21

22 (3) 薬物動態試験（ラット、TC）

23 ① 経口投与試験

24 絶食ラットを用いた TC-HCl の単回強制経口投与（TC として 75 mg/kg 体
25 重）試験が実施され、投与 1、2、3、4 及び 6 時間後に血漿及び組織中濃度
26 を測定した。

27 血漿中濃度は、投与 2 時間後に C_{max}（3.6 mg/L）に達し、投与 6 時間後
28 には 0.5 mg/L に低下した。組織中濃度は、投与 2 時間後に肝臓及び腎臓で最
29 高値を示した（表 1）。（参照 4、7） [FAS36 2.1.1.1]、[FAO TC p228]

30

31 表 1 ラットにおける TC の単回経口投与後の組織中濃度（mg/kg 又は/L）

組織	投与後時間 (h)				
	1	2	3	4	6
血漿	3.1	3.6	2.1	2.2	0.5
肺	3.7	4.0	1.7	1.5	1.2
脳	0.12	0.13	0.02	0.01	0.01
肝臓	8.5	10.1	4.0	3.0	2.5
腎臓	11.0	12.8	8.7	4.5	2.6

32

② 静脈内投与試験

ラット（4匹：2匹は胆管を結紮）を用いた³H-TCの単回静脈内投与（15 mg/kg 体重）試験が実施され、投与24時間後に、尿、胆汁及び腸管の放射活性を測定した。

非結紮群では、総放射活性の85及び92%が回収され、尿中に67及び72%が、糞中に18及び20%が排泄された。結紮群では、総放射活性の70及び85%が回収され、尿中からは68及び88%が、胆汁中からは30及び9%が回収された。ごくわずか（平均2.5%）のみが腸管内から回収された。

尿管を結紮して同様の投与試験を実施したところ、糞中へのTCの排泄増加は観察されなかった。（参照4、7）[FAS36 2.1.1.1](#)、[FAO TC p231~232](#)]

ラット（SD系、雄）を用いた³H-7-TC-HCl（純度98%）の静脈内投与（10 mg/kg 体重）試験が実施された。投与は、5分以上かけて、大腿静脈内に行われた。胆汁中に排泄されたTC-HClの消化管内吸収を*in situ*腸管標本を用いて評価した結果、胆汁排泄されたTCの約73%が腸管腔内で再吸収され、腸肝循環が示唆された。（参照4、7）[\[FAS36 2.1.1.1、FAO TC p232\]](#)

（4）薬物動態試験（ラット、CTC）

① 経口投与試験

ラットを用いたCTCの経口投与（25 mg/匹）試験が実施された。血中濃度は投与1時間後にC_{max}（1.8 mg/L）に達し、その後徐々に消失した。T_{1/2}は6~8時間であった。（参照6）[\[CTC再評価申請時概要 p24\]](#)

ラットを用いたCTCの経口投与（100 mg/kg 体重）試験が実施された。血中濃度は投与0.5時間後にC_{max}（1.10 mg/L）に達し、投与12時間後にはその6.4%に減少した。組織（筋肉、肺、肝臓、腎臓及び脾臓）中濃度は、投与0.5~2時間後に最高値に達し、投与12時間後においても検出可能であった。（参照3、6）[\[CTC申請時抄録 p10\]](#)、[\[CTC再評価申請時概要 p24\]](#)

ラット（6匹/群）を用いたCTCの単回経口投与（75 mg/kg 体重）試験が実施された。血漿中濃度は、投与1時間後に2.1 mg/Lに達し、投与6時間後には0.8 mg/Lに低下した。投与1、2、3、4及び6時間後の組織中濃度は、どの時点においても肝臓及び腎臓で最も高かった。肝臓では投与2時間後に、腎臓では投与1時間後に最高値に達した（表2）。（参照4、8）[FAS36 2.1.1.2](#)、[FAOCTCp253、262\]](#)

1 表2 ラットにおける CTC を単回経口投与後の組織中濃度 (mg/kg ~~又は/L~~)

	投与後時間 (h)				
	1	2	3	4	6
血漿	2.1	1.1	0.8	0.7	0.8
肺	5.2	3.8	2.3	2.2	2.1
脳	0.11	0.09	0.02	0.03	0.03
肝臓	16.2	21.4	15.2	10.0	5.3
腎臓	21.8	20.1	14.8	11.2	8.7

2
3 ラットを用いた ¹⁴C-CTC の経口投与 (60 mg/kg 体重) 試験が実施され、
4 投与後 24、48 及び 72 時間の尿及び糞中の放射活性を測定した。放射活性は
5 主に糞中にみられた。投与後 72 時間に 92 %が回収され、その大部分は投与
6 後 24 時間に排泄された。尿中からは約 5 %の放射活性が回収された。(参照
7 4) [FAS36 2.1.1.2]

8
9 ラットを用いた ¹⁴C-CTC の経口投与 (用量未記載) 試験が実施された。糞
10 及び尿における回収率は、放射化学的には 97.0 %であったが、バイオアッセ
11 イでは 70.3 %であった。投与後 24 時間の糞及び尿をペーパークロマトグラ
12 フィで調べた結果、CTC 及び不活化された 4-epi-CTC が大部分 (90 %) を
13 占め TC 及び未同定物はわずかであった。(参照 3、6) [CTC 申請時抄録 p10、
14 p160-1[CTC 再評価申請時概要 p24-25]

15
16 ② 静脈内投与試験

17 ラット (2 匹は胆管を結紮) を用いた ¹⁴C-CTC の単回静脈内投与 (15 mg/kg
18 体重) 試験が実施され、投与 24 時間後に、尿、胆汁及び腸管の放射活性を測
19 定した。

20 非結紮群では、総放射活性の 75 及び 79 %が回収され、尿中に 35 及び 37 %
21 が、糞中に 44 及び 38 %が排泄された。結紮群では、総放射活性の 47 及び
22 63 %が回収され、尿中からは 66 及び 43 %が、胆汁中からは 22 及び 51 %が
23 回収された。ごくわずか (平均 5 %) のみが腸管内から回収された。(参照 4)
24 [FAS36 2.1.1.2]

25
26 ③ 腹腔内投与試験

27 ラットを用いた ¹⁴C-CTC の腹腔内投与 (30 mg/kg 体重) 試験が実施され
28 た。投与後 24 時間に放射活性の 33 %が尿中に、5 %が糞中に排泄された。投
29 与後 24~72 時間に 7 %が尿中に、40 %が糞中に排泄された。(参照 4) [FAS36
30 2.1.1.2]

31

1 (5) 薬物動態試験 (ラット及びモルモット、CTC)

2 ラット(雌)及びモルモット(雌)を用いた CTC の経口投与 (6~800 mg/kg
3 体重) 試験が実施された。血清中濃度に用量相関性の増加はみられなかった。
4 モルモットに同用量を 9 日間投与したところ、血清中濃度は単回投与より高
5 かった。血清中 CTC 濃度は、クエン酸等の補助剤とともに投与することによ
6 り上昇した。この影響は 200 mg/kg 体重/日の用量まで観察され、投与 1 時間
7 後まで顕著であり、少なくとも 8 時間持続した。(参照 4) [FAS36 2.1.1.2]

8
9 (6) 薬物動態試験 (ラット及びイヌ、TC)

10 ① 静脈内投与試験

11 ラット (2 匹) 及びイヌ (1 匹) を用いた ³H-TC の単回静脈内投与 (それ
12 ぞれ 15 及び 4 mg/kg 体重) 試験が実施された。ラットでは、投与後 72 時間
13 以内に尿及び糞中からそれぞれ総放射活性の 69.2 及び 19.5 %が回収された。
14 イヌでは、投与後 168 時間以内に尿及び糞中からそれぞれ総放射活性の 71
15 及び 9 %が回収された。(参照 4、7) [FAS36 2.1.1.1、FAO TC p137]

16
17 ② 腹腔内及び経口投与試験

18 ラットを用いた ¹⁴C-TC の単回腹腔内投与 (60 mg/kg 体重) 試験及びイヌ
19 を用いた ³H-TC の単回経口投与 (25 mg/kg 体重) 試験が実施された。ラッ
20 トでは投与放射活性の約 90 %が尿及び糞中に排泄された。残りの放射活性の
21 大部分はキレート化された TC として被験動物の骨と結合した。ラットでは、
22 このキレート体を除いて TC の化学的変化はみられなかった。イヌの尿中では
23 TC の未変化体のみがみられた。(参照 4) [FAS36 2.1.4.1]

24
25 (7) 薬物動態試験 (ラット及びイヌ、CTC)

26 ラット (Wistar 系、雄 6 匹/群) 及びイヌ (ビーグル種、雄 2 匹/群) を用
27 いた ¹⁴C-CTC の経口 (60 mg/kg 体重)、腹腔内 (30 mg/kg 体重) 及び静脈
28 内投与 (15~60 mg/kg 体重) 試験が実施された。

29 投与及び排泄経路に関わらず、抗菌活性の回収率は放射活性の回収率より
30 有意に低かった。推定される主要代謝物は 4-epi-CTC で、ラットの尿中放射
31 活性の 23~35 %、イヌの尿中放射活性の 31~60 %を占めた。この代謝物は、
32 バイオアッセイで活性が全く認められなかった。この代謝物は真の代謝物で
33 あるか、アルカリ処理による分解物であるのかは明らかではなかった。一部
34 の被験動物の尿及び糞中に少量 (5~10 %) の iso-CTC がみられた。(参照 4)
35 [FAS36 2.1.4.2]

36
37 (8) 薬物動態試験 (ウサギ、OTC)

38 ① 経口投与試験

39 ウサギ (6 匹) を用いた OTC-HCl の単回強制経口投与 (500 mg/kg 体重)

1 試験が実施され、投与 4 時間後の体内分布について検討した。被験物質は体
2 内に広く分布し、分布濃度は消化管内容物>肺>胆汁>脾臓>尿及び皮膚>
3 心臓及び脳>腎臓>肝臓>血液であった。(参照 9) [農薬抄録 p114]

4 5 (9) 薬物動態試験 (ウサギ、CTC)

6 ウサギ (カリフォルニア種、雌雄、10 匹) を用いた工業用 CTC 又は
7 CTC-HCl の単回経口投与 (20 mg/kg 体重) 試験が実施された。平均血清中
8 濃度は、投与 3 時間後に 2.3 mg/L で、投与 12 時間後までに 0.09 mg/L に、
9 投与 24 時間後までに 0.08 mg/L に低下した。組織中濃度は、投与 24 時間後
10 の肝臓で最高値 (1.53 mg/kg) を示し、高い順に腎臓、肺及び心臓と続いた。
11 筋肉からは検出されなかった (検出限界: 37.5 µg/kg)。(参照 4) [FAS36 2.1.1.2]

12 13 (10) 薬物動態試験 (イヌ、OTC)

14 イヌを用いた OTC の単回経口投与 (10、50 及び 100 mg/kg 体重) 試験及
15 び 2 回経口投与 (10 及び 50 mg/kg 体重/回、12 時間間隔で投与) 試験が実
16 施され、血漿中 OTC 濃度を蛍光検出法により測定した。

17 単回経口投与では、血漿中濃度は投与 2 時間後に C_{max} に達し、10、50 及
18 び 100 mg/kg 体重の投与量でそれぞれ 0.88、1.01 及び 2.51 mg/L であった。
19 これらの濃度は 12 時間後にはその約 60 % に低下した。2 回投与では、2 回目
20 の投与後にやや高い濃度に達した。(参照 5) [FAS27 2.1.1.2]

21 22 (11) 薬物動態試験 (イヌ、TC)

23 ① 経口投与試験

24 イヌ (ビーグル種) を用いた TC の単回経口投与 (25 mg/kg 体重) 試験が
25 実施された。血清中濃度は投与 2 時間後の 3 mg/L から投与 24 時間後には 0.27
26 mg/L に低下した。尿中には投与後 72 時間以内に投与量の 10 % が排泄された。
27 (参照 4) [FAS36 2.1.1.1]

28 29 ② 静脈内投与試験

30 イヌ (ビーグル種、2 匹) を用いた ^3H -TC-HCl の静脈内投与 (TC として
31 10 mg/kg 体重) 試験が実施され、投与 4 時間後の各組織中の放射活性により
32 TC の体内分布について調べた。

33 最も高い放射活性がみられた組織は肝臓及び腎臓で、それぞれ平均 15 及び
34 43 mg/kg であった。回収された TC の活性の大部分は尿、消化管内容及び胆
35 汁中にみられた。皮下脂肪に放射活性は測定されなかった。(参照 4) [FAS36
36 2.1.1.1]

37
38 イヌを用いた TC の単回静脈内投与 (10 mg/kg 体重) 試験が実施された。
39 バイオアッセイ (検出限界: 0.05~0.1 mg/L) により測定した平均血清中濃

1 度は、投与 24 及び 48 時間後にそれぞれ 10.6 及び 0.14 mg/L であった。投与
2 後 72 時間までに投与量の 58 %が尿中に排泄された。(参照 4) [FAS36 2.1.1.1]

3 4 (1 2) 薬物動態試験 (イヌ、CTC)

5 ① 経口投与試験

6 イヌ (ビーグル種、4 匹) を用いた CTC の単回経口投与 (25 mg/kg 体重)
7 試験が実施された。血清中濃度は、投与 2 時間後に C_{max} (0.40~1.9 mg/L)
8 に達し、投与 24 時間後には平均 0.21 mg/mL に低下した。(参照 4) [FAS36
9 2.1.1.2]

10 11 ② 静脈内投与試験

12 イヌ (ビーグル種) を用いた CTC の単回静脈内投与 (10 mg/kg 体重) 試
13 験が実施された。血清中濃度は、投与 1 時間後に 6.6 mg/L を示し、投与 8、
14 24 及び 48 時間後にはそれぞれ 2.4、0.29 及び 0.06 mg/L に低下した。(参照
15 4) [FAS36 2.1.1.2]

16
17 イヌ (ビーグル種、雌 2 匹) を用いた ^{14}C -CTC の単回静脈内投与 (10 mg/kg
18 体重) 試験が実施された。投与 4 時間後では組織中の放射活性は肝臓 (30
19 mg/kg) >腎臓 (25 mg/kg) >回腸 (15 mg/kg) >十二指腸 (12 mg/kg) >
20 心臓 (10 mg/kg) の順 であに高かった。回収された放射活性の大部分は、尿、
21 腸内容物及び胆汁中にみられた。皮下脂肪を除いて、すべての組織及び体液
22 中に放射活性が認められた。(参照 4) [FAS36 2.1.1.2]

23 24 (1 3) 薬物動態試験 (牛、OTC)

25 ① 静脈内投与試験

26 週齢及び泌乳状態の異なる牛を用いた OTC の静脈内投与試験が実施され
27 た。子牛 (3、12 及び 14 週齢) に OTC をそれぞれ 7.54、6.88 及び 17.00 mg/kg
28 体重を、乳牛 (泌乳及び乾乳) にそれぞれ 3.32 及び 7.94 mg/kg 体重を静脈
29 内投与し、採血を行いバイオアッセイにより OTC 濃度を測定した (検出限界
30 不明)。3 週齢の子牛の V_d は 2.48 L/kg であり、乳牛の 2~3 倍高かった。3
31 及び 12 週齢の子牛の $T_{1/2}$ はそれぞれ 13.5 ± 3.6 及び 8.8 ± 0.52 時間であった。
32 投与量及び泌乳状態は、乳牛において V_d 及び $T_{1/2}$ に影響を及ぼさなかった。
33 (参照 5) [FAS27 2.1.1.4]

34
35 子牛 (1~42 日齢及び 250 日齢) を用いた OTC の静脈内投与 (10 mg/kg
36 体重/回) 試験が実施された。投与は、試験期間の第 1、2、4 及び 6 週の 2 日
37 目に実施し、採血して OTC 濃度を測定した (検出限界不明)。OTC の消失は、
38 新生子牛の方が有意に遅かった。 $T_{1/2}$ は、新生子牛、42 日齢子牛及び 250 日
39 齢子牛で、 11.2 ± 1.7 、 6.4 ± 1.3 及び 6.3 ± 0.7 時間と日齢が進むにつれ短くな

1 った。(参照 5) [FAS27 2.1.1.4]

2 3 ② 静脈内及び筋肉内投与試験

4 乳牛を用いた 3 つの異なる 10 % OTC 製剤の静脈内及び筋肉内投与 (約 5
5 mg/kg 体重) 試験が実施された。経時的に血液及び尿を採取した。

6 Vd は 1.00 ± 0.18 L/kg であり、製剤による違いはみられなかった。筋肉内
7 投与では、投与 7 時間後に血漿 C_{\max} (2.28 ± 0.15 mg/L) に達した。T_{1/2} は
8 9.02 ± 0.88 時間であった。OTC の大部分は腎臓から排泄され (85~86 %)、
9 胆汁排泄はごくわずか (2 %) であった。(参照 5) [FAS27 2.1.1.4]

10 11 ③ 筋肉内投与試験

12 乳牛 (5 頭) を用いた 5 つの異なる 20 % OTC 製剤の単回筋肉内投与 (10
13 mg/kg 体重) 試験が実施され、OTC の血漿中濃度並びに OTC 及びクレアチ
14 ニンの腎クリアランスを測定した (検出限界 (バイオアッセイ): 0.05 mg/L)。

15 血漿中濃度は投与 5~10 時間後に C_{\max} (製剤により 4.6~6.8 mg/L) に達
16 した。血漿中濃度は 0.5 mg/L を超える濃度が製剤により 48~72 時間持続し
17 た。平均腎クリアランスは 0.062 L/kg 体重/h であった。投与後 72 時間に、
18 尿から投与量の 61.7~88 % が回収された。(参照 5) [FAS27 2.1.1.4]

19
20 乳牛 (ホルスタイン種、雌 5 頭/投与群、1 頭/対照群) を用いた 20 % OTC
21 製剤の単回筋肉内投与 (OTC として 20 mg/kg 体重) 試験が実施された。血
22 清及び尿は、投与前、投与 1、3、6、24、48、72、96、120、240 及び 360
23 時間後に、組織 (心臓、肝臓、腎臓、筋肉、脂肪、小腸及び大腸) は投与 1、
24 5、10 及び 15 日後に採取し、各試料中濃度をバイオアッセイにより測定した。

25 血清中濃度は、投与 3 時間後に C_{\max} (平均 3.67 mg/L) に達し、その後徐々
26 に低下し、投与 360 時間後には検出限界未満 (<0.10 mg/L) となった。

27 組織中濃度は、投与 1 日後に最高濃度を示した。最も高濃度であったのは、
28 腎臓 (17.1 g/kg) で、次いで肝臓 (9.86 mg/kg) であり、他の組織は 1.00~
29 2.53 mg/kg であった。

30 尿中濃度は、投与 1~6 時間後に漸増し、投与 6 時間後には最高濃度 (平
31 均 265.5(147.0~400.0) mg/L) に達したが、個体差が大きく、投与 360 時間
32 後でも検出可能 (0.09 ± 0.04 mg/L) であった。(参照 9) [OTC 残留基準見直し
33 に関する資料 1]

34
35 乳牛 (ジャージー種、5 頭) を用いた OTC の単回筋肉内投与試験が実施さ
36 れた。血漿及び乳汁中濃度は、それぞれ投与 6 及び 12 時間後に最高濃度 (血
37 漿: 1.67 ± 0.66 mg/L、乳汁: 1.38 ± 0.46 mg/L) に達した。T_{1/2} は 7.99 ± 2.20
38 時間であった。(参照 5) [FAS27 2.1.1.4]

1 (14) 薬物動態試験 (牛、CTC)

2 ① 経口及び筋肉内投与試験

3 子牛を用いた CTC の 2 週間経口投与 (50~90 mg/頭) 試験が実施された。
4 最終投与後、血中には CTC が認められたが、組織 (肝臓、腎臓、脾臓、胸腺、
5 甲状腺、副腎、脳下垂体及び筋肉) 中では肝臓及び腎臓で認められたのみで、
6 他の組織からは検出されなかった。胃内容物、小腸内容物、胆汁、尿及び糞
7 中から高濃度の CTC が検出され、経口投与における主要排泄経路は糞中であ
8 ると考えられた。

9 また、筋肉内投与の場合の主要排泄経路は、尿及び胆汁であることが確認
10 された。(参照 6) p163 [CTC 再評価申請時概要 p27]

11 ② 投与試験 (投与経路未記載)

12 牛を用いた CTC の 61 日間投与 (11 mg/kg 体重/日) 試験が実施された。
13 最終投与当日の筋肉、肝臓及び腎臓からは CTC が検出されたが、脂肪からは
14 検出されなかった。(参照 6) p163 [CTC 再評価申請時概要 p27]

15
16 牛を用いた CTC の投与 (70 及び 350 mg/頭、投与期間未記載) 試験が実
17 施された。70 mg/頭群では肝臓及び腎臓からわずかに CTC が検出され、筋肉
18 及び脂肪からは検出されなかった。350 mg/頭群では、筋肉、肝臓及び腎臓か
19 ら検出された。(参照 6) p163 [CTC 再評価申請時概要 p27]

20 (15) 薬物動態試験 (豚、OTC)

21 ① 経口投与試験

22 豚 (ヨークシャー種、21 頭) を用いた OTC-HCl の単回経口投与 (50 mg/kg
23 体重) 試験が実施された。OTC は、腎臓に最も多くみられ、肝臓、肺、副腎、
24 心臓、胆汁、脂肪、リンパ節、脾臓、甲状腺及び尿中に分布した。最高残留
25 濃度 (441 mg/L) は投与 3 時間後の尿中にみられ、投与 48 時間後にも検出
26 された。血漿中 C_{max} (6.3 mg/L : 4.2~8.7 mg/L の範囲) は投与 3 時間後にみ
27 られた。(参照 5) [FAS27 2.1.1.3]

28
29 離乳子豚を用いた OTC の単回強制経口投与 (20 mg/kg 体重) 試験及び 3
30 日間混餌投与 (400 ppm) 試験が実施された。強制経口投与による血漿中 C_{max}
31 は混餌投与による場合の 6 倍であった (強制経口 : 1.27 mg/L、混餌 : 0.2 mg/L)。
32 強制経口投与では、血漿中濃度は投与 3±2 時間後に C_{max} に達したが、混餌
33 投与では投与開始から投与終了までの 30 時間以上にわたり定常状態 (0.2
34 mg/L) を示した。最終投与後 48 時間以内に血漿中 OTC 濃度は検出限界 (0.06
35 mg/L) 未満となった。OTC の推定生物学的利用率は低く、強制経口及び混餌
36 投与でそれぞれ 9.0 及び 3.7 %であった。(参照 5) [FAS27 2.1.1.3]

② 静脈内投与試験

豚を用いた OTC の単回静脈内投与 (20 mg/kg 体重) 試験が実施された。Vd は 1.62 ± 0.83 L/kg であり、 $T_{1/2}$ は 11.6~17.2 時間で、全身クリアランスは 0.249 L/kg 体重/h と推定された。投与後 72 時間以内に尿中からは投与量の 42~62 %が回収された。(参照 5) [FAS27 2.1.1.3]

③ 筋肉内投与試験

豚 (6 及び 4 頭) を用いた異なる剤型 (長時間作用型及び標準型) の OTC の単回筋肉内投与 (20 mg/kg 体重) 試験が実施された。血液及び尿を採取し、蛍光分光分析により OTC 濃度を測定した (検出限界: 血漿 0.1 mg/L、尿 0.2 mg/L)。

標準型の分布は緩慢で、投与 4 時間後に C_{max} (609 mg/L) に達した。投与量の約 60 %が投与後 24 時間で尿中に排泄され、投与後 1 週間以内に合計で投与量の 69 %が尿中から回収された。

長時間作用型では、投与後の最初の吸収はより速やかで、投与後 1 時間以内に C_{max} に達した。排泄の比率は標準型より低かったが、尿中から回収された総量は同様であった。投与後 3 日に総量の 60~75 %が尿中に排泄された。(参照 5) [FAS27 2.1.1.3]

子豚 (LW 種、雌 12 頭及び雄 6 頭) を用いた 20 % OTC 製剤の単回筋肉内投与 (20 mg/kg 体重) 試験が実施された。血液は投与前、投与 1、3、6、24、48、72、96 及び 120 時間後に、組織は投与 24 及び 120 時間後に、尿は投与前、投与 1、3、6、24、48、72、96 及び 120 時間後、並びに 10、15 及び 20 日後に採取し、各試料中濃度をバイオアッセイにより測定した。

血中濃度は、投与 1 時間後 (個体別では 1~6 時間後) に C_{max} に達し、投与 1 時間後の平均値は 3.91 ± 1.01 mg/L であった。その後、徐々に低下し、投与 120 時間後でも検出可能 (平均 0.15 ± 0.06 mg/L) であった。

組織中濃度では、投与 24 及び 120 時間後の被験動物の血清中濃度を 1 としたときの各組織中濃度の分布比は、腎臓 > 肝臓 > 筋肉 > 小腸 > 大腸 > 肺 > 心臓 > 脂肪であった。特に、腎臓は両時点において血清の約 10 倍の濃度を示し、次いで肝臓が約 2 倍を示した。

尿中濃度は、投与 6 時間後に最高濃度 (平均 265.4 (115~540) mg/L) を示したが、個体差が大きかった。投与 48 時間後以降急減したが、検出限界 (0.10 mg/L) 未満になったのは投与 20 日後であった。(参照 9) [OTC 残留基準見直しに関する資料 2]

(16) 薬物動態試験 (豚、TC)

豚(雌)を用いた TC-HCl の経口 (絶食時) 及び静脈内投与 (11 及び 22 mg/kg 体重) 試験の結果、生物学的利用率は、AUC から 23 %と算出された。

1 静脈内投与（11 mg/kg 体重）試験では、投与後の TC の血漿中動態からの
2 消失は、3 指数方程式相（tri-exponential equation）で示された。TC は速や
3 かに分布した後比較的ゆるやかに消失し、 $T_{1/2}$ は 16 時間であった。（参照 4、
4 7） [FAS36 2.1.1.1、FAO TCp139-140]

6 (17) 薬物動態試験（豚、CTC）

7 子豚を用いた CTC の 3 週間混餌投与（50、200 及び 1,000 ppm）試験が
8 実施された。50 ppm 群では、投与開始 1 及び 2 週間後には血中から検出さ
9 れなかったが、投与開始 3 週間後には検出された（0.05 mg/L）。200 及び 1,000
10 ppm 投与群では、投与開始 1 週から検出され（それぞれ 0.098 及び 0.15 mg/L）、
11 投与期間が長くなるにつれ血中濃度は増加の傾向を示した。（参照 6） p162
12 [CTC 再評価申請時概要 p26]

14 (18) 薬物動態試験（鶏、OTC）

15 鶏（雛）を用いた OTC の混餌投与（200 及び 1,000 ppm、通常カルシウム
16 飼料及び低カルシウム飼料）試験が実施された。200 ppm 群において通常カ
17 ルシウム及び低カルシウム飼料では、血中濃度それぞれ 0.11 及び 0.21 mg/L、
18 肺中濃度は 0.25 mg/kg 及び 0.23 mg/kg であった。通常カルシウム飼料の
19 1,000 ppm 群では、血中濃度が 0.51 mg/L、肺中濃度が 0.56 mg/kg であった。
20 （参照 10、11） [OTC-Q 抄録 p13 表、飼添 OTC-Q 抄録 p11 表]

22 (19) 薬物動態試験（鶏、CTC）

23 ① 経口投与試験

24 鶏を用いた CTC の強制単回経口投与（100 mg/kg 体重）試験が実施され、
25 経時的に体内分布を調べた。CTC は投与 10 分後には血中から検出され、投
26 与 2 時間後に C_{max} （1.92 mg/L）に達した。以後、血中濃度は経時的に減少
27 し、投与 24 時間後には消失した。各組織中濃度はいずれも投与 1～2 時間後
28 に最高値を示し、脳を除く各組織に分布した。投与 24 時間後には胆汁を除き
29 全組織から消失した。（参照 3、6） [CTC 申請時抄録 p10、CTC 再評価申請時概要
30 p25~26]

32 ② 混餌投与試験

33 鶏（8 週齢）を用いた CTC の 1 週間混餌投与（20、60、200、600、2,000
34 及び 6,000 ppm）試験が実施された。その結果、CTC は 600 ppm 以上投与
35 群で血中から検出された（600 ppm : 0.02 mg/L）。（参照 6） [CTC 再評価申請時
36 概要 p25]

37
38 鶏を用いた CTC の 11 週間混餌投与（50、100 及び 200 ppm）試験が実施
39 された。最終投与後の血中濃度は 0.014～0.061 mg/L であったが、最終投与

1 1日後には検出されなかった。(参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p25]

2
3 鶏を用いた CTC の 12 週間混餌投与 (50、100、150 及び 200 ppm) 試験
4 が実施された。投与終了時の血中濃度は、それぞれ 0.034、0.048、0.062 及
5 び 0.075 mg/L で、投与量の増加に伴い血中濃度が高くなったが、最終投与 1
6 日後にはいずれの投与群からも検出されなかった。投与終了時の組織中濃度
7 は、肝臓：0.054~0.184 mg/kg 及び筋肉：0.038~0.109 mg/kg であったが、
8 最終投与 1 日後にはいずれも消失した。(参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p26]

9
10 (20) 薬物動態試験 (魚^魚類、OTC)

11 ①えびの経口投与試験

12 えび (エビ^{エビ}、体重 30~40 g、10 尾/時点) を用いた OTC の単回経
13 口投与 (11 及び 22 mg/kg 体重) 試験が実施された。水温を 28~30℃に維持
14 し、投与 0.5 時間~10 日後の間のえびを採取して HPLC により測定した (検
15 出限界：0.01 mg/kg)。

16 その結果、OTC は吸収されにくく、組織中濃度は投与 8 時間後に C_{max} (11
17 及び 22 mg/kg 体重群でそれぞれ 0.74 及び 0.97 mg/kg) に達した (表 3)。(参
18 照 12、13) [TRS864 p39、[FAO OTC p126、128]

19
20 表 3 えびにおける OTC 投与後の組織中濃度 (mg/kg)

投与量 (mg/kg 体重)	投与後時間 (h)						
	0.5	1	2	4	8	12	24
11	0.09	0.21	0.39	0.62	0.74	0.68	0.36
22	0.10	0.26	0.52	0.82	0.97	0.90	0.55
投与後時間 (h)							
	30	48	54	72	96	120	144
11	0.25	0.08	0.20	ND	ND	ND	ND
22	0.41	0.18	0.20	ND	ND	ND	ND

21 ND：不検出 検出限界：0.01 mg/kg

22
23 ②ぶりの混餌投与試験

24 ぶりをを用いた OTC-Q 及び OTC-HCl の混餌投与 (それぞれ 50 mg/kg 体重
25 /日) 試験が実施された。投与は 1 日 1 回、2 日間実施し、第 1 回投与 3 時間
26 後、第 2 回投与 3、6、9 及び 24 時間後の組織 (血漿、筋肉、肝臓及び腎臓)
27 中 OTC 濃度を測定した (検出限界：血漿 0.05 mg/L、肝臓及び腎臓 0.2 mg/kg、
28 筋肉 0.05 mg/kg)。

29 結果を表 4 に示した。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p13~14]

1 表 4 ぶりにおける OTC 投与後の組織中濃度 (mg/kg 又は/L)

組織	投与物質	投与後時間 (h)				
		第 1 回	第 2 回			
		3	3	6	9	24
血漿	OTC-Q	0.08	0.13	0.15	0.11	<0.10
	OTC-HCl	0.08	0.14	0.16	0.12	<0.10
肝臓	OTC-Q	0.37	0.40	0.57	0.48	0.18
	OTC-HCl	0.29	0.46	0.67	0.47	0.17
腎臓	OTC-Q	0.40	0.32	0.23	<0.20	<0.20
	OTC-HCl	0.32	0.33	0.18	0.25	0.1
筋肉	OTC-Q	0.10	0.15	0.10	0.09	0.07
	OTC-HCl	0.05	0.15	0.13	0.12	0.09

2 検出限界：血漿-0.05 mg/L、肝臓及び腎臓-0.2 mg/kg、筋肉-0.05 mg/kg

3
4 ③ ひらめの経口投与試験

5 ひらめを用いた OTC-Q 及び OTC-HCl の単回強制経口投与（それぞれ 50
6 mg/kg 体重、モイストペレット溶液に混合して投与）試験が実施され、経時
7 的（投与前、投与 3、6、24、48、72、96 及び 120 時間後）に血清中 OTC
8 濃度を測定した（検出限界：0.05 mg/L）。

9 結果を表 5 に示した。（参照 10）[\[OTC-Q 抄録 p14\]](#)

10
11 表 5 ひらめにおける OTC 投与後の血清中濃度 (mg/L)

投与物質	投与後時間 (h)						
	3	6	24	48	72	96	120
OTC-Q	0.09	0.13	0.19	0.09	0.056	0.05	0.05
OTC-HCl	0.16	0.23	0.29	0.10	0.07	0.06	0.05

12 検出限界未満<0.05 mg/L は 0.05 として計算。

13
14 ④ とらふぐの経口投与試験

15 とらふぐ（3尾/時点）を用いた OTC-HCl の単回強制経口投与（50 mg(力
16 価)/kg 体重）試験が実施され、経時的（投与前、投与 1、3、6、24、48 及び
17 72 時間後）に組織（血漿、筋肉、肝臓及び腎臓）中 OTC 濃度を HPLC によ
18 り測定した（検出限界：0.01 mg/kg 又は/L）。

19 結果を表 6 に示した。（参照 14、15）[\[OTC-HCl 概要 p6、OTC-HCl 資料 4\]](#)

1 表 6 とらふぐにおける OTC 投与後の組織中濃度 (mg(力価)/kg 又は/L)

組織	投与前	投与後時間 (h)					
		1	3	6	24	48	72
血漿	N.C.	0.22	0.35	0.42	0.26	0.15	0.24
筋肉	N.C.	0.18	0.09	0.17	0.18	0.15	0.14
肝臓	N.C.	0.22	0.45	1.29	0.60	0.58	0.31
腎臓	<0.01	0.42	0.21	0.53	0.26	0.21	0.20

2 血漿、筋肉及び肝臓は 3 尾の平均値。腎臓は 3 尾プール値。

3 検出限界：0.01 mg/kg 又は/L

4 N.C.：計算せず

5

6 (2 1) 薬物動態試験 (魚類、CTC)

7 ① ~~ぶりはまち~~の経口投与試験

8 ~~ぶりはまち~~を用いた CTC の 3 日間強制経口投与 (20 及び 50 mg/kg 体重/
9 日) 試験が実施された。第 1 回投与 3 時間後に血中濃度は C_{max} に達し、その
10 後減少して第 2 回投与直前にはわずかしか検出されなかった。第 2 及び 3 回
11 投与後の血中濃度は第 1 回投与後の値を上回らなかった。

12 混餌投与した場合には、投与 2~8 時間後はほぼ同様の血中濃度を示し、強
13 制経口投与時同様、第 3 回投与後の値は第 1 回投与後の値を上回らなかった。

14 (参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p27]

15

16 ② にじますの経口投与試験

17 にじますを用いた CTC の強制経口投与 (50 mg/kg 体重) 試験が実施され
18 た。血中濃度は、水温 15°C において投与 3 時間後に C_{max} (0.92 mg/L) に達
19 し、徐々に消失した。水温 7°C では、5 日間投与すると、投与回数が増加する
20 につれ血中濃度は高くなった。(参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p27~28]

21

22 (2 2) 骨と歯に対する影響

23 ラット (15 日齢、15 匹/投与群、5 匹/対照群) に 72 時間の間に 12 時間毎
24 に 6 回 OTC を注射 (投与経路不明) した。被験動物を最終投与 4 時間後に
25 安楽死させ、脛骨をはずして骨端板を透過又は走査顕微鏡により検査し、
26 OTC-HCl の基質小胞の産生及び骨端軟骨の初期石灰化に及ぼす影響につい
27 て調べた。その結果、~~増殖及び肥大域における軟骨細胞の変性が観察された。~~
28 ~~軟骨細胞はわずかな基質小胞が表面を覆う短い過程を有していた。肥大化した~~
29 ~~石灰化軟骨では基質小胞は対照群に比べて少なく、集合して石灰小球を形~~
30 ~~成する能力が阻害された。骨 (ashed bone) 中には石灰小球を含むミネラル~~
31 ~~はほとんどみられなかった。細胞増殖帯及び細胞成熟帯の軟骨細胞に変性が~~
32 観察された。軟骨細胞は表面の基質小胞に乏しく、短い突起を有していた。
33 細胞成熟帯及び石灰沈着帯における基質小胞は対照に比して少なく、石灰小
34 球の集合と石灰化に異常がみられた。骨化した組織には、ミネラルを含む石

1 灰小球はほとんどみられなかった。 (参照 5) [FAS27 2.1.3]

2
3 OTC、CTC 及び TC (以下「TC 類」という。) (0.1~50 mg/kg 体重) を非
4 経口投与されたマウス、ラット、モルモット、ウサギ及びイヌの組織を UV
5 により検査した結果、脳以外の全組織は投与 30 分後以内に鮮やかな黄金色の
6 蛍光を発した。用量相関性はみられなかった。骨以外の組織の蛍光は、単回
7 投与後 6 時間以内に消失した。しかし、骨の蛍光は投与後 10 週間の観察期間
8 中を通じて持続した。(参照 4) [FAS36 2.1.2]

9
10 ラット (Sherman 系、雄) を用いた ³H-TC 又は ¹⁴C-CTC の単回経口投与
11 (いずれも 250 mg/kg 体重) 試験が実施された。

12 大腿骨中の放射活性は、³H-TC 投与群で、投与 4 及び 24 時間後並びに 4
13 週後においてそれぞれ 9.6、1.9 及び 0.4 mg/kg であった。¹⁴C-CTC 投与群の
14 骨中放射活性は、投与 4 時間及び 4 週間後においてそれぞれ平均 12 及び 2.3
15 mg/kg であった。

16 0.5~1,000 ppm の CTC を含む飼料を生涯摂取させた場合、大腿骨中の放
17 射活性の最大値は 570 mg/kg であった。TC の腹腔内投与 (10~150 mg/kg
18 体重) では、大腿骨中の放射活性には用量相関性がみられ、経口投与 (250
19 mg/kg 体重) 後よりはるかに高値を示した。(参照 4) [FAS36 2.1.2]

20 21 (2 3) ヒトにおける知見

22 ① 薬物動態 (OTC)

23 OTC は経口投与ではヒトの消化管から ~~の吸収は不完全であり、~~経口投与で
24 は約 60% が吸収される。血漿中濃度は、単回経口投与では投与後 2~4 時間以
25 内、反復経口投与では投与後 2.5 時間以内に C_{max} に達する。ヒトにおける
26 OTC の 7 日間経口投与 (500 mg/ヒト) 試験では、V_d が 4.07 L/kg と考えら
27 れた。OTC の吸収は、キレート化及び pH の上昇により、乳製品、アルミニ
28 ウムヒドロキシゲル、重炭酸ナトリウム、カルシウム及びマグネシウム塩、
29 並びに、鉄剤で阻害される。(参照 5) [FAS27 2.1.1.5]

30
31 ヒト (5 人) に OTC-HCl を単回経口投与 (0.5、1.0 及び 2.0 g/ヒト) し、
32 経時的 (投与 2、4、6 及び 24 時間後) な血中濃度、投与後 24 時間までの尿
33 中濃度及び排泄量並びに糞中排泄濃度について検討された。

34 結果を表 7 に示した。(参照 16) [農薬抄録 p109~110、p112~113]

表 7 ヒトにおける OTC-HCl の単回投与後の薬物動態パラメータ

投与量 (g/ヒト)	血液	尿			糞
	T _{max} (h)	T _{max} (h)	C _{max} (mg/L)	総排泄量 (mg)	濃度* (mg/kg)
0.5	2~4	3	140	約 100	約 600
1.0	6	3	300	200 弱	約 600
2.0	4~6	3	400	約 200	約 1,000

*：投与後の糞中 OTC-HCl 濃度。採取時未記載。

ヒト（3人）に OTC-HCl を 6 時間毎に 4 回連続経口投与（0.25、0.5 及び 1.0 g/ヒト/回）し、経時的（投与開始 7、9、12、13、15、18 及び 19 時間後）に血中濃度が測定された。

0.25 g/ヒト/回群では、投与開始 9 時間後（第 2 回投与 3 時間後）に、0.5 g/ヒト/回群では投与開始 15 時間後（第 3 回投与 3 時間後）に C_{max} を示した。また、1.0 g/ヒト/回群では、投与開始 7 時間後（第 2 回投与 1 時間後）及び 13 時間後（第 3 回投与 1 時間後）に C_{max} を示した。（参照 16）[\[農薬抄録 p111\]](#)

② 薬物動態（TC）

6 時間毎に TC を経口投与（250～500 mg/ヒト）した場合、血漿中濃度は 1～5 mg/L の範囲であった。TC の静脈内投与（250～500 mg/ヒト）では、血漿中濃度は、投与 0.5 時間後に 15～20 mg/L で、投与 1～2 時間後には 4～10 mg/L に低下し、投与 12 時間後でも 1～3 mg/L が存在した。（参照 4）[\[FAS36 2.1.3\]](#)

③ 薬物動態（OTC、CTC 及び TC）

ヒトにおいて、空腹時には経口投与された治療用量の CTC の約 30 %が吸収された。TC 及び OTC では、60～80 %が吸収された。（参照 4）[\[FAS36 2.1.3\]](#)

TC 類は、様々な結合率（TC：24～65 %、CTC：47 %）で血漿タンパクと結合して体内循環する。TC 類は母乳中にも認められ、その濃度は血漿中濃度の 60 %以上であった。TC 類は胎盤を通過し、胎児中では母体の血中濃度の 25～75 %の濃度がみられた。CTC 及び TC の血漿中 T_{1/2} はそれぞれ 8～10 及び 5.5 時間であると報告されている。（参照 4）[\[FAS36 2.1.3\]](#)

TC 類の吸収は、乳製品、重炭酸ナトリウム、水酸化アルミニウム及び鉄剤によるキレート化及び胃液の pH 上昇のために阻害される。（参照 4）[\[FAS36 2.1.3\]](#)

2. 残留試験

腎臓及び肝臓中 [CTC](#) 濃度は、全動物種で最終投与直後及び休薬期間中のどの時点においても最高濃度を示し、これらの組織では [CTC](#) の残留が最後まで認められた。休薬期間中の筋肉中残留は腎臓及び肝臓中残留の 10 %未満であり、脂肪中残留は筋肉中残留よりかなり低い値であった。(参照 12) [\[TRS864\]](#)

(1) 残留試験 (牛、OTC)

① 14 日間混餌投与試験

子牛 (ヘレフォード種/ホルスタイン種、雌雄、5 頭/時点) を用いた [OTC](#) の 14 日間混餌投与 (500 ppm : [OTC](#) として 5~13 mg/kg 体重/日) 試験が実施された。最終投与 3、5、7 及び 10 日後の肝臓、腎臓、筋肉、腎臓脂肪及び血漿中の [OTC](#) 濃度を HPLC により測定した (検出限界:各組織-0.2 mg/kg、血漿-0.04 mg/kg、定量限界:全試料とも 0.25 mg/kg)。

腎臓中濃度は、最終投与 5、7 及び 10 日後にそれぞれ 0.4、0.5 及び 0.45 mg/kg であり、最終投与 10 日後にも残留が認められた。他の組織中残留濃度は腎臓より大幅に低かった。肝臓では、最終投与 7 日後に 0.27 mg/kg を示した 1 例を除き、最終投与 5 日後には残留が認められなかった。筋肉及び腎臓脂肪では、最終投与 5 日後以降残留はみられなかった。(参照 16) [\[NRA1998 p7\]](#)

② 21 日間混餌投与試験

牛 (ホルスタイン種、5 ヶ月齢、3 頭) を用いた [OTC](#) の 21 日間混餌投与 (975 ppm : 22.04 mg/kg 体重 /日) 試験が実施された結果、最終投与 5 日後の肝臓、腎臓、筋肉及び脂肪のいずれにおいても [OTC](#) は検出されなかった (検出限界 : 0.125~0.25 mg/kg)。(参照 9、10) [\[OTC-Q 抄録 p5、飼添 OTC-Q 抄録 p4、牛に OTC を飼料添加投与した場合の組織内残留 p4\]](#)

③ 60 日間混餌投与試験

牛 (去勢雄) を用いた [OTC](#) の 60 日間混餌投与 (71 及び 357 ppm : 0.4 及び 2 g/頭/日) 試験が実施された。その結果、最終投与日のいずれの組織 (肝臓、腎臓、筋肉、脂肪、心臓、舌及び胃壁) からも [OTC](#) は検出されなかった (検出限界 : 0.1~0.15 mg/kg)。(参照 9) [\[OTC-Q 抄録 p4~5\]](#)

④ 6 ヶ月間混餌投与試験

子牛を用いた [OTC-Q](#) の 6 ヶ月間混餌投与 (50、150 及び 500 ppm) 試験が実施された。投与中の中間時点、最終投与 0、3、5 及び 7 日後の血清、筋肉、肝臓、腎臓、小腸及び脂肪中の [OTC-Q](#) 濃度を測定した (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

50 ppm 群では、最終投与 0 日後の腎臓にわずかに残留が認められたのみで、他の組織からは検出されなかった。150 ppm 群では、血清で最終投与 0

1 日後に、肝臓、腎臓及び小腸で最終投与 3 日後まで OTC-Q が検出されたが、
 2 最終投与 5 日後以降は検出されなかった。500 ppm (10 倍量) 群では、筋肉
 3 で最終投与 0 日後に、血清、肝臓及び小腸で最終投与 3 日後まで、腎臓で最
 4 終投与 5 日後まで OTC-Q がわずかに検出されたが、最終投与 7 日後以降に
 5 残留は認められなかった。(参照 9、10) [OTC-Q 抄録 p15~16、飼添 OTC-Q 抄録
 6 p13]

7
 8 ⑤ 単回筋肉内投与試験 (i)

9 牛 (ホルスタイン種、雌 15 頭) を用いた 20 %OTC 製剤(1 mL 中 OTC
 10 を 200 mg(力価)含有)の単回筋肉内投与 (OTC として 20 及び 40 mg/kg 体
 11 重) 試験が実施された。20 mg/kg 体重群 (8 頭) は、投与 1、5、10、15、
 12 20、25、30 及び 35 日後に、40 mg/kg 体重群 (5 頭) は、投与 1、25、30、
 13 35 及び 40 日後に主要組織 (心臓、肝臓、腎臓、筋肉、脂肪、小腸、大腸及
 14 び投与部位筋肉 3 カ所) を採取し、バイオアッセイにより残留性について検
 15 討した (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

16 結果を表 8 及び 9 に示した。

17
 18 表 8 牛における OTC 20 mg/kg 体重を単回筋肉内投与後の組織中濃度*
 19 (mg/kg)

組織	投与後時間 (日)							
	1	5	10	15	20	25	30	35
心臓	24.5	0.40	0.20	0.12	<0.05	<0.05	—	—
肝臓	9.86	1.00	0.74	0.20	<0.05	<0.05	—	—
腎臓	17.1	2.16	1.34	0.35	0.09	<0.05	<0.05	—
筋肉	2.28	0.58	0.35	0.23	<0.05	<0.05	—	—
脂肪	1.00	0.63	0.50	0.30	0.07	<0.05	<0.05	—
小腸	2.53	0.32	0.30	0.06	0.05	<0.05	<0.05	—
大腸	1.63	0.38	0.25	0.20	<0.05	<0.05	—	—
投与部位	中心				6.25	<0.05	<0.05	<0.05
	近位				0.08	<0.05	<0.05	<0.05
	遠位				0.05	<0.05	<0.05	<0.05

20 * : バイオアッセイにより測定

21 — : 分析せず

□ : 採材せず

検出限界 : 0.05 mg/kg

表 9 牛における OTC 40 mg/kg 体重を単回筋肉内投与後の組織中濃度*

(mg/kg)

組織	投与後時間 (日)					
	1	25	30	35	40	
心臓	3.86	0.05	<0.05	<0.05	—	
肝臓	13.6	0.05	<0.05	<0.05	—	
腎臓	22.7	0.14	0.05	<0.05	<0.05	
筋肉	3.30	<0.05	<0.05	<0.05	—	
脂肪	0.70	0.07	<0.05	<0.05	—	
小腸	2.21	0.07	<0.05	<0.05	—	
大腸	1.74	<0.05	<0.05	—	—	
投与部位	中心		6.25	<0.05	<0.05	<0.05
	近位		0.07	<0.05	<0.05	<0.05
	遠位		0.08	<0.05	<0.05	<0.05

*: バイオアッセイにより測定

—: 分析せず

□: 採材せず

検出限界: 0.05 mg/kg

20 mg/kg 体重群では、投与 1 日後の組織中濃度が最も高く、特に腎臓 (17.1 mg/kg) 及び肝臓 (9.80 mg/kg) が高かった。投与 5 日後以降急速に低下し、投与 20 日後には腎臓、脂肪及び小腸 (それぞれ 0.09、0.07 及び 0.05 mg/kg) でのみ検出され、最終投与 25 日以降は投与部位筋肉も含め全例が検出限界未満となった。

40 mg/kg 体重群では、投与 1 日後の組織中濃度は 20 mg/kg 体重群より高く、特に腎臓 (22.7 mg/kg) 次いで肝臓 (13.6 mg/kg) が高かった。しかし、最終投与 25 日後には腎臓 (0.14 mg/kg)、脂肪及び小腸 (0.07 mg/kg)、並びに心臓、肝臓及び筋肉 (0.05 mg/kg) は痕跡程度が検出され、大腸は検出限界未満となった。投与部位筋肉は中心部が各組織より高値 (6.25 mg/kg) を示した。投与 30 日後には腎臓 (0.05 mg/kg) でのみ検出され、投与 35 日後には投与部位筋肉を含む全例が検出限界未満となった。(参照 9) [OTC 残留基準見直しに関する資料 3]

⑥ 単回筋肉内投与試験 (ii)

牛 (ホルスタイン種、3 ヶ月齢、雌 6 頭) を用いた 20 % OTC 製剤 (1 mL 中 OTC を 200 mg (力価) 含有) の単回筋肉内投与 (OTC として 20 mg/kg 体重) 試験が実施された。投与前、投与 1、3 及び 6 時間後の血清、並びに 29、30 及び 35 日後の血清及び筋肉中の OTC 濃度を HPLC により測定した (検出限界: 0.01 mg/kg)。

結果を表 10 及び 11 に示した。

1 表 10 牛における OTC 20 mg/kg 体重を単回筋肉内投与 1～6 時間後の平均血清中濃度* (mg/kg)

	投与後時間 (h)			
	投与前	1	3	6
平均血清中濃度	<0.01	3.07	3.77	3.29

3 * : HPLC により測定 検出限界 : 0.01 mg/kg

4

5 表 11 牛における OTC 20 mg/kg 体重を単回筋肉内投与 29～30 日後の組織中濃度* (mg/kg)

	投与後時間 (日)					
	29		30		35	
動物番号	1	2	3	4	5	6
血清	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
投与部位筋肉	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
投与部位周囲筋肉	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01

7 * : HPLC により測定 検出限界 : 0.01 mg/kg

8

9 投与後は全例から OTC が検出され、投与 1、3 及び 6 時間後の平均血清中濃度はそれぞれ 3.07、3.77 及び 3.29 mg/kg であった。また、投与 1、3 及び 10 6 時間後に血清 C_{max} を示したのはそれぞれ 3、2 及び 1 頭であった。投与 29 11 及び 30 日後には全例から OTC が 0.01 mg/kg 検出されたが、投与 35 日後には 12 投与部位筋肉 (2/2 例) 及び投与部位周囲筋肉の一部 (1/2 例) から OTC 13 が 0.01 mg/kg 検出され、血清 (2/2 例) 及び投与部位周辺筋肉の一部 (1/2 14 例) は検出限界未満であった。(参照 9) [OTC 残留基準見直しに関する資料 6]

15

16

17 (2) 残留試験 (乳汁、OTC)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

泌乳牛 (ホルスタイン種、3 頭/群) を用いた ~~20 %OTC 製剤 (1 mL 中に OTC を 200 mg (力価) を含有)~~ の単回筋肉内投与 (20 及び 40 mg/kg 体重) 試験が実施され、経時的 (投与 0 及び 12 時間並びに 1～20 日後、20 mg/kg 体重群では投与 18 日後まで) に乳汁中残留性について検討した。

両投与群ともに投与 12 時間後に最も高い乳汁中濃度を示した。その後徐々に低下し、20 mg/kg 体重群では投与 11 日後に、40 mg/kg 体重群では投与 15 日後に全例が検出限界 (0.05 mg/L) 未満になった。(参照 9) [OTC 残留基準見直しに関する資料 5]

27 (3) 残留試験 (牛、TC)

28 ① 14 日間飲水投与試験

29 牛を用いた TC の 14 日間飲水投与 (24 mg/kg 体重/日) 試験が実施された。30 最終投与 10 日後の平均腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 0.4 及び 0.17 mg/kg

1 であった。(参照 12) [TRS864]

2 3 ② 子宮内投与試験

4 泌乳牛に TC を子宮内投与 (3 g/頭) した場合、投与 84 時間後の乳汁中濃
5 度は < 0.10 mg/kg であった。(参照 12) [TRS864]

6 7 (4) 残留試験 (牛、CTC)

8 ① 7 日間混餌投与試験

9 子牛を用いた CTC の 7 日間混餌投与 (20 ppm) 試験が実施された。最終
10 投与 15 日後の腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 0.12 及び 0.04 mg/kg であっ
11 た。(参照 12) [TRS864]

12 13 ② 28 日間混餌投与試験

14 牛 (ヘレフォード種、去勢雄 12 頭) を用いた CTC の 28 日間混餌投与 (70
15 及び 350 mg/頭/日) 試験が、単独又はジエチルスチルベステロールと併用で
16 実施され、CTC の残留性について検討した。

17 その結果、70 mg/頭/日群では、最終投与直後の肝臓及び腎臓から一部に
18 0.03~0.04 mg/kg が検出されたのみであった。350 mg/頭/日群では、最終投
19 与直後の筋肉、肝臓及び腎臓、並びに最終投与 2 日後の肝臓及び腎臓から検
20 出されたが、他の組織では検出限界以下であった。(参照 3) [CTC 抄録 p9]

21 22 ③ 61 日間混餌投与試験

23 牛 (ホルスタイン種、雌 12 頭) を用いた CTC の 61 日間混餌投与 (11 mg/kg
24 体重/日 : 摂餌量を 9 kg/頭/日とすると 530 ppm) 試験が実施され、CTC の
25 残留性について検討した。

26 その結果、CTC の残留は、最終投与直後では脂肪を除き、筋肉、肝臓及び
27 腎臓から検出されたが、最終投与 10 日後では、腎臓のみからからのみに検出
28 された (0.05mg/kg)。(参照 3) [CTC 抄録 p9]

29 30 ④ 23 週間混餌投与試験

31 子牛 (約 2 週齢、雄、6 頭/投与群、2 頭/対照群) を用いた CTC 製剤の 23
32 週間混餌投与 (CTC として 0、50、150 及び 500 ppm : 0、1.5、4.2 及び 13.3
33 mg(力価)/kg 体重/日) 試験が実施された。最終投与 4~5 時間並びに 1、3、6
34 及び 9 日後に血漿、肝臓、腎臓、筋肉、脂肪及び腸管を採取しバイオアッセ
35 イにより残留について調べた (検出限界 : 0.025 mg(力価)/kg)。

36 結果を表 12 に示した。

表 12 子牛における CTC の 23 週間~~筋肉混餌内~~投与後の組織中残留
(mg(力価)/L 又は/kg)

投与量 (ppm)	組織	最終投与後時間 (日)				
		4~5h	1	3	6	9
50	血漿	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
	肝臓	0.142	0.062	<0.025	<0.025	<0.025
	腎臓	0.249	0.131	0.056	0.025	<0.025
	筋肉	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
	脂肪	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
	腸管	0.120	0.056	<0.025	<0.025	<0.025
150	血漿	0.064	0.037	<0.025	<0.025	<0.025
	肝臓	0.420	0.185	0.027	<0.025	<0.025
	腎臓	0.571	0.379	0.059	0.059	0.037
	筋肉	0.060	0.047	<0.025	<0.025	<0.025
	脂肪	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
	腸管	0.239	0.102	<0.025	<0.025	<0.025
500	血漿	0.129	0.067	<0.025	<0.025	<0.025
	肝臓	1.038	0.517	0.137	0.093	0.079
	腎臓	1.536	0.734	0.412	0.329	0.164
	筋肉	0.149	0.076	0.027	<0.025	<0.025
	脂肪	0.073	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
	腸管	1.040	0.212	0.044	<0.025	<0.025

検出限界：0.025 mg(力価)/L 又は/kg

各組織中の残留量はほぼ投与量に比例して増加した。残留量は、腎臓>肝臓>腸管>筋肉>血漿>脂肪の順~~であって~~多かった。50 ppm 群では、最終投与 9 日後に全組織が検出限界未満となった。150 ppm 群では腎臓を除いて、500 ppm 群では腎臓及び肝臓を除いて、最終投与 6 日後には他の組織の残留は検出限界未満となった。(参照 3) **[OTC 抄録⑨CTC の牛における残留試験]**

⑤ 混餌投与試験 (投与期間未記載)

牛を用いた CTC の混餌投与 (22 ppm、投与期間未記載) 試験が実施された。最終投与 5 日後の腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 0.20 及び 0.10 mg/kg であった。(参照 12) **[TRS864]**

⑥ ~~2~10 日間経口及び飲水~~投与試験

子牛を用いた CTC の ~~2~10 日間可溶性ポリーラス又は飲水~~経口投与 (22 mg/kg 体重 ppm) 試験が実施された。最終投与 7 日後の腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 0.45 及び 0.27 mg/kg であった (表 13) (参照 ~~12[TRS864]~~—8)

1 [FAO CTC p53]

2
3 表 13 子牛における CTC の経口投与後の組織中残留 (mg/kg)

組織	最終投与後時間 (日)			
	0	3	7	10
筋肉	1.26	0.47	0.14	0.03
肝臓	3.22	1.39	0.27	0.09
腎臓	4.57	1.26	0.45	0.15
脂肪	0.49	0.15	0.04	<LOD~0.03

4 * : 22 ppm の割合で 10 日間投与

5
6 ⑦ 皮下投与試験

7 子牛 (雌雄 2 頭/時点/投与群、2 頭/対照群) を用いた OTC 製剤の単回皮下
8 投与 (20 mg/kg 体重) 試験が実施され、投与 4、10、16、22、28 及び 35 日
9 後の肝臓、腎臓、筋肉及び脂肪中残留をバイオアッセイにより測定した (定
10 量限界 : 0.075 mg/kg)。

11 最終投与 16 日までに、筋肉及び腎臓中濃度はそれぞれ <0.1 及び <0.4
12 mg/kg となった。投与部位の残留は、ばらつきバラツキはあったが、一貫し
13 て減少した。(参照 17) [NRA1998 p8]

14
15 (5) 残留試験 (乳汁、CTC)

16 ① 単回子宮内投与試験

17 泌乳牛を用いた CTC の単回子宮内投与 (2 g/頭) 試験が実施された。投与
18 3 日後の乳汁中濃度は <0.05 mg/L であった。(参照 12) [TRS864]

19
20 泌乳牛を用いた CTC の単回子宮内投与 (3 g/頭) 試験が実施された。投与
21 84 時間後の乳汁中濃度は <0.15 mg/L であった。(参照 12) [TRS864]

22
23 ② 5 日間乳房内投与試験

24 泌乳牛を用いた CTC の 5 日間乳房内投与 (426 mg/頭/日) 試験が実施され
25 た。最終投与 4.5 日後の平均乳汁中濃度は、0.07 mg/L であった。(参照 12)
26 [TRS864]

27
28 ③ 3 日間投与試験

29 泌乳牛 (16 頭) を用いた CTC の 3 日間混餌投与 (2.2、4.4 及び 8.8 mg/kg
30 体重/日、投与経路未記載) 試験が実施された結果、血液及び乳汁の両方から
31 CTC が検出された。(参照 6) [[CTC 再評価時概要 p63⑦-4]

④ 2週間投与試験

泌乳牛を用いた CTC の 2 週間混餌投与 (0.22、1.1 及び 2.2 mg/kg 体重/日、投与経路未記載) 試験が実施された。

0.22 mg/kg 体重/日群では、血中及び乳汁中に CTC は認められなかった。1.1 mg/kg 体重/日以上投与群では投与期間中に乳汁中への移行が認められたが、最終投与 48 時間後には乳汁中の CTC は消失した。(参照 6) [CTC 再評価時概要 p63、⑦-3]

⑤ 投与試験 (期間未記載)

泌乳牛 8 頭を用いた CTC の経口投与 (200~600 mg/頭/日、期間未記載) 試験が実施された。その結果、200 及び 300 mg/頭/日群では乳汁中に CTC はみられず、400 mg/頭/日群では一部の被験動物の乳汁中から検出された。また、500 mg/頭/日群では 0.05 mg/L が、600 mg/頭/日群では 0.06 mg/L までの量が乳汁中に移行していた。(参照 6) [CTC 再評価時概要 p63、⑦-8]

(6) 残留試験 (豚、OTC)

① 7日間混餌投与試験

豚 (6 頭) を用いた OTC の 7 日間混餌投与 (1,000 ppm) 試験が実施され、最終投与 0、3、5、7 及び 10 日後の肝臓、腎臓、筋肉、脂肪及び小腸中の OTC の残留についてバイオアッセイにより調べた (検出限界: 0.05 mg/kg)。その結果、肝臓、脂肪及び小腸では最終投与 3 日後以降、筋肉では最終投与 5 日後以降 OTC の残留は認められなかった。腎臓では、最終投与 7 日後に検出限界まで減少し、最終投与 10 日後には残留は認められなかった。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p6]

② 21日間混餌投与試験

子豚 (3~4 ヶ月齢、3 頭/時点) を用いた OTC の 21 日間混餌投与 (165 ppm) 試験が実施された。最終投与 4、5、6 及び 7 日後において、肝臓、腎臓、筋肉及び脂肪のいずれの組織においても OTC の残留は認められなかった。(参照 10、11) [OTC-Q 抄録 p6、飼添 OTC-Q 抄録 p5]

豚 (雌、3 頭/時点) を用いた OTC の 21 日間混餌投与 (220 ppm) 試験が実施され、最終投与 0、1、2、4、7 及び 14 日後の肝臓、腎臓、筋肉、脂肪及び心臓中の OTC の残留について調べた (検出限界: 0.25 mg/kg)。その結果、最終投与 1 日後以降は、いずれの組織においても OTC の残留は認められなかった。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p6]

豚 (雌、3 頭/時点) を用いた OTC の 21 日間混餌投与 (550 ppm) 試験が実施され、最終投与 1、3、5、9 及び 16 日後の肝臓、腎臓、筋肉、脂肪及び

1 心臓中の OTC の残留について調べた (検出限界 : 0.25 mg/kg)。その結果、
2 最終投与 3 日後以降は、いずれの組織においても OTC の残留は認められな
3 かった (検出限界 : 0.25 mg/kg)。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p6]

4 5 ③ 30 日間混餌投与試験

6 子豚(3 頭/時点)を用いた OTC-Q の 30 日間混餌投与(100、300 及び 1,000
7 ppm) 試験が実施された。投与期間中の中間時点並びに、最終投与 0、3、5
8 及び 7 日後の血清、筋肉、肝臓、腎臓、小腸及び脂肪中の OTC-Q 濃度を測
9 定した (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

10 100 ppm 群では、最終投与 3 日後に腎臓でわずかに OTC-Q が検出された
11 のみで他の組織からは検出されなかった。腎臓も最終投与 5 日後には残留は
12 認められなかった。300 ppm 群では、腎臓を除く組織では最終投与 3 日後以
13 降残留は認められず、最終投与 7 日後には腎臓を含む全組織で OTC-Q の残
14 留は認められなかった。1,000 ppm (約 14 倍量) 群では、脂肪で最終投与 0
15 日後まで、血清及び小腸では最終投与 3 日後まで、筋肉では最終投与 5 日後
16 まで OTC-Q がわずかに検出されたが、その後は認められなかった。腎臓で
17 は、最終投与 7 日後でも残留が認められ、肝臓ではも最終投与 7 日後までわ
18 ずかに認められた (1/3 例)。(参照 10、11) [OTC-Q 抄録 p15、飼添 OTC-Q 抄録
19 p13、OTC-Q の豚による残留試験 II 分析試験-2]

20 21 22 ④ 単回筋肉内投与試験

23 豚(LW 種、雌雄、35 頭)を用いた 20 %OTC 製剤(1 mL 中 OTC を 200 mg(カ
24 穌)含有)の単回筋肉内投与 (OTC として 20 及び 40 mg/kg 体重) 試験が実
25 施された。20 mg/kg 体重群 (3 頭/時点) は、投与 1、5、10、15、20、25 及
26 び 30 日後に、40 mg/kg 体重群 (2 頭/時点) は、投与 1、15、20、25、30
27 及び 35 日後に主要組織 (心臓、肺、肝臓、腎臓、筋肉、脂肪、小腸、大腸及
28 び投与部位筋肉) を採取し、バイオアッセイにより残留性について検討した
29 (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

30 結果を表 14 及び 15 に示した。
31
32
33
34
35
36
37
38
39

表 14 豚における OTC 20 mg/kg 体重を単回筋肉内投与後の平均組織中濃度 (mg/kg)

組織	投与後時間 (日)						
	1	5	10	15	20	25	30
心臓	1.26	0.29	0.10	<0.05	<0.05	—	—
肝臓	2.17	0.38	0.06	<0.05	<0.05	—	—
腎臓	9.97	1.80	0.29	0.10	0.08	<0.05	<0.05
筋肉	1.43	0.29	0.11	0.05	<0.05	<0.05	—
脂肪	0.30	0.11	0.06	<0.05	<0.05	—	—
小腸	1.02	0.36	0.26	0.13	<0.05	<0.05	—
大腸	1.53	0.26	0.09	0.06	<0.05	<0.05	—
注射部位	318	7.43	2.60	1.21	0.05	<0.05	<0.05

n=3 — : 分析せず 平均値の算出は<0.05 を 0.05 として計算した。

表 15 豚における OTC 40 mg/kg 体重を単回筋肉内投与後の平均組織中濃度 (mg/kg)

組織	投与後時間 (日)					
	1	15	20	25	30	35
心臓	1.97	0.08	<0.05	<0.05	—	—
肝臓	4.08	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05
腎臓	16.14	0.21	0.11	0.09	<0.05	<0.05
筋肉	2.03	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05
脂肪	0.99	<0.05	<0.05	—	—	—
小腸	1.59	<0.05	<0.05	—	—	—
大腸	3.07	<0.05	<0.05	<0.05	—	—
投与部位	2,858	44.00	2.54	0.16	<0.05	<0.05

n=2 — : 分析せず

20 mg/kg 体重群では、投与 1 日後の組織中濃度は、投与部位筋肉が最も高く (318 mg/kg)、次いで腎臓 (9.97 mg/kg) > 肝臓 > 大腸 > 筋肉 > 心臓 > 小腸 > 脂肪であった。特に脂肪は低濃度 (0.30 mg/kg) であった。投与 5 日後には急減し、投与 25 日後には、投与部位筋肉及び腎臓も含め全組織が検出限界未満となった。

40 mg/kg 体重群では、投与 1 日後の投与部位筋肉が特に高く (2,858 mg/kg)、次いで腎臓 (16.14 mg/kg) > 肝臓 > 大腸 > 筋肉 > 心臓 > 小腸 > 脂肪であった。その後、各組織とも減少し、投与 30 日後には全組織が検出限界未満となった。

(参照 9) [\[OTC 残留基準見直しに関する資料 4\]](#)

1 (7) 残留試験 (豚、TC)

2 豚を用いた CTC の 14 日間飲水投与 (24 mg/kg 体重/日) 試験が実施され
3 た。最終投与 4 日後の平均腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 0.2 及び 0.1 mg/kg
4 であった。(参照 12) [TRS864,p37]

5
6 (8) 残留試験 (豚、CTC)

7 ① 7 日間混餌投与試験

8 豚に CTC を 7 日間混餌投与 (400 ppm) した。最終投与 0 日後では肝臓及
9 び腎臓中濃度はそれぞれ 1.3 mg/kg 及び 2.7 mg/kg あったが、最終投与 3
10 日後以降は 10 %以下まで残留レベルが低下し、最終投与 3 日後の肝臓及び
11 腎臓中濃度はそれぞれ 0.11 及び 0.15 mg/kg、最終投与 5 日後にはそれぞれ
12 0.08 及び 0.11 mg/kg となった。(参照 8、12) [FAO CTCp52、TRS864]

13
14 ② 3 週間混餌投与試験

15 子豚を用いた CTC の 3 週間混餌投与 (50、200 及び 1,000 ppm) 試験が
16 実施され、血清中の CTC 濃度を測定した。200 ppm 以上投与群では、投与
17 開始 1 週間後より血清中に CTC が検出されたが、50 ppm 群では投与開始 3 週
18 後に初めて検出された。また、最終投与 2 日後には、1,000 ppm 群を除き血
19 清中に残留は認められなかった。(参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p61~62]

20
21 ③ 1 ヶ月間混餌投与試験

22 子豚 (ランドレース又は YL 種、3 頭/時点) を用いた CTC の 1 ヶ月間混餌
23 投与 (110、220 及び 550 ppm) 試験が実施され、最終投与 0、5、10 及び
24 15 日後の組織 (血漿、筋肉、肝臓及び腎臓) 中残留をバイオアッセイにより
25 測定した。

26 110 ppm 群では、最終投与 5 日後に残留はみられなかった。220 ppm 群で
27 は、最終投与 5 日後に肝臓及び腎臓の一部に残留が認められたが、最終投与
28 10 日後以降は検出されなかった。550 ppm 群では、最終投与 15 日後に全組
29 織が検出限界 (0.05 mg/kg 又は/L) 以下であった。(参照 6) [CTC 再評価申請
30 時概要 p62、⑦-25]

31
32 ④ 31 日間混餌投与試験

33 子豚 (15 頭/群) を用いた CTC の 31 日間混餌投与 (110 ppm) 試験が単
34 独又はスルファメサジン、スルファメサジン及びペニシリンと併用して実施
35 され、組織中の残留について検討された。

36 筋肉及び脂肪では、最終投与 0 日後に微量の残留が認められたが、最終投
37 与 3 日後には検出限界以下になった。肝臓及び腎臓では、無投薬対照群から
38 も抗菌活性が検出され結果の信頼性は十分ではないが、最終投与 7 日後でそ
39 れぞれ 0.07~0.09 及び 0.11~0.16 mg/kg の残留が認められた。(参照 3) [CTC

抄録 p8、⑤ CTC 含有飼料で飼育された家畜の可食部位からの CTC の残留の消失]

⑤ 60 日間混餌投与試験

子豚 (LH 種、5 頭/時点) を用いた CTC-HCl の 60 日間混餌投与 (200 ppm) 試験が実施され、最終投与 5 及び 7 日後の主要組織 (血清、筋肉、肝臓及び腎臓) 中の残留について検討された。その結果、CTC は最終投与直後の血清 3/5 例から検出されたのみで、他の組織からは検出されなかった。(参照 3) [⑥ 肉豚に対する CTC-HCl の残留調査試験]

⑥ 98 日間豚餌投与試験

子豚を用いた CTC の 98 日間混餌投与 (100 ppm) 試験が実施され、最終投与 5、7 及び 10 日後の残留について検討された。筋肉及び脂肪は、最終投与 5 日後には CTC が検出されなかったが、肝臓及び腎臓では最終投与 10 日後にも微量が検出された。(参照 6) [CTC 再評価申請時概要 p62]

⑦ 5 日間飲水投与試験

豚を用いた CTC の 5 日間飲水投与 (198 ppm) 試験が実施された。最終投与 2 日後に腎臓及び肝臓中濃度はそれぞれ 0.31 及び 0.05 mg/kg であった。(参照 8、12) [FAO CTC p50、TRS864]

(9) 残留試験 (羊、CTC)

限定的ではあるが、羊を用いた CTC の 42 日間混餌投与 (50 ppm) 試験が実施された。最終投与直後では、腎臓、肝臓、筋肉及び脂肪中濃度はそれぞれ 0.33、0.11、0.027 及び <0.025 mg/kg であった。最終投与 4 日後には、これらの組織から CTC の残留は検出されなかった。(参照 8、12) [FAO CTC p57、TRS864]

(10) 残留試験 (鶏、OTC)

① 10 日間混餌投与試験

鶏 (ブロイラー、10 週齢、6 羽/時点) を用いた OTC の 10 日間混餌投与 (220 ppm、低カルシウム飼料に添加) 試験が実施され、最終投与 0、1、2、3 及び 4 日後に主要組織 (肝臓、腎臓、筋肉、心臓、筋胃及び皮膚) 中の残留について検討した。その結果、最終投与 2 日後以降はいずれの組織においても OTC の残留は認められなかった (検出限界: 0.1~0.15 mg/kg)。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p7]

② 3 週間混餌投与試験

産卵鶏 (48 羽) を用いた OTC の 3 週間混餌投与 (220 ppm) 試験が実施され、最終投与 0、1、2、3、4、5、7 及び 14 日後に主要組織 (肝臓、腎臓、

1 筋肉、心臓及び皮膚/脂肪) 中の残留について検討した。その結果、最終投与
2 4 日後以降はいずれの組織においても OTC の残留は認められなかった (検出
3 限界 : 0.15~0.25 mg/kg)。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p7~8]

4 5 ③ 30 日間混餌投与試験

6 鶏 (ブロイラー、3 羽/群/時点) を用いた OTC-Q の 30 日間混餌投与 (55、
7 165 及び 550 ppm) 試験が実施された。投与中の中間時点、最終投与 0、3、
8 5 及び 7 日後の血清、筋肉、肝臓、腎臓、小腸及び脂肪中の OTC-Q 濃度をバ
9 イオアッセイにより測定した (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

10 55 ppm 群では、最終投与 3 日後以降、全例で OTC-Q の残留は認められな
11 かった。165 ppm 群では、最終投与 3 日後に肝臓、腎臓及び小腸でわずかに
12 検出されたのみで、最終投与 7 日後以降は腎臓の 1/3 例で検出限界値が認め
13 られた以外全ての組織で OTC-Q の残留は認められなかった。550 ppm 群で
14 は、最終投与 5 日後に筋肉、肝臓、腎臓及び小腸でわずかに検出されたが、
15 最終投与 7 日後には肝臓、腎臓及び小腸にそれぞれ 1 例ずつ検出限界値が認
16 められた以外残留は認められなかった。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p15、OTC-Q の
17 鶏による残留試験 II 分析試験-2]

18 19 ④ 8~10 週間混餌投与試験

20 鶏 (ブロイラー、雛、15 羽/群) を用いた OTC の 8~10 週間混餌投与 (102
21 及び 500 ppm) 試験が実施された。最終投与 12 時間後の肝臓、腎臓、胸筋、
22 筋胃及び血液中において OTC の残留は認められなかった。(参照 10) [OTC-Q
23 抄録 p7]

24 25 ⑤ 10 週間混餌投与試験

26 鶏 (ブロイラー、雛、雌雄各 3 羽) を用いた OTC の 10 週間混餌投与 (8.16
27 ppm) 試験が実施された。最終投与 0 日後の肝臓、股筋及び筋胃のいずれの
28 組織においても OTC の残留は認められなかった。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p7]

29 30 ⑥ 連続混餌投与試験 (投与期間未記載)

31 鶏を用いた OTC の連続混餌投与 (5.5、55、110、220、551、1,103、2,756
32 及び 5,513 ppm、投与期間未記載) 試験が実施され、最終投与 0、1、2、3、
33 5 及び 7 日後の組織 (肝臓、腎臓、筋肉、心臓、大腸及び肺) 中の残留につ
34 いて検討した (検出限界 : 0.08~0.1 mg/kg)。

35 5.5 及び 55 ppm 群では最終投与 0 日後以降、110~551 ppm 群では最終投
36 与 1 日後以降、及び 1,103 ppm 群では最終投与 3 日後以降、いずれも OTC
37 の残留は認められなかった。2,756 及び 5,513 ppm 群では、最終投与 5 日後
38 以降は残留が認められなかった。(参照 10、11) [OTC-Q 抄録 p7、飼添 OTC-Q 抄
39 録 p6]

1
2 (1 1) 残留試験 (卵、OTC)

3 ① 7日間混餌投与試験

4 採卵鶏を用いた OTC 製剤の 7 日間混餌投与 (OTC として 100、200 及び
5 400 ppm) 試験が実施された。投与開始 4 日後、並びに最終投与 0、1、2、4
6 及び 7 日後に各群より 4 個ずつ採卵し、卵黄 2 個をあわせて 1 検体として OTC
7 濃度を測定した。また、最終投与 0、4 及び 7 日後においては卵白についても
8 OTC 濃度を測定した (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

9 100 ppm 群では、最終投与 0 日後の卵黄 1 検体から 0.05 mg/kg の OTC が
10 検出されたのみで、他の卵黄及び卵白に残留はみられなかった。200 ppm 群
11 では、最終投与 2 日後まで卵黄に OTC が検出されたが、卵白には残留は認め
12 られなかった。400 ppm 群では、最終投与 4 日後まで卵黄に検出されたが、
13 卵白では最終投与 0 日後の 2/4 個に残留が認められたのみであった。(参照
14 10) [OTC-Q 抄録 p16]

15
16 ② 7日間飲水投与試験

17 採卵鶏を用いた OTC 製剤の 7 日間飲水投与 (OTC として 10、20 及び 40
18 mg(力価)/kg 体重/日) 試験が実施された。投与開始 4 日後、並びに最終投与
19 0、1、2、4 及び 7 日後に各群より 6 個ずつ採卵し、卵黄 2 個をあわせて 1
20 検体とし、1 検体につき 2 回 OTC 濃度を測定した。また、最終投与 0、4 及
21 び 7 日後においては卵白についても OTC 濃度を測定した (検出限界 : 0.05
22 mg/kg)。

23 10 mg(力価)/kg 体重/日群では、卵黄及び卵白のいずれの検体からも OTC
24 は検出されなかった。20 mg(力価)/kg 体重/日群では、卵黄から最終投与 1 日
25 後に OTC が検出されたが、それ以降は検出されず、いずれの卵白にも残留は
26 認められなかった。40 mg(力価)/kg 体重/日群では、卵黄は最終投与 4 日後ま
27 で、卵白は最終投与 0 日後にのみ OTC が検出された。(参照 10) [OTC-Q 抄録
28 p16]

29
30 (1 2) 残留試験 (鶏、TC)

31 鶏を用いた TC の 5 日間飲水投与 (620 ppm) 試験が実施された。最終投
32 与 24 時間後の平均腎臓及び肝臓中濃度は、それぞれ 1.4 及び 0.2 mg/kg であ
33 った。最終投与 4 日後の全卵中残留は 0.27 mg/kg で、最終投与 10 日後には
34 <0.06 mg/kg に低下した。(参照 12) [TRS864]

35
36 (1 3) 残留試験 (鶏、CTC)

37 ① 5日間混餌投与試験

38 鶏 (10 週齢、5 羽/時点) を用いた CTC の 5 日間混餌投与 (0、800、1,200、
39 1,600 及び 2,000 ppm) 試験が実施され、最終投与 0、1、3 及び 6 日後の組

1 織（筋肉、肝臓、腎臓及び脂肪）中濃度を測定した（検出限界：0.025 mg/kg）。
2 腎臓を除いた組織では、最終投与数日後で全例が検出限界未満となった。
3 筋肉、肝臓及び脂肪からは、800 ppm 群ではそれぞれ最終投与 3、6 及び 1
4 日後以降検出されず、1,200 ppm 以上投与群では 1,600 ppm 群の肝臓を除き、
5 最終投与 6 日後にはいずれの組織にも残留はみられなかった。腎臓では、混
6 餌濃度に比例して残留量も増加し、全投与群で最終投与 6 日後にも残留が認
7 められた。（参照 3）[\[CTC 抄録、可食部からの CTC の消失\]](#)

9 ② 6 日間混餌投与試験

10 鶏を用いた CTC の 6 日間混餌投与（100～1,000 ppm）試験が実施され、
11 肝臓及び筋肉中の CTC 濃度を測定した。その結果、100 ppm 群では、最終
12 投与 0 日後でも検出されず、200 及び 1,000 ppm 群では、最終投与 2 日後に
13 消失した。（参照 6）[\[再評価申請時概要 p59\]](#)

15 ③ 7 日間混餌投与試験

16 鶏を用いた CTC の 7 日間混餌投与（8,000 ppm）試験が実施され、最終投
17 与 1、2、3 及び 5 日後の肝臓中濃度を測定した。最終投与 3 日後では 1/5 例
18 に検出されたが、最終投与 5 日後にはいずれの検体からも検出されなかった。
19 （参照 6）[\[再評価申請時概要 p60\]](#)

21 ④ 1 週間混餌投与試験

22 鶏を用いた CTC の 1 週間混餌投与（20～6,000 ppm）試験が実施された後、
23 血清中の CTC 濃度を測定した。600～6,000 ppm 群では CTC が検出された
24 が、20、60 及び 200 ppm 群ではいずれの検体からも検出されなかった。（参
25 照 6）[\[再評価申請時概要 p59\]](#)

27 ⑤ 3 週間混餌投与試験

28 鶏（初生雛）を用いた CTC の 3 週間混餌投与（220 ppm）試験が実施され、
29 CTC の残留について検討された。筋肉及び肝臓では最終投与 5 日後以降は検
30 出限界以下であったが、腎臓では最終投与 7 日後に 0.09 mg/kg が検出された。
31 （参照 3）[\[CTC 抄録 p9\]](#)

33 ⑥ 8 週間混餌投与試験

34 鶏（ブロイラー、雛）を用いた CTC の 8 週間混餌投与（55 及び 110 ppm）
35 試験が単独又はテレフタル酸（[TPA](#)）と併用（CTC は 55 ppm のみ）して実
36 施され、最終投与 12、24 及び 48 時間後の肝臓及び胸筋肉中の残留について
37 検討した。その結果、いずれの検体からも CTC は検出されなかった。（参照
38 3）[\[CTC 抄録 p9\]](#)

1 鶏（ブロイラー、雛）を用いた CTC の 8 週間混餌投与（20、500 及び 1,000
2 ppm）試験が実施され、最終投与 0、1、2、3、5 及び 7 日後の血液、胸筋肉
3 及び肝臓中の残留について検討した。CTC は、20 ppm 群では検出されな
4 かった。500 ppm 群では最終投与 0 日後のみ、1,000 ppm 群では、最終投与 0
5 日後の血液及び胸筋肉並びに最終投与 2 日後までの肝臓からのみ検出された。
6 （参照 3、6）[CTC 抄録 p9、⑦抗生物質の畜産物内残留に関する研究、再評価申請時概
7 要 p59]

8 9 ⑦ 60 日間混餌投与試験

10 鶏（~~ハバード種~~ブロイラー、雛、雌 40 羽/投与群）を用いた CTC の 60 日
11 間混餌投与（0、55、165 及び 550 ppm）試験が実施され、最終投与 0、1、2、
12 4 及び 7 日後の組織（血漿、肝臓、腎臓、筋肉、脂肪及び消化管）中濃度を
13 バイオアッセイにより測定した（検出限界：0.025 mg/kg）。

14 各組織中の残留量は混餌濃度に比例して増加した。最も高濃度の残留が認
15 められたのは腎臓で、次いで消化管＞肝臓＞筋肉＞血漿＞脂肪の順であった。
16 55 ppm 群では、最終投与 0 日後において血漿、筋肉及び脂肪に残留は認めら
17 れず、腎臓、肝臓及び消化管のみに CTC が検出されたが、肝臓及び消化管は
18 最終投与 1 日後に、腎臓は最終投与 4 日後に検出限界未満となった。165 及
19 び 550 ppm 群では、それぞれ最終投与 2 及び 4 日後に腎臓を除いて、全例が
20 検出限界未満となった。（参照 3）[CTC 抄録⑩CTC の鶏における残留試験]

21 22 ⑧ 8～10 週間混餌投与試験

23 鶏を用いた CTC の 8～10 週間混餌投与（220 及び 440 ppm）試験が実施
24 され、最終投与 12 時間後の組織（胸筋肉、肝臓、腎臓、筋胃及び血液）中の
25 残留について調べた結果、いずれの検体からも検出されなかった。（参照 6）
26 [再評価申請時概要 p59]

27 28 ⑨ 11 週間混餌投与試験

29 鶏を用いた CTC の 11 週間混餌投与（50 及び 100 ppm）後、血清中の CTC
30 濃度を測定した。最終投与 0 日後では CTC が検出されたが、最終投与 1 日後
31 には残留は認められなかった。（参照 6）[再評価申請時概要 p59]

32 33 ⑩ 12 週間混餌投与試験

34 鶏（雛）を用いた CTC の 12 週間混餌投与（50、100、150 及び 200 ppm）
35 試験が実施され、組織（腎臓、肝臓、可食組織及び血液）中の残留について
36 検討した。

37 50 ppm 群では、最終投与 1 日後にいずれの組織においても残留は認めら
38 れなかった。100 ppm 以上投与群では、最終投与 3 日後にいずれの群でも腎
39 臓のみに残留が認められたが、他の組織からは検出されなかった。（参照 6）

1 [再評価申請時概要 p60]

2
3 ⑪ 連続継続的混餌投与試験（投与期間未記載）

4 鶏を用いた CTC の~~連続継続的（投与期間未記載）~~な混餌投与（200 ppm、
5 投与期間未記載）試験が実施された。その結果、最終投与 1 日後に腎臓及び
6 肝臓中濃度はそれぞれ 0.3 及び 0.05 mg/kg であった。（参照 12）[TRS864、p36]

7
8 ⑫ 3 日間飲水及び混餌投与試験

9 鶏（ブロイラー）を用いた CTC の 3 日間飲水（528 ppm）及び混餌投与（200
10 ppm）試験が実施された。その結果、最終投与 2 日後に腎臓及び肝臓中濃度
11 はそれぞれ 0.5 及び 0.09 mg/kg であった。（参照 12）[TRS864]

12
13 (14) 残留試験（卵、CTC）

14 ① 7 日間混餌投与試験

15 産卵鶏（35 羽）を用いた CTC の 7 日間混餌投与（8,000 ppm）試験が実
16 施され、投与開始から最終投与 7 日後まで毎日卵中 CTC 濃度を測定した。

17 その結果、投与開始 1 日後より CTC の卵中への移行が認められたが、卵白
18 では最終投与 3 日後に、卵黄では最終投与 6 日後に消失した。（参照 6）[再評
19 価申請時概要 p61、⑦-18]

20
21 産卵鶏（8 羽/群）を用いた CTC-HCl の 7 日間混餌投与（0、20、500 及び
22 1,000 ppm）試験が実施され、最終投与 14 日後まで卵中の CTC 含有量をバ
23 イオアッセイにより検討した。

24 20 ppm 群では、いずれの時点においても CTC の移行はみられなかった。
25 500 ppm 群では、投与開始 3 日後から最終投与 1 日後まで、1,000 ppm 群で
26 は、投与開始 2 日後から最終投与 5 日後まで卵中に移行がみられた。（参照 6）
27 [再評価申請時概要 p61、⑦-14]

28
29 ② 12～14 日間混餌投与試験

30 産卵鶏（白色レグホン、10 羽/群）を用いた CTC-HCl の混餌投与（110 及
31 び 440 ppm）試験が実施され、投与開始 12～14 日後までの卵中の CTC 含有
32 量をバイオアッセイにより検討した結果、いずれの群のいずれの時点におい
33 ても CTC の移行はみられなかった。（参照 6）[再評価申請時概要 p61、⑦-19]

34
35 ③ 2 週間混餌投与試験

36 産卵鶏（21 ヶ月齢、16 羽/群）を用いた CTC 及び~~テレフタル酸（TPA）~~の
37 2 週間混餌投与（CTC 単独：440 及び 550、CTC+TPA：440+3,000 ppm）試
38 験が実施され、投与開始 7 及び 14 日後、並びに最終投与 1 及び 3 日後の全
39 卵中の CTC 量をバイオアッセイにより検討した。

1 CTC 単独 440 ppm 群では CTC は検出されなかった。CTC 単独 550 ppm
2 群及び TPA 併用群では、投与開始 7 及び 14 日後並びに最終投与 1 日後に CTC
3 が検出されたが、最終投与 3 日後にはいずれの群からも検出されなかった。

4 (参照 6) [再評価申請時概要 p60、⑦-12]

5 6 ④ 20 日間混餌投与試験

7 産卵鶏に CTC を 20 日間混餌投与 (45 mg/羽/日) した結果、卵黄及び卵白
8 の他、卵殻にも CTC の移行が認められた。投与量が 2 mg/羽/日の場合は、投
9 与開始 5、10 及び 15 日後の卵黄及び卵白からは検出されず、投与開始 20 日
10 後に移行が認められた。(参照 6) [再評価申請時概要 p61、⑦-6]

11 12 ⑤ 3 週間混餌投与試験

13 産卵鶏を用いた CTC の 3 週間混餌投与 (3、10、50、100、200、2,000、
14 10,000 及び 20,000 ppm) 試験が実施され、投与開始から投与後に 1 週毎に
15 採卵し、CTC の残留性について検討した。

16 3~100 ppm 群では、全期間中において検出されなかった。200~20,000
17 ppm 群では投与期間中すべて卵中への移行が認められたが、最終投与 1 週後
18 に 200 ppm 群で、最終投与 2 週後に 2,000 及び 10,000 ppm 群で、最終投与
19 4 週間後に 20,000 ppm 群で CTC が消失した。(参照 6) [再評価申請時概要 p60~61、
20 ⑦-1]

21 22 ⑥ 45 日間混餌投与試験

23 産卵鶏 (14 ヶ月齢、20 羽/群) を用いた CTC の 45 日間混餌投与 (220、
24 440 及び 880 ppm) 試験が実施された。飼料は ~~テレフタル酸 (TPA)~~ を 3,000
25 ppm 添加されたものが用いられた。投与開始 30、35 及び 45 日後及び最終投
26 与 5 日後の CTC の卵中移行についてバイオアッセイにより検討した。

27 その結果、880 ppm 群でのみ CTC が検出され、投与開始 30 及び 45 日後
28 の移行量は、卵黄でそれぞれ 0.11 及び 0.09 mg/kg、卵白で 0.08 及び 0.09
29 mg/kg、並びに全卵で 0.09 及び 0.10 mg/kg であったが、最終投与 5 日後で
30 はいずれの投与群からも検出されなかった。(参照 6) [再評価申請時概要 p60、
31 ⑦-12]

32 33 ⑦ 97 日間混餌投与試験

34 産卵鶏 (140 日齢、6 羽/群) を用いた CTC の 97 日間混餌投与 (0、50、
35 150 及び 200 ppm) 試験が実施され、投与開始 3 週後から投与終了日までは
36 隔日、最終投与後は毎日卵中の CTC 量を測定した (検出限界: 0.02 mg/kg)。

37 50 ppm 群では、投与 43 日後まで CTC が検出されなかったが、それ以降
38 は検出限界付近の残留が認められた。100 ppm 以上投与群では大部分に CTC
39 が検出された。50 ppm 群では最終投与 1 日後に 100 ppm 群では最終投与 2

1 日後に、150 及び 200 ppm では最終投与 3 日後に消失した。(参照 6) [再評価
2 申請時概要 p61、⑦-16]

3 4 ⑧ 連続混餌投与試験 (投与期間未記載)

5 産卵鶏に CTC を連続混餌投与 (125、250、500、750 及び 1,000 ppm、投
6 与期間未記載) して、卵中移行量について検討した。125 及び 250 ppm 群で
7 は CTC は検出されなかったが、500 ppm 以上投与群では、卵中への移行が
8 認められた。(参照 6) [再評価申請時概要 p60]

9 10 ⑨ 7 日間以上混餌及び飲水投与試験

11 産卵鶏に CTC を 7 日間飲水投与 (120 ppm) したところ、最終投与直後の
12 卵中濃度は <0.05 mg/kg であったが、同じ期間以上混餌投与 (600 ppm) し
13 た場合、最終投与 1 日後の卵中濃度は 0.19 mg/kg であった。(参照 12)
14 [TRS864]

15 16 (15) 残留試験 (七面鳥、CTC)

17 ① 混餌投与試験 (投与期間未記載)

18 七面鳥を用いた CTC の混餌投与 (600 ppm) 試験が実施された。最終投与
19 4 日後の平均腎臓及び肝臓中濃度はそれぞれ 0.4 及び 0.1 mg/kg であった。(参
20 照 12) [TRS864]

21 22 ② 3 日間飲水投与試験

23 七面鳥を用いた CTC の 3 日間飲水投与 (528 ppm) 試験が実施された。最
24 終投与 4 日後の平均腎臓及び肝臓中濃度はそれぞれ 0.4 及び 0.1 mg/kg であ
25 った。(参照 12) [TRS864]

26 27 (16) 残留試験 (魚介類、OTC、CTC)

28 ① はまちぶりの混餌投与試験

29 ぶりをを用いた OTC-HCl の 7 日間混餌投与 (100 及び 200 mg/kg 体重/日)
30 試験が実施され、投与開始 4 日後、並びに最終投与 0、3、5、7、10、15、
31 20、25 及び 30 日後に、血漿、筋肉、肝臓、腎臓及び腸管における OTC の残
32 留について調べた (検出限界：0.05 mg/kg)。

33 100 mg/kg 体重/日群では最終投与 15 日後に、200 mg/kg 体重/日群では最
34 終投与 20 日後に、いずれの組織からも OTC の残留が認められなくなった。
35 (参照 10) [OTC-Q 抄録 p8]

36
37 ぶりをを用いた OTC-Q の 7 日間混餌投与 (50 mg/kg 体重/日) 試験が実施さ
38 れ、最終投与 4 時間後、並びに 5、10、15、20、25、28、30 及び 35 日後に、
39 血漿、筋肉、肝臓及び腎臓における OTC の残留について調べた (検出限界：

1 0.05 mg/kg。

2 血漿では最終投与 10 日後に、肝臓では最終投与 15 日後に、筋肉及び腎臓
3 では最終投与 20 日後に OTC 濃度は検出限界以下になった。(参照 10) [OTC-Q
4 抄録 p8]

5
6 はまちぶり (体重約 600 g) を用いた CTC の 3 日間混餌投与 (80 mg/kg
7 体重/日) 試験が実施され、最終投与 5、15、24、48、72 及び 120 時間後の
8 血液、筋肉 (赤身及び白身)、肝臓及び脾臓中の残留についてバイオアッセイ
9 により検討した。

10 最終投与 48 時間後には筋肉 (白身) 及び肝臓中から検出されたが、最終投
11 与 72 時間後には消失した。TPA テレフタル酸 (800 mg/kg 体重/日) を併用
12 した場合、肝臓中の残留時間が延長し、最終投与 120 時間後にも検出された。
13 (参照 6) [CTC-HCl 抄録 p63、⑦-10]

14 15 ② えびの混餌投与試験

16 うしえび (体重 30~40 g、6 尾/群/時点) を用いた OTC の 5 日間混餌投与
17 (2,500 及び 5,000 ppm ; ペレット又は魚肉飼料) による残留試験が実施さ
18 れた。筋肉中濃度は投与開始 20 日後まで 1 日 2 回、HPLC により調べた (検
19 出限界 : 0.01 mg/kg)。

20 投与開始後 5 日間の 2,500 及び 5,000 ppm 群における OTC の筋肉中濃度
21 は、魚肉飼料群でそれぞれ 3~17 及び 12~40 mg/kg であったのに対し、ペ
22 レット群ではそれぞれ 0.2~1.5 及び 1~3 mg/kg であった。平均最高残留濃
23 度は最終投与 1 日後に観察され、2,500 ppm 群では、魚肉飼料及びペレット
24 群でそれぞれ 1.2 及び 0.45 mg/kg であり、5,000 ppm 群ではそれぞれ 20.0
25 及び 0.75 mg/kg であった。

26 筋肉中残留は、魚肉飼料及びペレット群では最終投与それぞれ 10 及び 3
27 日後まで検出された。魚肉飼料で混餌投与された えびエビ における OTC の半
28 減期は 1.2 日であった。(参照 12、13) [TRS864、FAO OTC127,129]

29 30 ④③ ひらめの混餌投与試験

31 ひらめを用いた OTC-Q の 7 日間混餌投与 (100 mg/kg 体重/日) 試験が実
32 施され、投与最終投与 2、9、18、27 及び 36 日後に、筋肉中の OTC の残留
33 について調べた (検出限界 : 0.05 mg/kg)。

34 最終投与 27 日後には 1/5 例のみ 0.06 mg/kg が検出されたのみで、4/5
35 例は検出限界以下であった。最終投与 36 日後には全例で OTC の残留は認め
36 られなかった。(参照 10) [OTC-Q 抄録 p9]

37 38 ⑤④ ウナギうなぎの混餌投与試験及び薬浴試験

39 ウナギうなぎ (体重約 130 g、5 尾/時点) を用いた CTC の 7 日間混餌投与

1 (50 mg/kg 体重/日) 試験が実施され、最終投与 ~~1～日後から~~10 日後までの
2 血液、筋肉、腎臓、肝臓及び脾臓中の残留についてバイオアッセイにより検
3 討した。

4 その結果、最終投与 2 日後の 1/5 例の肝臓に残留が認められたが、最終投
5 与 3 日後には、各組織から消失した。(参照 6) [CTC-HCl 抄録 p63、⑦-22]

6
7 CTC 溶液 (30 ppm) でウナギ (体重約 130 g、4 尾/時点) を 5 日間
8 薬浴させた後、薬浴終了 ~~1～日後から~~10 日後までの筋肉、肝臓及び腎臓中の
9 濃度をバイオアッセイにより測定した。

10 筋肉及び腎臓では薬浴終了 24 時間後には検出されなかったが、肝臓では薬
11 浴終了 3 日後まで残留が認められたが、薬浴終了 4 日後には消失した。(参照
12 6) [CTC-HCl 抄録 p63、⑦-23]

13 14 ⑥⑤ アユあゆの混餌投与試験

15 アユあゆ (体重約 60 g、6 尾/時点) を用いた CTC の 7 日間混餌投与 (50
16 mg/kg 体重/日) 試験が実施され、最終投与 24 時間 (1 日) ~~～後から~~7 日後
17 までの血液、肝臓、腎臓及び筋肉中の残留についてバイオアッセイにより検
18 討した。各組織の試料は 3 尾分ずつプールして測定した。

19 その結果、最終投与 5 日後まで残留が認められたが、最終投与 6 日後には
20 全例が検出限界以下となった。(参照 6) [CTC-HCl 抄録 p63、⑦-21]

21 22 ⑦⑥ ギンザケの混餌投与試験

23 ギンザケの幼魚 (体重 13～62 g) を用いた OTC 製剤の 10 日間混餌投与
24 (7,900 ppm : 79 mg/kg 体重/日) による残留試験が実施された。平均水温は
25 6℃。最終投与 1、4、8、14 及び 19 日後に ~~皮/魚肉~~皮付き魚肉を HPLC (検
26 出限界 : 0.005 mg/kg、定量限界 : 0.018 mg/kg) により分析した。OTC は最
27 終投与 1 日後の 0.21～2.0 mg/kg から最終投与 19 日後には <0.02～0.06
28 mg/kg に減少し、終末 T_{1/2} は 4.9 日であった。(参照 18、19) [TRS911、FAO OTC
29 p62]

30 31 ⑧⑦ ウォールアイの混餌投与試験

32 ウォールアイ (平均体重 59 g) を用いた OTC の 10 日間混餌投与 (2,000
33 ppm : 82 mg/kg 体重/日) による残留試験が実施された。平均水温は 18℃。
34 最終投与 1、2、3、7、9、11 及び 14 日後に ~~皮/魚肉~~皮付き魚肉を HPLC (検
35 出限界 : 0.007 mg/kg、定量限界 : 0.024 mg/kg) により分析した。平均残留
36 濃度は最終投与 1 日後の 0.72 mg/kg から最終投与 14 日後には 0.30 mg/kg に
37 減少し、終末 T_{1/2} は 10.5 日であった。~~平均魚肉中濃度は、体薬 14 日後の暫
38 定 MRL (0.2 mg/kg) の 1.5 倍以上であった。~~(参照 18、19、20) [TRS911、
39 FAO OTC p62、APVMAp4]

⑨⑧ カワカマスの混餌投与試験

2 群のカワカマス（9ヶ月齢、平均体重 110 及び 120 g）を用いた OTC 製剤の 10 日間混餌投与による残留試験が実施された。1 群にはサケ用飼料（2,700 ppm、66 mg/kg 体重/日）を投与し、もう 1 群にはゆっくり沈むウォールアイ用飼料（3,300 ppm、87 mg/kg 体重/日）を投与した。平均水温は 14°C で、~~皮/魚肉~~皮付き魚肉を HPLC（検出限界：6.5 µg/kg、定量限界：24.0 µg/kg）により分析した。サケ用飼料投与群の魚肉中の OTC の平均残留濃度は最終投与 11 日後の 0.20 mg/kg から最終投与 20 日後の 0.07 mg/kg に減少し、終末 T_{1/2} は 5.9 日であった。ゆっくり沈むウォールアイ用飼料投与群の魚肉中濃度は最終投与 11 日後の 0.31 mg/kg から最終投与 20 日後の 0.13 mg/kg に減少し、終末 T_{1/2} は 6.7 日であった。（参照 18、19、20）[TRS911]、[FAO OTC p62]、[APVMAp4]

カワカマス（平均体重 52.7 g、4~5 尾/時点）を用いた OTC の 10 日間混餌投与（103 mg/kg 体重/日）による残留試験が実施され、最終投与 1、2、4 及び 8 日後に魚肉（皮を除く）中の残留について検討した。平均水温は 13.8 ±0.1°C であった。最終投与 8 日後の魚肉中 OTC 濃度はほぼ 0.4 mg/kg で、1 コンパートメントモデルを用いた T_{1/2} は 3.3 日であった。（参照 20）[APVMAp4]

⑩ とらふぐの混餌投与試験

とらふぐ（平均体重 938 g、5 尾/時点）を用いた OTC 製剤の 7 日間経口混餌投与（100 mg(力価)/kg 体重/日）試験が実施され、最終投与 9、18、27、36 及び 45 日後の筋肉及び肝臓中濃度を HPLC により測定した（検出限界：0.01 µg/kg）。

結果を表 16 に示した。

表 16 とらふぐにおける OTC 製剤の 7 日間経口混餌投与後の平均組織中残留① (mg(力価)/kg)

組織	最終投与後時間（日）				
	9	18	27	36	45
筋肉	0.47	0.12	<0.01~0.04	<0.01~0.05	<0.01
肝臓	0.67	0.19	0.03	<0.01~0.06	<0.01

検出限界：0.01 µg/kg

筋肉及び肝臓ともに最終投与 45 日後には全例の組織中濃度が検出限界未満となった。（参照 13）[OTC-HCl 概要 p9、OTC-HCl 資料 7]

とらふぐ（平均体重 238 g、5 尾/時点）を用いた OTC 製剤の 7 日間経口投

1 与 (100 mg(力価)/kg 体重/日) 試験が実施され、最終投与 9、18、27、36 及
 2 び 45 日後に筋肉及び肝臓中濃度を HPLC により測定した (検出限界 : 0.01
 3 mg/kg)。

4 結果を表 17 に示した。

5
 6 表 17 とらふぐにおける OTC 製剤の 7 日間経口投与後の平均組織中残留②
 7 (mg(力価)/kg)

組織	最終投与後時間 (日)				
	9	18	27	36	45
筋肉	0.05	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
肝臓	0.06	<0.01~0.03	<0.01	<0.01	<0.01

8 検出限界 : 0.01 mg/kg

9
 10 筋肉及び肝臓ともに最終投与 27 日後には全例の組織中濃度が検出限界未
 11 満となった。(参照 14) [OTC-HCl 概要 p9]

12 3. 遺伝毒性試験

14 OTC、CTC 及び ETC の遺伝毒性に関する各種の *in vitro* 及び *in vivo* 試験の
 15 結果を表 18、19 及び 20 に示した。(参照 4、5、16) [FAS27、36、農薬抄録 p42
 16 表、p91~92、EPA RED p9]

17
 18
 19 表 18 OTC の遺伝毒性試験結果 (参照 5) [FAS27 2.2.7]

	試験	対象	用量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> TA1535、TA1537、 TA1538、TA98、TA100	1 µg/plate (±S9)	陰性 (1980)
		<i>S.typhimurium</i> TA1535、TA1537、TA98、 TA100	0~1 µg/plate (±S9)	陰性 (1987)
		<i>Bacillus subtilis</i> H17、M45	2、10、20、100、200、 500、1,000、2,000 mg/disk	陰性 農薬抄録 p42 表(1978)
		<i>S.typhimurium</i> TA1535、TA1537、 TA1538、TA98、TA100 <i>Escherichia coli</i> WP2hcr	0.05、0.1、0.5、10、 50、100 mg/plate (±S9)	陰性 農薬抄録 p42 表、p91~92、 OTC-Q 抄録 p12 (1978)

	<u>マウスリンフ</u> <u>ホーマ</u> 前進突 然変異試験	<u>マウスリンフ</u> <u>ホーマ</u> L5178Y/TK ^{+/-} 細胞	12.5~800 µg/mL <u>毒性あり>400µg/mL</u> 25~400 µg/mL <u>毒性あり≥200µg/mL</u> (±S9)	陰性(-S9) 陽性(+S9) ¹⁾ (1987)
	染色体異常試 験	CHO 細胞	80~200 µg/mL 700~900 µg/mL (±S9)	陰性 (1987)
CHL V79 細胞		3.75、7.5、15、30、 60 µg/mL (-S9)	陰性 農薬抄録 p42 表、p93~94 (1991)	
		7.81、15.63、31.25、 62.5、125 µg/mL (±S9)	陰性 農薬抄録 p42 表、p93~94 (1991)	
	姉妹染色分体 交換試験	CHO 細胞	60、70、80 µg/mL 400、500 µg/mL (±S9)	陰性 (1987)
<i>in vivo</i>	小核試験	マウス	50、250、500 mg/kg 体重 24h 間隔 2 回投与	陽性 ²⁾ (1983)
		マウス (ICR 系、7 週齢、 雄 5 匹/群) 骨髓細胞	500、1,000、2,000 mg/kg 体重 単回強制経口投与	陰性 農薬抄録 p42 表、p95~94 (2003)
	宿主経路試験	マウス <i>S.typhimurium</i> G46	100 mg/kg 体重	陰性 (1983)

1) : +S9 下で細胞毒性が生じる濃度においてのみ変異がみられた。

2) : 小核増加に用量相関性はなかった。

3

4

5 表 19 CTC の遺伝毒性試験結果 (参照 4) FAS36.2.2.6.

	試験	対象	用量	結果
<i>in vitro</i>	<u>復帰突然変異</u> Ames 試験	<i>S.typhimurium</i> TA100, TA98, TA1535, TA1337, TA1538 <i>E. coli</i> WP-2uvrA-	0.1~15 µg/plate 毒性あり>1.0 µg/plate (±S9)	陰性 (1989)
		<i>S.typhimurium</i> TA100, TA98, TA1535, TA1537 <i>E. coli</i> WP-2uvrA-	~10 µg/plate 毒性あり (±S9)	陰性 (1989)

	HGPRT 試験	CHO 細胞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 20~100 µg/mL(+S9) ・ 25~125 µg/mL(-S9) 最高用量で毒性あり	陰性 (1988)
	不定期 DNA 合成 UDS 試験	ラット肝細胞	25~75 µg/mL	陰性 (1988)
<i>in vivo</i>	染色体異常試験	ラット	500、2,500、5,000 mg/kg 体重	陰性 (1988)
		ヤハズエンドウ レンズマメ Lens-eseulentes	1 %水溶液 1 %水溶液	陰性 陰性 ¹⁾ (1988)

1) : 不確実な結果

2
3
4

表 20 TC の遺伝毒性試験結果 (参照 4) **FAS362.2.6.**

	試験	対象	用量	結果
<i>in vitro</i>	Ames 試験	<i>S.typhimurium</i> TA100, TA98, TA1535, TA1537	0~10 µg/plate 毒性あり ≥ 3 µg/plate (± S9)	陰性 (1989)
	マウスリンフォーマ前 進突然変異 試験	マウスリンフォーマ L5178Y/TK^{+/-}細胞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 25~300 µg/mL(-S9) 毒性あり ≥ 200 µg/mL ・ 10~120 µg/mL(+S9) ・ 20~120 µg/mL(+S9) 	陰性 陰性 弱陽性 (1989)
	姉妹染色分 体交換試験	CHO 細胞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5~49.9 µg/mL(-S9) 毒性あり ≥ 40.2 µg/mL ・ 302~600 µg/mL(+S9) 毒性あり: 600 µg/mL 	陰性 陰性 (1989)
	染色体異常 試験	ヒトリンパ球		10 µg/mL
CHO 細胞			<ul style="list-style-type: none"> ・ 39.9~400 µg/mL(-S9) 毒性あり: 400 µg/mL ・ 1,000~2,750 µg/mL (+S9) 	陰性 陰性 (1989)
	遺伝子突然 変異試験	C3H マウス由来 FM3A 細胞	10~100 µg/mL	陽性 ⇕ (1976)
<i>in vivo</i>	染色体異常 試験	タマネギ	12~20 µg/mL	陽性 ⇕ (1976)

	SLRL 試験	キイロショウジョウバエ	注射：5,000~5,300 ppm 混餌：9,005 ppm	陰性 陰性 (1989)
--	---------	-------------	------------------------------------	--------------------

1) : タンパク質合成阻害によるもの。

OTC は、*in vitro* の前進突然変異試験 (+S9) で細胞毒性が生じる濃度においてのみ陽性の結果が得られたが、*in vivo* の小核試験での陽性結果に用量依存性はみられなかった。

TC は、*in vitro* の哺乳動物細胞を用いた遺伝子突然変異試験及び *in vivo* の植物における染色体異常試験で陽性の結果が得られたが、いずれも TC がリボソームと結合することで起こるタンパク質合成阻害によるものと考えられた。

CTC は、全ての遺伝毒性試験において陰性の結果が得られている。

以上のことから、TC 類は生体にとって問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。

4. 急性毒性試験

(1) マウス及びラットにおける急性毒性試験

マウス及びラットにおける OTC、TC 及び CTC の LD₅₀ を表 21、22 及び 23 にまとめた。(参照 3、4、5、6、10、16) [FAS27 2.2.1、FAS36 2.2.1、農薬抄録 p45/46、CTC 抄録、CTC 再評価資料、OTC-Q 抄録]

表 21 マウス及びラットにおける OTC の LD₅₀ (参照 5) FAS27 2.2.1

動物種	雌雄	投与経路	投与物質	LD ₅₀ (mg/kg 体重)
マウス	雌雄	p.o.	OTC	>5,200*
	雌雄		OTC-HCl	7,200*
	雌雄		OTC-HCl	3,600~4,400*
	雌雄		OTC-HCl	154~189*
	雌雄		OTC-Q	>9,000*
	雌雄	i.v.	OTC-HCl	192*
	雌雄	s.c.	OTC-HCl	243~330*
	雌雄	i.p.	OTC-Q	279 (雄)、234 (雌) (OTC-Q 抄録)
ラット	雌雄	p.o.	OTC-Q	9,000 (OTC-Q 抄録)
	雌雄	i.v.	OTC-HCl	280*
	雌雄	s.c.	OTC-Q	5,886 (雄)、6,300 (雌) (OTC-Q 抄録)

	雌雄	i.p.	OTC-Q	518 (雄)、302 (雌) (OTC-Q 抄録)
--	--------------------	----------------------	-----------------------	---

* : OTC 換算値、p.o. : 経口投与、i.v. : 静脈内投与、s.c. : 皮下投与、i.p. : 腹腔内投与

表 22 マウス及びラットにおける CTC の LD₅₀ (参照 4) [FAS36 2.2.1](#)

動物種	雌雄	投与経路	投与物質	LD ₅₀ (mg/kg 体重)
マウス	雌雄	p.o.	CTC	>10,000 (CTC 抄録)
	n.s.		CTC	>1,500
	雌雄		CTC-HCl	>3,000
	雌		CTC-HCl	2,150
	雌雄		CTC-HCl	3,350(雄)、 4,200(雌)
	雌雄	s.c.	CTC-HCl	5,500(雄)、 8,200(雌)
	雌	i.v.	CTC-HC	93
	雌雄	i.p.	CTC-HCl	128 (雄)、168 (雌)
ラット	雌雄	p.o.	CTC	>10,000 (CTC 抄録)
	雌雄		CTC-HCl	>3,000
	雌		CTC-HCl	>4,000
	n.s.		CTC-HCl	10,300(成獣)、 5,500(<2 日齢)
	雌		Ca-CTC	>10,000
	雌雄	i.v.	CTC-HCl	160
	n.s.		CTC 製剤	118
	n.s.	i.p.	CTC-HCl	335

p.o. : 経口投与、i.v. : 静脈内投与、s.c. : 皮下投与、i.p. : 腹腔内投与、n.s. : 特定せず

表 23 マウス及びラットにおける TC の LD₅₀ (参照 4) [FAS36 2.2.1](#)

動物種	雌雄	投与経路	投与物質	LD ₅₀ (mg/kg 体重)
マウス	n.s.	p.o.	TC	2,550
	n.s.		TC	>3,000
	n.s.		TC	808(42 日齢)、300(3 日齢)
	n.s.	i.v.	TC	157
	n.s.	i.p.	TC	330
ラット	雄	p.o.	TC-HCl	>4,000
	n.s.		TC	>3,000

	n.s.		TC	807(49 日齢)、360(3 日齢)
	n.s.		TC-HCl	6,443(成獣)、 3,827(<2 日齢)
	n.s.	i.v.	TC	128

p.o. : 経口投与、i.v. : 静脈内投与、i.p. : 腹腔内投与、n.s. : 特定せず

5. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性試験 (マウス、OTC)

マウス (ICR 系、雌雄各 12 匹/群) を用いた OTC-Q (純度 : 50.5 %) の混餌投与 (0、80、400、2,000、10,000、50,000 及び 100,000 ppm) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

一般状態は、50,000 ppm 以上投与群で著しい自発運動の減少及び衰弱がみられ、50,000 ppm 群で 22/24 例 (雄:12、雌:10) が、100,000 ppm 群で全例が死亡した。

体重は、10,000 ppm 群でわずかな増加抑制がみられた。50,000 ppm 群では初期に減少し、回復の徴候がみられたが、その後は増加抑制がみられた。

摂餌量については、100,000 ppm 群では忌避によりほとんど摂餌しなかった。50,000 ppm 群では、初期にはほとんど摂餌しなかったが、投与開始 5 週以降回復した。

血液学的検査では、50,000 ppm 群の雌で対照群に比べて Hb がわずかに低く、WBC 及び PLT~~+~~が多かった。

血液生化学的検査では、雌にエーテル麻酔の影響と考えられる血糖値の変動がみられたのみであった。

剖検では、途中死亡例で胃内に内容物はほとんどなく、皮下及び腹腔内脂肪が減少していた。最終投与後の剖検では、50,000 ppm 群で消瘦が著しく、皮下及び腹腔内脂肪がほとんど消耗していた以外注目すべき所見はみられなかった。

臓器重量~~で~~は、10,000 ppm 群の雌雄で肝臓重量が対照群に比べ減少した。50,000 ppm 群の雌では、心臓、肺、肝臓、腎臓及び脳の比重量が増加したが、体重減少によるものと考えられた。

病理組織学的検査では、投与に起因する影響はみられなかった。

本試験における NOAEL は、2,000 ppm (雄:173.5 mg/kg 体重/日、雌:225.4 mg/kg 体重/日) と考えられた。(参照 16) 【農薬抄録 p41 表、p53~56】1974

(2) 13 週間亜急性毒性試験 (マウス、OTC)

マウス (B6C3F1 系、雌雄各 10 匹/群) を用いた OTC-HCl の混餌投与 (0、3,100、6,300、12,500、25,000 及び 50,000 ppm (雄:392、741、1,845、3,821 及び 8,300 mg/kg 体重/日、雌:459、845、1,850、3,860 及び 7,990 mg/kg 体

1 重/日)) による 13 週間亜急性毒性試験が実施された。

2 投与に起因した死亡はみられず、摂餌量、体重、剖検及び病理組織学的検査
3 に投与に起因する影響はみられなかった。

4 体重は、25,000 ppm 以上投与群で、3~15 %減少した。

5 骨中 OTC 濃度は、50,000 ppm 群の雌にのみ蛍光分析により検出された。

6 本試験における NOAEL は 12,500 ppm (雄: 1,845 mg/kg 体重/日、
7 雌:1,850mg/kg 体重/日) と考えられた。資料中に記載なし。体重減少を毒性とみな
8 した。(参照 5) [FAS27 2.2.2.1]1987

9 10 (3) 6 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)

11 マウス (雄 10 匹/群) を用いた CTC の強制経口投与 (0、20 及び 100 mg/kg
12 体重/日、5 日/週投与) による 6 週間亜急性毒性試験が実施された。

13 100 mg/kg 体重/日群の血液学的検査で、有意な変化はみられなかった。両
14 投与群で成長促進が観察された。(参照 4) [FAS36 2.2.2.2]1954

15 16 (4) 12 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)

17 マウス (系統未記載、雄 20 匹/群) を用いた CTC の強制経口投与 (0、40
18 及び 200 mg/kg 体重/日) による 12 週間亜急性毒性試験が実施された。

19 一般状態、死亡率、体重、摂餌量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿
20 検査及び病理学的検査に投与による影響はみられなかった。

21 本試験における NOAEL は、最高用量である 200 mg/kg 体重/日と考えら
22 れた。(参照 3) [CTC 抄録 p9、別表 6-2]

23 24 (5) 14 週間亜急性毒性試験 (マウス、CTC)

25 マウス (系統未記載、雄 20 匹/群) を用いた CTC の経口投与 (0、40 及び
26 100 mg/kg 体重/日、5 日/週投与) による 14 週間亜急性毒性試験が実施され
27 た。試験開始 4 週以降、最高用量を 200 mg/kg 体重/日 (100 mg/kg 体重の 2
28 回/日投与) とした。

29 死亡率、一般状態、体重、血液学的検査、剖検及び病理組織学的検査にお
30 いて投与による影響はみられなかった。

31 本試験における NOAEL は、最高用量である 200 mg/kg 体重/日と考えら
32 れた。(参照 4) [FAS36 2.2.2.1]1948

33 34 (6) 6 週間亜急性毒性試験 (マウス、TC)

35 マウス (雄 10 匹/群) を用いた TC-HCl の強制経口投与 (0、20 及び 100 mg/kg
36 体重/日、5 日/週投与) による 6 週間亜急性毒性試験が実施された。被験動物
37 には、被験物質を 4~6 %含む 2 %デンプン溶液を投与した。

38 最終投与後に 100 mg/kg 体重/日群において血液学的検査を実施した結果、
39 有意な変化はみられなかった。投与群では、対照群と比較して成長速度の増

1 加がみられた。(参照 4) [FAS36 2.2.2.1] 1954

2 3 (7) 13 週間亜急性毒性試験 (マウス、TC)

4 マウス (B6C3F1 系、6~7 週齢、雌雄 10~15 匹/群) を用いた TC-HCl の
5 混餌投与 (0、3,100、6,300、12,500、25,000 及び 50,000 ppm : 0、470、
6 950、1,800、3,700 及び 7,500 mg/kg 体重/日) による 13 週間亜急性毒性試
7 験が実施された。

8 死亡例はみられなかった。

9 体重は、50,000 ppm 群で最終平均体重がわずかに (雄:16 %、雌:6 %) 減
10 少した。

11 骨中 TC 濃度は、TC-HCl の用量増加に伴い増加した。

12 本試験における NOAEL は 25,000 ppm (3,700 mg/kg 体重/日) と考えら
13 れた。資料中に記載なし。体重減少を毒性とみなした。(参照 4) :[FAS36 2.2.2.1]1989

14 15 (8) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット、OTC)

16 ラット (SD 系、雌雄各 12 匹/群) を用いた OTC-Q (純度 : 50.5 %) の混
17 餌投与 (0、80、400、2,000、10,000、50,000 及び 100,000 ppm) による 90
18 日間亜急性毒性試験が実施された。

19 一般状態では、100,000 ppm 群で著しく自発運動が減少し、全例が死亡し
20 た。

21 体重は、10,000 ppm 群の雄で投与開始 3~4 週にわずかな増加抑制がみら
22 れたが、50,000 ppm 群では投与開始期間を通じて増加抑制がみられた。

23 摂餌量は、100,000 ppm 群ではほとんど摂取しなかった。50,000 ppm 群
24 では、初期にはほとんど摂取しなかったが、投与開始 4 週以降からは体重当
25 たりの 1 日平均摂餌量は対照群より多くなり試験終了時まで持続した。

26 血液学的検査では、50,000 ppm 群で Hb 及び Ht の低下、PLT の増加傾向
27 がみられた。

28 血液生化学的検査では、いずれの検査項目も正常範囲内の変動であった。

29 剖検では、途中死亡例で胃内にほとんど内容物はなく、皮下及び腹腔内脂
30 肪が減少していた。最終投与後の剖検で、盲腸の膨大が 1,000 ppm 群でわず
31 かに、50,000 ppm 群で顕著に認められたが、この盲腸所見は、抗菌性物質の
32 投与による腸内細菌叢の変動に伴う変化であり、げっ歯類等の盲腸の特異性
33 を考慮すると、毒性学的意義に乏しい変化と考えられた。

34 臓器重量では、50,000 ppm 群の多くの臓器で絶対重量の減少がみられたが、
35 比重量では差がないか又は増加がみられ、体重増加抑制によるものと考えら
36 れた。

37 病理組織学的検査では、50,000 ppm 群の盲腸に著変は認められず、他に投
38 与に起因する影響はみられなかった。

39 以上より、本試験における NOAEL は 10,000 ppm (雄:871.6 mg/kg 体重/

1 日、雌:460.1 mg/kg 体重/日) と考えられた。(参照 16) [農薬抄録 p41 表、
2 p57~61]1974

3 4 (9) 13 週間亜急性毒性試験 (ラット、OTC)

5 ラット (F344/N 系、雌雄各 10 匹/群) を用いた OTC-HCl の混餌投与 (0、
6 3,100、6,300、12,500、25,000 及び 50,000 ppm (雄:198、394、778、1,576
7 及び 3,352 mg/kg 体重/日、雌:210、431、854、1,780 及び 3,494 mg/kg 体重
8 /日)) による 13 週間亜急性毒性試験が実施された。

9 投与に起因した死亡はみられず、摂餌量、体重及び剖検所見に投与に起因
10 する影響はみられなかった。

11 病理組織学的検査では、全投与群の雄でわずかな肝臓の細小葉周辺性
12 (periacinar) 脂肪変性がみられたが、用量相関性は認められなかった。な
13 お、対照群の結果は提出されていなかった。骨中の OTC 濃度は雌雄で検出さ
14 れ、用量相関的に増加した。骨中 OTC 濃度は、12,500 ppm 以上投与群の雌
15 で有意に増加し、雄では 50,000 ppm 群のみが有意に増加した。

16 本試験における NOAEL は最高用量である 50,000 ppm (雄:3,494 mg/kg
17 体重/日、雌:3,352 mg/kg 体重/日) と考えられた。資料中に記載なし (参照 5)
18 [FAS27 2.2.2.2]1987

19 20 専門委員コメント

21 (OTC, CTC, TC の試験が混在し、試験期間も前後していますが、記載順につ
22 いて他の評価書と整合するようにした方が見やすいと思います。)

23 24 (10) 30 日間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

25 ラット (Wistar 系、雌雄各 10 匹/群) を用いた菌糸体 CTC (純度:10.9%)
26 及び結晶 CTC の混餌投与 (菌糸体:40,000、80,000 及び 160,000 ppm、結
27 晶:9,300 ppm) による 30 日間亜急性毒性試験が実施された。

28 その結果、菌糸体 CTC の 80,000 ppm 以上投与群の雄で肝臓の脂肪変性が
29 みられた。

30 本試験における菌糸体 CTC の NOAEL は 40,000 ppm (CTC として 4,351.2
31 mg/kg 体重) と考えられた。(参照 3) [CTC 抄録 p9、別表 6-5]

32 33 (11) 12 週間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

34 ラット (系統未記載、雄 20 匹/群) を用いた CTC の強制経口投与 (0、10、
35 40 及び 200 mg/kg 体重/日) による 12 週間亜急性毒性試験が実施され、各種
36 検査が行われたが投与による影響はみられなかった。

37 本試験における NOAEL は、最高用量である 200 mg/kg 体重/日と考えら
38 れた。(参照 3) [CTC 抄録 p9、別表 6-3]

1 (12) 3ヶ月間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

2 ラット (系統未記載、20 匹/群) を用いた CTC の経口投与 (0、150 及び
3 300 mg/kg 体重/日) による 3ヶ月間亜急性毒性試験が実施された。

4 体重は、両投与群とも対照群より高値を示した。試験終了時の血液学的検
5 査に投与による影響はみられなかった。

6 本試験における NOAEL は、最高用量である 300 mg/kg 体重/日と考えら
7 れた。本文に記載なし (参照 4) :[FAS36 2.2.2.2]1956

8
9 (13) 14週間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

10 ラット (系統未記載、雄 20 匹/群) を用いた CTC の強制経口投与 (0、10、
11 40 及び 100 mg/kg 体重/日、5 日/週投与) による 14週間亜急性毒性試験が実
12 施された。試験開始 4 週以降、最高用量を 200 mg/kg 体重/日 (100 mg/kg
13 体重の 2 回/日投与) とした。

14 死亡率、一般状態、体重増加量、Hb、血圧、剖検所見及び病理組織学的検
15 査所見に投与による影響はみられなかった。

16 本試験における NOAEL は、最高用量である 200 mg/kg 体重/日と考えら
17 れた。(参照 4) [FAS36 2.2.2.2]1948

18
19 (14) 6ヶ月間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

20 ラット (系統未記載) を用いた CTC の強制経口投与 (0、0.1、1.0、10 及
21 び 50 mg/kg 体重/日) による 6ヶ月間亜急性毒性試験が実施された。

22 一般状態、死亡率、体重変化、摂餌量及び病理学的検査に投与による影響
23 は認められなかった。

24 本試験における NOAEL は、最高用量である 50 mg/kg 体重/日と考えられ
25 た。(参照 3) [CTC 抄録 p9、別表 6-4]

26
27 (15) 13週間亜急性毒性試験 (ラット、TC)

28 ラット (F344/N 系、7~8 週齢、雌雄 10~15 匹/群) を用いた TC-HCl の
29 混餌投与 (0、3,100、6,300、12,500、25,000 及び 50,000 ppm : 0、155、
30 315、625、1,250 及び 2,500 mg/kg 体重/日) による 13週間亜急性毒性試験
31 が実施された。

32 死亡例はみられなかった。

33 25,000 ppm 以上投与群の雄に肝臓の細胞質空胞化変性がみられた。25,000
34 ppm 以上投与群の雌雄では骨髄萎縮がみられた。

35 骨中 TC 濃度は、TC-HCl の用量増加に伴い増加した。

36 本試験における NOAEL は 12,500 ppm (625 mg/kg 体重/日) と考えられ
37 た。本文に記載なし (参照 4) [FAS36 2.2.2.1]1989

38

1 (16) 31日間亜急性毒性試験（イヌ、CTC）

2 イヌを用いた CTC の経口投与による 31 日間亜急性毒性試験が実施された。
3 最初の 17 日間は 100 mg/kg 体重/日を 1 日 1 回、続いて 14 日間は 100 mg/kg
4 体重/日を 1 日 2 回投与した。

5 その結果、一般状態、成長率、血液学的検査、剖検及び病理組織学的検査
6 において投与による影響はみられなかった。（参照 4） [FAS36 2.2.2.2]1956
7

8 (17) 9～15 週間亜急性毒性試験（イヌ、CTC）

9 イヌ（10 匹）を用いた CTC の経口投与（100 mg/kg 体重/日、2 回/日、5
10 日/週、カプセル投与）による 9～15 週間亜急性毒性試験が実施された。

11 一般状態、体重、血液学的検査、血液凝固時間、肝機能検査（BSP クリア
12 ランス）、腎機能検査（PSP クリアランス）、尿検査、剖検及び病理組織学的
13 検査において投与による影響はみられなかった。

14 本試験における NOAEL は、最高用量である 100 mg/kg 体重/日と考えら
15 れた。本文に記載なし（参照 4） [FAS36 2.2.2.2]1948
16

17 (18) 98 又は 121 日間亜急性毒性試験（イヌ、CTC）

18 イヌ（雑種、2～5 歳、10 匹）を用いた CTC の経口投与（250 mg/kg 体重
19 /日、6 日/週、カプセル投与）による 98 日間亜急性毒性試験が実施された。
20 また、別のイヌ（4 匹）を用いて、同量を 2 週間投与後 3 週間休薬の繰り返し
21 による投与方法で計 121 日間投与試験を実施した。

22 試験期間中、98 日間連続投与群の 5 例が死亡した。これらの動物では、持
23 続的な体重減少、無関心及び摂餌低下がみられた。

24 血液学的検査では、Hb、RBC、顆粒球及び総白血球数がわずかに減少した。

25 病理学的変化として、衰弱、脂肪肝、腎臓の脂肪過多（excess fat in the
26 kidney）、骨髄の枯渇（depletion of the bone marrow）並びに脾臓、リンパ
27 節及び骨格筋の萎縮等がみられた。（参照 4） [FAS36 2.2.2.2]1954
28

29 (19) 3ヶ月間亜急性毒性試験（イヌ、TC）

30 イヌ（雑種、4 匹/群）を用いた TC の経口投与（20 及び 200 mg/kg 体重/
31 日、5 日/週、2 回/日投与）による 3ヶ月間亜急性毒性試験が実施された。体
32 重、肝機能（BPS クリアランス）、腎機能（PSP クリアランス）、血液凝固時
33 間、非タンパク態窒素、血糖値及び血球数に投与による影響はみられなかつ
34 た。（参照 4） [FAS36 2.2.2.1]1954
35

36 (20) 98 日間亜急性毒性試験（イヌ、TC）

37 イヌ（雑種、8～4 匹/群）を用いた TC の経口投与（0 及び 250 mg/kg 体重
38 /日、6 日/週、カプセル投与）による 98 日間亜急性毒性試験が実施された。

39 死亡例はみられなかった。

1 血液学的検査及び病理学的検査における変化は認められなかった。(参照
2 4) [FAS36 2.2.2.1]1954

3 4 (2 1) 12 週間亜急性毒性試験 (マウス、ラット及びイヌ、CTC)

5 マウス、ラット及びイヌを用いた経口投与 (0、100 及び 200 mg/kg 体重/
6 日) による 12 週間亜急性毒性試験が実施された。

7 投与期間中、一般状態、体重、血液学的検査、血液生化学的検査、血圧並
8 びに肝及び腎機能検査において対照群との差はみられなかった。(参照 6) [CTC
9 再評価申請時抄録 p6]

10
11 (試験内容の不明部分の多いもの、記載内容の乏しいもの等を参考試験として
12 まとめました。)

13 (参考 1) 30 及び 90 日間亜急性毒性試験 (マウス及びラット、CTC)

14 マウス及びラットを用いて加熱処理した CTC の経口投与 (0、0.2 及び 2.0
15 mg/kg 体重/日) による 30 及び 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

16 成長、血液学的検査及び病理組織学的検査において対照群との差はみられ
17 なかった。(参照 6) [CTC 再評価申請時抄録 p6~7]

18 19 (参考 2) 28 日間亜急性毒性試験 (ラット、CTC)

20 ラット (Sherman 系、雌雄各 6 匹/群) を用いた CTC の混餌投与 (0、20,000
21 及び 50,000 ppm : 0、2,000 及び 5,000 mg/kg 体重/日) による 28 日間亜急
22 性毒性試験が実施された。

23 5,000 mg/kg 体重/日群で有意な体重増加抑制がみられた。他の項目につい
24 ては検討されなかった。(参照 4) [FAS36 2.2.2.2]1960

25 26 (参考 3) 6 週間亜急性毒性試験 (ウサギ、CTC)

27 ウサギを用いた CTC の混餌投与 (11、22 及び 44 ppm) による 6 週間亜
28 急性毒性試験が実施された。

29 その結果、44 ppm 群で、小腸及び盲腸の比重量が有意に減少したほか異
30 常は認められなかった。(参照 6) [CTC 再評価申請時抄録 p6]

31 32 (参考 4) 亜急性毒性試験 (モルモット、CTC)

33 モルモットを用いた CTC の混餌投与 (100 ppm) による亜急性毒性試験が
34 実施された。投与開始 2 日後から体重減少がみられ、投与開始 10 日後までに
35 6/9 例が死亡した。残りの 2/3 例も投与開始 5~6 週後に死亡した。(参照 6)
36 [CTC 再評価申請時抄録 p6]

37
38 モルモットを用いた CTC の 9 週間投与 (0、0.3 及び 0.5 mg/匹、投与経路
39 未記載) 試験が実施された。投与群では、体重が有意に重く、脛骨が長く、

1 心臓及び脾臓重量が減少したが組織学的検査では、対照群との差はみられな
2 かった。(参照 6) [CTC 再評価申請時抄録 p6]

3 4 6. 慢性毒性及び発がん性試験

5 (1) 24 ヶ月間慢性/発がん性併合毒性試験 (マウス、OTC)

6 マウス (ICR 系、5 週齢、雌雄各 67 匹/投与群、雌雄各 102 匹/対照群) を
7 用いた OTC-Q (純度:56%) の混餌投与 (0、80、312.5、1,250、5,000 及び
8 20,000 ppm) による 24 ヶ月間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。試
9 験期間中、投与開始 6、12 及び 18 ヶ月後にそれぞれ 5、5 及び 10 匹/群を病
10 理検査に供した。

11 一般状態、死亡率及び摂餌量に投与による影響は認められなかった。

12 体重は、20,000 ppm 群の雄に軽度の増加抑制が認められた以外、投与に起
13 因する変化はみられなかった。

14 血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、腎及び肝機能検査に投与に起
15 因する影響はみられなかった。

16 剖検では、5,000 ppm 以上投与群の雌雄で、投与開始 6 ヶ月後に盲腸の膨
17 大が認められたが、その後は目立たなくなり、試験終了時には 20,000 ppm
18 群の雌雄でやや目立つ程度であった。

19 臓器重量では、5,000 ppm 以上投与群の雌雄で盲腸重量が対照群より重か
20 った。

21 病理組織学的検査では、盲腸を含む他の組織にも投与に起因した非腫瘍性
22 変化及び腫瘍性変化は認められなかった。

23 本試験において、5,000 ppm 以上投与群の雌雄に認められた盲腸所見は、
24 抗菌性物質の投与による腸内細菌叢の変動に伴う変化であり、げっ歯類等の
25 盲腸の特異性を考慮すると、毒性学的意義に乏しい変化と考えられた。本試
26 験における NOAEL は 5,000 ppm (雄: 601.6 mg/kg 体重/日、雌:631.6 mg/kg
27 体重/日) と考えられた。発がん性はないと考えられた。(参照 16) [農薬抄録
28 p42 表、p63~70]1977

29 30 (2) 103 週間慢性毒性/発がん性併合試験 (マウス、OTC)

31 マウス (B6C3F1 系、雌雄各 50 匹/群) を用いた OTC-HCl (純度:98.8%)
32 の混餌投与 (0、6,300 及び 12,500 ppm) による 103 週間慢性毒性/発がん性
33 併合試験が実施された。一般状態、死亡率、体重、摂餌量、剖検及び病理組
34 織学的検査について検討した。

35 その結果、12,500 ppm 群で平均体重が投与開始半年後の時点のみ対照群に
36 比べ 5~9% の低値を示した。

37 雌雄ともに腫瘍発生率の有意な増加はみられなかった。

38 本試験における NOAEL は、最高用量である 12,500 ppm (1,372 mg/kg
39 体重/日) と考えられた。発がん性はみられなかった。本文中記載なし。

1 **COMMENTS**に記載。(参照 5) [FAS27 2.2.3.1]1987

2
3 (3) 12ヶ月間発がん性試験(マウス、CTC)

4 乳がん高発生系マウス(SHN系、34匹/群)を用いたCTC(純度:55%)
5 の飲水投与(0及び11ppm)による12ヶ月間発がん性試験が実施された結
6 果、乳がん発生率(投与群:65%、対照群:75%)に投与による影響はみられ
7 なかった。(参照3) [CTC抄録p10、別表9]

8
9 (4) 103週間慢性毒性/発がん性併合試験(マウス、TC)

10 マウス(B6C3F1系、雌雄各50匹/群)を用いたTC-HCl(純度:91%)の
11 混餌投与(0、12,500及び25,000ppm(雄:0、1,500及び3,000mg/kg体重/
12 日、雌:0、1,500及び3,500mg/kg体重/日))による103週間慢性毒性/発が
13 ん性併合試験が実施された。一般状態、体重、摂餌量、剖検及び病理組織学
14 的検査について検討した。

15 生存率は、雄で上昇し、0、12,500及び25,000ppm群でそれぞれ31/50、
16 43/50及び43/50例であった。雌では変化がなかった(37/50、35/50及び38/50
17 例)。

18 体重では、平均体重が両投与群で雌雄とも対照群に比べてわずかに低値を
19 示したが、摂餌量に差はみられなかった。

20 腫瘍発生率は、雌雄ともに有意差はみられなかった。投与群の雌では、肝
21 細胞腺腫又は肝細胞がんの発生はみられなかった(0、12,500及び25,000ppm
22 群でそれぞれ10/49、0/48及び0/50例)。

23 本試験におけるNOAELは最高用量である25,000ppm(雄:3,000mg/kg
24 体重/日、雌:3,500mg/kg体重/日)と考えられた。発がん性はみられなかつ
25 た。**本文に記載なし。COMMENTSに記載。**(参照4) [FAS36 2.2.3.1]1991

26
27 (5) 60週間発がん性試験(ラット、OTC)

28 ラット(SD系、雌雄各15匹/群)を用いたOTCの60週間飲水投与
29 (0.1%OTC溶液及び0.1%OTC溶液+0.1%亜硝酸ナトリウム溶液:用量未
30 記載)試験が実施された。生存動物は試験開始130週後に安楽死させた。

31 両群間に死亡率の差はみられなかった。

32 OTC群に肝腫瘍はみられなかった。併用群では、肝細胞腫瘍3例及び胆管
33 腫1例がみられた。(参照5) [FAS27 2.2.8]1975

34
35 専門委員コメント

36 ラットの60週間投与(生存動物は130週?)で1群15匹の試験を発がん
37 性試験とするのは疑問であり、参考扱いにするか、他の試験もあることから
38 削除するのがよいかと思えます。

1 (6) 24 ヶ月間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、OTC①)

2 ラット (Osborne-Mendel 系、雄 100~180 匹/群) を用いた OTC-HCl の
3 混餌投与 (0、100、1,000 及び 3,000 ppm) による 24 ヶ月間慢性毒性/発が
4 ん性併合試験が実施された。被験動物数は、0、100、1,000 及び 3,000 ppm
5 群でそれぞれ 180、100、130 及び 100 匹であった。一般状態、死亡率、体重、
6 摂餌量、血液学的検査、剖検及び病理組織学的検査について検討した。

7 投与開始 24 ヶ月後の死亡率は、対照及び投与量順にそれぞれ 43、23、23
8 及び 13 %であった。

9 体重は、対照群より投与群の方が増加量が多かった。

10 体重及び血液学的検査に投与の影響はみられなかった。

11 剖検では、灰白腎臓の退色が対照及び投与量順にそれぞれ 4、7、16 及び
12 16 %にみられた。また、投与群の甲状腺に極めて軽度~中等度の褐色の色素
13 沈着がみられたが、用量相関性はなかった。

14 腫瘍発生率の増加はみられなかった。

15 本試験における NOAEL は、最高用量である 3,000 ppm (150 mg/kg 体重
16 /日) と考えられた。発がん性はみられなかった。**本文に記載なし。COMMENTS**
17 **に記載。** (参照 5) [FAS27 2.2.3.2]1964

18
19 (7) 24 ヶ月間慢性/発がん性併合毒性試験 (ラット、OTC②)

20 ラット (SD 系、5 週齢、雌雄各 57 匹/投与群、雌雄各 100 匹/対照群) を
21 用いた OTC-Q (純度:56 %) の混餌投与 (0、80、312.5、1,250、5,000 及び
22 20,000 ppm) による 24 ヶ月間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。試
23 験期間中、投与開始 6、12 及び 18 ヶ月後にそれぞれ 5、5 及び 10 匹/群を病
24 理検査に供した。

25 一般状態、死亡率及び摂餌量に投与による影響は認められなかった。

26 体重は、20,000 ppm 群の雄に軽度の増加抑制が認められた以外、投与に起
27 因する変化はみられなかった。

28 血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、腎及び肝機能検査に投与に起
29 因する影響はみられなかった。

30 剖検では、5,000 ppm 以上投与群の雌雄で、投与開始 6 ヶ月後に盲腸の膨
31 大が認められたが、その後は 20,000 ppm 群の雌雄でやや目立つ程度であっ
32 た。

33 臓器重量でも、5,000 ppm 以上投与群の雌雄で内容物を含む盲腸重量が対
34 照群より増加したが、大きな差はみられなかった。

35 病理組織学的検査では、盲腸を含む他の組織にも投与に起因した非腫瘍性
36 変化、腫瘍性変化はともにみられなかった。

37 本試験において、5,000 ppm 以上投与群の雌雄に認められた盲腸所見は、
38 抗菌性物質の投与による腸内細菌叢の変動に伴う変化であり、げっ歯類等の
39 盲腸の特異性を考慮すると、毒性学的意義に乏しい変化と考えられた。

1 本試験における NOAEL は 5,000 ppm (雌雄それぞれ 283.6 及び 246.5
2 mg/kg 体重/日) と考えられた。発がん性はないと考えられた。(参照 16) [農
3 薬抄録 p42 表、p71~79]1977

4
5 (8) 103 週間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、OTC)

6 ラット (F344/N 系、雌雄各 50 匹/群) を用いた OTC-HCl (純度: 98.8%)
7 の混餌投与 (0、25,000 及び 50,000 ppm) による 103 週間慢性毒性/発がん
8 性併合試験が実施された。一般状態、死亡率、体重、摂餌量、剖検及び病理
9 組織学的検査について検討した。

10 その結果、50,000 ppm 群の雄で平均体重が投与開始後 1 年間は対照群に
11 比べ 5~8% の低値を示した。

12 病理組織学的検査では、雄の副腎で良性の褐色細胞腫が用量依存的に増加し
13 た (表 25) が、雄及び対照群の生存率が低いためこの発生数の増加は意義のあ
14 るものとは考えられなかった。また、50,000 ppm 群の雌で~~腺~~下垂体腺腫の発生
15 率が増加した (表 26)。しかし、~~腺~~下垂体過形成の発生数は対照群より少なか
16 った。

17 これらのことから、発がん性はないと考えられた。本文中記載なし。

18 COMMENTS に記載。(参照 5) [FAS27 2.2.3.2]1987

19
20 専門委員コメント

21 (生存率が低いことの記載が、体重の結果の前にあったほうがよいかと思
22 います)

23
24 表 25 雄ラットにおける副腎の病変の発生例数 (例)

	投与量 (ppm)		
	0	25,000	50,000
副腎髓質過形成	7/50	14/50	9/50
良性褐色細胞腫	10/50	18/50	25/50
悪性褐色細胞腫	2/50	1/50	0/50

25
26 表 26 雌ラットにおける~~腺~~下垂体の病変の発生例数 (例)

	投与量 (ppm)		
	0	25,000	50,000
過形成	16/50	10/50	11/50
腺腫	19/50	17/50	30/50
腺癌	2/50	7/50	3/50

27
28 (9) 52 週間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC)

29 ラット (系統不明、40 匹) を用いた CTC の混餌投与 (0、10,000 及び 50,000

1 ppm : 0、1,000 及び 5,000 mg/kg 体重/日) による 52 週間慢性毒性/発がん性
2 併合試験が実施された。

3 1,000 mg/kg 体重/日群では、体重の有意な変化はみられず、毒性徴候も観
4 察されなかった。

5 5,000 mg/kg 体重/日群では、10 例が投与開始 10 週までに死亡した。体重
6 は、対照群と比較して 33 %低値を示し、病理組織学的検査では、全組織が黄
7 色化を呈した。

8 本試験における NOAEL は、1,000 mg/kg 体重/日と考えられた。本文に記載
9 なし (参照 4) [FAS36 2.2.3.2]1956

10 11 (10) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC)

12 ラット (Sherman 系、雌雄各 20 匹/群) を用いた CTC (食品添加物グレ
13 ードのものを再結晶して使用) の混餌投与 (0、1、5、20、100、500、2,000、
14 10,000 及び 50,000 ppm) による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施さ
15 れた。

16 死亡率は、500 ppm 以上投与群で対照群を下回っていた。

17 一般状態では、50,000 ppm 群で胃腸障害と考えられる腹部膨満が初期にみ
18 られた。

19 体重は、50,000 ppm 群の雌雄全例が対照群に比べて有意な低値を示した。

20 血液学的検査では、50,000 ppm 群の雌雄で WBC の低値がみられた。

21 剖検では、50,000 ppm 群の雄で精巣の両側性の萎縮がみられた。

22 病理組織学的検査では、50,000 ppm 群で脾臓のリンパ濾胞中心部に~~夫形~~変
23 性細網細胞が、雄に肝細胞の脂肪変性並びに萎縮精巣における~~輸精~~細管の変
24 性及び無精子症がみられた。また、~~腺~~下垂体、乳腺、肺、甲状腺の順で腫瘍
25 の発生がみられたが、対照群にも共通にみられ、加齢に伴う自然発生腫瘍で
26 あると考えられた。

27 本試験における NOAEL は、10,000 ppm (696 mg/kg 体重/日) と考えら
28 れた。発がん性はみられなかった。本文に記載なし (参照 3) [CTC 抄録 p9、別表
29 7]

30 31 (11) 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、CTC、投与期間未記載)

32 ラット (Sherman 系、雌雄各 20 匹/群系統未記載) [FAS36 2.2.3.2 から読
33 み取れなかったのですが、1 群の匹数を記載できますでしょうか。]を用いた
34 CTC の混餌投与 (0、1、5、20、100、500、2,000、10,000 及び 50,000 ppm :
35 0、0.07、0.35、1.3、7、34、130、700 及び 5,200 mg/kg 体重/日) による慢
36 性毒性/発がん性併合試験 (投与期間未記載) が実施された。死亡率、一般状
37 態、体重増加量、摂餌量、血液学的検査、剖検、臓器重量及び病理組織学的
38 検査について検討した。

39 投与開始 12 週までに 50,000 ppm 群で雄 8 例が死亡し、他の群では死亡例

1 はみられなかったが、試験終了時の雄の死亡率は、対照群と差はなかった。
2 一般状態では、50,000 ppm 群の雌雄で、腹部膨満、鼻部と口の痲痺及び流
3 涎等の胃腸障害の徴候を示した。

4 体重は、50,000 ppm 群の雌雄で増加抑制がみられた。

5 血液学的検査では、50,000 ppm 群の雌雄で WBC が減少した。

6 病理組織学的検査では、50,000 ppm 群において、雌雄に脾臓リンパ濾胞の
7 黄色色素の沈着及び肺の間質性線維症を度々伴う単球浸潤が、雄に精細管の
8 変性を伴う精巣の萎縮及び肝臓の脂肪浸潤がみられた。

9 蛍光検査では、500 ppm 以上投与群において CTC の存在が示唆された（存
10 在箇所未記載）。

11 血液生化学的検査及び尿検査は実施されていない。

12 腫瘍発生率の増加はみられなかった。

13 本試験における NOAEL は 10,000 ppm（700 mg/kg 体重/日）と考えられ
14 た。発がん性はみられなかった。（参照 4）[\[FAS36 2.2.3.2\] 1961](#)

15 16 (12) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、TC）

17 離乳ラット（Osborne-Mendel 系、雄 100～180 匹/群）を用いた TC-HCl
18 の混餌投与（0、100、1,000 及び 3,000 ppm：0、5、50 及び 150 mg/kg 体
19 重/日）による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。試験期間中、
20 各群 10 匹を短期間の間隔でと殺した。と殺又は瀕死の被験動物は剖検及び病
21 理組織学的検査に供した。

22 一般状態、体重、摂餌量及び血液学的検査に投与に起因する影響はみられ
23 なかった。投与開始 18～19 ヶ月後には、投与群の全例で対照群と比べ、より
24 活発であり体重増加も速やかであった。

25 死亡率は、投与群の方が対照群に比べて低かった。

26 病理組織学的検査では、3,000 ppm 群で長骨及び頭蓋冠の黄色化がみられ
27 た。

28 腫瘍発生率の増加はみられなかった。

29 本試験における NOAEL は最高用量である 3,000 ppm（150 mg/kg 体重/
30 日）と考えられた。発がん性はみられなかった。[本文に記載なし](#)（参照 4）[\[FAS36](#)
31 [2.2.3.1\]1961](#)

32 33 (13) 12ヶ月間慢性毒性試験（イヌ、OTC①）

34 イヌ（雑種、雌雄各 2 匹/群）を用いた OTC-HCl の混餌投与（0、5,000 及
35 び 10,000 ppm）による 12 ヶ月間慢性毒性試験が実施された。一般状態、死
36 亡率、体重、摂餌量、血液学的検査、臓器重量、剖検及び病理組織学的検査
37 について検討した。

38 その結果、10,000 ppm 群の雄で、精巣細管の生殖精上皮変性が観察された
39 以外に、投与に起因する影響はみられなかった。

1 本試験における NOAEL は、5,000 ppm (125 mg/kg 体重/日) と考えられ
2 た。(参照 5) [FAS27 2.2.2.3]1964

3 4 (14) 12 ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、OTC②)

5 イヌ (雑種各 2 匹/群) を用いた OTC-Q の混餌投与 (0、2,000、5,000 及
6 び 10,000 ppm) による 12 ヶ月間慢性毒性試験が実施された。

7 死亡は、5,000 ppm 以上投与群でみられた。5,000 ppm 群の 4 例匹は、投
8 与開始 3 又は 5 ヶ月後に死亡又は切迫と殺した。10,000 ppm 群では、1 例匹
9 が投与開始 3 ヶ月後に死亡した時点で残りの 3 例匹への投与を中止し試験を
10 終了した。

11 一般状態は、5,000 ppm 以上投与群で食欲不振がみられた。

12 体重は、5,000 ppm 以上投与群で摂餌量減少 (10,000 ppm 群で顕著) に
13 伴い減少した。

14 血液学的検査では、5,000 ppm 以上投与群に軽度の白血球減少がみられた
15 が、高度の衰弱によるものと考えられた。

16 剖検では、5,000 ppm 群の雌 1 例で胃腸管の出血がみられ、10,000 ppm
17 群の 1 例では、腸管の充血及び出血がみられた。

18 臓器重量及び病理組織学的検査では、投与に起因する影響はみられなかつ
19 た。

20 本試験における NOAEL は、2,000 ppm (雌雄それぞれ 52.5 及び 51.4 mg/kg
21 体重/日) と考えられた。(参照 16) [農薬抄録 p42 表、p80~82] 1964

22 23 (15) 24 ヶ月間慢性毒性試験 (イヌ、OTC)

24 イヌ (ビーグル種及び雑種各 4 匹/群) を用いた OTC-HCl の混餌投与 (0、
25 1,000、3,000 及び 10,000 ppm) による 24 ヶ月間慢性毒性試験が実施された。
26 投与開始 12 ヶ月後に各犬種 1 匹/群を中間と殺した。一般状態、死亡率、体
27 重、摂餌量、血液学的検査、ALP、BSP クリアランス、BUN、臓器重量、剖
28 検、病理組織学的検査及び精液検査について検討した。

29 投与開始 12 及び 24 か月後に各 1 例が死亡したが、それぞれイヌ糸状虫症
30 及び胃腸炎によるものであった。

31 全ての投与群で投与に起因する影響はみられなかった。

32 精巣及び精巣上体の萎縮が、対照群で投与群より高頻度にみられた。

33 本試験における NOAEL は、最高用量である 10,000 ppm (250 mg/kg 体
34 重/日) と考えられた。(参照 5) [FAS27 2.2.2.3]1964

35 36 (16) 54 週間慢性毒性試験 (イヌ、CTC)

37 イヌ (ビーグル種及びバセンジー種、9~12 ヶ月齢、雌雄各 2 匹/群) を用
38 いた CTC-HCl の経口投与 (10 及び 100 mg/kg 体重/日、カプセル投与) によ
39 る 54 週間慢性毒性試験が実施された。また、別のイヌ (ビーグル種：雌 1

1 匹、バセンジー種：雄 2 匹及び雌 1 匹) には 50 mg/kg 体重/日を投与した。
2 対照群は設けなかった。血液学的検査、臨床化学的検査、尿検査、糞スミア、
3 剖検、臓器重量、病理組織学的検査及び最終投与後の組織中残留について検
4 討した。

5 一般状態では、投与に起因する胃腸障害（嘔吐、下痢、食欲不振及び肛門
6 腺腫脹）が全投与群で試験期間前半に、特にバセンジー種で観察された。

7 投与 4 時間後の平均血中濃度（1 年以上の試験期間中実施された各群 12～
8 14 回の結果から算定）は、10、50 及び 100 mg/kg 体重/日群でそれぞれ 0.34、
9 0.58 及び 0.94 mg/L であった。

10 臓器重量では、100 mg/kg 体重/日群の雄 1 例で、甲状腺重量が高値を示し
11 たが、形状及び~~腺の状態~~外観は正常であった。

12 剖検では、100 mg/kg 体重/日群で骨のわずかな黄色化がみられ、各群 2 例
13 に慢性胃炎がみられた。

14 組織中濃度は、骨>腎臓>肝臓の順に高く、脳、心臓及び脾臓からは検出
15 されなかった。

16 本試験における NOAEL は、最高用量である 100 mg/kg 体重/日と考えら
17 れた。（参照 4）[FAS36 2.2.2.2] 1957

18 19 (17) 24 ヶ月間慢性毒性試験（イヌ、TC）

20 イヌ（雑種及びビーグル種、雄、各大種 4 匹/群）を用いた TC の混餌投与
21 (1,000、3,000 及び 10,000 ppm：25、75 及び 250 mg/kg 体重/日) による
22 慢性毒性試験が実施された。投与開始 12 ヶ月後に各群雑種及びビーグル種各
23 1 匹を中間と殺し、病理組織学的検査に供した。

24 一般状態、死亡率、体重、摂餌量、血液学的検査所見、ALP、BSP クリア
25 ランス、尿素窒素、精巣及び精巣上体の重量、剖検所見、精子の濃度及び運
26 動性、並びに精液の性状に投与の影響は認められなかった。

27 全投与群で骨組織に黄色の着色がみられ、その着色度には用量相関性がみ
28 られた。また、甲状腺に用量依存的な黒褐色の色素沈着がみられ、甲状腺の
29 病理組織学的検査では、投与群のほとんどの被験動物に濾胞上皮細胞質内顆
30 粒がみられた。これは、TC 又はその代謝物の沈着により生じたと考えられた。
31 病理組織学的変化は観察されなかった。

32 本試験における NOAEL は、最高用量である 10,000 ppm (250 mg/kg 体
33 重/日) と考えられた。本文に記載なし（参照 4）[FAS36 2.2.2.1]1964

34 35 7. 生殖発生毒性試験

36 (1) 生殖発生毒性試験（マウス、OTC①）

37 妊娠マウス（CD1 系、42 匹/群）に OTC-HCl を妊娠 6～15 日に経口投与
38 (0、1,325、1,670 及び 2,100 mg/kg 体重/日、コーン油とともに投与) し、
39 妊娠 17 日に供試した。

1 死亡例は、各群それぞれ 0/42、1/42、3/41 及び 3/39 例であった。

2 母動物では、妊娠子宮重量及び肝臓の絶対重量が 2,100 mg/kg 体重/日群で
3 減少した。体重には対照群との有意差はみられなかった。

4 繁殖成績（着床数、流産数、死亡/生存胎児数、胎児体重）に投与に起因す
5 る影響はみられなかった。また、胎児の外表、内臓及び骨格異常も対照群と
6 同様であった。

7 本試験における母体毒性の NOAEL は、1,670 mg/kg 体重/日と考えられた。
8 発生毒性はみられなかった。（参照 5） [FAS27 2.2.6.1]1986

9
10 妊娠マウス（ICR 系）に OTC-HCl（純度：99.6 %）を妊娠 6～15 日にコ
11 ーン油に懸濁して投与（1,325、1,670 及び 2,100 mg/kg 体重/日）した。妊娠
12 17 日に帝王切開し、着床数並びに生存及び死亡・吸収胎児数を検査した。生
13 存胎児については、性別、体重並びに外表、内臓及び骨格異常について調べ
14 た。

15 親動物では、用量相関的な死亡率の増加（1,325 mg/kg 体重/日群：2.4 %、
16 1,670 mg/kg 体重/日群：7.3 %、2,100 mg/kg 体重/日群：7.7 %）がみられた
17 が、体重増加及び胎児着床数に対照群との差はみられなかった。

18 胎児では、いずれの検査項目においても投与に起因する影響はみられなか
19 った。

20 本試験における NOAEL は、親動物では設定できず、LOAEL が 1,325
21 mg/kg 体重/日、胎児における NOAEL は最高用量である 2,100 mg/kg 体重/
22 日と考えられた。催奇形性はみられなかった。（参照 16） [農薬抄録 p42 表、
23 p89~90]1986

24
25 妊娠マウス（CD1 系）に OTC-HCl を妊娠 6～15 日に強制経口投与（0、
26 1,350、1,670 及び 2,100 mg/kg 体重/日）した。

27 その結果、投与による影響は認められず、本試験における母体毒性及び発
28 生毒性の NOAEL は最高用量である 2,100 mg/kg 体重/日と考えられた。（参
29 照 21） [EPA RED p9]

30
31 （事務局より）

32 上記 3 試験は、同一試験と考えられますが、それぞれ、毒性評価が異なり、
33 NOAEL、LOAEL の取り方が異なっています。死亡例数をどう考えたらよろ
34 しいでしょうか。

35 36 37 (2) 生殖毒性試験（マウス、CTC）

38 マウスに 4 産にわたり CTC を混餌投与（0 及び 175 ppm：0 及び 25 mg/kg
39 体重/日）した。その結果、同腹児数、生後 4 週の児の生存率及び平均体重は

1 対照群と比べて有意差はみられなかった。

2 本試験における NOAEL は唯一の投与量である 25 mg/kg 体重/日と考えら
3 れた。本文中に記載なし。(参照 4) [FAS36 2.2.4.1]1956

4 5 (3) 2 世代生殖毒性試験 (ラット、OTC①)

6 ラット (Wistar 系) を用いた OTC-HCl の混餌投与 (0 及び 360 ppm) に
7 よる 2 世代生殖毒性試験が実施された。被験動物 (雌 30 匹及び雄 10 匹) は
8 離乳時 (23 日齢) に投与を開始し、120 日齢時に 1 回目の交配を行った。2
9 回目の交配は 1 回目出産児の離乳 1 ヶ月後に実施された。2 回目出産児の雌
10 雄各 1 匹を交配させ、次世代の繁殖及び授乳への影響を観察した。

11 その結果、繁殖成績 (同腹児数、一腹の重量及び児体重、並びに生存/死亡
12 胎児の割合) に第 1 及び 2 世代の有意差はみられなかった。また、両世代の
13 生後 3~21 日の児動物は対照群に比べ体重が増加した。

14 本試験における NOAEL は、唯一の投与量である 360 ppm (18 mg/kg 体
15 重/日) と考えられた。生殖毒性はみられなかった。本文中に記載なし。COMMENTS
16 に記載。(参照 5) [FAS27 2.2.4.1]1954

17 18 (4) 2 世代生殖毒性試験 (ラット、OTC②)

19 ラット (SD 系、雌雄各 35 匹/群) を用いた OTC-Q (純度:66%) の混餌投
20 与 (0、2,000 及び 20,000 ppm) による 2 世代生殖毒性試験が実施された。
21 被験物質は、P 世代は投与開始から F₁ 児離乳時まで、F₁ 世代は離乳時から
22 F₂ 児離乳時までの各 13 週間投与した。F₀ 及び F_{1b} の各群 5 匹を妊娠 21 日に
23 帝王切開し、胎児について調べた。残りは自然分娩させ、出産状況、新生児
24 数、死産児数、外表異常等について調べた。

25 親動物 (F₀、F_{1b} 及び F_{2b}) では、投与期間を通じて一般状態に変化はみら
26 れず、死亡及び流産もみられなかった。また、剖検でも著変は認められな
27 かった。第 1 及び第 2 回交配時における妊娠率及び交尾率は、対照群と差が認
28 められず、親動物の繁殖成績に投与の影響は無いと考えられた。

29 妊娠末期胎児 (F_{1a} 及び F_{2a}) では、死亡が各群で 4~12 例みられたが、投
30 与量との関連はみられなかった。F_{1a} (F₀ の胎児) の 20,000 ppm 群及び F_{2a}
31 (F_{1a} の胎児) では、体重が対照群よりわずかに軽かった。F_{2a} に奇形が散見
32 されたが、自然発生率の範囲内であった。骨格異常、化骨進行度及び骨格変
33 異の発生頻度に投与量との関連はみられなかった。

34 自然分娩による児動物 (F_{1b} 及び F_{2b}) では、F_{2b} の 20,000 ppm 群で出生
35 時体重がわずかに低かったが、体重増加率に差はみられなかった。離乳期 (生
36 後 3 週) までの哺育率は、F_{1b} で 2,000 ppm 群が 84.6% 及び 20,000 ppm 群
37 が 89.4%、並びに F_{2b} で 20,000 ppm 群が 44.7% であり、それぞれ対照群 (100
38 及び 66.7%) より低かった。F_{2b} で生後 6 週の生存率が 20,000 ppm 群 (66.7%)
39 で対照群 (90.8%) より低かった。出生児の外表分化、聴覚、行動、剖検所

見、性機能の発育及び骨格に異常はみられなかった。

本試験における NOAEL は、親動物では 20,000 ppm、児動物では 2,000 ppm と考えられた。(参照 16) [農薬抄録 p42 表、p83~86]1979

(5) 発生毒性試験 (ラット、OTC①)

妊娠ラット (SD 系) に OTC を妊娠 1~20 日に胃挿管による混餌投与 (0、250、1,000 及び 2,000 ppm : 0.7 µCi の ⁴⁵Ca 及び 20 µg の Ca を含む 1.0 mL の溶液として 1 日 2 回投与) し、妊娠 21 日に帝王切開した。母動物及び児の大腿骨を焼却し放射性 Ca を測定した。

摂餌量、体重、同腹児数及び胎児体重に投与に起因する影響はみられなかった。全胎児とも出産時に生存しており外表異常はみられなかった。母動物及び胎児ともに骨中の放射性 Ca の取り込みは、用量依存的に増加した。

本試験における NOAEL は最高用量である 2,000 ppm と考えられた。本文中に記載なし。催奇形性はみられなかった。(参照 5) [FAS27 2.2.6.2]1965

(6) 発生毒性試験 (ラット、OTC②)

妊娠ラット (Wistar 系) に OTC を妊娠 1~21 日に経口投与 (0、48、240 及び 480 mg/kg 体重/日) し、妊娠 21 日に胎児の骨格異常をアリザリンレッド染色により検査した。

全投与群において、対照群と比べて、胎児の前肢の骨化が低下し、胚吸収が増加した。この影響は 480 mg/kg 体重/日群でより高頻度に観察された。

本試験において NOAEL は設定されず、LOAEL は 48 mg/kg 体重/日と考えられた。本文中に記載なし。(参照 5) [FAS27 2.2.6.2]1970

(7) 発生毒性試験 (ラット、OTC③)

妊娠ラット (CD 系、36 匹/群) に OTC-HCl を妊娠 6~15 日に強制経口投与 (0、1,200、1,350 及び 1,500 mg/kg 体重/日、コーン油とともに投与) し、妊娠 20 日に全被験動物を検査した。

死亡率は、0、1,200、1,350 及び 1,500 mg/kg 体重/日群でそれぞれ 0、5.6、15.2 及び 24.2 % で用量依存的に増加した。

母動物では、投与群で呼吸困難及び被毛粗剛の頻度が増加した。体重の増加抑制がみられ、肝臓の絶対重量が全投与群で有意に減少した。

胎児では、体重が全投与群で有意に減少した。

本試験において NOAEL は設定されず、LOAEL は 1,200 mg/kg 体重/日と考えられた。本文中に記載なし

催奇形性はみられなかった。(参照 5) [FAS27 2.2.6.2]1986

(8) 発生毒性試験 (ラット、OTC④)

妊娠ラット (SD 系、F₀:5 匹/群、F_{1b}:10 匹/群) に OTC-Q (純度:66%) を

1 妊娠 0～21 日に混餌投与 (0、2,000 及び 20,000 ppm) した。妊娠 21 日に
2 帝王切開し、着床数、生存及び死亡胎児数並びに吸収胚数を調べ、生存胎児
3 については、性別、体重並びに外表、内臓及び骨格異常について検査した。

4 親動物では、いずれの検査項目についても投与の影響はみられなかった。

5 胎児では、体重が F₀ 胎児の ~~20,000~~ 2,000 ppm 群及び F_{1b} 胎児の両投与群
6 でわずかに軽かった。F_{1b} 胎児に対照群を含む全群で胸椎体分離及び胸椎体変
7 形が 1～2 例みられたが、自然発生的なものと考えられた。

8 本試験における NOAEL は、親動物で 20,000 ppm、胎児では 2,000 ppm
9 と考えられた。催奇形性はみられなかった。(参照 16) [農薬抄録 p42 表、
10 p87～88]1976

11 12 (9) 2 世代生殖毒性試験 (ラット、CTC)

13 ラット (Sherman 系、21 日齢前後、雄 5 匹及び雌 15 匹/群) を用いた混
14 餌投与 (0 及び 10,000 ppm : 0 及び 500 mg/kg 体重/日) による CTC の 2 世
15 代生殖毒性試験が実施された。親動物 (F₀) は 100 日齢前後で交配させた。
16 同腹児 (F₁) は 8～9 匹に減らし、離乳後は親世代と同様に給餌した。10,000
17 ppm 群では F₁ 雌 21 及び雄 7 匹を用いて交配させ、対照群ではそれよりやや
18 多い被験動物を用いて交配させた。一般状態、体重、摂餌量、受胎率、繁殖
19 成績及び児の成長率について検討した。

20 投与群の親動物 (F₀₊ 及び F₁₊) の雄では、体重が対照群に比べてやや低値
21 を示したが、それ以外の毒性及び生殖影響は認められなかった。

22 本試験における NOAEL は唯一の投与量である 500 mg/kg 体重/日と考え
23 られた。生殖毒性はみられなかった。本文中に記載なし。COMMENTS に記載。(参
24 照 4) [FAS36 2.2.4.1] 1964

25 26 (10) 生殖毒性試験 (ラット、CTC①)

27 ラットに 2 産にわたり CTC を混餌投与 (0 及び 45 ppm : 0 及び 2 mg/kg
28 体重/日) した。その結果、同腹児数、生後 4 週の生存率及び平均体重は対照
29 群と比べて有意差はみられなかった。

30 本試験における NOAEL は唯一の投与量である 2 mg/kg 体重/日と考えられ
31 た。本文中に記載なし。(参照 4) [FAS36 2.2.4.1]1956

32 33 (11) 生殖毒性試験 (ラット、CTC②)

34 ラット (Sherman 系) に 3 世代にわたり CTC を混餌投与 (0 及び 10,000
35 ppm) した。その結果、受胎数、同腹児数、生産児数、離乳児数及び体重は
36 対照群と比べて有意差はみられなかった。

37 本試験における NOAEL は唯一の投与量である 10,000 ppm と考えられた。
38 本文中に記載なし。(参照 3) [CTC 抄録 p10、別表 8]

39

1 (12) 生殖発生毒性試験 (ラット、TC)

2 ラット (SD 系、雌雄) に TC-HCl を交配 3 日前から混餌投与 (0 及び 500
3 ppm : 0 及び 25 mg/kg 体重/日) した。妊娠ラット (15~20 匹/群) には、妊
4 娠期間を通じて被験物質の投与を継続した。妊娠 21 日に一部の被験動物を帝
5 王切開し、残りの被験動物は自然分娩させた。

6 胚吸収率、妊娠率、児の死亡率、同腹児数及び児体重に投与による有意な
7 影響はみられなかった。外表、骨格及び内臓検査では、帝王切開群で水尿管
8 症-hydroureter (14 % ; 対照 0.8 %) 及び分裂腰椎 fragmented lumbar (3 % ;
9 対照 0 %) の発生が増加したが、自然分娩群では、水尿管症の発生は対照及
10 び投与群でそれぞれ 15 及び 12 % であった。

11 本試験における NOAEL は唯一の投与量である 25 mg/kg 体重/日と考えら
12 れた。本文中に記載なし。(参照 4) [FAS36 2.2.5.1]1965

13
14 (13) 発生毒性試験 (ラット、TC)

15 妊娠ラット (Wistar 系) に TC (0、54、270 及び 540 mg/kg 体重/日) 又
16 は TC-HCl (0、40、200 及び 400 mg/kg 体重/日) を妊娠 1~21 日に経口投
17 与した。妊娠 21 日における胎児の骨格異常について調べた。

18 高用量投与群の胎児で、前肢の骨化遅延 (reduction of ossification) がよ
19 り頻発したが、後肢にはみられず、骨格及び内臓検査では不可逆的な構造変
20 化はみられなかった。(3.の COMMENTS の記載)

21 本試験における NOAEL はそれぞれの最高用量である 540 及び 400 mg/kg
22 体重/日と考えられた。催奇形性はみられなかった。本文に記載なし。COMMENTS
23 に記載 (参照 4) :[FAS36 2.2.5.1] 1970

24
25 (14) 発生毒性試験 (ラット、TC、投与経路未記載)

26 妊娠ラット (Wistar 系、16 匹/群) に TC-HCL を投与 (0 及び 150~200 mg
27 日) して発生毒性試験が実施された。Group I では妊娠 1~18 日に、Group
28 II では分娩後 1~28 日に被験物質を投与した。妊娠 20 日には、Group I の投
29 与群及び対照群の各 3 匹例を帝王切開した。残りは自然分娩させ、児の成長
30 について調べた。

31 妊娠期間、体長及び体重に投与の影響はみられず、奇形も観察されなかつ
32 た。Group II では、投与群で生後 28 日の脚の長さが対照群に比べて 15 % 短
33 かった。児の骨格の UV 試験では、典型的な TC に起因する蛍光がみられ、
34 TC が骨に吸収されることが示唆された。(参照 4) [FAS36 2.2.5.1]1963

35
36 (参考 1) 発生毒性試験 (マウス、テトラサイクリン系抗生物質)

37 マウス胚の尺骨原基痕跡を用い、テトラサイクリン系抗生物質の発生毒性
38 について検討された。Ca 沈着した骨の長さ、総 Ca 量及び放射性 Ca 取り込
39 み量を判定基準とすると、CTC 及び OTC は TC、メタサイクリン、ジメチル

1 テトラサイクリンより、これらに与える影響は少なかった。(参照 3) [CTC 抄
2 録 p10、再評価申請時資料 p7]

3 4 8. その他の試験

5 (1) 眼刺激性及び感作性試験

6 ウサギを用いて CTC を腹腔内、筋肉内又は皮下投与した場合、あるいは眼
7 に直接滴下した場合、局所刺激性が生じた。1%溶液により生じた眼刺激性は
8 軽微で、投与 48 時間以内に完全に回復した。(参照 4) [FAS36 2.2.8]1948

9 10 (2) 皮膚刺激性及び感作性試験

11 ラット (SD 系、9 週齢、雌雄各 10 匹) を用いた OTC-Q の皮膚刺激性試
12 験が実施された。被験物質 (OTC として 5,000 mg/kg 体重) を被験動物の背
13 部皮膚に塗布し、投与 24 時間後の投与局所の変化を肉眼的に調べ、塗布 8
14 日後まで観察した。

15 投与群の投与局所の皮膚は、塗布 24 時間後及びその後も対照群と差はみら
16 れず、発赤、腫脹、浮腫等の変化も認められなかった。また、諸臓器にも変
17 化はみられなかった。(参照 10[OTC-Q 抄録 p12]

18
19 モルモット (ハートレー系、6 週齢、20 匹/感作群、10 匹/非感作群) を用
20 いた OTC-HCl の皮膚感作性試験が Maximization Test 法により実施された
21 (24 日間観察)。感作群は、被験物質の 0.5%水溶液 0.1 mL を皮内感作 (感
22 作 0 日) した後、感作 7 日後に 25%水溶液 0.2 mL を 48 時間閉塞貼付して
23 皮膚感作した。非感作群は、注射用水を用いて同様の感作試験を実施した。
24 感作 21 日後に被験物質の 25%水溶液 0.1 mL を 24 時間閉塞貼付して惹起し、
25 惹起貼付除去 24 及び 48 時間後に紅斑及び浮腫の形成について観察した。

26 感作群では、惹起貼付除去 24 及び 48 時間後のいずれの観察でも、散在性
27 又は斑状～中等度びまん性の紅斑が全例で認められた。非感作群では全例で
28 皮膚反応はみられなかった。(参照 16) [農薬抄録 p41 表、p49~50]2008

29 30 (3) 心臓血管系への影響

31 麻酔処理したウサギ (雄、6 匹) に 0.5 mL の生理食塩水に溶解した TC-HCl
32 を静脈内投与 (1、2 及び 5 mg/kg 体重) した。投与は、3、10、20 及び 60
33 秒の時間をかけて実施された。投与 1~3 分後に、投与量及び投与速度に依存
34 的な心拍数の低下 (正常値: 270~300 拍/分から 100 拍/分以下) がみられた。
35 動脈血圧に対する影響はみられなかった。

36 5 mg/kg 体重群では、呼吸は抑制され、呼吸停止又は 1~2 分間にわたるゆ
37 っくりとした浅い呼吸がみられた。(参照 4) [FAS36 2.2.9.1]1980

38
39 イヌに CTC を静脈内投与 (50 mg/kg 体重) しても、心電図上に明白な変

1 動はみられなかった。(参照 3) [CTC 抄録 p10]

2
3 イヌ及びネコにおける CTC の静脈内投与 (20~100 mg/kg 体重) は、エ
4 ピネフリン、アセチルコリン及びヒスタミンの血管運動及び心臓に対する迷
5 走神経刺激作用に影響を及ぼさなかった。(参照 3) [CTC 抄録 p10]

6 7 (4) 肝毒性に関する試験

8 TC-HCl (≥ 0.25 mM) は *in vitro* でマウス又はヒトの肝臓ミトコンドリア
9 の TCA サイクルの活性及び脂肪酸の β 酸化を可逆的に阻害した。マウスに
10 TC-HCl を腹腔内投与 (1 mM/kg 体重) した後、トレーサーとして ϕ [U- 14 C]
11 パルミチン酸を経口投与後、~~1 mM/kg 体重を腹腔内投与~~したところ、肝臓中
12 TG が増加し、病理組織学的検査では微小空胞変性がみられた。(1988)

13
14 ラットの肝細胞を用いて TG 及びタンパク質の合成及び分泌に対する TC
15 の影響について調べた。TC は 14 C-TG 分泌を濃度依存的に阻害したが、TG
16 及びタンパク質の合成には影響を及ぼさなかった。(参照 4) [FAS36 2.2.9.2]1989

17 18 (5) 腎毒性に関する試験

19 ラット (Wistar 系) に TC を単回静脈内投与 (150 mg/kg 体重、尾静脈よ
20 り投与) した。複数回の試験を実施したが、腎臓における局所貧血はみられ
21 なかった。(参照 4) [FAS36 2.2.9.3]1966

22 23 (6) その他の薬理試験

24 CTC の酸性及びアルカリ性溶液をイヌに静脈内投与した。10 mg/kg 体重
25 の投与では血圧及び呼吸に影響を及ぼさなかった。酸性溶液では、30~40
26 mg/kg 体重の投与で血色素尿症を呈するが、アルカリ性溶液では、100 mg/kg
27 体重の投与でも耐過した。

28
29 ネコにおける CTC の静脈内投与 (20 mg/kg 体重) 試験では、一過性の血
30 圧の下降が認められたが回復は早く、呼吸にも影響を及ぼさなかった。(参照
31 3) [CTC 抄録 p10]

32 33 9. ヒトにおける知見

34 ヒトの治療において、TC-HCl は成人では通常 250 又は 500 mg/ヒトの用
35 量で 6 時間おきに経口投与するよう、米国国民医薬品集 (US National
36 Formulary) 及び英国薬局方 (British Pharmacopoeia) に規定されている。
37 CTC は、カプセル投与 (50、100、250 mg/ヒト) 及び注射による投与 (100、
38 200、500 mg/ヒト) が認められている。(参照 4) [FAS36 2.3.1]

1 (1) 投与後の影響

2 ① OTC

3 ヒトの OTC の使用による多様な毒性及び刺激作用が報告されている。OTC
4 は胃腸障害（上腹部の熱感及び苦痛、腹部不快感、吐き気、嘔吐及び下痢）
5 を引き起こす可能性がある。静脈内投与では、静脈血栓症を発現することが
6 ある。長期投与では、末梢血に変化（白血球増加、異型リンパ球、顆粒球の
7 毒性顆粒形成（toxic granulation of granulocytes）、血小板減少性紫斑病の
8 発現）がみられる場合がある。植物毒素反応（phytotoxic reaction）が起こ
9 る可能性があり、しばしば爪甲離床症及び爪の色素沈着を伴う。肝障害及び
10 血液凝固不全も起こる。7歳以下の子どもで歯の褐色化が起こる場合がある。
11 母親が妊娠中に OTC 投与治療を受けた幼児に歯の褐色化が進む可能性もあ
12 る。胎児や子どもの骨に OTC が沈着し、骨の成長が低下することがあるが
13 OTC への暴露期間が短いと容易に回復する。（参照 5） [FAS27 2.3.1]

14 ② TC

15 高用量の TC 製剤をヒトが治療で使用した場合、骨及び歯の変色が生じる
16 ことが知られている。子どもが長期又は短期の治療を受けた場合、黄色又は
17 褐色にエナメル質が変色する。投与期間より抗生物質の投与総量が重要であ
18 る。この影響のリスクは、新生児及び最初の歯が生える前の乳児に製剤が投
19 与される場合に最も高くなる。しかし、歯の石灰化が進む 2 ヶ月～8 歳齡の
20 子どもに製剤が投与された場合、永久歯の色素沈着が発現する。この影響の
21 初期の特徴は黄色蛍光色の歯への着色である。

22
23
24 TC は、重篤な慢性尋常性座瘡の治療に低用量（100 mg/ヒト/日）で経口投
25 与される。TC 類治療で通常生じる合併症はわずかな胃腸障害である。（参照
26 4） [FAS36 2.3.1]

27 ③ TC 類

28 TC 類の使用によるヒトに対するさまざまな有害影響が報告されている。
29 TC 類は刺激性物質で、静脈内投与すると血栓性静脈炎を起こす。筋肉内投与
30 では疼痛が激しく推奨できない。経口投与では、上腹部の熱感、腹部不快感、
31 吐き気及び嘔吐を引き起こすことがある。

32
33
34 妊婦に対する TC 類を用いた治療によりその子どもに歯の変色が生じる可
35 能性があり、子どもへの暴露は授乳期間中にも生じる。

36
37 TC 類は妊娠期間及び小児期間中は骨に沈着する。これらの物質を幼児が投
38 与された場合、腓骨を測定することにより骨の成長が 40 %低下することが示
39 された。この影響は投与期間が短い場合速やかな回復が可能である。

1
2 全ての TC 類は光毒性を生じる可能性があり、皮膚が直射日光にさらされ
3 ると軽度から重篤な皮膚反応を呈する。

4
5 TC 類の非経口的な反復投与後、特徴的な肝臓への影響として脂肪蓄積がみ
6 られた。TC 類は腎臓機能が低下した患者において、尿毒症を悪化させる可能
7 性がある。理由は明らかではないが、妊婦では、肝臓障害に対する感受性が
8 増すと考えられる。

9
10 TC 類はほとんどアレルギー反応を起こさない。TC 類に対する過敏症とし
11 て粘膜組織でアレルギー症状を呈したと報告された。中枢神経系の副作用、
12 血中細胞への影響についての報告はまれである。TC 類を用いた長期にわたる
13 治療により末梢血に変化が生じることもあり、白血球増多、異型リンパ球、
14 顆粒球の毒性的顆粒化 (toxic granulation of granulocytes) 及び血小板減少
15 性紫斑病が観察された。

16
17 TC 類は治療に用いられた場合、乳幼児に頭蓋内圧及び泉門膨隆の緊張（偽
18 脳腫瘍）を高める可能性がある。若年層では頭痛、吐き気、嘔吐及び複視を
19 訴える。（参照 4） [FAS36 2.3.1]

20 21 (2) 過敏性

22 4 歳女児及び 6 歳男児で、それぞれ耳炎及び尿路感染症の OTC を用いた治
23 療後に感作性が観察された。

24
25 パッチテストで OTC による湿疹状接触アレルギーの発現が 3 人の被験者
26 で認められた。対照群は全て陰性であった。

27
28 3%OTC 感作群として 10 名及び陰性対照として 31 名の被験者にパッチテ
29 ストが実施され、感作群では、7/10 例に強い反応が、2/10 例に弱い反応がみ
30 られた。対照群の 30/31 例及び感作群の 1/10 例で反応はみられなかった。（参
31 照 5） [FAS27 2.3.2]

32 33 10. 微生物学的影響に関する試験

34 (1) *in vitro* 試験

35 ① 動物由来菌における MIC

36 動物由来の異なる菌種に対する TC の MIC を表 27 に示した。

表 27 テトラサイクリンの動物由来細菌に対する平均 MIC

菌種	MIC (μg/mL)
<i>Escherichia coli</i>	12.5 (3.1~500)
<i>Proteus mirabilis</i>	>100 (50~>100)
<i>Enterobacter</i>	25 (6.3~50)

() : 範囲(1986)

TC、CTC 及び OTC の MIC (0.1~100 μg/mL) が *Staphylococcus* sp.、*Proteus* sp. 及び *E. coli* を含む多くの臨床分離菌について報告されている。このデータから、3 種の TC 類のさまざまな微生物に対する抗菌活性は極めて類似していることが示された。

3 種の動物由来細菌 (*Pasteurella hemolytica*、*P. multocida* 及び *Bordetella bronchiseptica*) から分離された 34 株について、CTC の抗菌活性を OTC とともに調べた。MIC の幾何平均は、CTC で 0.32 μg/mL、OTC で 0.52 μg/mL であった。*E. coli* (1 株のみ) では、CTC で 4.8 μg/mL、OTC で 2.8 μg/mL であった。

in vitro 試験で、*S. aureus* の MIC は、CTC で 0.19 μg/mL、TC で 0.21 μg/mL、OTC で 0.55 μg/mL であった。

in vitro 試験で、動物又はヒト由来の *E. coli* の MIC₅₀ は、CTC で 2 μg/mL、OTC で 4 μg/mL であった。*Enterococcus faecalis* 及び *E. faecium* の MIC は、CTC に対する値が OTC の 2 倍 高い感受性 を示した。(参照 4) [FAS36 2.2.7.1])

② ヒト由来臨床分離菌における MIC

健康なヒトの糞便から分離された菌種 (10 菌株/種) の範囲で TC と OTC の抗菌活性が比較された。MIC を求める際の TC 及び OTC の濃度は 0.06~32 μg/mL で、細菌濃度は 10⁷ CFU/mL であった。結果を表 28 に示した。ほとんどの菌種の感受性は、TC 及び OTC に対して同様であったが、TC は、*Bifidobacterium* sp.、*Eubacterium* sp. (p<0.05) 及び *Fusobacterium* sp. (p<0.1) に対しては OTC より低い濃度で活性を示し、*Streptococcus* sp. (p<0.05) に対しては OTC より高い濃度で活性を示した。試験に用いた全菌種を考慮した MIC の幾何平均は、TC では 3.2 μg/mL、OTC では 3.8 μg/mL であった。(参照 4) [FAS36 2.2.7.1])

1 表 28 ヒト由来菌に対する TC 及び OTC の MIC (µg/mL)

菌種	TC		OTC	
	MIC ₅₀	幾何平均	MIC ₅₀	幾何平均
<i>Escherichia coli</i>	>32	>32	>32	>32
<i>Bifidobacterium</i> sp.	16	8.6	>32	>17.1
<i>Bacteroides fragilis</i>	4	2.5	4	2.5
<i>Eubacterium</i> sp.	2*	1.6	4	2.6
<i>Clostridium</i> sp.	0.062	0.2	0.25	0.2
<i>Streptococcus</i> sp.	16	>19.7	8	>13.9
<i>Fusobacterium</i> sp.	0.125	0.1	0.25	0.2
<i>Lactobacillus</i> sp.	2*	1.9	2	2.3
<i>Proteus</i> sp.	>32	>32	>32	>32
<i>Peptostreptococcus</i> sp.	2	3.2	4	4.0

2 * : MIC₅₀=MIC₉₀

3
4 ヒト結腸において最も数の多い 50 菌種の各 4 菌株を用いて、嫌気性菌に
5 対して米国臨床研究所規格委員会 (NCCLS : National Committee for
6 Clinical Laboratory Standards) で推奨されている方法により、MIC が求め
7 られた。試験は嫌気下、pH6.0、6.5 及び 7.0、接種濃度 10⁵ 及び 10⁷ 細胞/ス
8 ポットで実施した。供試菌には、30 年以上の間に健康なヒトから分離された
9 菌が含まれた。

10 *Bacteroides* 属では長年にわたり耐性が增強されていることが判明した。
11 TC に対する MIC が < 0.5 µg/mL の株が 1933~1969 年に分離され、MIC が
12 >1 µg/mL の株が 1970 年に分離された。数年前に分離された菌株の感受性は、
13 今日分離された菌株の感受性とは大きく異なるため、これらの結果を近年分
14 離された菌株と直ちに比較することはできない。

15
16
17 ヒトボランティアから分離された糞便を用いて、NCCLS の方法で MIC に
18 ついて検討された。好気性及び嫌気性菌は TC に感受性であり、50 %以上の
19 菌株が break-point 値 (8 µg/mL) 以下の濃度で阻害された。ブレインハート
20 インフュージョン寒天培地及び腸球菌培地から分離された多くの好気性菌
21 (*Enterococcus* 及び *E.coli*) の平均 MIC₅₀ は 1 µg/mL であった。McConkey
22 培地で好氣的に分離された少数例の *E.coli* 菌株では、平均 MIC₅₀ は 8 µg/mL
23 であったが、MIC₉₀ はより高い値 (64 µg/mL) を示した。嫌気性菌では、血
24 液添加ブレインハートインフュージョン培地及び Schaedler 培地のいずれに
25 おいても平均 MIC₅₀ は 1 µg/mL であった。グラム陽性嫌気性菌はグラム陰性
26 菌より TC に対し感受性であった。本試験で得られた結果は Richez (1994
27 年) によって得られたものと非常に類似していた。(参照 22) [FAS41 2.3.1.1]

1
2 ③ 連続フローのケモスタットシステムを用いた試験

3 TC 類の影響については、連続フローのケモスタットのモデルシステムによ
4 る一連の研究が実施されている。

5 連続フローのシングルチャンバーケモスタットにプールした健康なヒトボ
6 ランティアの糞便を接種し、ヒト結腸を模倣した条件下で培養した。チャン
7 バーで使用された培地には、多岐にわたる胆汁、L-システイン、塩類、ヘミ
8 ン、ビタミン類及び Tween 80 が添加された栄養成分（カゼイン、ペプトン
9 及び植物性炭水化物）が含まれていた。対照のケモスタット（薬剤なし）の
10 培地のロットは試験ケモスタットの培地を変えるときに同時に変えた。糞便
11 の接種後、定常状態に達するまで（通常 2 週間）培養し、培養液の顕微鏡学
12 的一般性状、細胞の脂肪酸、通性大腸菌及び腸球菌を含む正常細菌叢の対象
13 細菌数等の腸内細菌の性状等について調べた。

14 定常状態に達すると、各ケモスタットに TC が添加（0、0.15、1.5 及び 15
15 mg/mL）された。これらの用量は 0、0.025、0.25 及び 2.5 mg/kg 体重の ADI
16 値に相当し、1 g の糞便又は結腸内容に TC が約 100 µg 存在すると推定され
17 る。ケモスタットの細菌数は通常の結腸の状態を模倣したものである。

18 試料採取は、TC 添加前（試験開始 17～24 日）及び添加中（試験開始 25
19 ～33 日）に実施された。（参照 22） [FAS41 2.3.1.2]

20
21 a 定着抵抗性（colonization resistance）に対する TC 類の影響

22 抵抗性に及ぼす TC 類の影響については、連続フローのケモスタットシス
23 テムによる試験が実施されている。

24 ケモスタットに糞便を接種し定常状態に達した後、TC を添加（0、0.15、
25 1.5 及び 15 mg/L、試験開始 25～33 日）した。試験開始 33、34 及び 35 日後
26 に各ケモスタットに *Clostridium difficile* VPI 10463 の生菌 10⁷ 個を接種し、
27 外来微生物の定着を阻害する細菌叢の能力について調べた。試料は試験開始
28 34～42 日に採取した。対照試料は TC の添加前及び添加中に採取し、細菌数
29 及び毒性価の背景データとした。試料は新たな芽胞を選択するためにあらか
30 じめエタノールで洗浄するか又は洗浄せずに、選択培地（D-cycloserine,
31 cefotoxin, and fructose agar:CCFA）を用いて *C.difficile* の培養を行った。
32 CCFA 培地では、エタノールで洗浄しない場合、他の *Clostoridium* sp.と、
33 少なくとも 1 種の *Enterococcus* sp.が増殖した。*C.difficile* の toxin A の濃度
34 も測定した。糞便を接種していない陽性対照のケモスタットに *C. difficile*
35 VPI 10463 を接種し、糞便を接種しないケモスタットで *C. difficile* が定着可
36 能であることが示された。このケモスタットでは、最初の 72 時間は菌数が減
37 少したが、*C. difficile* がケモスタットの環境に適応すると（接種約 6 日後）、
38 菌数は 10⁵～10⁶ 個/mL に増加した。

39 試験に用いたケモスタットでは、陽性対照と異なり *C. difficile* は定着せず、

1 接種初期において toxin A の産生もみられなかった。これらは、CCFA 培地
2 における *C. difficile* の培養により確認されたものではなかった。なぜならば、
3 CCFA 培地における菌数が、*C. difficile* 非接種・糞便接種ケモスタットと、
4 *C. difficile* 接種・糞便非接種の対照ケモスタットで、しばしば同様か、それ
5 以上であったためである。このバックグラウンドを構成する菌種は同定され
6 ていない。

7 以上の内容をまとめると、定着抵抗性を欠く陽性対照ケモスタット（糞便
8 非接種）において、*C. difficile* は定着した。さらに、糞便接種ケモスタット
9 に TC を添加（0、0.15、1.5 及び 15 mg/L）しても、*C. difficile* が定着する
10 レベルまで、定常状態の細菌叢の定着抵抗性を減じることはなかった。（参照
11 22） [FAS41 2.3.1.3]

12 13 b TC の耐性菌選択試験

14 対照のケモスタットと TC（0.15、1.5 及び 15 mg/L）を添加したケモスタ
15 ットにおける腸球菌、*E.coli* 及び *Bacteroides fragilis* の TC 耐性株数を比較
16 した。まず、TC に対する背景耐性がケモスタットに接種した糞便で調べられ
17 た。分離された TC 耐性株の割合を表 29 に示した。

18
19 表 29 糞便中細菌の TC に対する背景耐性

TC (mg/L)	耐性の割合 (%)	
	<i>E.coli</i>	腸球菌
4	3	ND
8	3	91
16	3	92
32	ND	91
64	ND	91

20 ND：設定せず

21
22 *E.coli* の耐性株数の増加は、背景値（8 mg/L で 3%）と比較して求められ
23 た。20～300 コロニーが存在する McConkey 寒天培地から得られた *E.coli*
24 を TC（4、8 又は 16 mg/L）を含む寒天に重層した。培養 16 及び 24 時間後、
25 マスタープレート上の細菌数と TC を含むプレートの細菌数とを比較した。
26 TC の最高添加量（15 mg/L）において、耐性 *E.coli* の割合は添加開始 24 時
27 間後までに <20% から >50% に増加し、添加開始 48 時間後には >60% に達
28 した。添加を継続したにもかかわらず、その後耐性 *E.coli* の割合は減少し始
29 め、添加開始 6 日後には 35% にまで減少した。非添加対照ケモスタットでは、
30 耐性株の割合は 5% を超えることはなかった。TC を 0.15 及び 1.5 mg/L 添加
31 したケモスタットでは、結果にばらつきがみられた。腸球菌及び *B.fragilis*
32 の耐性にはほとんど影響はみられず、おそらくこれらの細菌の高い耐性率（60

1 ~100 %) によるものと考えられた。さらに、これらの細菌の耐性は試験開
2 始時から非常に高く (ケモスタットに接種した糞便中の腸球菌の 91 %が TC
3 に耐性)、TC を添加しても計測可能な影響はみられなかった。ケモスタット
4 における *B.fragilis* の TC 耐性は最低でも >50 %で、ほとんどは 90 %に近い
5 値であった。(参照 22) [FAS41 2.3.1.4]

6 7 ④ OTC と他抗菌性物質併用の影響

8 *Staphylococcus aureus* ATCC 9144 を 30 ppb の OTC に 14 日間暴露した
9 後 OTC の MIC を測定したが、抗菌性物質に暴露されていない細菌と同様で
10 あった。このことから 30 ppb は *in vitro* で耐性菌を選択するのに十分ではな
11 いと考えられた。OTC を低濃度の他の抗菌性物質 (ネオマイシン、エリスロ
12 マイシン、スルファメタジン、及び/又はジヒドロストレプトマイシン) と併
13 用した場合、MIC は上昇した。*Staphylococcus aureus* ATCC 9144 及び
14 *Enterobacter cloacae* B520 と低用量の抗菌性物質を 14 日間培養した結果、
15 同様な結果が得られている。これらの結果から、抗菌性物質との併用により、
16 細菌の感受性が低下する可能性があることが判明した。(参照 22) [FAS41 2.3.1]

17 18 ⑤ OTC の *E.coli* の耐性獲得に対する影響

19 低濃度の抗生物質が *E. coli* の株間における耐性の接合伝達に及ぼす影響に
20 ついて、レシピエント及びドナー (被伝達及び伝達菌) *E. coli* に OTC を添
21 加 (0.01、0.1 及び 1.0 µg/L) して調べた結果、耐性プラスミドの伝達頻度は
22 増加しなかった。しかし、OTC 濃度が 0.01 µg/L では、耐性プラスミドの伝
23 達頻度は減少した。同様の試験において、鶏糞由来の *E.coli* CS-1 及びヒト腸
24 内細菌の *E. cloacae* B520 を用いて耐性の進行について調べた。いずれの菌
25 も 0.1~5 µg/L の濃度の CTC 及び OTC に対して感受性が低下した。他の抗
26 菌性物質 (ストレプトマイシン、タイロシン、スルファメタジン、バシトラ
27 シン、ヴァージニアマイシン、フラボマイシン及びモネンシン) では 1.0 µg/L
28 の濃度で感受性の変化はみられなかった。しかし、耐性の測定に用いた菌株
29 及び方法により大きなばらつきがみられた。(参照 22) [FAS41 2.3.1] 1988

30 31 (2) *in vivo* 試験

32 ① マウスを用いた投与試験

33 無菌マウスに *E.coli* K-12 株の 3 クローン (three clones) 移植試験が行われ、
34 菌は増殖して安定集団を形成した。その後、OTC を飲水投与した結果、
35 感受性菌が優先菌として残ったことが示された。このマウスモデルにおける
36 最小選択濃度は 8~12 µg/mL であった。これらの OTC 濃度は感受性株を用
37 いた MIC (0.5 µg/mL) より高かった。

38 同じ菌株を用いた *in vitro* 試験では、OTC の最小選択濃度は 0.05 µg/mL
39 で、MIC の 1/10 であった。(参照 5) [FAS27 2.2.9.1]

1
2 マウスにおける *S.aureus* に対する *in vivo* 活性を調べた結果、ED₅₀ は OTC、
3 CTC 及び TC でそれぞれ 5.8、7.6 及び 7.2mg/kg 体重であった。(参照 4) [FAS36
4 2.2.7.2]

5
6 無菌マウスにヒト細菌叢を移植した試験では、CTC の飲水投与 (0.5
7 µg/mL) で耐性 *E.coli* が増加した。用量は食品中の許容残留量に近い値であ
8 ったが、食品中の CTC 残留が耐性獲得に寄与する可能性はおそらく低いと考
9 えられる。なぜならば、食品摂取後に耐性腸内細菌数は毎日 100 万個増加す
10 ることが報告されているからである。1987

11
12 無菌マウスに 2 つの同質遺伝子系統の *E.coli* (片方は R プラスミドを有す
13 る) を移植し、TC を 10~15 日間飲水投与した。TC の最低濃度は 6.5 µg/mL
14 であり、この場合糞中濃度は 0.5 µg/g となった。この値はプラスミドを有し
15 ない株の MIC の 1/2 であった。この濃度では、腸内の感受性株を死滅させる
16 ことはなかったが、このモデルには障壁影響に関与する主要な嫌気性細菌叢
17 は含まれていなかった。1993

18
19 無菌マウスに子豚由来の糞中細菌叢を移植し、CTC を飲水投与 (20 µg/mL)
20 した。その結果、CTC 耐性の乳糖発酵性細菌の出現が増加した。(参照 22)
21 [FAS41 2.3.2]1984

22 23 ② ラットを用いた投与試験

24 成熟ラット (9 匹/投与群、3 匹/対照群) を用いた OTC の混餌投与による
25 漸増投与試験が実施された。0 及び 10 ppm で 6 週間混餌投与後、混餌濃度
26 を 50 ppm に上げてさらに 2 週間投与した。

27 その結果、投与群の糞中に OTC 耐性菌の出現はみられなかった。(参照 5)
28 [FAS27 2.2.9.2]1975

29 30 ③ イヌを用いた投与試験

31 成熟イヌ (ビーグル種、5 匹/群) を用いた OTC の 44 日間混餌投与 (0、2
32 及び 10 ppm) 試験が実施された。試験期間中の糞を比較プレート計数により
33 調べた結果、10 ppm 群で耐性菌への変化がみられた。2 ppm (50 µg/kg 体重
34 /日) 群に影響はみられなかった。(参照 5) [FAS27 2.2.9.3]1975

35 36 ④ 七面鳥を用いた投与試験

37 七面鳥を用いた OTC の 18 週間混餌投与 (0、50 及び 100 ppm) 試験が実
38 施された。投与開始 8、16 及び 18 週後に血液及び肝臓から菌を分離し、8 種
39 の抗菌性物質に対する耐性について調べた。抗菌性物質に対する耐性は、OTC

濃度の上昇に伴い増加した。(参照 5) [FAS27 2.2.9.4]1981

(3) ヒトの知見

① 健康なヒトへの投与試験

健康な成人ボランティアにより低用量の OTC の糞中細菌叢に対する生態学的影響について検討された。30名の被験者では週に1回、4週連続で、腸内細菌総数及び OTC 耐性腸内細菌について調べられた。別の14名のボランティアでは、OTC の7日間経口投与試験 (2(6名)、20(6名)及び2,000 mg/ヒト/日(2名)、2回/日投与) が実施された。糞中 OTC 濃度、総嫌気性菌数、並びに主要嫌気性菌の形態学的及び生理学的特徴が報告された。投与前、投与開始7日後及び最終投与7日後に、これらの主要嫌気性菌の MIC が測定され、総菌数及び OTC 耐性腸内細菌数が調べられた。

その結果、2,000 mg/ヒト/日投与で主要嫌気性菌及び OTC 感受性腸内細菌が効果的に減少し、その間に OTC 耐性腸内細菌の著しい増殖が観察され、酵母が定着した。

20 mg/ヒト/日投与では、主要嫌気性菌叢の組成に影響は及ぼさず、外来性の細菌の定着は観察されなかった。しかし、OTC 感受性腸内細菌が排除されなかった場合、大部分の OTC 感受性嫌気性菌は消失した。このことから、この用量の OTC が消化管内で生態学的影響を及ぼすことが示唆された。

2 mg/ヒト/日投与では、糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に変化はみられなかった。

本試験における NOAEL は 2 mg/ヒト/日と考えられた。(参照 5、22) [FAS27 2.3.3、FAS41 2.4]

上記試験において、投与前及び投与開始7日後の TC 感受性及び TC 耐性腸内細菌数における個人差の検定が Wilcoxon test の序列法を用いて行われた。その結果、各投与群とも有意な個人差はみられなかった。(参照 23)

ボランティアに TC を4日間投与 (0、50及び1,000 mg/ヒト/日) した。その結果、高用量では *E.coli* の腸管からの除去量が増加したが、低用量では増加しなかったことから、50 mg/ヒト/日の TC ではヒト腸内細菌叢の定着障壁を攪乱させないと考えられた。

健康なヒトに OTC を5日間経口投与 (1 g/ヒト/日) した結果、おそらく腸内細菌叢の代謝により生成されたと考えられる胆汁酸のけん化性抱合体の糞便中濃度が減少した。また、コレステロールからコプロスタノール及びコプロスタノンへの細菌による変換が減少し、糞便中の中性ステロール量が減少し、糞便中のエストロゲン複合物の排泄が増加した。

1 上記と同用量の TC では、*E.coli* の TC 耐性株数が増加した。

2
3 TC 類の最小有効量（1 g/ヒト/日）では、8～10 日間の経口投与で好気性又
4 は嫌気性菌量に最小限の影響が認められるのみであった。TC は、この量を分
5 けて投与されると、まれに軽度の副作用（吐き気、下痢及び嘔吐）を起こす
6 ことがあるが、投与を中止すると消失する。（参照 22） [FAS41 2.4]

7 8 ② 治療における投与の影響

9 TC 類を用いた治療により、特に糖尿病や抵抗性が低下している患者では、
10 これらの薬剤に感受性のない細菌、酵母及び真菌の感染速度が速くなる。（参
11 照 4） [FAS36 2.2.7]

12
13 TC を用いた治療後にヒトにおいて耐性 *E.coli* が出現すると報告されてい
14 るが、耐性菌は最終投与後に時間の経過とともに減少した。

15
16 初期の試験で、OTC を 6 ヶ月間投与（10 mg/ヒト/日）されたヒトで耐性
17 大腸菌及び酵母が増加したが、この影響は一過性のもので、耐性の腸内細菌
18 は投与前にも存在していた。

19
20 尋常性座瘡の治療のため TC を長期にわたり投与（100 mg/ヒト/日）され
21 た場合、腸内細菌叢の耐性パターンが変化し、伝達性 R 因子細菌を有するヒ
22 トの割合及び多剤耐性菌株数が増加した。（参照 22） [FAS41 2.4]

23 24 ③ 酵素及び腸内細菌叢の生化学的パラメータに対する影響

25 TC 類は高濃度で腸に到達し、投与 48 時間以内に腸内細菌叢を攪乱させる。
26 腸内細菌叢の攪乱は、治療用量又はそれ以下の用量でもおこる。耐性菌を誘
27 導し、代謝活性及び腸内細菌叢の定着抵抗性（定着障壁）を変化させて病原
28 性菌、日和見感染菌及び耐性菌の異常増殖を招き、明らかな悪性影響は伴わ
29 ないが、腸内細菌叢のバランスを変化させる。

30
31 TC 類は、同様の抗菌活性を有する広域抗菌性物質と考えられている。これ
32 らの薬剤は本来グラム陽性菌に高い抗菌活性を有しているが、多くの細菌が
33 TC 類に対し耐性となった。TC 類に耐性の嫌気性菌も出現している。TC 類
34 の静菌作用は、細菌のタンパク質合成阻害によるものである。リボソームの
35 30S サブユニットに結合し、アミノアシル-tRNA のリボソーム受容体への結
36 合を妨げる。TC 類のタンパク質合成及び細胞増殖に対する阻害作用は、投与
37 を中止すると通常回復する。TC は他の TC 類より選択的に耐性を獲得すると
38 考えられるが、TC 類のどれか一つに耐性を獲得した細菌は、しばしば他の
39 TC 類にも耐性となる。

1
2 ヒトボランティアに治療用量の OTC を投与した結果、腸内細菌叢の代謝
3 に変化がみられた。投与により、腸内細菌叢による生化学的過程における糞
4 便中性ステロールのエステル化及び置換が著しく減少した。治療用量の OTC
5 の投与で、男性では抱合型エストロゲンの糞便中濃度が上昇するが、これは
6 腸内細菌叢で生成される β-グルクロニダーゼの加水分解作用が低下すること
7 に起因すると考えられた。避妊薬であるエチニロエストラジオールを服用し
8 ている女性が TC を投与されると、エストロゲンの腸内吸収が減少すること
9 により、エストロゲンの平均半減期が著しく短くなり、エチニロエストラジ
10 オールの糞便中への排泄が増加した。TC を投与すると、腸内細菌叢の β-グル
11 クロニダーゼ活性が低下し、そのためにエストロゲンの代謝が変化した。健
12 康なボランティアに治療用量の TC を投与し、続いて潰瘍性大腸炎の治療薬
13 であるサリチルアゾスルファピリジン (SASP) を投与した結果、SASP の代
14 謝に変化が生じた。TC を投与しない場合、被験者は糞便中に SASP の分解
15 産物を排泄し、投与した場合は SASP の未変化体を排泄し、細菌のアゾリダ
16 クターゼの活性低下がみられた。また、通常腸内で代謝される強心配糖体で
17 あるジゴキシンの代謝にも、抗菌性物質が腸内細菌叢に作用することにより
18 変化が生じることが判明した。腸内細菌叢、主に嫌気性菌 *Eubacterium*
19 *lentum* の代謝活性は、ラクトン環の還元及び配糖体部分の加水分解と関連し
20 ている。TC を用いた治療により、ジゴキシンの還元物質の尿中排泄は減少し、
21 その結果、ジゴキシンの血清中濃度が上昇し、ジギタリスの毒性が発現する
22 可能性がある。

23
24 下痢及び重複感染は、TC 類を用いた治療を制限する一般的な副作用である。
25 TC 類は、多くの好気性及び嫌気性大腸菌群並びにグラム陽性芽胞菌の増殖を
26 阻害する。糞便性大腸菌群数が減少すると、TC 耐性菌(特に酵母及び腸球菌)、
27 *Proteus* 及び *Pseudomonas* が異常増殖し、重複感染が発生する可能性がある。
28 TC を用いた治療により生じた重複感染のうち、抗菌性物質による下痢及び
29 *Clostridium difficile* の異常増殖により生じたサイトトキシンによる偽膜性
30 腸炎がヒトにとって最も重要である。胃腸障害の発生は用量相関的に増加す
31 る。通常、投与を中止して数日以内に正常な腸内細菌叢が修復される。(参照
32 22) [FAS41 2.2]

33 34 Ⅲ. 食品健康影響評価

35 1. 国際機関における評価

36 (1) JECFA における評価

37 JECFA では、第 12 回会議 (1968 年) で TC 類が Group として評価され、
38 暫定的な ADI (0~0.15 mg/kg 体重/日) が設定された。第 36 回会議 (1990
39 年) で OTC が再評価され、ヒトボランティアの試験における腸内細菌叢に及

1 ぼす影響から得られた NOAEL (2 mg/ヒト/日) に安全係数 10 を適用し ADI
2 (0~0.003 mg/kg 体重/日) が設定された。その後第 45 回会議 (1995 年) で、
3 OTC、CTC 及び TC の抗菌活性が同様であることを考慮し、TC 類の Group
4 ADI として 0~0.003 mg/kg 体重/日 (単独又は総和として) が設定された。
5 (参照 24) [TRS 888 p50]

6 さらに、連続フローのケモスタットのモデルシステムによる試験の結果、
7 TC を添加後の *E.coli* の耐性菌に対する影響は TC のヒト腸内細菌叢に対する
8 影響の報告所見と一致しており、最も感受性の高いエンドポイントである耐
9 性菌の選択においてほとんど個体差がみられないことから、安全係数は不要
10 であると判断された。その結果、第 50 回会議 (1998 年) では ADI が見直さ
11 れ、ヒトボランティアの試験で得られた NOAEL (2 mg/ヒト/日) に基づき、
12 TC 類の Group ADI として 0.03 mg/kg 体重/日 (単独又は総和として) が設
13 定されている。(参照 22) [TRS 888 p52]

14 15 (2) EMEA における評価

16 EMEA では、TC 類の抗菌活性が同様であることを考慮し、JECFA (第 45
17 回会議;1995 年) の評価を支持し、TC 類の Group ADI として 0~0.003 mg/kg
18 体重/日が設定されている (1995 年)。(参照 25) [EMEA SUMMARY REPORT(3)]

19 20 2. 毒性学的 ADI について

21 TC 類は、遺伝毒性試験において、OTC では *in vitro* の前進突然変異試験
22 (+S9) で細胞毒性が生じる濃度においてのみ陽性の結果が得られたが、*in*
23 *vivo* の小核試験での陽性結果に用量依存性はみられなかった。TC では *in*
24 *vitro* の遺伝子突然変異試験及び *in vivo* の染色体異常試験で陽性結果が得ら
25 れたが TC がリボソームと結合することで起こるタンパク質合成阻害による
26 ものと考えられた。CTC では、全遺伝毒性試験が陰性であり、TC 類には生
27 体にとって問題となる遺伝毒性はがないものと考えられた。

28 慢性毒性/発がん性試験では、OTC のラットを用いた 103 週間慢性毒性/発
29 がん性併合試験において、雄の副腎で良性褐色細胞腫の用量依存的な発生が
30 みられたが雄及び対照群の生存率が低かったため発生数の増加は重要とは考
31 えられなかったこと及び雌の最高用量群で脳下垂体腺腫の発生率が増加した
32 が脳下垂体過形成の発生は対照群より少なかったことから、OTC には発がん
33 性はないと考えられた。また、TC 及び CTC に発がん性は認められなかった。

34 したがって、TC 類は遺伝毒性発がん物質とは考えられず、ADI を設定す
35 ることが可能であると考えられた。

36 ~~各種毒性試験において得られた最も小さい NOAEL は、ラットを用いた~~
37 ~~OTC の 2 世代生殖毒性試験における NOAEL (18 mg/kg 体重/日) であった。~~

38 各種毒性試験のうち、投与による影響が認められた最も低い指標は、ラッ
39 トを用いた OTC の発生毒性試験における胎児の前肢骨化低下及び胚吸収増

1 加に基づく LOAEL 48 mg/kg 体重/日であった。

2
3 毒性学的 ADI を設定するにあたっては、この LOAEL/NOAEL に、安全係
4 数として種差 10、及び個体差 10 及び LOAEL を使用することによる追加の
5 10 の 1,000/100 を適用して、毒性学的 ADI は 0.0480-18 mg/kg 体重/日と設
6 定するのが適当であると考えられた。

7 8 3. 微生物学的 ADI について

9 微生物学的影響については、健康なヒトボランティアにおける腸内細菌へ
10 の影響が検討された結果、糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に及ぼす影響を
11 指標に NOAEL (2 mg/ヒト/日) が得られた。

12 また、連続フローのケモスタットのモデルシステムによる試験(用量:0.025、
13 0.25 及び 2.5 mg/kg 体重/日)の結果、2.5 mg/kg 体重/日の添加で *E.coli* の耐
14 性菌の数がわずかに増加し、添加開始 24 時間以内に <20 %から >50 %に増
15 加し、添加開始 48 時間後には >60 %に達した。この割合は添加が継続して
16 いたにもかかわらず、添加開始 6 日後までに 35 %にまで減少した。非添加対
17 照ケモスタットでは、耐性菌の割合は 5 %を超えることはなかった。0.025
18 及び 0.25 mg/kg 体重/日を添加したケモスタットでは影響はみられなかった。

19 JECFA では、これらの結果は TC のヒト腸内細菌叢に対する影響の報告所
20 見と一致しており、また腸内細菌の耐性菌の選択に対する影響に関してほと
21 んど個体差がみられないことから、安全係数は不要であるとしている。

22 当委員会でも、ヒトの糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に及ぼす影響をみ
23 た試験において、OTC の感受性に個人差がみられていないことから、安全係
24 数は必要ないとする JECFA の評価を適切であると考え、同試験から得られ
25 た NOAEL (0.03 mg/kg 体重/日) を基に、微生物学的 ADI は、0.03 mg/kg
26 体重/日と設定するのが適当であると考えられた。

27 28 4. ADI の設定について

29 微生物学的 ADI の 0.03 mg/kg 体重/日は、毒性学的 ADI の 0.0480-18 mg/kg
30 体重/日より小さく、毒性学的 ADI についても担保されていると考えられる
31 ことから、ADI は 0.03 mg/kg 体重/日と設定することが適当であると判断さ
32 れた。

33
34 以上より、TC 類の食品健康影響評価については、ADI (OTC、TC 及び
35 CTC の Group ADI として) として次の値を設定することが適当であると思
36 えられる。

37
38 テトラサイクリン類 0.03 mg/kg 体重/日
39 (オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン及びクロルテトラサイクリ
40 ンの Group ADI として)

1
2
3
4
5
6
7

暴露量については、当評価結果を踏まえ暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

DRAFT

1 表 30 JECFA における各種試験の無毒性量等の比較

2 ○ オキシテトラサイクリン：OTC

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	NOAEL (mg/kg 体重/日) 等
マウス	13 週間亜急性 毒性試験	0、3,100、6,300、 12,500、25,000、50,000 ppm (雄：392、741、 1,845、3,821、8,300 雌：459、845、1,850、 3,860、7,990) (OTC-HCl・混餌)	— 25,000 ppm 以上投与群で 3~15 % の体重減少 50,000 ppm 群：雌のみに骨中 OTC 検出
	60 週間発がん 性試験	0.1 %OTC 溶液、 0.1 %OTC 溶液+0.1 % 亜硝酸 Na 溶液 (用量 不明) (OTC・飲水)	— 亜硝酸 Na 非添加群：肝腫瘍なし 亜硝酸 Na 添加群：肝細胞腫、胆管 腫
	103 週間慢性 毒性/発がん性 併合試験	0、6,300、12,500 ppm (OTC-HCl・混餌)	1,372 (12,500 ppm) 12,500 ppm 群：投与開始半年後の み体重低値 発がん性なし
	生殖発生毒性 試験	0、1,325、1,670、2,100 (OTC-HCl・経口)	1,670 (母体毒性) 妊娠子宮重量、肝臓重量の減少 発生毒性なし
ラット	13 週間亜急性 毒性試験	0、3,100、6,300、 12,500、25,000、50,000 ppm (雄：198、394、 778、1,576、3,352、雌： 210、431、854、1,780、 3,494) (OTC-HCl・混餌)	— 全投与群：肝臓の細葉周辺性脂肪 変性、骨中 OTC 濃度の用量依存的 増加
	24 ヶ月間慢性 毒性/発がん性 併合試験	0、100、1,000、3,000 ppm (OTC-HCl・混餌)	150 (3,000 ppm) 毒性影響なし 発がん性なし
	103 週間慢性 毒性/発がん性 併合試験	0、25,000、50,000 ppm (OTC-HCl・混餌)	— 50,000 ppm 群雄：投与開始 1 年間 体重低値 (5~8 %) 雄：副腎の良性褐色腫の増加 50,000 ppm 群雌：下垂体腺腫の増 加

			発がん性なし
	2 世代生殖毒性試験	0、360 ppm (OTC-HCl・混餌)	18 (360 ppm) 毒性影響なし 生殖毒性なし。
	発生毒性試験	0、250、1,000、2,000 ppm (OTC・混餌)	— 毒性影響無し 催奇形性なし
		0、48、240、480 (OTC・経口)	— 胎児前肢骨化低下、胚吸収増加、 胎児骨化減少
		0、1,200、1,350、1,500 (OTC-HCl・経口)	— 母動物：用量依存的な死亡率増加、 呼吸困難、被毛粗剛、体重増加抑制、 肝重量減少 胎児：体重減少 催奇形性なし
イヌ	12 ヶ月間慢性毒性試験	0、5,000、10,000 ppm (OTC-HCl・混餌)	125 (5,000 ppm) 精巣細管の生殖上皮変性
	24 ヶ月間慢性毒性試験	0、1,000、3,000、10,000 ppm (OTC-HCl・混餌)	250 (10,000 ppm) 毒性影響なし
毒性学的 ADI		設定なし	
毒性学的 ADI の設定根拠		NOAEL：18 mg/kg 体重/日以上（ラット 2 世代生殖毒性試験）が得られたが、ヒト腸内細菌に対する影響を安全性評価に用いる方が適切と考えられた。	
微生物学的 ADI		0.03 mg/kg 体重/日	
微生物学的 ADI の設定根拠		ヒトボランティアの腸内細菌叢に対する OTC の影響(2 mg/ヒト/日の用量で、糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に变化なし。)	
ADI		0.03 mg/kg 体重/日 (OTC、TC、CTC の Group ADI)	

1

2

○ クロルテトラサイクリン：CTC

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	NOAEL (mg/kg 体重/日) 等
			JECFA
マウス	6 週間亜急性毒性試験	0、20、100 (CTC・経口)	— 血液学的検査に変化なし
	3 ヶ月間亜急	0、20、100	—

	性毒性試験	(CTC・投与経路不明)	毒性徴候、血液学的検査に変化なし
	14週間亜急性毒性試験	0、40、100 (試験開始4週以降最高用量が200) (CTC・経口)	200 毒性影響なし
	生殖毒性試験	0、175 ppm (0、25) (CTC・混餌)	— 有意な影響なし
ラット	28日間亜急性毒性試験	0、20,000、50,000 ppm (0、2,000、5,000) (CTC・混餌)	— 5,000：体重増加抑制
	3ヶ月間亜急性毒性試験	0、150、300 (CTC・経口)	— 血液学的検査に変化なし
	14週間亜急性毒性試験	0、10、40、100 (試験開始4週以降最高用量が200) (CTC・経口)	200 毒性影響なし
	52週間慢性毒性/発がん性併合試験	0、10,000、50,000 ppm (0、1,000、5,000) (CTC・混餌)	1,000 (10,000 ppm) 死亡例、体重低値、全組織の黄色化
	慢性毒性/発がん性併合試験、(投与期間不明)	0、1、5、20、100、500、2,000、10,000、50,000 ppm (0、0.07、0.35、1.3、7、34、130、700、5,200) (CTC・混餌)	700 (10,000 ppm) 死亡例、胃腸障害の徴候、体重増加抑制、WBCの減少、脾臓リンパ濾胞の黄色色素沈着、肺の単球浸潤、精巣萎縮、肝臓の脂肪浸潤 発がん性なし
	生殖毒性試験	0、45 ppm (0、2) (CTC・混餌)	— 有意な影響なし
	2世代生殖毒性試験	0、10,000 ppm (0、500) (CTC・混餌)	— 親動物：雄；体重低値 生殖毒性なし
イヌ	31日間亜急性毒性試験	100(投与開始1~17日)、200(投与開始18~31日) (CTC・経口)	— 毒性影響なし
	14週間亜急性毒性試験	0、10、50、100 (CTC・投与経路不明)	— 毒性影響なし
	9~15週間亜急性毒性試験	100 (CTC・経口)	— 毒性影響なし

	98 又は 121 日間亜急性毒性試験	98 日間：250 121 日間：250（2 週間投与 + 3 週間休薬の繰り返し） （CTC・経口）	— 98 日間投与群：死亡例、体重減少、無関心、摂餌量低下 Hb、RBC、顆粒球、総白血球の減少 脂肪肝、骨髄の枯渇等
	54 週間慢性毒性試験	10、50、100 （CTC-HCl・経口）	100 投与群：試験期間前半の胃腸障害 100：骨のわずかな黄色化、慢性胃炎
毒性学的 ADI		設定なし	
毒性学的 ADI の設定根拠		NOAEL：100 mg/kg 体重/日以上（イヌ 54 週間慢性毒性試験）が得られたが、ヒト腸内細菌に対する影響を安全性評価に用いる方が適切であり、十分な安全域があると考えられた。	
微生物学的 ADI		0.03 mg/kg 体重/日	
微生物学的 ADI の設定根拠		ヒトボランティアの腸内細菌叢に対する OTC の影響（2 mg/ヒト/日の用量で、糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に变化なし。） TC、CTC、OTC の抗菌活性が同様である	
ADI		0.03 mg/kg 体重/日（OTC、TC、CTC の Group ADI）	

1

2 ○ テトラサイクリン：TC

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	NOAEL (mg/kg 体重/日) 等
			JECFA
マウス	6 週間亜急性毒性試験	0、20、100 （TC-HCl・経口）	— 血液学的検査に変化なし
	13 週間亜急性毒性試験	0、3,100、6,300、 12,500、25,000、50,000 ppm（0、470、950、 1,800、3,700、7,500） （TC-HCl・混餌）	— 50,000 ppm 群でわずかな最終体重減少 骨中 TC 濃度の用量依存的増加
	103 週間慢性毒性/発がん性併合試験	0、12,500、25,000 ppm （雄：0、1,500、3,000、 雌：0、1,500、3,500） （TC-HCl・混餌）	— 毒性影響無し 発がん性なし
ラット	13 週間亜急性毒性試験	0、3,100、6,300、 12,500、25,000、50,000	— 25,000 ppm 以上投与群：雄；肝臓

		ppm (0、155、315、625、1,250、2,500) (TC-HCl・混餌)	の細胞質空胞変性、雌雄；骨髄萎縮 骨中 TC 濃度の用量依存的増加
	2 年間慢性毒性/発がん性併合試験	0、100、1,000、3,000 ppm (0、5、50、150) (TC-HCl・混餌)	— 毒性影響なし 3,000 ppm 群：長骨及び頭蓋冠の黄色化 発がん性なし
	発生毒性試験	0、150~200 mg/匹/日 (TC-HCl・投与経路不明) Group I：妊娠 1~18 日に投与 Group II：分娩後 1~28 日に投与	— 毒性影響なし Group II：生後 28 日の脚の長さが長い 児の骨格：TC に起因する蛍光
		0、54、270、540 (TC・経口) 0、40、200、400 (TC-HCl・経口)	— 高用量群：前端的骨化遅延 催奇形性なし
	発生毒性試験	0、500 ppm (0、25) (TC-HCl・混餌)	— 帝王切開群：水尿管症、分裂腰椎
イヌ	98 日間亜急性毒性試験	0、250 (TC・経口)	— 毒性影響なし
	3 ヶ月間亜急性毒性試験	20、200 (TC・経口)	— 毒性影響なし
	24 ヶ月間慢性毒性試験	1,000、3,000、10,000 ppm (25、75、250) (TC・混餌)	— 毒性影響無し 投与群：骨組織の着色 (黄色)
毒性学的 ADI		設定なし	
毒性学的 ADI の設定根拠			
微生物学的 ADI		0.03 mg/kg 体重/日	
微生物学的 ADI の設定根拠		ヒトボランティアの腸内細菌叢に対する OTC の影響(2 mg/ヒト/日の用量で、糞中細菌叢の組成及び OTC 感受性に变化なし。) TC、CTC、OTC の抗菌活性が同様である	
ADI		0.03 mg/kg 体重/日 (OTC、TC、CTC の Group ADI)	

1
2

1
2

<別紙：検査値等略称>

略称	名称
ADI	一日摂取許容量
ALP	アルカリフォスファターゼ
<u>AUC</u>	
BSP	ブロムスルファレイン (Bromsulfalein)
BUN	血中尿素窒素
<u>CFU</u>	
C _{max}	最高濃度
<u>EC₅₀</u>	生物半数に影響が現れる環境濃度 (Effective Concentration)
ED ₅₀	半数有効濃度 (Effective Dose)
EMEA	欧州医薬品庁
<u>FDA</u>	<u>米国食品医薬品庁</u>
Hb	ヘモグロビン
HPLC	高速液体クロマトグラフィー
Ht	ヘマトクリット値
JECFA	FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議
LC ₅₀	半数致死濃度 (環境) (Lethal Concentration)
<u>LOAEL</u>	
<u>MIC</u>	<u>最小阻止濃度</u>
<u>MIC₅₀</u>	
<u>MIC₉₀</u>	
<u>MRL</u>	<u>最大残留基準値</u>
<u>NOAEL</u>	<u>最大無毒性量</u>
NOEC	無影響濃度 (No Observed Effect Concentration)
PLT	血小板数
PSP	フェノールスルフォンフタレイン (Phenolsulfonphthalein)
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TG	中性脂肪
Vd	分布容積
WBC	白血球数

3
4
5

1 <参照>

- 2 1. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平
3 成 17 年 11 月 29 日付、平成 17 年厚生労働省告示第 499 号）
- 4 2. 廣川書店：グッドマン・ギルマン薬理書（下）第 10 版,高折修二,福田英臣,
5 赤池昭紀,2002
- 6 3. クロルテトラサイクリンについての試験成績等の抄録
7 ・クロルテトラサイクリン含有飼料で飼育された家畜の可食部位からのクロ
8 ルテトラサイクリンの残留の消失
9 ・肉豚に対する塩酸クロルテトラサイクリンの残留調査試験
10 ・可食部からのクロルテトラサイクリンの消失 II.鶏と七面鳥
11 ・クロルテトラサイクリンの牛における残留試験
12 ・クロルテトラサイクリンとスピラマイシンの鶏体内の残留量ならびにそ
13 の消失について
- 14 4. JECFA: Toxicological evaluation of certain veterinary drug residues in
15 food, WHO FOOD ADDITIVES SERIES 36, 1995
- 16 5. JECFA: Toxicological evaluation of certain veterinary drug residues in
17 food, WHO FOOD ADDITIVES SERIES 27, 1990
- 18 6. 再評価申請時の添付資料概要（クロルテトラサイクリン）
- 19 7. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives: Residues of some
20 veterinary drugs in foods and animals. 41/8 , Tetracycline,1996
- 21 8. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Residues of
22 someveterinary drugs in foods and animals . 41/8 . Chlortetracycline.1996
- 23 9. 平成 19 年度残留基準見直しに関する資料（オキシテトラサイクリン）
24 資料
25 ・ PC-3001 の牛における血中・尿中及び組織内濃度
26 ・ PC-3001 の豚における血中・尿中及び組織内濃度
27 ・ PC-3001 の牛における組織内残留性
28 ・ PC-3001 の豚における組織内残留性
29 ・ PC-3001 の牛における乳汁残留性
30 ・ 牛におけるテラマイシン・LA 注射液の残留性試験
- 31 10. アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンの試
32 験成績等の抄録（抜粋）
- 33 11. 飼料添加物アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイ
34 クリンの試験成績等の抄録（抜粋）
35 ・牛にオキシテトラサイクリンを飼料添加投与した場合の組織内残留-2
36 ・アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンの豚
37 による残留試験 II 分析試験
- 38 12. JECFA; EVALUATION OF CERTAIN VETERINARY DRUG RESIDUES
39 IN FOOD. WHO Technical Report Series, No.864,Oxytetracycline,1996

- 1 13. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Residues of some
2 veterinary drugs in foods and animals. 41/8,Oxytetracycline.1996
- 3 14. 塩酸オキシテトラサイクリン製剤の概要,2005
- 4 15. トラフグにおける塩酸オキシテトラサイクリン製剤の吸収等試験
- 5 16. 農薬抄録 (オキシテトラサイクリン)
- 6 17. NRA;RESIDUE EVALUATION SECTION. EVALUATION REPORT,
7 Oxytetracycline. 1998
- 8 18. JECFA; EVALUATION OF CERTAIN VETERINARY DRUG RESIDUES
9 IN FOOD. WHO Technical Report Series, No.911,Oxytetracycline,2002
- 10 19. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Residues of some
11 veterinary drugs in foods and animals . 41/14, Oxytetracycline
12 (Addendum).1996
- 13 20. APVMA: Application for an emergency use permit to allow the use of the
14 registered product, CCD OTC(Oxytetracycline Hydrochloride Water
15 Soluble Powder)(P52863),in medicated feed for finish, to treat an
16 outbreak of endemic disease caused by *Streptococcus iniae*.
17 Permit9909.2007
- 18 21. EPA,R.E.D.FACTS,Hydroxytetracycline Monohydrochloride and
19 Oxytetracycline Calcium, U.S.A. Enviromental Protection Agency,1993
- 20 22. JECFA: Toxicological evaluation of certain veterinary drug residues in
21 food, WHO FOOD ADDITIVES SERIES 41, 1998
- 22 23. Tancrede C.,Barakat R. Ecological impact of low doses of oxytetracycline
23 on human intestinal microflora. Adv.Med.Vet.,1985. 161. (5) p457-463
- 24 24. JECFA; EVALUATION OF CERTAIN VETERINARY DRUG RESIDUES
25 IN FOOD. WHO Technical Report Series, No.888,Tetoracyclines.1999
- 26 25. EMEA: COMMITTEE FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR VETERINARY USE
27 Oxytetracycline,Tetoracycline,Chlortetracycline SUMMARY REPORT(3).
28 1995
- 29 26. 食品衛生調査会乳肉水産食品・毒性合同部会,クロルテトラサイクリン/オキ
30 シテトラサイクリン/テトラサイクリンの審議結果,1998
- 31