








65歳以上と65歳未満の各集団における喫食実態の比較

喫食頻度




出典:平成18年度 調査事業「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価に係る情報収集調査 報告書」Web アンケートによる喫食実態調査データに基づき、資料作成 回答のあった人数に応じて割合を算出。









出典:平成18年度 調査事業「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価に係る情報収集調査 報告書 Web アンケートによる喫食実態調査データに基づき、資料作成 回答のあった人数に応じて割合を算出。

65歳以上と65歳未満の各集団における喫食実態の比較

喫食量




出典:平成18年度 調査事業「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価に係る情報収集調査 報告書」Web アンケートによる喫食実態調査データに基づき、資料作成 回答のあった人数に応じて割合を算出。
 * 鶏卵に関しては、単位が個数




出典:平成18年度 調査事業「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価に係る情報収集調査 報告書 Web アンケートによる喫食実態調査データに基づき、資料作成 回答のあった人数に応じて割合を算出。

外食傾向の比較（65歳以上 & 65歳未満）



*65歳未満の集団のうち、無回答3例を除いて集計
 *65歳以上の集団のうち、不明回答1例を除いて集計

賞味期限切れ食品の喫食実態の比較(65歳以上 & 65歳未満)



*65歳未満の集団のうち、ナチュラルチーズは無回答294例を除いて集計(N=2567)、ハムは53例を除いて(N=2808)、魚卵は154例を除いて(N=2707)
 *65歳以上の集団は、不明回答1例を除き、さらにナチュラルチーズは無回答16例を除いて集計(N=122)、ハムは1例を除いて(N=137)、魚卵は10例を除いて(N=128)