

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」に基づく報告について

平成 27 年 8 月 19 日

推定摂取量の対 ADI 比 (TMDI^{*1}/ADI 及び EDI^{*2}/ADI (%))

| | 農薬名 一日摂取許容量：ADI (mg/kg 体重/日) | 国民平均 | | 幼小児 (1～6 歳) | | 妊婦 | | 高齢者 (65 歳以上) | |
|---|------------------------------------|------|------|----------------|------|------|------|-----------------|------|
| | | TMDI | EDI | TMDI | EDI | TMDI | EDI | TMDI | EDI |
| 1 | アシュラム 0.36 | 0.1 | — | 0.5 | — | 0.2 | — | 0.1 | — |
| 2 | キザロホップエチル 0.009 | 22.6 | — | 45.2 | — | 22.7 | — | 25.9 | — |
| 3 | シモキサニル 0.013 | 37.8 | — | 79.1 | — | 33.5 | — | 41.1 | — |
| 4 | テフルベンズロン 0.01 | 74.7 | 29.9 | 117.9 | 67.3 | 61.0 | 29.7 | 94.9 | 34.3 |
| 5 | フェノチオカルブ 0.015 | 1.3 | — | 4.1 | — | 0.3 | — | 2.0 | — |
| 6 | フルチアセットメチル 0.001 | 0.4 | — | 1.6 | — | 0.5 | — | 0.4 | — |
| 7 | ベンジルアデニン 0.062 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.1 | — | 0.2 | — |

—：試算せず

※1 TMDI (Theoretical Maximum Daily Intake) … 理論最大 1 日摂取量。各農産物等の基準値案×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

※2 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定 1 日摂取量。各農産物等の作物残留試験成績の平均値×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

推定摂取量の対 ARfD 比 (ESTI^{*3}/ARfD (%)) の最大値

| | 農薬名 急性参照用量：ARfD (mg/kg 体重) | 一般 | 幼小児 (1～6 歳) | 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14～50 歳) ^{*4} |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | アシュラム 3 | 0 (ほうれんそう等) | 0 (ほうれんそう等) | — |
| 2 | シモキサニル 0.08 | 40 (セロリ) | 70 (トマト) | — |
| 3 | フェノチオカルブ 0.13 | 4 (みかん) | 10 (みかん) | — |
| 4 | フルチアセットメチル 設定不要 | / | / | / |

—：該当せず

/：実施せず

※3 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。

※4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量が設定された場合に推定。