

（案）

農薬評価書

イソピラザム

（第2版）

2015年9月11日
食品安全委員会農薬専門調査会

目 次

	頁
○ 審議の経緯.....	4
○ 食品安全委員会委員名簿.....	4
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	5
○ 要 約.....	8
I. 評価対象農薬の概要.....	9
1. 用途.....	9
2. 有効成分の一般名.....	9
3. 化学名.....	9
4. 分子式.....	9
5. 分子量.....	10
6. 構造式.....	10
7. 開発の経緯.....	10
II. 安全性に係る試験の概要.....	11
1. 動物体内運命試験.....	11
(1) ラット.....	11
(2) ヤギ.....	18
(3) ニワトリ.....	18
2. 植物体内運命試験.....	19
(1) 小麦.....	19
(2) ぶどう.....	20
(3) レタス.....	21
(4) 後作物.....	22
3. 土壌中運命試験.....	23
(1) 好氣的土壌中運命試験①.....	23
(2) 好氣的土壌中運命試験②.....	23
(3) 好氣的土壌中運命試験③.....	24
(4) 好氣的/嫌氣的土壌中運命試験.....	24
(5) 土壌表面光分解試験①.....	25
(6) 土壌表面光分解試験②.....	25
(7) 土壌吸着/脱着試験.....	25
4. 水中運命試験.....	26
(1) 加水分解運命試験.....	26
(2) 水中光分解試験（緩衝液及び自然水）.....	26
5. 土壌残留試験.....	27

1	6. 作物等残留試験.....	28
2	(1) 作物残留試験.....	28
3	(2) 後作物残留試験.....	28
4	(3) 畜産物残留試験.....	28
5	(4) 推定摂取量.....	29
6	7. 一般薬理試験.....	29
7	8. 急性毒性試験.....	30
8	(1) 急性毒性試験.....	30
9	(2) 急性神経毒性試験（ラット）.....	31
10	9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験.....	32
11	10. 亜急性毒性試験.....	32
12	(1) 90日間亜急性毒性試験（ラット）①.....	32
13	(2) 90日間亜急性毒性試験（ラット）②.....	33
14	(3) 28日間亜急性毒性試験（ラット）①＜参考資料＞.....	34
15	(4) 28日間亜急性毒性試験（ラット）②＜参考資料＞.....	35
16	(5) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）①.....	35
17	(6) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）②.....	36
18	(7) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）.....	36
19	(8) 28日間亜急性毒性試験（代謝物Y、ラット）.....	37
20	(9) 28日間亜急性毒性試験（代謝物Fs、ラット）.....	37
21	11. 慢性毒性試験及び発がん性試験.....	38
22	(1) 1年間慢性毒性試験（イヌ）.....	38
23	(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）.....	39
24	(3) 18か月間発がん性試験（マウス）.....	40
25	12. 生殖発生毒性試験.....	41
26	(1) 2世代繁殖試験（ラット）.....	41
27	(2) 発生毒性試験（ラット）①.....	42
28	(3) 発生毒性試験（ラット）②.....	43
29	(4) 発生毒性試験（ウサギ）①（用量設定試験）.....	43
30	(5) 発生毒性試験（ウサギ）②.....	44
31	(6) 発生毒性試験（ウサギ）③（用量設定試験）.....	44
32	(7) 発生毒性試験（ウサギ）④.....	45
33	13. 遺伝毒性試験.....	46
34	(1) 遺伝毒性試験（原体）.....	46
35	(2) 遺伝毒性試験（代謝物）.....	48
36	14. その他の試験.....	49
37	(1) 肝細胞腺腫の発生メカニズムに関する検討.....	49
38	(2) 子宮内膜腺癌の発生メカニズムに関する検討.....	50

1	（3）28 日間亜急性毒性試験（ラット）	51
2		
3	Ⅲ. 食品健康影響評価	53
4		
5	・別紙 1：代謝物/分解物略称	62
6	・別紙 2：検査値等略称	65
7	・別紙 3：作物残留試験成績（国内）	67
8	・別紙 4：作物残留試験成績（海外）	76
9	・別紙 5：後作物残留試験成績（海外）	85
10	・別紙 6：畜産物残留試験	86
11	・別紙 7：推定摂取量	87
12	・参照	88
13		
14		

1 <審議の経緯>

2 —第 1 版関係—

2011 年 9 月 7 日 インポートトレランス設定の要請（小麦、大麦等）
 2011 年 10 月 6 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 1006 第 14 号）
 2011 年 10 月 11 日 関係書類の接受（参照 1~78）
 2011 年 10 月 13 日 第 403 回食品安全委員会（要請事項説明）
 2011 年 12 月 26 日 インポートトレランス設定の要請（バナナ）
 2012 年 1 月 5 日 関係書類の接受（参照 79）
 2012 年 5 月 16 日 第 17 回農薬専門調査会評価第四部会
 2012 年 9 月 27 日 第 86 回農薬専門調査会幹事会
 2012 年 10 月 15 日 第 449 回食品安全委員会（報告）
 2012 年 10 月 16 日 から 11 月 14 日まで 国民からの意見・情報の募集
 2012 年 11 月 19 日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
 2012 年 11 月 26 日 第 455 回食品安全委員会（報告）
 （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 80）
 2013 年 10 月 22 日 残留農薬基準告示（参照 81）

3

4 —第 2 版関係—

2015 年 2 月 20 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：はくさい、キャベツ等）
 2015 年 2 月 27 日 インポートトレランス設定の要請（かぼちゃ）
 2015 年 6 月 23 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0623 第 1 号）、関係書類の接受（参照 82~106）
 2015 年 6 月 30 日 第 567 回食品安全委員会（要請事項説明）
 2015 年 8 月 3 日 第 46 回農薬専門調査会評価第四部会
 2015 年 9 月 11 日 第 127 回農薬専門調査会幹事会

5

6 <食品安全委員会委員名簿>

(2012 年 6 月 30 日まで)	(2015 年 6 月 30 日まで)	(2015 年 7 月 1 日から)
小泉直子（委員長）	熊谷 進（委員長）	佐藤 洋（委員長）
熊谷 進（委員長代理*）	佐藤 洋（委員長代理）	山添 康（委員長代理）
長尾 拓	山添 康（委員長代理）	熊谷 進
野村一正	三森国敏（委員長代理）	吉田 緑

畑江敬子	石井克枝	石井克枝
廣瀬雅雄	上安平冽子	堀口逸子
村田容常	村田容常	村田容常

* : 2011 年 1 月 13 日から

1 <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2012 年 3 月 31 日まで)

納屋聖人（座長）	佐々木有	平塚 明
林 真（座長代理）	代田眞理子	福井義浩
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清
浅野 哲**	田村廣人	堀本政夫
石井康雄	津田修治	本間正充
泉 啓介	津田洋幸	増村健一**
上路雅子	長尾哲二	松本清司
臼井健二	永田 清	柳井徳磨
太田敏博	長野嘉介*	山崎浩史
小澤正吾	西川秋佳	山手丈至
川合是彰	布柴達男	與語靖洋
川口博明	根岸友恵	義澤克彦
桑形麻樹子***	根本信雄	吉田 緑
小林裕子	八田稔久	若栗 忍
三枝順三		

* : 2011 年 3 月 1 日まで

** : 2011 年 3 月 1 日から

*** : 2011 年 6 月 23 日から

2

(2012 年 4 月 1 日から)

・ 幹事会		
納屋聖人（座長）	三枝順三	松本清司
西川秋佳（座長代理）	永田 清	吉田 緑
赤池昭紀	長野嘉介	
上路雅子	本間正充	
・ 評価第一部会		
上路雅子（座長）	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀（座長代理）	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍
・ 評価第二部会		
吉田 緑（座長）	桑形麻樹子	藤本成明
松本清司（座長代理）	腰岡政二	細川正清

泉 啓介	根岸友恵	本間正充
・評価第三部会		
三枝順三(座長)	小野 敦	永田 清
納屋聖人(座長代理)	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一
・評価第四部会		
西川秋佳(座長)	代田眞理子	森田 健
長野嘉介(座長代理)	玉井郁巳	山手丈至
川口博明	根本信雄	與語靖洋

(2014年3月31日まで)

・幹事会		
納屋聖人(座長)	上路雅子	松本清司
西川秋佳*(座長代理)	永田 清	山手丈至**
三枝順三(座長代理**)	長野嘉介	吉田 緑
赤池昭紀	本間正充	
・評価第一部会		
上路雅子(座長)	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀(座長代理)	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍
・評価第二部会		
吉田 緑(座長)	桑形麻樹子	藤本成明
松本清司(座長代理)	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充
・評価第三部会		
三枝順三(座長)	小野 敦	永田 清
納屋聖人(座長代理)	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一
・評価第四部会		
西川秋佳*(座長)	川口博明	根本信雄
長野嘉介(座長代理*; 座長**)	代田眞理子	森田 健
山手丈至(座長代理**)	玉井郁巳	與語靖洋
井上 薫**		

*: 2013年9月30日まで

** : 2013年10月1日から

(2014年4月1日から)

・幹事会		
西川秋佳(座長)	小澤正吾	林 真
納屋聖人(座長代理)	三枝順三	本間正充
赤池昭紀	代田眞理子	松本清司
浅野 哲	永田 清	與語靖洋
上路雅子	長野嘉介	吉田 緑*
・評価第一部会		

上路雅子（座長）	清家伸康	藤本成明
赤池昭紀（座長代理）	林 真	堀本政夫
相磯成敏	平塚 明	山崎浩史
浅野 哲	福井義浩	若栗 忍
篠原厚子		

・評価第二部会

吉田 緑（座長）*	腰岡政二	細川正清
松本清司（座長代理）	佐藤 洋	本間正充
小澤正吾	杉原数美	山本雅子
川口博明	根岸友恵	吉田 充
桑形麻樹子		

・評価第三部会

三枝順三（座長）	高木篤也	中山真義
納屋聖人（座長代理）	田村廣人	八田稔久
太田敏博	中島美紀	増村健一
小野 敦	永田 清	義澤克彦

・評価第四部会

西川秋佳（座長）	佐々木有	本多一郎
長野嘉介（座長代理）	代田真理子	森田 健
井上 薫	玉井郁巳	山手丈至
加藤美紀	中塚敏夫	與語靖洋

*：2015 年 6 月 30 日まで

1

2 <第 17 回農薬専門調査会評価第四部会専門参考人名簿>

太田敏博

3

4 <第 86 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

小澤正吾

林 真

5

要 約

ピラゾールカルボキサミド系殺菌剤である「イソピラザム」（CAS No. 881685-58-1）について、各種資料等を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、作物残留試験（はくさい、キャベツ等）、一般薬理試験の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内運命（小麦、ぶどう等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット及びイヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。

各種毒性試験結果から、イソピラザム投与による影響は、主に体重（増加抑制）及び肝臓（肝細胞肥大、重量増加、好酸性変異肝細胞巣等）に認められた。神経毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

ラットの雌で肝細胞腺腫及び子宮内膜腺癌の発生頻度が増加したが、遺伝毒性試験では全て陰性の結果が得られており、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。

2 世代繁殖試験において、親動物に体重増加抑制のみられた用量で着床数の低下が認められた。

発生毒性試験（ラット）において、母動物に毒性の認められる用量で骨化遅延及び骨格変異が認められたが、奇形は認められなかった。一方、発生毒性試験（ウサギ）においては 400 mg/kg 体重/日以上の高用量で小眼球が認められた。

各種試験結果から、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をイソピラザム（親化合物のみ）と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値がラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 5.5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.055 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

また、イソピラザムの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の 30 mg/kg 体重であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.3 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺菌剤

2. 有効成分の一般名

和名：イソピラザム

英名：isopyrazam

3. 化学名

IUPAC

和名：2 *syn*-異性体 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-イソプロピル-1,4-メタノナフタレン-5-イル]ピラゾール-4-カルボキサミド及び 2 *anti*-異性体 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-イソプロピル-1,4-メタノナフタレン-5-イル]ピラゾール-4-カルボキサミド の混合物

英名：mixture of 2 *syn*-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 2 *anti*-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide

CAS (No. 881685-58-1)

和名：1*H*-ピラゾール-4-カルボキサミド, 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-*N*-[(1*R*,4*S*,9*R*)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-(1-メチルエチル)-1,4-メタノナフタレン-5-イル]-, (*syn* 異性体) 及び 1*H*-ピラゾール-4-カルボキサミド, 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-*N*-[(1*R*,4*S*,9*S*)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-(1-メチルエチル)-1,4-メタノナフタレン-5-イル]-, (*anti* 異性体) の混合物

英名：A mixture of 1*H*pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-*N*-[(1*R*,4*S*,9*R*)-1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-, rel- (*syn-isomer*) and 1*H*pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-*N*-[(1*R*,4*S*,9*S*)-1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-, rel- (*anti-isomer*)


4. 分子式

C₂₀H₂₃F₂N₃O


5. 分子量

359.4

6. 構造式



syn 体



anti 体

7. 開発の経緯

イソピラザムは、1990 年代後半にシンジェンタ社（スイス）によって開発されたピラゾールカルボキサミド系化合物に属する殺菌剤である。作用機構はミトコンドリアの電子伝達系のタンパク質複合体 II、すなわちコハク酸脱水素酵素を阻害することにより呼吸機能に影響を及ぼし、抗菌活性を示すものと考えられている。海外では EU 諸国、米国、ニュージーランド等、10 か国で登録されている。今回、農薬取締法に基づく農薬登録申請（新規：はくさい、キャベツ等）及びインポートトレランス設定の要請（かぼちゃ）がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験〔II.1～4〕は、イソピラザムのピラゾール環の 5 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「 $[\text{pyr-}^{14}\text{C}]$ イソピラザム」という。）、イソピラザム *anti* 異性体のピラゾール環の 5 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「 $[\text{pyr-}^{14}\text{C}]anti$ イソピラザム」という。）及びフェニル基の全ての炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「 $[\text{phe-}^{14}\text{C}]$ イソピラザム」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からイソピラザムの濃度（ mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット

① 吸収

a. 血中濃度推移

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 13 匹）に、 $[\text{pyr-}^{14}\text{C}]$ イソピラザムを 1 mg/kg 体重（以下〔1.〕において「低用量」という。）又は 75 mg/kg 体重（以下〔1.〕において「高用量」という。）で単回経口投与し、血中濃度推移について検討された。

全血及び血漿中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

両投与量群において、全血と血漿の薬物動態学的パラメータに明らかな差はなかった。

C_{max} 及び AUC は、ほぼ用量に相関して増加した。雌における C_{max} 及び AUC は雄に比べ 1.3～2.5 倍高かった。雌で血漿からの消失がより速いことが示唆された。（参照 1、2）

表 1 全血及び血漿中薬物動態学的パラメータ

試料 投与量(mg/kg 体重)	全血				血漿			
	1		75		1		75	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
T_{max} (hr)	3	3	3	4	6	3	3	4
C_{max} ($\mu\text{g/g}$)	0.0750	0.126	6.31	12.2	0.0857	0.160	7.56	17.7
$T_{1/2}$ (hr)	NC	4.81	8.68	6.21	NC	4.60	7.52	NC
$\text{AUC}_{0-48}(\text{hr} \cdot \mu\text{g/g})$	1.00	1.62	96.9	210	1.14	1.44	81.4	207
$\text{AUC}_{0-\infty}(\text{hr} \cdot \mu\text{g/g})$	NC	1.67	98.7	211	NC	1.49	82.7	NC

NC：最終相が特定できず計算できなかった。

b. 吸収率

胆汁中排泄試験〔1. (1)④b.〕で得られた投与後 48 時間における尿、胆汁及びカ

一カス¹における放射能の合計から、イソピラザムの経口投与後48時間の吸収率は低用量で63.7～72.9%、高用量で63.1～71.4%と算出された。（参照1、5）

② 分布

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各15匹）に[pyr-¹⁴C]イソピラザムを低用量若しくは高用量で単回経口投与し、又はWistar Hannover ラット（一群雄21匹）に[pyr-¹⁴C]イソピラザムを低用量で反復経口（14日間）投与して体内分布が検討された。また、尿及び糞中排泄試験[1. (1)④a.]に用いた動物を投与168時間後にと殺して、臓器及び組織中放射能濃度が測定された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表2に示されている。

両投与量群とも雌で96時間後の残留放射能が雄より低い傾向が認められた。

168時間後の残留放射能は全て0.586 µg/g以下であった。特定の臓器及び組織への残留傾向は認められなかった。（参照1、3、4、8）

表2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度（µg/g）

	投与量 (mg/kg 体重)	性別	T _{max} 付近 ^a	投与96時間後 ^b
単 回 経 口	1	雄	消化管(6.16)、肝臓(0.551)、 腎臓(0.310)、副腎(0.196)、 血漿(0.088)	消化管(0.303)、甲状腺(0.040)、 肝臓(0.030)、副腎(0.013)、 腎臓(0.012)、脂肪(腎周囲) (0.008)、脾臓(0.007)、カ ーカス(0.007)
		雌	消化管(7.04)、肝臓(0.677)、 腎臓(0.397)、副腎(0.356)、 脂肪(腎周囲)(0.351)、脾 臓(0.204)、卵巣(0.179)、 甲状腺(0.164)、心臓(0.145)、 肺(0.132)、血漿(0.125)	消化管(0.223)、卵巣(0.028)、 副腎(0.019)、肝臓(0.015)、 甲状腺及び脂肪(腎周囲) (0.012)、腎臓(0.007)、カ ーカス(0.007)
	75	雄	消化管(53.6)、肝臓(53.5)、 腎臓(17.0)、甲状腺(16.1)、 骨(14.1)、副腎(13.8)、 カーカス(7.76)、脂肪(腎 周囲)(7.20)、脾臓(6.62)、 血漿(6.43)	消化管(29.3)、肝臓(2.16)、 腎臓(0.596)、脂肪(腎周囲) (0.584)、カーカス(0.482)、 副腎(0.437)、脾臓(0.258)、 全血(0.219)、甲状腺(0.190)、 肺(0.149)、心臓(0.133)、 血漿(0.126)
		雌	消化管(52.1)、脂肪(腎周 囲)(58.0)、肝臓(35.5)、 副腎(28.2)、卵巣(23.7)、 子宮(20.2)、脾臓(16.6)、 腎臓(15.2)、肺(10.3)、 カーカス(9.98)、血漿(9.94)	肝臓(0.579)、消化管(0.441)、 脂肪(腎周囲)(0.426)、卵巣 (0.217)、カーカス(0.201)、 副腎(0.113)、腎臓(0.105)、 全血(0.082)、脾臓(0.072)

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

反 復 経 口	1	雄	消化管 (0.683)、肝臓 (0.164)、 腎臓 (0.053)、カーカス (0.043)、 全血 (0.016)、副腎 (0.016)、 脾臓 (0.012)、甲状腺 (0.012)、 肺 (0.007)、骨 (0.007)、血 漿 (0.006)
------------------	---	---	--

a：低用量群では投与 6 時間後、高用量群では投与 10 時間後

b：反復経口投与のみ 72 時間後

/：記載なし

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [1. (1) ④a.] で採取された尿及び糞、胆汁中排泄試験 [1. (1) ④b.] で採取された胆汁、反復経口投与後の尿及び糞中排泄試験 [1. (1) ④d.] で採取された尿、糞及び胆汁並びに血中濃度推移試験 [1. (1) ①a.] で採取された血漿を試料として代謝物同定・定量試験が実施された。

血漿、尿、糞及び胆汁中における主要代謝物は表 3 に示されている。

また、胆汁中排泄試験（構造異性体間比較試験）[1. (1) ④c.] で採取された尿及び胆汁を試料として代謝物同定・定量試験が実施された。

構造異性体間比較試験における尿及び胆汁中主要代謝物は表 4 に示されている。

未変化のイソピラザムは雌の血漿中及び雌雄の糞中に僅かに認められるのみであった。抱合体を含めて 25 種類の代謝物が検出された。

尿中では非抱合体が主であったが、雌では硫酸抱合体も認められた。胆汁中では大部分がグルクロン酸抱合体であった。糞中には雌では硫酸抱合体が多かったが雄では見られなかった。また、雌では *N*-脱メチル化反応、雄ではカルボン酸生成反応後の代謝物が多く認められた。

このような性差が認められたものの、ラットの主要代謝経路は試料、用量、異性体間及び投与回数にかかわらず同様に、①イソプロピル側鎖、及び/又はビシクロ環の水酸化、*N*-脱メチル化及び水酸基のカルボン酸への酸化、②生成した水酸基又はカルボキシル基のグルクロン酸又は硫酸抱合化であった。（参照 1、9）

1 表 3 血漿、尿、糞及び胆汁中における主要代謝物（%TAR）

試験の 種類	投与 方法	投与量 (mg/kg 体重)	性 別	試料 採取時間	イソピ ラザム	代謝物
血中濃度 推移試験	単回 経口	1	雄	血漿 (3 及び 6h)	ND	S(0.062)、U(0.013)
			雌	血漿 (3 及び 6h)	0.007	Ls(0.054)、N(0.046)、P(0.027)、 S(0.010)、M-sul(0.004)
		75	雄	血漿 (3 及び 6h)	ND	S(5.07)、U(1.26)
			雌	血漿 (3 及び 6h)	0.989	Ls(10.1)、N(7.50)、M-sul(0.261)、 P(0.215)、S(0.106)
尿及び糞 中排泄試 験		1	雄	尿 (0-48h)	ND	U(4.65)、T(2.84)、V(2.79)、I(2.37)、 S(1.51)、P(1.26)、I-glu(0.58)
				糞 (0-48h)	0.40	T(23.4)、P(10.1)、I(9.96)、K(8.08)、 Q(3.69)、U(3.43)、M(2.96)
			雌	尿 (0-48h)	ND	P(10.4)、M-sul(3.32)、P-sul(3.12)、 S(2.95)、I(2.72)、U(1.78)
				糞 (0-48h)	0.48	P-sul(16.2)、P(15.9)、I-sul(7.74)、 M(7.56)、B-sul(7.26)、I(2.40)
		75	雄	尿 (0-48h)	ND	U(3.79)、V(1.98)、T(1.61)、 S(1.30)、P(0.97)、I(0.59)、 I-glu(0.56)
				糞 (0-48h)	0.86	T(16.5)、I(12.1)、P (9.03)、S(7.74)、 U(7.60)、K (6.85)、M(3.84)
			雌	尿 (0-48h)	ND	P(5.73)、M-sul(3.97)、P-sul(1.78)、 I(1.51)、U(1.23)、S(1.02)
				糞 (0-48h)	1.37	M(21.8)、P(12.3)、P-sul(9.30)、 B-sul(8.60)、M-sul(4.51)、C(4.17)、 I-sul(3.83)
胆汁中排 泄試験		1	雄	胆汁 (0.5-24h)	ND	I-glu(13.5)、B-glu(11.9)、C(5.32)、 U(4.81)、D(4.77)、T(4.31)、 P-glu(3.76)
			雌	胆汁 (0.5-24h)	ND	M-glu(20.9)、P-glu(9.11)、 B-glu(8.46)、I-glu(5.25)
		75	雄	胆汁 (1-48h)	ND	B-glu(27.8)、S-glu(7.42)、 M-glu(6.43)、I-glu(5.33)、D(4.05)、 P-glu(2.66)
			雌	胆汁 (1-48h)	ND	M-glu(36.1)、B-glu(12.6)、 P-glu(6.63)、I-glu(2.75)
尿及糞び 糞中排泄 試験	反復 経口	1	雄	尿 (0-24h) ^a	ND	U(4.82)、D(3.14)、I(1.77)、V(1.75)、 T(1.37)、P(1.19)、I-glu(0.97)
				糞 (0-24h) ^a	ND	P(23.4)、I(17.2)、K(14.1)、Q(7.59)、 T(3.02)

2 ND：検出されず

^a：最終投与（14 回目投与）後 0-24 時間

表 4 構造異性体間比較試験における尿*及び胆汁中主要代謝物（%TAR）

標識体	投与量 (mg/kg 体重)	性別	試料	採取 時間	イソ ピラ ザム	代謝物
[pyr- ¹⁴ C] イソピラザム	2	雄	尿	0-48h	ND	U(2.84)、I(1.07)、P(0.78)、 I-glu(0.64)、S(0.3)
			胆汁	1-48h	ND	B-glu(18.5)、I-glu(13.8)、 U(4.53)、M-glu(4.36)、 P-glu(3.09)
[pyr- ¹⁴ C] <i>anti</i> - イソピラザム	75		尿	0-48h	ND	P(4.64)、U(2.95)、V(2.61)、 T(1.16)、I(1.02)、S(0.97)
			胆汁	1-48h	ND	S-glu(13.0)、B-glu(6.11)、 T(4.96)、M-glu(3.49)、I-glu (2.37)、P-glu(2.37)

ND：検出されず

*：カニユーレ挿入下で採取された尿

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄

Wistar Hannover ラット（雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]イソピラザムを低用量又は高用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。

単回経口投与したイソピラザムの排泄経路及び速度に投与量及び性別による差は認められなかった。投与後 48 時間に 90%TAR 以上が尿糞中に排泄され、主に糞中に排泄された。（参照 1、3、7）

表 5 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与量 (mg/kg 体重)	1		75	
	雄	雌	雄	雌
尿	19.6	27.1	13.3	17.5
糞	83.0	77.3	79.4	78.5
ケージ洗浄液	3.3	1.9	2.9	4.4
組織+カーカス*	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
総回収率	106	106	95.7	100

*：最終採取時点で採取した血液及び組織を含む。

b. 胆汁中排泄

胆管カニユーレを挿入した Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]イソピラザムを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 6 に示されている。
 いずれの用量群及び雌雄とも排泄は速やかであり、主に胆汁中に排泄された。
 (参照 1、5)

表 6 投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与量 (mg/kg 体重)	1		75	
性別	雄	雌	雄	雌
胆汁	57.9	47.6	54.7	57.0
尿	14.9	15.9	7.3	13.6
糞	26.4	35.7	27.3	21.2
消化器+内容物	0.1	0.2	0.2	0.2
ケージ洗浄液	2.4	3.3	1.6	2.7
カーカス	0.1	0.2	1.1	0.8
総回収率	102	103	92.2	95.4

c. 胆汁中排泄（構造異性体間比較試験）

胆管カニューレを挿入した Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹、高用量[pyr-¹⁴C]イソピラザム投与群の雌のみ 7 匹）に、[pyr-¹⁴C]イソピラザム又は [pyr-¹⁴C]anti-イソピラザムを 2 mg/kg 体重若しくは高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 7 に示されている。

構造異性体間に吸収や排泄経路の顕著な差は認められなかった。投与量及び性別にかかわらず排泄は速やかであり、主に胆汁中に排泄された。（参照 1、6）

表 7 投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率 (%TAR)

標識体	[pyr- ¹⁴ C]イソピラザム				[pyr- ¹⁴ C]anti-イソピラザム			
投与量 (mg/kg 体重)	2		75		2		75	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
胆汁	56.3	48.9	58.0	41.6	38.3	56.1	36.5	61.1
尿	15.4	26.0	7.6	7.0	22.1	12.2	16.3	15.9
糞	23.8	19.8	34.1	48.3	32.5	28.3	38.3	20.4
消化器+内容物	<0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
ケージ洗浄液	1.1	1.5	1.2	1.8	3.5	2.1	3.2	1.3
カーカス	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2
総回収率	96.8	96.4	101	98.7	96.6	99.1	94.5	98.8

d. 反復経口投与後の尿及び糞中排泄

Wistar Hannover ラット（一群雄 3 匹）に[pyr-¹⁴C]イソピラザムを低用量で反復経口（14 日間）投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

初回及び 14 回投与後 24 時間の尿及び糞中排泄率は表 8 に示されている。（参照 1、8）

表 8 投与後 24 時間の尿及び糞中排泄率（%TAR）

投与量(mg/kg 体重)	1	
投与回数(回)	1	14*
尿	19.7	21.6
糞	47.9	88.6
ケージ洗浄液	2.51	2.89
総回収率	70.1	113

*：14 回投与の値は、14 日目に投与された放射能に対する割合として示されている。

e. 呼気排泄

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に[pyr-¹⁴C]イソピラザムを 2.5 mg/kg 体重又は 250 mg/kg 体重で単回経口投与して、呼気排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の尿、糞及び呼気中排泄率は表 9 に示されている。

イソピラザムの呼気中への排泄放射能は投与量及び雌雄の違いにかかわらず全て検出限界未満であり、48 時間の総排泄量は 0.05%TAR 未満であった。（参照 1、7）

表 9 投与後 48 時間の尿、糞及び呼気中排泄率（%TAR）

投与量 (mg/kg 体重)		2.5		250	
性別		雄	雌	雄	雌
尿		17.4	24.7	14.0	18.0
糞		77.9	70.3	68.2	49.3
呼気	CO ₂	<0.04	<0.04	<0.03	<0.04
	揮発性代謝物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ケージ洗浄液		0.33	0.84	0.62	1.73
消化管+内容物		0.51	1.51	3.39	6.14
カーカス		0.14	0.20	0.31	0.71
総回収率		96.3	97.6	86.6	75.9

⑤ オートラジオグラフィー

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に[pyr-¹⁴C]イソピラザムを 2.5

mg/kg 体重又は 250 mg/kg 体重で単回経口投与して、オートラジオグラフィーによる組織分布が検討された。

全身オートラジオグラフィーによる組織中放射能分布は、雌雄及び両投与量群で類似していた。放射能は投与後 2 時間で広く組織中に分布したが、48 時間後の残留放射能は極めて低く、その大部分は消化管及び胃で検出され、肝臓及び腎臓では低レベルであった。（参照 1、7）

（２）ヤギ

① 原体

泌乳ヤギ（品種不明）（3 匹）に、[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn/anti* 比＝95 : 5）又は[phe-¹⁴C]イソピラザム（*syn/anti* 比＝95 : 5 及び 70 : 30）を 29～45 mg/kg 乾燥飼料で経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

乳汁中の総残留放射能は標識体や異性体比の違いにかかわらず 4 日目に定常状態になった。組織中の残留放射能は肝臓で 0.33～0.6 µg/g、腎臓で 0.14～0.19 µg/g であったほか、筋肉、脂肪及び乳汁では 0.04 µg/g 以下であった。代謝物 J が筋肉、肝臓、腎臓及び乳汁で、それぞれ最大 44%TRR (<0.01 µg/g)、17%TRR (0.1 µg/g)、25%TRR (0.04 µg/g) 及び 32%TRR (0.02 µg/g) 認められた。また、代謝物 G が肝臓で最大 21%TRR (0.13 µg/g) 認められた。（参照 76）

② 代謝物 Fs

泌乳ヤギ（品種不明）（1 匹）に、ピラゾール環の炭素を ¹⁴C で標識した（標識位置の詳細不明）代謝物 Fs を 19 mg/kg 乾燥飼料で 7 日間経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

組織中の残留放射能は肝臓 (0.44 µg/g) や腎臓 (0.25 µg/g) を除いて 0.05 µg/g 以下であり、Fs は脂肪で最も多く (6.2%TRR、<0.01 µg/g)、その他の組織中では 1.5%TRR 以下であった。主要代謝物は J で筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳汁でそれぞれ最大 56%TRR、36%TRR、36%TRR、38%TRR 及び 33%TRR 認められた。（参照 76）

（３）ニワトリ

産卵鶏（品種不明）（15 羽）に、[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn/anti* 比＝95 : 5）又は[phe-¹⁴C]イソピラザム（*syn/anti* 比＝95 : 5 及び 70 : 30）を 11 mg/kg 乾燥飼料で 7 日間経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

鶏卵の総残留放射能は投与 7 日目に定常状態になった。鶏卵も含めた組織中総残留放射能は肝臓 (0.12～0.16 µg/g) を除き 0.03 µg/g 以下であった。卵黄中のイソピラザム及び代謝物 J はそれぞれ 3.4～4.9%TRR (<0.01 µg/g) 及び 6.6～12%TRR (<0.01 µg/g)、卵白ではイソピラザムは同定されず代謝物 J のみが 7～29%TRR (<0.01 µg/g) 認められた。脂肪組織における主な残留物はイソピラ

ザムであった（5.9～18%TRR）。肝臓中のイソピラザム及び代謝物 J は 1～2%TRR であった。（参照 76）

2. 植物体内運命試験

（1）小麦

小麦（品種：Tybalt）に、[phe-¹⁴C]イソピラザム S（*syn/anti*比＝96.4：3.6）若しくは[phe-¹⁴C]イソピラザム A（*syn/anti*比＝70.4：29.6）又は[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn/anti*比＝95.4：4.6）を 125 g ai/ha の用量で、BBCH31（第1節形成時）、BBCH39（止め葉が開く時期）、BBCH69（開花終了時）にそれぞれ1回、計3回茎葉散布処理し、2回目処理13日後（出穂始期～出穂終期）に茎葉を、最終処理46～48日後（成熟期）に玄麦及びわら（もみ殻を含む）を採取して、植物体内運命試験が実施された。

小麦試料中における残留放射能濃度は表10に、主要代謝物は表11に示されている。

最終処理後の総残留放射能はわらに多く認められ、玄麦では低かった。標識体や試料の違いにかかわらず、残留放射能の大部分は未変化のイソピラザムであり、代謝物ではFs、次いでGが多かった。このほか、わらでは代謝物DやHが認められたが、10%TRRを超える代謝物は認められなかった。（参照1、10）

表10 小麦試料中における残留放射能濃度

標識体	試料	抽出前	抽出後			
		総放射能	抽出液		抽出残渣	
		mg/kg	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
[phe- ¹⁴ C] イソピラザム S	茎葉	7.09	6.46	98.9	0.065	1.0
	わら	20.8	21.6	96.1	0.855	3.8
	玄麦	0.058	0.050	89.5	0.0058	10.5
[pyr- ¹⁴ C] イソピラザム	茎葉	6.18	6.17	98.7	0.081	1.3
	わら	20.2	19.1	95.3	0.921	4.6
	玄麦	0.059	0.050	86.1	0.0079	13.9
[phe- ¹⁴ C] イソピラザム A	茎葉	4.75	4.91	99.5	0.025	0.5
	わら	14.1	13.0	97.0	0.414	3.1
	玄麦	0.031	0.0256	78.6	0.007	21.4

1 表 11 小麦試料中における主要代謝物

標識体	試料		抽出液						抽出 残渣
			イソ ピラ ザム	D	Fs	G	H	未同定	
[phe- ¹⁴ C]イ ソピラ ザム S	わら	mg/kg	15.5	0.472	1.64	0.652	0.495	2.67	0.855
		%TRR	68.7	2.1(1.6)	7.3(5.2)	2.9(2.3)	2.2(1.8)	11.9	3.8
	玄麦	mg/kg	0.037	ND	0.0007	ND	ND	0.0067	0.0058
		%TRR	65.6	ND	1.2	ND	ND	12	10.5
[pyr- ¹⁴ C]イ ソピラ ザム	わら	mg/kg	12.1	0.540	1.94	0.760	0.320	3.8(3.4)	0.921
		%TRR	60.7	2.7(2.4)	9.7(7.0)	3.8(3.4)	1.6(1.4)	2.40	4.6
	玄麦	mg/kg	0.030	ND	0.0008	0.0003	0.0013	0.010	0.0079
		%TRR	53.3	ND	1.4	0.5	2.4	17.7	14.4
[phe- ¹⁴ C]イ ソピラ ザム A	わら	mg/kg	8.56 ^{ab}	0.241	1.02	0.374	0.201	1.95	0.414
		%TRR	64.0 ^{ab}	1.8(1.6)	7.6(6.5)	2.8(2.2)	1.5(1.3)	14.6	3.1
	玄麦	mg/kg	0.021 ^a	ND	0.0004	0.0002	—	0.003	0.007
		%TRR	63.2 ^a	ND	1.3	0.5	—	8.4	21.4

2 ()内の値は抱合体として検出された%TRR

3 ND：検出されず

4 —：データなし

5 ^a： *syn* 体、*anti* 体がともに存在したが、個別に定量できなかったため含量値として記載。6 ^b： LC/MS/MS により *syn/anti* 比を確認したところ、散布処理液との比較で大きな変化は見られな
7 かった。

9 (2) ぶどう

10 ぶどう（品種：syrah）に、[phe-¹⁴C]イソピラザム（*syn*：*anti*=69.5：30.5）
11 及び[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn*：*anti*=69.1：30.9）を 400 g ai/ha の用量で 1
12 回茎葉散布処理し、処理 21 日後に成熟果房及び葉を採取して、植物体内運命試
13 験が実施された。

14 ぶどう試料中における残留放射能濃度は表 12 に示されている。

15 ぶどうの果実及び葉の放射能の大部分はアセトニトリル/水で抽出され、いずれ
16 の標識体においても大部分は未変化のイソピラザムであった（果実：89.4～
17 90.3%TRR、葉：86.4～91.2%TRR）。果実中の主な代謝物として G 及び Ds が
18 合計で最大 1.7%TRR、Fs が最大 1.4%TRR 認められた。10%TRR を超えて検出
19 された代謝物は認められなかった。回収された未変化のイソピラザムの *syn/anti*
20 比は処理前と比較して大きな変化はなかった。（参照 1、11）
21

表12 ぶどう試料中における残留放射能濃度

標識体	試料	抽出前	抽出後			
		総放射能	抽出液		抽出残渣	
		mg/kg	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
[phe- ¹⁴ C] イソピラザム	果実	0.156	0.126	98.2	0.002	1.8
	葉	11.0	10.8	98.5	0.187	1.7
[pyr- ¹⁴ C] イソピラザム	果実	0.147	0.145	98.6	0.002	1.4
	葉	3.77	3.70	98.3	0.068	1.8

(3) レタス

レタス（品種：Mona）に、[phe-¹⁴C]イソピラザム（*syn* : *anti*=69.7 : 30.3）及び[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn* : *anti*=69.3 : 30.7）を 125 g ai/ha の用量で BBCH40 以前（播種 42 日後）、BBCH42（播種 53 日後）、BBCH46（播種 63 日後）にそれぞれ 1 回、計 3 回茎葉散布処理し、最終処理 3 及び 14 日後に葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

レタス葉における残留放射能濃度は表 13 に、代謝物は表 14 に示されている。

最終処理 14 日後の総残留放射能は 0.217～0.316 mg/kg であった。残留放射能の大部分はアセトニトリル/水で抽出され、いずれの標識体においても主成分は未変化のイソピラザムであった。10%TRR を超えて認められた代謝物は Fs（抱合体を含む）であった。処理後経過日数に伴い、イソピラザムが減少し代謝物が増加する傾向が認められた。（参照 1、12）

表13 レタス葉における残留放射能濃度

標識体	処理後 日数 (日)	抽出前	抽出後			
		総放射能	抽出相		抽出残渣	
		mg/kg	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
[phe- ¹⁴ C] イソピラザム	3	1.61	1.51	96.9	0.048	3.1
	14	0.316	0.279	89.8	0.032	10.2
[pyr- ¹⁴ C] イソピラザム	3	1.47	1.48	96.4	0.054	3.5
	14	0.217	0.187	85.1	0.033	14.9

表14 最終処理14日後のレタスにおける代謝物

標識体		[phe- ¹⁴ C] イソピラザム		[pyr- ¹⁴ C] イソピラザム	
		mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
抽出相	イソピラザム	0.108	34.8	0.100	45.3
	Ds+G	0.018(0.018)	5.8(5.8)	0.011(0.011)	4.7(4.7)
	Da	0.005(0.005)	1.6(1.6)	0.002(0.002)	0.8(0.8)
	Ls	0.002(0.002)	0.7(0.7)	0.002(0.002)	0.8(0.8)

Es	0.008(0.008)	2.6(2.6)	0.004(0.004)	1.9(1.9)
Fs	0.053(0.050)	17.1(16.2)	0.031(0.031)	14.1(14.1)
H	0.012(0.012)	4.0(4.0)	0.008(0.008)	3.7(3.7)
R	0.009(0.009)	2.8(2.8)	0.006(0.006)	2.8(2.8)
W	NA	NA	0.008(0.008)	3.7(3.7)
Y	NA	NA	0.002(0.002)	1.0(1.0)
極性糖抱合体	0.049	16.0	0.042	19.4
未同定	0.002	0.5	0.004	1.8
抽出残渣	0.032	10.2	0.033	14.8

()内は抱合体として検出されたものの値

NA：分析せず

植物におけるイソピラザムの主要代謝経路はイソプロピル基の水酸化及びビシクロ環の水酸化並びに抱合体の生成であった。ほかにピラゾール環の *N*-脱メチル化や 2 つの芳香環を結ぶアミド結合の開裂も考えられた。

(4) 後作物

土壌に[phe-¹⁴C]イソピラザム又は[pyr-¹⁴C]イソピラザムを 360 g ai/ha の用量で処理した土壌に、処理 30、90 及び 300 日後、レタス、小麦及びかぶを作付けして、未成熟及び成熟作物を採取して、植物体内運命試験が実施された。

後作物における最大残留放射能濃度は表 15 に示されている。

イソピラザムは処理 30 日後のレタス及びかぶ（根）に、それぞれ 13%TRR 及び 26～34%TRR 認められたが、処理 90 日後には全ての作物で 3%TRR 以下となった。

代謝物は、Y（抱合体を含む）がレタス、小麦（茎葉）及びかぶ（葉）においてそれぞれ最大で 35%TRR、21.7%TRR 及び 47%TRR、Fs（抱合体を含む）が小麦（茎葉、乾草及びわら）においてそれぞれ最大で 18%TRR、13.8%TRR 及び 17.6%TRR 認められた。ほかに 10%TRR を超えて検出された代謝物は認められなかった。（参照 76、77）

表 15 後作物における最大残留放射能濃度（mg/kg）

標識体	処理後日数 (日)	レタス	小麦（玄麦）	小麦（わら）	かぶ（葉）	かぶ（根）
[pyr- ¹⁴ C] イソピラ ザム	30	0.02	0.02	0.92	0.05	—
	90	0.03	0.02	0.88	0.05	0.02
	300	0.02	0.02	0.71	0.04	<0.01

—：データなし

3. 土壌中運命試験

(1) 好氣的土壌中運命試験①

壤土(英国及びスイス)、砂壤土(スイス)及び微砂質埴土(フランス)に[phe-¹⁴C]イソピラザム (*syn: anti*=73.4:26.6) を 0.17 mg/kg 乾土となるように処理し、土壌水分をほ場容水量 (pF2.0) 相当に調整し、20±2℃の暗所で最長 369 日間インキュベートして、好氣的土壌中運命試験が実施された。

好氣的土壌における処理 120 日後の分解物分布は表 16 に、各土壌の半減期は表 17 に示されている。

4 種の土壌の 0～120 日における残留放射能の回収率は 89.2～100%TAR、壤土 (スイス) の 180～369 日における回収率は 84.2～92.6%TAR であり、回収された放射能の大部分はイソピラザムであった。主要分解物は Fs で、Fs の異性体 Fa も検出された。このほか *N*-脱メチル化体 Ls 及びその異性体 La も認められた。また、非標識体 Y が壤土 (スイス)、砂壤土及び微砂質埴土で認められ、アミド結合の開裂が示唆された。

好氣的土壌中におけるイソピラザムの主要分解経路はイソプロピル基の水酸化であった。マイナーな経路としてピラゾール環の *N*-脱メチル化が認められた。

(参照 1、13)

表 16 好氣的土壌における処理 120 日後の分解物分布 (%TAR)

分解物	土壌			
	壤土 (英国)	壤土 (スイス)	砂壤土	微砂質埴土
イソピラザム	79.6	44.7	73.1	61.0
Fs	2.5	12.6	5.0	13.7
Fa	0.3	ND	0.1	ND
Ls+La	0.1	1.2	0.6	0.1

ND : 検出せず

表 17 好氣的土壌における各土壌の半減期

土壌	壤土 (英国)	壤土 (スイス)	砂壤土	微砂質埴土
半減期 (日)	592	121	349	231

(2) 好氣的土壌中運命試験②

壤土(スイス)に[pyr-¹⁴C]イソピラザム (*syn: anti*=69.4:30.6) を 0.168 mg/kg 乾土となるように処理し、土壌水分をほ場容水量 (pF2.0) 相当に調整し、20±2℃の暗所で 360 日間インキュベートして、好氣的土壌中運命試験が実施された。

好氣的土壌における分解物分布は表 18 に示されている。

好氣的条件下でイソピラザムは緩やかに減少し、処理後 360 日には 2.61%TAR まで減少した。主要分解物は Fs 及び Y であった。

イソピラザムの主要分解経路はイソプロピル基の水酸化及びアミド結合の開

裂であった。それらはさらに分解され、無機化されて CO₂ が生成されるか、又は結合残留成分中に組み込まれた。

半減期は 40 日と算出された。（参照 1、14）

表 18 好氣的土壤における分解物分布（%TAR）

経過日数（日）		0	14	60	120	360
抽出物	イソピラザム	93.4	67.2	26.8	15.3	2.61
	<i>syn/anti</i>	70.9/29.1	78.2/21.8	78.7/21.3	80.2/19.8	81.2/18.8
	Fs	0.00	11.4	19.8	12.4	2.16
	Y	0.00	0.57	5.21	9.23	5.38
	未同定*	0.00	15.1	25.7	27.4	19.3
	合計	93.4	94.2	77.5	64.5	29.4
¹⁴ CO ₂		NS	0.06	1.95	3.25	22.7
抽出残渣		0.27	2.07	17.4	25.7	58.3
回収率		93.7	96.3	96.8	93.5	110

NS：試料なし

*：単独で 4.75%TAR 以上の分解物画分は存在しなかった。

（３）好氣的土壤中運命試験③

砂質埴壤土（英国）、砂壤土（スイス、２種類）及び微砂質埴壤土（フランス）に[phe-¹⁴C]イソピラザム（*syn*：*anti*=69.7：30.3）を 0.17 mg/kg 乾土となるように処理し、土壤水分をほ場容水量（pF2.0）相当に調整して、好氣的条件下、20±2℃の暗所で最長 361 日インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

４種の土壤における残留放射能の回収率は 91.9～105%TAR であり、回収された放射能の大部分はイソピラザムであった。イソピラザムは緩やかに減少し、処理 123 日後には 48.4～87.6%TAR 認められた。分解物 Fs は徐々に増加し、123 日後には 23.6%TAR 検出された。無機化は僅かであり、¹⁴CO₂ の生成量は試験期間を通じて 1.9%TAR 以下であった。

半減期は 141 日～976 日と算出された。（参照 1、15）

（４）好氣的/嫌氣的土壤中運命試験

砂質埴壤土（英国）に[pyr-¹⁴C]イソピラザム（*syn*：*anti*=69.4：30.6）を 0.17 mg/kg 乾土となるように処理し、土壤水分をほ場容水量（pF2.0）相当に調整して、好氣的条件下、20±2℃の暗所で 30 日間インキュベートした後、窒素を通気して嫌氣的条件とし、20±2℃の暗所で 90 日間インキュベートして好氣的/嫌氣的土壤中運命試験が実施された。

総残留放射能の回収率は 92.0～95.8%TAR であった。非抽出性残渣は最大で 4.63%TAR で 86%TAR 以上が抽出された。¹⁴CO₂ は嫌氣的条件開始時に最大

(0.23% TAR)であったことから、嫌氣的条件下では $^{14}\text{CO}_2$ までは分解されないと考えられた。抽出された放射能の大部分はイソピラザムであり、嫌氣的条件開始後変化はなく 80% TAR 以上で推移した。分解物としては、嫌氣的条件開始時に Fs が 3.51% TAR 検出され、その後も 2~3% TAR で変化しなかったことから、Fs は嫌氣的条件下で安定と考えられた。

半減期は 1 年以上と算出された。（参照 1、16）

（５）土壤表面光分解試験①

壤土（スイス）に[pyr- ^{14}C]イソピラザム（*syn* : *anti*=70 : 30）を、乾燥土壤（風乾）及び湿土壤（水分含量 : pF2.5）に 131~142 g ai/ha となるように処理し、 $20\pm 2^\circ\text{C}$ で 21 日間キセノンランプ（平均光強度 : 乾燥土壤 36.7 W/m²、湿土壤 36.0 W/m²、波長範囲 : 295 nm 未満をフィルターでカット）照射して土壤表面光分解試験が実施された。

照射 21 日後にイソピラザムは乾燥土壤で 68.3% TAR まで減少した一方、湿土壤では 93.8% TAR 認められた。乾燥土壤では分解物として、X（最大 8.0% TAR）及び W（最大 5.4% TAR）が認められた。暗所対照区では[pyr- ^{14}C]イソピラザムは安定であった。

乾燥土壤における半減期は、42.0 日（東京春換算 198 日）と算出された。湿土壤では、イソピラザムの明瞭な分解が認められず、半減期は求められなかった。（参照 1、17）

（６）土壤表面光分解試験②

乾燥壤土（スイス）に[phe- ^{14}C]イソピラザム（*syn* : *anti*=73.7 : 26.3）を、133~136 g ai/ha となるように処理した後、 $20\pm 2^\circ\text{C}$ で 21 日間キセノンランプ（平均光強度 : 40.7 W/m²、波長範囲 : 295 nm 未満をフィルターでカット）照射して土壤表面光分解試験が実施された。

イソピラザムは 21 日後には 72.4% TAR に減少した。また、14 種の未同定画分が検出されたが、いずれも単独では 3% TAR 以下であった。暗所対照区では[phe- ^{14}C]イソピラザムは安定であった。

イソピラザムの半減期は、35.9 日（東京春換算 188 日）と算出された。（参照 1、18）

（７）土壤吸着/脱着試験

① 海外土壤を用いた土壤吸脱着試験

イソピラザムを用いて、6 種類の土壤[砂質埴壤土（英国）、砂壤土（米国）、砂土（米国）、壤土（スイス）、微砂質埴土（米国）及び微砂質埴壤土（フランス）]における土壤吸着/脱着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 11.6~51.8、有機炭素含有率により補正した吸

着係数 $K_{ads_{oc}}^{ads}$ は 1,730～4,120 であった。土壌脱着係数 K_{des}^{des} は 18.1～68.3、有機炭素含有率により補正した脱着係数 $K_{des_{oc}}^{des}$ は 1,950～6,240 であった。（参照 1、19）

② 国内土壌を用いた土壌吸着試験

イソピラザムを用いて、壤土（栃木及び埼玉）における土壌吸着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数 K_{ads}^{ads} はイソピラザム *syn* 体で 6.41～30.9、イソピラザム *anti* 体で 6.21～33.1、有機炭素含有率により補正した吸着係数 $K_{ads_{oc}}^{ads}$ はイソピラザム *syn* 体で 567～1,020、イソピラザム *anti* 体で 550～1,100 であった。（参照 82）

4. 水中運命試験

（1）加水分解運命試験

pH4（クエン酸緩衝液：予備試験のみ）、pH5（酢酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）及び pH9（ホウ酸緩衝液）の各種滅菌緩衝液に $[pyr-^{14}C]$ イソピラザム（*syn* : *anti* = 91.3 : 8.7）を 0.32 mg/L となるように添加した後、 $49.7 \pm 0.02^{\circ}C$ （予備試験）又は $25.3 \pm 0.1^{\circ}C$ （本試験）で予備試験では 5 日間、本試験では 30 日間インキュベートして加水分解試験が実施された。

$[pyr-^{14}C]$ イソピラザムは、両試験条件下において、全ての pH 値で安定であり、本試験 30 日間培養後の回収率は、pH5～9 で 91.5%～95.6% TAR であった。予備試験及び本試験において、10% TAR を超える分解物は認められなかった。

経時的な減衰が認められなかったため、半減期は求められなかった。（参照 1、20）

（2）水中光分解試験（緩衝液及び自然水）

滅菌リン酸緩衝液（pH7.0）及び滅菌自然水（湖沼水（英国）、pH7.37）に $[phe-^{14}C]$ イソピラザム（*syn* : *anti* = 73.4 : 26.6、72.6 : 27.4）又は $[pyr-^{14}C]$ イソピラザム（*syn* : *anti* = 69.3 : 30.7）を 0.5 mg/L となるように添加した後、 $25 \pm 2^{\circ}C$ で最長 29 日間キセノンランプ（光強度：25.2～28.1 W/m²、波長範囲：295 nm 未満をフィルターでカット）照射して水中光分解試験が実施された。

光分解における放射能分布は表 19 に示されている。

試験水や標識体の違いにかかわらずイソピラザムは経時的に減少し、自然水中でより速く減少した。緩衝液中と自然水中で分解経路に違いはなく、分解物として $[pyr-^{14}C]$ 標識体からは X 及び W が確認された。 $[phe-^{14}C]$ 標識体からは同定された分解物はなかった。暗所対照区では、イソピラザムはいずれも安定であった。いずれも試験期間を通して、イソピラザムの *syn/anti* 比に変化は認められなかった。

イソピラザムの主要分解経路は、アミド結合の開裂による分解物 X 及び W の生成、脱離したフェニル環の高極性化合物への分解であった。これらの分解物は最終的に $^{14}\text{CO}_2$ まで分解されるものと考えられた。

イソピラザムの緩衝液中での半減期は 54.3 日（東京春換算 176 日）、自然水中での半減期は 4.2～4.9 日（東京春換算 15.2～16.4 日）と算出された。（参照 1、21）

表 19 光分解における放射能分布（%TAR）

標識体	試験水	照射日数	0	1	3	6 ^a /7 ^b /8 ^c	12 ^d /14 ^e /15 ^f	25 ^g /29 ^h
[phe- ^{14}C] イソピラザム	緩衝液 (pH7)	イソピラザム	103	—	100	95.8 ^c	94.4 ^f	75.8 ^h
		極性画分 1	0.0	—	0.0	0.0 ^c	0.0 ^f	1.8 ^h
		極性画分 2	0.0	—	0.0	0.0 ^c	0.0 ^f	0.0 ^h
		$^{14}\text{CO}_2$	—	—	0.0	0.2 ^c	0.7 ^f	2.2 ^h
	自然水 (pH7.37)	イソピラザム	100	94.3	65.0	32.6 ^b	21.6 ^e	12.2 ^h
		極性画分 1	0.0	0.5	2.4	6.7 ^b	8.7 ^e	11.0 ^h
		極性画分 2	0.0	0.6	2.6	7.1 ^b	5.9 ^e	4.7 ^h
		$^{14}\text{CO}_2$	—	0.0	0.5	3.0 ^b	8.4 ^e	14.3 ^h
[pyr- ^{14}C] イソピラザム	緩衝液 (pH7)	イソピラザム	103	—	99.2	69.1 ^c	63.1 ^f	71.9 ^h
		W	0.0	—	1.0	11.5 ^c	14.8 ^f	10.9 ^h
		X	0.0	—	0.0	4.7 ^c	7.4 ^f	4.4 ^h
		$^{14}\text{CO}_2$	—	—	0.0	0.7 ^c	1.3 ^f	1.5 ^h
	自然水 (pH7.37)	イソピラザム	102	92.7	60.0	31.6 ^a	20.2 ^d	9.6 ^g
		W	0.0	4.3	15.4	27.5 ^a	31.9 ^d	36.4 ^g
		X	0.0	1.1	5.3	12.9 ^a	16.8 ^d	20.1 ^g
		$^{14}\text{CO}_2$	—	0.0	0.1	0.7 ^a	3.4 ^d	9.9 ^g

—：試験を実施せず

a~h：それぞれの照射日数に対応

5. 土壌残留試験

火山灰土・壤土（茨城）及び沖積土・壤土（高知）を用いて、イソピラザム、代謝物 Fs 及び代謝物 Y を分析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。

推定半減期は表 20 に示されている。（参照 1、83）

表 20 イソピラザムの推定半減期^a（日）

試験	処理濃度	分析対象化合物	土壌	推定半減期
ほ場試験 (畑地状態)	873 g ai/ha ^a	イソピラザム(<i>syn</i> 体)及び イソピラザム(<i>anti</i> 体)	火山灰土・壤土	42.9
			沖積土・壤土	12.5
		イソピラザム(<i>syn</i> 体)、イ ソピラザム(<i>anti</i> 体)、代謝 物 Fs 及び代謝物 Y	火山灰土・壤土	47.0
			沖積土・壤土	14.0

^a：18.7 %フロアブル剤を使用

6. 作物等残留試験

（１）作物残留試験

国内において、果実、野菜等を用いて、イソピラザム（*syn* 体及び *anti* 体）、代謝物 Fs 及び代謝物 Fa を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙 3 に示されている。

イソピラザムの最大残留値は、散布 1 日後に収穫したもも（果皮）で認められた 14.0 mg/kg であった。また、可食部における最大残留値は、散布 1 日後に収穫した結球レタス（茎葉）の 5.51 mg/kg であった。代謝物 Fs の最大残留値は、散布 7 日後に収穫したメロン（果皮）における 0.040 mg/kg、可食部においては散布 7 日後に収穫した結球レタス（茎葉）の 0.038 mg/kg であり、代謝物 Fa については全て定量限界未満であった。

海外において、大麦、小麦及びバナナ等を用い、イソピラザム（*syn* 体及び *anti* 体）、代謝物 Fs 及び代謝物 Fa を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙 4 に示されている。

イソピラザムの最大残留値は、散布 30 日後に収穫した大麦（玄麦）で認められた 0.504 mg/kg であった。代謝物 Fs の最大残留値は、散布 45 日後に収穫した小麦（玄麦）で認められた 0.056 mg/kg であり、代謝物 Fa については全て定量限界未満であった。（参照 1、22、84～100、105）

（２）後作物残留試験

小麦の栽培中にイソピラザム（*syn/anti* 比＝70 : 30）を 375 g ai/ha の用量で 3 回茎葉散布処理した土壌で、大麦、にんじん及びほうれんそうを栽培して、イソピラザム、代謝物 Fs 及び Y を分析対象とした後作物残留試験が実施された。

結果は別紙 5 に示されている。

イソピラザムはにんじん（根部）で 0.01 mg/kg 認められたほかは、いずれの作物においても定量限界未満であった。可食部における代謝物 Fs の最大残留値は、散布 60 日後に植え付けした大麦（玄麦）で認められた 0.031 mg/kg で、代謝物 Y の最大残留値は、散布 60 日後に植え付けしたほうれんそうで認められた 0.06 mg/kg であった。（参照 76、77）

（３）畜産物残留試験

泌乳牛（品種不明）（一群 3 匹）にイソピラザム（*syn/anti* 比＝70 : 30）を 0.545、1.53 及び 5.09 mg/kg 体重/日（飼料中濃度 15、42 及び 140 mg/kg）で 28 日間投与して、イソピラザム及び代謝物 J を分析対象とした畜産物残留試験が実施された。

結果は別紙 6 に示されている。

イソピラザム並びにイソピラザム及び代謝物 J の合計値は最大でそれぞれ

0.17 及び 2.0 $\mu\text{g/g}$ （肝臓）検出された。（参照 76）

（４）推定摂取量

作物残留試験成績に基づき、イソピラザム（*syn* 体及び *anti* 体）を暴露評価対象物質として国内で栽培される農産物から摂取される推定摂取量及びイソピラザムを暴露評価対象化合物として畜産物から摂取される推定摂取量が表 21 に示されている。

なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用方法からイソピラザム（*syn* 体及び *anti* 体）が最大の残留量を示す使用条件で、全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。また、畜産物における推定摂取量の算定には、各試料の最大値を用いた。

表 21 食品中より摂取されるイソピラザムの推定摂取量

	国民平均 (体重：55.1 kg)	小児（1～6 歳） (体重：16.5 kg)	妊婦 (体重：58.5 kg)	高齢者(65 歳以上) (体重：56.1 kg)
摂取量 (μg /人/日)	297	204	319	343

注) 畜産物における推定摂取量については、農薬登録の使用条件の範囲内での計算が困難であることから、試験結果のうちの最大残留値を用いたため、農産物に比べて過大評価となっている可能性がある。

7. 一般薬理試験

ラットを用いたイソピラザムの一般薬理試験が実施された。結果は表 22 に示されている。（参照 1、101～103）

表 22 一般薬理試験概要

試験の種類		動物種	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
系 中 枢 神 経	一般状態 (Irwin 変法)	Wistar Hannover ラット	雄 6	0 ^a 、30、250、 2,000 (経口)	2,000	—	影響なし
	呼吸数/1 回換気量/分 時換気量、収縮期/拡張期/ 平均血圧、心拍数、心電図	Wistar Hannover ラット (麻酔下)	雄 4	0 ^a 、30、250、 2,000 (十二指腸内)	250	2,000	2,000 mg/kg 体重投与群： 収縮期/拡張期/平均血圧低下

腎機能	尿検査、 Cre クリアランス	Wistar Hannover ラット	雌 6	0 ^a 、30、250、 2,000 (経口)	250	2,000	2,000 mg/kg 体重投与 群：浸透圧、Cre [§] 、蛋 白質 [§] 、Na [§] 、K [§] 、Cl、 Ca [§] 、P [§] 増加
-----	--------------------	---------------------------	-----	--	-----	-------	--

1 使用したイソピラザムの *syn/anti* 比は、全て 92.8 : 7.2

2 [§]：有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

3 ^a：溶媒として 0.5%CMC 水溶液が用いられた。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

イソピラザム原体のラットを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 23 に示されている。(参照 1、23～27)

表 23 急性毒性試験概要(原体)

投与 経路	<i>syn/anti</i> 比	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
経口 ^a	92.8 : 7.2	Wistar Hannover ラット 雌 1～3 匹 ^b		>2,000	175 mg/kg 体重：立毛 275 mg/kg 体重：立毛 2,000 mg/kg 体重：立毛、円背位、鎮静、運動失調 死亡例なし
	69.7 : 30.3	Wistar Hannover ラット 雌 1～7 匹 ^b		推定値 2,000	175 mg/kg 体重：立毛 550 mg/kg 体重：立毛、鎮静、運動失調、円背位 2,000 mg/kg 体重：立毛、鎮静、円背位、低体温、腹臥位、横臥位、痙攣、胃の膨満、十二指腸の水溶性内容物及び灰白色内容物、空・回腸の内容物なし、死亡(5/7 例切迫と殺)
	100 : 0	Wistar Hannover ラット 雌 5 匹 ^b		>2,000	2,000 mg/kg 体重：立毛、円背位、鎮静、運動失調 死亡例なし
	0 : 100	Wistar Hannover ラット 雌 1～3 匹 ^b		310	175 mg/kg 体重：立毛、円背位、鎮静、運動失調 550 mg/kg 体重：立毛、円背位、腹臥位、鎮静、死亡(3/3 例切迫と殺) 2,000 mg/kg 体重：腹臥位、運動失調、死亡(1/1 例切迫と殺)
	50 : 50	Wistar Hannover ラット 雌 1～3 匹 ^b		310	175 mg/kg 体重：立毛、円背位、腹臥位、鎮静、運動失調 550 mg/kg 体重：腹臥位、鎮静、運動失調、死亡(3/3 例切迫と殺)

					2,000 mg/kg 体重：立毛、腹臥位、運動失調、死亡（1/1 例切迫と殺）
経皮 ^c	92.8 : 7.2	Wistar Hannover ラット 雌雄各 5 匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし
吸入 ^d	92.8 : 7.2	Wistar Hannover ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		被毛湿潤、鼻周囲の汚れ、血涙、流涎、呼吸異常音 死亡例なし
			>5.28	>5.28	

a : 0.5%CMC 水溶液に懸濁

b : 上げ下げ法による評価

c : 最小量の蒸留水でペーストにして腹部皮膚に 24 時間閉塞貼付

d : Aerosil 添加、4 時間鼻部暴露

代謝物 Y 及び Fs のラットを用いた急性経口毒性試験が実施された。結果は表 24 に示されている。（参照 1、28、29）

表 24 急性経口毒性試験概要（代謝物）

被験物質 ^a	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
代謝物 Y	Wistar Hannover ラット、雌 5 匹		>2,000	立毛、円背位、鎮静 死亡例なし
代謝物 Fs	Wistar Hannover ラット、雌 5 匹		>2,000	症状及び死亡例なし

a : 0.5%CMC 水溶液に懸濁して投与

（2）急性神経毒性試験（ラット）

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた単回強制経口（原体；異性体比 *syn* : *anti* = 92.8 : 7.2 ; 0、30、250 及び 2,000 mg/kg 体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 25 に示されているが、全て一過性であった。また、投与に関連した神経病理組織学的変化は認められなかった。

本試験において 250 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で活動低下等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 30 mg/kg 体重であると考えられた。急性神経毒性は認められなかった。（参照 1、30）

表 25 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000 mg/kg 体重		・摂餌量減少
250 mg/kg 体重以上	・活動低下 [§] 、立ち上がり回数減少 [§]	・活動低下 [§] 、衰弱、立ち上がり回数減少、横臥位 [§] ・よろめき歩行 [§] ・体重増加抑制 ・自発運動量（移動距離、中央部からの移動時間、立ち上がり回数）減少
30 mg/kg 体重	毒性所見なし	毒性所見なし

[§]：有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

イソピラザム原体の NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、軽度な眼刺激性が認められたが、皮膚刺激性は認められなかった。（参照 1、31、32）

CBA マウスを用いた皮膚感作性試験（局所リンパ節試験法）が実施され、イソピラザムは皮膚感作性を示すと判断された。（参照 1、31～33）

10. 亜急性毒性試験

（1）90 日間亜急性毒性試験（ラット）①

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌[原体（*syn/anti* 比＝92.8 : 7.2）：0、300、1,500 及び 6,000 ppm：平均検体摂取量は表 26 参照]投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 26 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①の平均検体摂取量

投与群（ppm）		300	1,500	6,000
平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	21.3	106	463
	雌	23.8	118	484

各投与群で認められた毒性所見は表 27 に示されている。

本試験において 1,500 ppm 以上投与群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 300 ppm（雄 21.3 mg/kg 体重/日、雌 23.8 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、34）

表 27 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
6,000 ppm	・体重増加抑制(投与 2～3 週) ・摂餌量減少(投与 1 週) ・食餌効率低下 ・GGT 及び AST 増加 ・CK 増加 ・ナトリウム、クロール及びリン増加 ・胸腺絶対及び比重量²減少	・食餌効率低下 ・Chol 増加 ・GGT 及び ALT 増加 ・ナトリウム及びクロール増加
1,500 ppm 以上	・肝絶対、比及び補正重量³増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・TG 減少	・体重増加抑制(1,500 ppm 投与群：投与 4 週以降、6,000 ppm 投与群：投与 2 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・肝比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大
300 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②

構造異性体間の毒性発現を比較するため、Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌[検体①：原体（*syn/anti* 比＝92.8：7.2）及び検体②：原体（*syn/anti* 比＝69.7：30.3）：0、100、250 及び 2,000 ppm：平均検体摂取量は表 28 参照]投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 28 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②の平均検体摂取量（mg/kg 体重/日）

検体	投与群（ppm）	100	250	2,000
①	雄	8.30	20.3	159
	雌	9.87	24.1	193
②	雄	8.24	20.8	163
	雌	9.49	24.2	197

各投与群で認められた毒性所見は表 29 に示されている。

syn/anti 異性体比の異なる検体において、検体投与による影響は同様であり、毒性学的プロファイルに大きな差はなかった。

本試験において 2,000 ppm 群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等が認められるので、無毒性量は雌雄とも 250 ppm（検体①：雄 20.3 mg/kg 体重/日、雌 24.1 mg/kg 体重/日、検体②：雄 20.8 mg/kg 体重/日、雌 24.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、35）

² 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。

³ 最終体重を共変量として調整した平均値（以下同じ。）。

表 29 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	検体①		検体②	
	雄	雌	雄	雌
2,000 ppm	・肝及び甲状腺絶対、比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大	・体重増加抑制(投与 0～14 日以降) ・食餌効率低下 ・Chol 増加 ・Glob 増加 ・A/G 比低下 ・肝比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・小葉中間帯肝細胞空胞化	・肝比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・小葉中間帯肝細胞空胞化	・体重増加抑制(投与 0～14 日以降) ・食餌効率低下 ・肝比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・小葉中間帯肝細胞空胞化
250 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし

(3) 28 日間亜急性毒性試験（ラット）①<参考資料⁴>

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌[原体（*syn/anti* 比 = 92.8 : 7.2）：0、300、4,000 及び 8,000 ppm：平均検体摂取量は表 30 参照]投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 30 28 日間亜急性毒性試験（ラット）①の平均検体摂取量

投与群（ppm）		300	4,000	8,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	29.4	393	793
	雌	28.1	390	721

各投与群で認められた毒性所見は表 31 に示されている。

本試験において 4,000 ppm 以上投与群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 300 ppm (雄 29.4 mg/kg 体重/日、雌 28.1 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 1、36）

表 31 28 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
8,000 ppm		・ GGT 及びカリウム増加
4,000 ppm 以上	・ 体重増加抑制(投与 4 日以降) ・ 摂餌量減少[§](投与 1 週以降) ・ TG 減少 ・ 肝比及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大	・ 体重増加抑制(投与 4 日以降) ・ 摂餌量減少[§](投与 1 週以降) ・ Ure、Chol 及びリン増加 ・ 肝比及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大
300 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

⁴ 投与期間が短いため参考資料とした。

§：統計処理は実施されていないが、検体投与の影響と判断した。

（４）28 日間亜急性毒性試験（ラット）②<参考資料⁵>

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 5 匹、対照群 15 匹のうち 9 匹は投与 1 日目にと殺）を用いた混餌[原体（*syn/anti* 比＝89：11）：0、100、500 及び 2,000 ppm：平均検体摂取量は表 32 参照]投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 32 28 日間亜急性毒性試験（ラット）②の平均検体摂取量

投与群（ppm）		100	500	2,000
平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	9.1	46.1	175
	雌	9.6	48.1	191

各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。

2,000 ppm 投与群の雌雄で総 P450、EROD 及び PROD 活性の増加が、500 ppm 投与群雌で PROD 活性の増加が認められ、肝薬物代謝酵素の誘導があることが示された。

本試験において 2,000 ppm 投与群の雄で小葉中心性肝細胞肥大等が、同群雌で体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雌雄とも 500 ppm（雄 46.1 mg/kg 体重/日、雌 48.1 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、37）

表 33 28 日間亜急性毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000 ppm	・ TG 減少 ・ Cre 及び CK 増加 ・ 肝絶対、比及び補正重量増加 ・ 小葉中心性肝細胞肥大	・ 体重増加抑制(投与 11 日以降) ・ Ure 増加
500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（５）90 日間亜急性毒性試験（イヌ）①

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口[原体（*syn/anti* 比＝92.8：7.2）：0、30、100 及び 300 mg/kg 体重/日]投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 34 に示されている。

本試験において 100 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で ALP 増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 30 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1、38）

⁵ 投与期間が短いため参考資料とした。

表 34 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
300 mg/kg 体重/日	・活動性の低下、異常行動（左右首振り／身震い）、ふらつき、異常発声(投与 2 及び/又は 3 日) ・運動失調、起立不能、緩慢なよろめき前進／後退、振戦、前肢反射の消失、攻撃性、興奮性(投与 2 日) ・体重増加抑制(投与 2 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・PLT 増加 ・Alb、TP 及び Chol 減少 ・肝（胆嚢を含む）比重量増加	・体重増加抑制(投与 5 週以降) ・摂餌量減少(投与 5 週以降) ・TP、Chol 及びナトリウム減少 ・尿比重減少 ・肝(胆嚢を含む)絶対及び比重量増加[§]
100 mg/kg 体重/日以上	・ALP 増加 ・肝（胆嚢を含む）絶対及び補正重量増加[§]	・ALP 増加 ・Alb 減少
30 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

§：絶対重量に有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

（6）90 日間亜急性毒性試験（イヌ）②

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口[原体（*syn/anti* 比＝69.7：30.3）：0、10、30 及び 250 mg/kg 体重/日]投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。

本試験において 250 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 30 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1、39）

表 35 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）②で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
250 mg/kg 体重/日	・流涎(投与 3 日以降) ・異常行動（鎮静、散発的な後肢屈曲、運動失調、首振り及び眼瞼下垂）(投与 27 日以降) ・活動性の低下(投与 3 日) ・体重増加抑制(投与 1～2 週：1 匹) ・摂餌量減少(投与 1 週)	・流涎(投与 2 日以降) ・体重増加抑制(投与 1～2 週：1 匹) ・摂餌量減少(投与 1 週に減少傾向)
30 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（7）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌[原体（*syn/anti* 比＝92.8：7.2）：0、300、1,500 及び 6,000 ppm：平均検体摂取量は表 36 参照]投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 36 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群（ppm）		300	1,500	6,000
平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	20.3	98.0	382
	雌	24.9	114	468

本試験において、雄では検体投与による影響は認められず、雌では 6,000 ppm 投与群で体重増加抑制（投与 8 日以降）及び摂餌量減少（投与 1 週以降）が認められたので、無毒性量は雄で本試験の最高用量である 6,000 ppm（382 mg/kg 体重/日）、雌で 1,500 ppm（114 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 1、40）

（8）28 日間亜急性毒性試験（代謝物 Y、ラット）

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（代謝物 Y:0、2,000、6,000 及び 12,000 ppm：平均検体摂取量は表 37 参照）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 37 28 日間亜急性毒性試験（代謝物 Y、ラット）の平均検体摂取量

投与群（ppm）		2,000	6,000	12,000
平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	175	497	1,020
	雌	176	525	1,110

本試験においていずれの投与群にも検体投与による影響は認められなかったので、無毒性量は本試験の最高用量である 12,000 ppm（雄：1,020 mg/kg 体重/日、雌：1,110 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、41）

（9）28 日間亜急性毒性試験（代謝物 Fs、ラット）

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（代謝物 Fs：0、300、4,000 及び 10,000 ppm：平均検体摂取量は表 38 参照）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 38 28 日間亜急性毒性試験（代謝物 Fs、ラット）の平均検体摂取量

投与群（ppm）		300	4,000	10,000
平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	27	370	927
	雌	29	388	906

各投与群で認められた毒性所見は表 39 に示されている。

4,000 ppm 以上投与群の雄で PROD 活性及び総 P450 増加、雌で肝臓 1 g 当た

りのタンパク量増加、300 ppm 以上投与群の雌雄で EROD 増加、雄で肝臓 1 g 当たりのタンパク量増加、雌で PROD 活性増加が認められ、薬物代謝酵素誘導があることが示された。

本試験において、4,000 ppm 以上投与群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 300 ppm（雄 27 mg/kg 体重/日、雌 29 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 1、42）

表 39 28 日間亜急性毒性試験（代謝物 Fs、ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
10,000 ppm	・Glob 増加	・リン及びカルシウム減少
4,000 ppm 以上	・肝絶対及び比重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・甲状腺ろ胞上皮細胞肥大 [§]	・肝絶対及び比重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 [§]
300 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

[§]：有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

（1）1 年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口[原体 (*syn/anti* 比=92.8:7.2)：0、25、100 及び 250 mg/kg 体重/日]投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 40 に示されている。

本試験において 100 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で ALP 増加が、更に雄では肝絶対及び比重量増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 25 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1、43）

表 40 1 年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
250 mg/kg 体重/日	・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・網赤血球数減少 ・GDH 及び ALT 増加 ・TP 減少	・体重減少(投与 1 週)/体重増加抑制(投与 6 週以降) ・摂餌量減少(投与 1～3 週) ・Alb 及び TP 減少
100 mg/kg 体重/日以上	・体重減少(投与 1 週) ^a /体重増加抑制(投与 2 週以降) ^b ・ALP 増加 ・Alb 減少 ・肝絶対 [§] 及び比重量増加	・ALP 増加
25 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

[§]：100 mg/kg 体重/日投与群では絶対重量に有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

^a：250 mg/kg 体重/日投与群では投与 1、3、5 週

^b：250 mg/kg 体重/日投与群では投与 2、4、6 週以降

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)

Wistar Hannover ラット(発がん群; 一群雌雄各52匹、慢性群; 中間と殺群雌雄各12匹)を用いた混餌[原体(*syn/anti*比=92.8:7.2):0、100、500及び3,000 ppm: 平均検体摂取量は表41参照]投与による2年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表41 2年間慢性毒性/発がん性試験併合試験(ラット)の平均検体摂取量

投与群(ppm)		100	500	3,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	5.5	27.6	174
	雌	6.9	34.9	233

各投与群で認められた毒性所見は表42、子宮内膜腺腫及び子宮内膜腺癌の発生頻度は表43、肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度は表44にそれぞれ示されている。

検体投与に関連する腫瘍性病変として3,000 ppm群の雌で子宮内膜腺癌及び肝細胞腺腫の発生頻度が増加した。3,000 ppm群の雄で甲状腺ろ胞細胞腺腫の発生頻度が増加したが、前腫瘍性病変が認められていないことから、検体投与による影響ではないと考えられた。

本試験において500 ppm以上投与群の雌雄で好酸性変異肝細胞巣等が認められたので、無毒性量は雌雄とも100 ppm(雄5.5 mg/kg 体重/日、雌6.9 mg/kg 体重/日)であると考えられた。(参照1、44)

(肝細胞腺腫及び子宮内膜腺癌の発生に関するメカニズム試験は[14. (1) ~ (2)]参照)

表42 2年間慢性毒性/発がん性試験併合試験で認められた毒性所見(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
3,000 ppm	・体重増加抑制(投与2週以降)、摂餌量(投与1週以降)及び食餌効率低下 ・Hb及びHt減少 ・Lym及びMon減少 ・TG減少 ・ALT増加 ・ALP減少 ・小葉中心性肝細胞褐色色素沈着 ・腸間膜リンパ節洞赤血球增多症	・摂餌量減少(投与1週以降) ・後肢握力低下 ・Hb、Ht及びRBC減少 ・PLT増加 ・Chol増加及びGlu減少 ・GGT増加 ・ALP及びAST減少 ・ナトリウム、クロール、カルシウム、Cre及び尿素増加
500 ppm 以上	・GGT増加 ・小葉中心性肝細胞空胞化 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・好酸性変異肝細胞巣	・体重増加抑制(投与4週以降)^a及び食餌効率低下 ・TG及びBil減少 ・小葉中心性肝細胞肥大 ・好酸性変異肝細胞巣

		・小葉中心性肝細胞褐色色素沈着 ・腎尿細管褐色色素沈着
100 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 3,000 ppm 投与群では投与 2 週以降

表 43 子宮内膜腺腫及び子宮内膜腺癌の発生頻度

投与量 (ppm)	0	100	500	3,000
検査動物数	52	52	52	52
子宮内膜腺腫	1	0	1	0
子宮内膜腺癌	1	2	3	15***

Peto 検定 : ** : $p < 0.01$

Fisher 検定 : # : $p < 0.01$

表 44 肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度

性別	雄				雌			
投与量 (ppm)	0	100	500	3,000	0	100	500	3,000
検査動物数	52	52	52	52	52	52	52	52
肝細胞腺腫	1	0	0	3	0	1	1	11***
肝細胞癌	0	0	0	1	0	0	0	1

Peto 検定 : ** : $p < 0.01$

Fisher 検定 : # : $p < 0.01$

(3) 18 か月間発がん性試験（マウス）

C57BL/10J_fCD-1 マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌[原体 (*syn/anti* 比=92.8 : 7.2) : 0、70、500 及び 3,500 ppm : 平均検体摂取量は表 45 参照] 投与による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 45 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)		70	500	3,500
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	7.8	56.2	433
	雌	9.9	74.9	554

各投与群で認められた毒性所見は表 46 に示されている。

検体投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、3,500 ppm 投与群の雄で体重増加抑制等が、500 ppm 以上投与群の雌で小葉周辺性肝細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雄で 500 ppm (56.2 mg/kg 体重/日)、雌で 70 ppm (9.9 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 1、45）

1 表 46 18 か月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
3,500 ppm	・眼分泌物(投与 48 週以降) ・体重増加抑制(投与 2 週以降) ・食餌効率低下 ・肝（胆嚢を含む）比及び補正重量増加 ・小葉中間帯肝細胞肥大 ・鼻涙管炎症・滲出液	・体重増加抑制(投与 4 週以降) ・肝（胆嚢を含む）絶対、比及び補正重量増加 ・鼻腔・咽頭上皮内好酸性小体 ・涙腺マクロファージ褐色色素沈着 ・胆嚢上皮内好酸性小体 ・脾絶対、比及び補正重量減少 ・卵巣マクロファージ褐色色素沈着
500 ppm 以上	500 ppm 以下 毒性所見なし	・食餌効率低下 ・小葉周辺性肝細胞肥大
70 ppm		毒性所見なし

2
3 1 2. 生殖発生毒性試験

4 (1) 2 世代繁殖試験（ラット）

5 Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 26 匹）を用いた混餌[原体（*syn/anti*
6 比＝92.8 : 7.2）：0、100、500 及び 3,000 ppm：平均検体摂取量は表 47 参照]投
7 与による 2 世代繁殖試験が実施された。

8
9 表 47 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

性別		雄			雌		
投与群 (ppm)		100	500	3,000	100	500	3,000
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	8.3	41.2	250	9.3	46.6	277
	F ₁ 世代	9.5	47.8	289	10.2	50.1	301

10
11 各投与群で認められた毒性所見は表 48 に示されている。

12 本試験において、親動物では 500 ppm 以上投与群の雌雄で小葉中心性/び慢性
13 肝細胞肥大等が認められ、児動物では 500 ppm 以上投与群雌雄で肝絶対、比及
14 び補正重量増加が認められたので、一般毒性に対する無毒性量は親動物において
15 雌雄とも 100 ppm（P 雄：8.3 mg/kg 体重/日、P 雌：9.3 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：
16 9.5 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：10.2 mg/kg 体重/日）、児動物で 100 ppm（P 雄：8.3
17 mg/kg 体重/日、P 雌：9.3 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：9.5 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：10.2
18 mg/kg 体重/日）であると考えられた。また、3,000 ppm 投与群において着床数
19 の低下が認められたので、繁殖能に対する無毒性量は 500 ppm（P 雄：41.2 mg/kg
20 体重/日、P 雌：46.6 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：47.8 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：50.1 mg/kg
21 体重/日）であると考えられた。（参照 1、46）
22

1 表 48 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親：P、児：F ₁		親：F ₁ 、児：F ₂	
		雄	雌	雄	雌
親動物	3,000 ppm	・体重増加抑制（投与 2 週以降） ・摂餌量減少（投与 1 週以降） ・食餌効率低下 ・肝絶対、比及び補正重量増加	・摂餌量減少（投与 3 週以降） ・食餌効率低下 ・肝絶対、比及び補正重量増加 ・脾絶対及び比重量減少 ・卵巢及び子宮絶対、比[§]及び補正重量増加 ・着床数減少	・体重増加抑制 ・摂餌量減少 ・肝絶対、比及び補正重量増加	・肝絶対、比及び補正重量増加 ・腎比及び補正重量増加 ・卵巢、子宮絶対、比及び補正重量減少 ・脾絶対及び比重量減少 ・着床数減少
	500 ppm 以上	・甲状腺絶対、比及び補正重量増加 ・小葉中心性/び慢性肝細胞肥大	・体重増加抑制（投与 9～10 週）^a ・小葉中心性/び慢性肝細胞肥大	・小葉中心性/び慢性肝細胞肥大	・体重増加抑制 ・摂餌量減少 ・小葉中心性/び慢性肝細胞肥大
	100 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	3,000 ppm	・体重増加抑制 ・包皮分離遅延	・体重増加抑制 ・肝絶対^{§§}、比及び補正重量増加 ・膈開口遅延	・体重増加抑制 ・肝絶対[§]、比及び補正重量増加	・体重増加抑制
	500 ppm 以上	・肝絶対^{§§}、比及び補正重量増加	500 ppm 以下 毒性所見なし	500 ppm 以下 毒性所見なし	・肝絶対^{§§}、比及び補正重量増加
	100 ppm	毒性所見なし			毒性所見なし

2 §：比重量に有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

3 §§：絶対重量に有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

4 a：3,000 ppm 投与群では投与 2 週以降

6 (2) 発生毒性試験（ラット）①

7 Wistar Hannover ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 4～20 日に強制経口[原体
8 (*syn/anti* 比=92.8:7.2) : 0、20、75 及び 250 mg/kg 体重/日、溶媒: 0.5%CMC
9 水溶液]投与して、発生毒性試験が実施された。

10 各投与群で認められた毒性所見は表 49 に示されている。

11 本試験において、75 mg/kg 体重/日以上之母動物で妊娠子宮重量低下が、胎児
12 では骨化遅延等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児で 20 mg/kg 体重/
13 日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 1、47）

表 49 発生毒性試験(ラット)①で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
250 mg/kg 体重/日	・切迫と殺(2例:妊娠19日及び20日) ・体重減少(妊娠5日～6日)/体重増加抑制(妊娠7日以降) ・摂餌量減少(妊娠4～7日以降)	・低体重 ・骨化遅延(第2、4、6頸椎体、第2尾椎弓、手足骨格、第4頸椎弓) ・着床後胚死亡率増加 ・早期子宮内死亡率増加
75 mg/kg 体重/日以上	・妊娠子宮重量低下	・骨化遅延(第3、5頸椎体及び頸椎歯突起)並びに剣状突起軟骨不完全増加 ・生存胎児数減少
20 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

(3) 発生毒性試験(ラット)②

Wistar Hannover ラット(一群妊娠雌24匹)の妊娠4～20日に強制経口[原体(*syn/anti*比=69.7:30.3):0、20、75及び200 mg/kg 体重/日、溶媒:0.5%CMC水溶液]投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表50に示されている。

本試験において、75 mg/kg 体重/日以上之母動物で体重増加抑制が、胎児では低体重等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児で20 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照1、48)

表 50 発生毒性試験(ラット)②で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
200 mg/kg 体重/日	・腹臥位(妊娠4～18日)、鎮静(妊娠4～20日)、立毛(妊娠13～21日) ・体重減少(妊娠5～7日)	・骨化遅延(第5、6胸骨分節、第1、2頸椎体、基節骨、中足骨) ・剣状突起軟骨分岐例の増加
75 mg/kg 体重/日以上	・体重増加抑制(妊娠7日以降)^a ・摂餌量減少(妊娠4日以降)	・低体重 ・骨化遅延(距骨、第3頸椎体)
20 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

^a: 200 mg/kg 体重/日投与群では妊娠8日以降

(4) 発生毒性試験(ウサギ)①(用量設定試験)

ヒマラヤウサギ(一群雌10匹)の妊娠4～27日に強制経口[原体(*syn/anti*比=92.8:7.2):0、100、200及び400 mg/kg 体重/日、溶媒:0.5%CMC水溶液]投与して、発生毒性試験が実施された。

400 mg/kg 体重/日投与群の胎児5例で心室中隔欠損が、また胎児2例で小眼球が認められ、うち1例では網膜皺壁、重度の後鼻孔狭窄等を伴っていた。

本試験において母動物では検体投与による影響は認められず、胎児で小眼球等が認められたので、無毒性量は母動物で本試験の最高用量である400 mg/kg 体重

1 /日、胎児で 200 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1、49）

3 (5) 発生毒性試験（ウサギ）②

4 ヒマラヤウサギ（一群雌 5 匹）の妊娠 4～27 日に強制経口[原体（*syn/anti* 比
5 =92.8 : 7.2） : 0、600、800 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : 0.5%CMC 水溶
6 液]投与して、発生毒性試験が実施された。

7 各投与群で認められた毒性所見は表 51 に示されている。

8 検体投与群の胎児に小眼球が認められ、病理組織学検査では、小眼球が認めら
9 れた全例に網膜異形成、脈絡膜低形成、後水晶体線維配列異常又は水晶体胞遺残
10 のいずれかが観察された。同様の所見は肉眼的に小眼球が認められなかった胎児
11 にも観察された。対照群では肉眼的に小眼球が認められなかった 1 例の胎児に軽
12 度の片側性網膜異形成が観察されたのみであったことから、検体投与の影響と考
13 えられた。

14 本試験において、母動物では検体投与による影響は認められず、600 mg/kg 体
15 重/日以上投与群の胎児で小眼球が認められたので、無毒性量は母動物で本試験の
16 最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日、胎児では 600 mg/kg 体重/日未満であると
17 考えられた。（参照 1、50）

19 表 51 発生毒性試験（ウサギ）②で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
1,000 mg/kg 体重/日	1,000 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし	・四肢の屈曲又は回転異常を有する腹数の増加、変異胎児数増加（冠状縫合線の異常 [§] 、前頭骨及び頭頂骨の癒合 [§] 、頭頂骨不規則骨化 [§] ）
800 mg/kg 体重/日以上		
600 mg/kg 体重/日以上		・小眼球 ・網膜異形成 ・脈絡膜低形成 ・後水晶体線維の配列異常 ・水晶体胞遺残

20 [§] : 有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

22 (6) 発生毒性試験（ウサギ）③（用量設定試験）

23 NZW ウサギ（一群雌 10 匹）の妊娠 7～28 日に強制経口[原体（*syn/anti* 比＝
24 92.8 : 7.2） : 0、400、700 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : 0.5%CMC 水溶液]
25 投与して、発生毒性試験が実施された。

26 各投与群で認められた毒性所見は表 52 に示されている。

27 400 及び 1,000 mg/kg 体重/日投与群の母動物それぞれ 1 例で摂餌量減少に伴
28 い著しく体重が減少したため、切迫と殺された。また、400 及び 700 mg/kg 体重

1 /日投与群でそれぞれ1例が流産し、これらの動物においても体重減少が認めら
 2 れた。1,000 mg/kg 体重/日投与群の胎児に認められた小眼球は、有意差は認めら
 3 れなかったが、試験施設の背景値を上回る頻度で出現したことから検体投与の影
 4 響と判断した。

5 本試験において、400 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で肝絶対及び比重量
 6 増加等が、1,000 mg/kg 体重/日投与群の胎児で低体重等が認められたので、無毒
 7 性量は母動物で400 mg/kg 体重/日未満、胎児では700 mg/kg 体重/日であると考
 8 えられた。（参照1、51）

10 表52 発生毒性試験（ウサギ）③で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
1,000 mg/kg 体重/日	・切迫と殺（1例：妊娠21日） ・早期胚吸収率増加 ・BUN増加	・着床後胚死亡率増加[§] ・低体重 ・外表奇形（小眼球[§]） ・内臓変異（虹彩周囲出血） ・眼の赤色化又は暗赤色域 ・胆嚢小型化発現頻度増加
700 mg/kg 体重/日以上	・流産（1例：妊娠25日） ・体重減少(妊娠9日以降)/体重増加抑制(妊娠23日以降)^a ・摂餌量減少(妊娠7日以降) ・肝細胞肥大 ・小葉中心性肝細胞空胞化 ・肝細胞グリコーゲン空胞化減少	700 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし
400 mg/kg 体重/日以上	・切迫と殺（1例：妊娠23日） ・流産（1例：妊娠25日） ・GGT上昇 ・肝絶対及び比重量増加[‡]	

11 §：有意差は認められていないが、検体投与の影響と判断した。

12 ‡：比重量の統計処理は実施されていないが、検体投与の影響と判断した。

13 ^a：1,000 mg/kg 体重/日投与群では妊娠21日以降

15 (7) 発生毒性試験（ウサギ）④

16 NZW ウサギ（一群雌25匹）の妊娠7～28日に強制経口[原体（*syn/anti*比＝
 17 92.8：7.2）：0、30、150及び500 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%CMC水溶液]投
 18 与して、発生毒性試験が実施された。

19 各投与群で認められた毒性所見は表53に示されている。

20 500 mg/kg 体重/日投与群の母動物1例が妊娠24日に死亡した。

21 500 mg/kg 体重/日投与群の胎児にみられた小眼球については、1例のみの発現
 22 であるものの、発生毒性試験（ウサギ）③[12.(6)]においても、1,000 mg/kg 体
 23 重/日投与群で発現頻度増加が認められていることから、検体投与との関連性は否
 24 定できないと考えられた。

本試験において、150 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で肝細胞肥大等が、500 mg/kg 体重/日投与群の胎児で小眼球等が認められたので、無毒性量は母動物で 30 mg/kg 体重/日、胎児では 150 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 1、52）

表 53 発生毒性試験（ウサギ）④で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
500 mg/kg 体重/日	・死亡（1例：妊娠 24 日） ・摂餌量減少（妊娠 7 日以降） ・小葉中心性肝細胞空胞化（軽微～中等度） ・肝細胞グリコーゲン空胞化減少	・低体重 ・外表奇形（小眼球）
150 mg/kg 体重/日以上	・肝絶対及び比重量増加[§] ・肝細胞肥大	150 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし
30 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	

[§]：比重量の統計処理は実施されていないが、検体投与の影響と判断した。

発生毒性試験（ウサギ）①～④[12. (4)～(7)]で認められた所見には系統による差はなかったことから、発生毒性試験（ウサギ）における無毒性量は母動物で 30 mg/kg 体重/日、胎児で 150 mg/kg 体重/日であると考えられた。400 mg/kg 体重/日以上投与群の胎児において、小眼球が認められた。なお、発生毒性試験（ウサギ）①で認められた心室中隔欠損の増加は②～④の試験では再現されなかったため、毒性影響とは判断しなかった。

13. 遺伝毒性試験

(1) 遺伝毒性試験（原体）

イソピラザム原体の細菌を用いた復帰突然変異試験、マウスリンフォーマ細胞を用いた遺伝子突然変異試験、ヒトリンパ球細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験、イソピラザムをラットに投与しての *in vivo* *lin vitro* 肝 UDS 試験及びラットの骨髓細胞を用いた小核試験が実施された。

結果は表 54 に示されている。

全て陰性であったことから、イソピラザムに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 1、53～61）

1
2

表 54 遺伝毒性試験概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
in vitro	復帰突然変異試験 ^a <i>Escherichia coli</i> （ WP2/pKM101 及び WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株） <i>Salmonella typhimurium</i> （ TA98、TA100、TA1535 及び TA1537 株）	1 回目：100~5,000 µg/プレート （+/-S9）（プレート法） 2 回目：5~5,000 µg/プレート （-S9）（プレート法）、 100~5,000 µg/プレート（+S9）（プレインキュベーション法）	陰性
	復帰突然変異試験 ^b <i>E. coli</i> （WP2/pKM101 及び WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株） <i>S. typhimurium</i> （ TA98、TA100、TA1535 及び TA1537 株）	1 回目：3~5,000 µg/プレート （+/-S9）（プレート法） 2 回目：10~5,000 µg/プレート （+/-S9）（プレインキュベーション法）	陰性
	復帰突然変異試験 ^c <i>E. coli</i> （WP2/pKM101 及び WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株） <i>S. typhimurium</i> （ TA98、TA100、TA1535 及び TA1537 株）	1 回目：3~5,000 µg/プレート （+/-S9）（プレート法） 2 回目：3~5,000 µg/プレート （+/-S9）（プレインキュベーション法）	陰性
	遺伝子突然変異試験 ^a マウスリンフォーマ （L5178Y $tk^{+/-}$ ）細胞	1 回目：0.63~30 µg / mL （-S9）、2.5~50 µg / mL（+S9） 2 回目：1~20 µg / mL（-S9）、 5.5~30 µg / mL（+S9） 3 回目：2~25 µg / mL（-S9）、 15~40 µg / mL（+S9）	陰性
	遺伝子突然変異試験 ^b マウスリンフォーマ （L5178Y $tk^{+/-}$ ）細胞	1 回目：2.8~44.0 µg / mL （-S9）、5.5~88.0 µg / mL （+S9） 2 回目：0.7~44.0 µg / mL （-S9）、5.5~88.0 µg / mL （+S9）	陰性
	染色体異常試験 ^a ヒト末梢血リンパ球細胞	1 回目：20~40 µg / mL（-S9）、 20~50 µg / mL（+S9） 2 回目：10~20 µg / mL（-S9）、 20~50 µg / mL（+S9） 処理時間：3 時間又は 20 時間	陰性
	染色体異常試験 ^b ヒト末梢血リンパ球細胞	1 回目：16.9~51.7 µg / mL （-S9）、29.6~90.5 µg / mL （+S9） 2 回目：3.0~16.0 µg / mL （-S9）、25.0~75.0 µg / mL （+S9） 処理時間：4 時間又は 22 時間	陰性

<i>in vivo/in vitro</i>	UDS 試験 ^a	Wistar Hannover ラット (一群雄 3 匹) (培養肝細胞)	2,000 mg/kg 体重 (強制単回経口投与、媒体：0.5%CMC 水溶液、肝細胞調製：2、16 時間後)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験 ^a	Wistar Hannover ラット (一群雄 5 匹) (骨髓細胞)	2,000 mg/kg 体重 (強制単回経口投与、媒体：0.5%CMC 水溶液、標本作成：24、48 時間後)	陰性

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

使用された原体の異性体比

^a : *syn* : *anti* = 92.8 : 7.2、^b : *syn* : *anti* = 69.7 : 30.3、^c : *syn* : *anti* = 86.2 : 13.8

(2) 遺伝毒性試験 (代謝物)

主として植物及び土壌由来の代謝物 Y 及び Fs について、細菌を用いた復帰突然変異試験、マウスリンフォーマ細胞を用いた遺伝子突然変異試験及びヒトリンパ球細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験が実施された。結果は表 55 に示されており、いずれの試験においても陰性であった。(参照 1、62~67)

表 55 遺伝毒性試験概要 (代謝物)

被験物質	試験		対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 Y	<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2/pKM101 及び WP2 <i>uvrA</i> / pKM101 株) <i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535 及び TA1537 株)	1 回目 : 3~5,000 µg/プレート (+/-S9) (プレート法) 2 回目 : 33~5,000 µg/プレート (+/-S9) (プレインキュベーション法)	陰性
		遺伝子突然変異試験	マウスリンフォーマ (L5178Y <i>tk</i> ⁺) 細胞	1 回目、2 回目 : 110~1,760 µg / mL (+/-S9)	陰性
		染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球細胞	1 回目 : 575~1,760 µg / mL (-S9) 、 328~1,006 µg / mL (+S9) 2 回目 : 575~1,760 µg / mL (+/-S9) 処理時間 : 4 時間又は 22 時間	陰性
代謝物 Fs	<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (WP2/pKM101 及び WP2 <i>uvrA</i> / pKM101 株) <i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535 及び TA1537 株)	1 回目 : 3~5,000 µg/プレート (+/-S9) (プレート法) 2 回目 : 33~5,000 µg/プレート (+/-S9) (プレインキュベーション法)	陰性

	遺伝子突然変異試験	マウスリンフォーマ (L5178Y <i>tk</i> ^{+/+}) 細胞	1 回目 : 50~800 µg / mL (+/-S9) 2 回目 : 25~400 µg / mL (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球細胞	1 回目 : 171~522 µg / mL (+/-S9) 2 回目 : 31.8~522 µg / mL (-S9) 、171~522 µg / mL (+S9) 処理時間 : 4 時間又は 22 時間	陰性

14. その他の試験

2 年間慢性毒性/発がん性試験併合試験（ラット）[11. (2)]において認められた肝細胞腺腫及び子宮内膜腺癌の発生機序解明の目的で、以下のメカニズム試験が実施された。

(1) 肝細胞腺腫の発生メカニズムに関する検討

① ラットを用いた飼料混入投与による 14 日間作用機序解明試験

Wistar Hannover ラット（一群雌 30 匹）を用いた 14 日間混餌[原体 (*syn/anti* 比=92.8 : 7.2) : 0、500 及び 3,000 ppm : 平均検体摂取量は 0、58、327 mg/kg 体重/日]投与による作用機序解明試験が実施された。

500 及び 3,000 ppm 群で肝絶対重量増加及び比重量増加傾向が認められた。また、総 P450 含量、PROD 活性及び EROD 活性が増加した。3,000 ppm の 3 日間投与群で肝細胞有糸分裂像の増加、7 日間及び 14 日間投与群で小葉中心性肝細胞肥大が認められた。また、肝細胞の BrdU 標識細胞数（S 期標識指数）は、3,000 ppm の 3 日間投与群で有意に増加し、有糸分裂像の増加を裏付けた。（参照 1、68）

② ラット培養肝細胞を用いた細胞増殖及び薬物代謝酵素誘導の検討

Wistar Hannover ラット雌より得られた単離肝細胞を用いて作成した初代肝細胞単層プレートに、イソピラザム (*syn/anti* 比=92.8 : 7.2) を 1、3、10、30、65 及び 100 µM 濃度で 96 時間処理し、P450 活性及び細胞増殖の誘導能が検討された。陽性対照として PB が用いられた。

イソピラザム処理により、肝細胞 BrdU 標識細胞数の増加並びに PROD 及び BROD 活性の上昇が認められたことから、イソピラザムは PB と同様にラット肝細胞中の P450 (CYP2B) を誘導し、細胞増殖活性を有すると考えられた。（参照 1、69）

③ ヒト培養肝細胞を用いた細胞増殖及び薬物代謝酵素誘導に関する検討

ヒト（57歳女性）から得られた凍結肝細胞を用いて作成した初代肝細胞単層プレートに、イソピラザム（*syn/anti* 比=92.8 : 7.2）を1、3、10、30、65及び100 µM濃度で96時間処理し、P450活性及び細胞増殖の誘導能が検討された。陽性対照としてPBが用いられた。

イソピラザム処理は、細胞増殖及びPROD活性に影響を及ぼさず、BROD活性を上昇させたことから、イソピラザムは、PBと同様にヒト肝細胞中のP450（CYP2B又はCYP3A）を誘導するが、細胞増殖活性は有さないと考えられた。（参照1、70）

（2）子宮内膜腺癌の発生メカニズムに関する検討

① 卵巣摘出雌ラットを用いた子宮肥大試験

検体の子宮におけるエストロゲン様活性を調べるために、卵巣摘出ラットにおける子宮肥大の有無を検討した。

Wistar Hannover ラット[一群雌6匹（卵巣摘出成熟動物）]にイソピラザム（*syn/anti* 比=92.8 : 7.2）を3日間強制経口（原体：0、300 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%CMC-Na）投与し、試験が実施された。陽性対照として17α-エチニルエストラジオールが用いられた。

イソピラザム投与により、摂餌量の低下及び体重の低下傾向が認められたが、子宮絶対及び比重量には影響を及ぼさなかったため、イソピラザムはエストロゲン様活性を有さないと考えられた。（参照1、71）

② ヒト培養肝細胞を用いたエストロゲンα受容体結合活性試験（*in vitro*）

ヒト（hERα-HeLa-9903⁶）細胞培養プレートにイソピラザム（*syn/anti* 比=92.8 : 7.2）を10⁻⁵M~10⁻¹²Mの8濃度（DMSO溶液）で処理し、24時間培養し、イソピラザムの*in vitro*におけるヒト由来エストロゲン受容体α（ERα）への結合能の有無が検討された。陽性対照として17β-エチニルエストラジオールが用いられた。

イソピラザムはいずれの用量においてもERαへの結合能を示さず、*in vitro*においてエストロゲン受容体への結合能を有しないものと考えられた。（参照1、72）

（メカニズム試験のまとめ）

イソピラザム投与によるCYP2Bの誘導は、PBによるCYPの誘導パターンと一致しており、PBと同様のメカニズムでラットに肝細胞腺腫を発生させたと考えら

⁶ ヒトHeLa-細胞にヒトエストロゲンα受容体及びルシフェラーゼアッセイ用コンストラクト（ミバエ由来ルシフェラーゼ及びマウスメタロチオネイン由来のビテロジェニン-エストロゲン応答配列プロモーター）を組み込んだ細胞。

れた。イソピラザムはエストロゲン様活性を有さないと考えられた。

（３）28 日間亜急性毒性試験（ラット）

構造異性体間の毒性発現を比較するため、Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 5 匹、対照群 3 匹）を用いた混餌[（検体①：原体（*syn/anti* 比＝50.4 : 49.6）、検体②：原体（*syn/anti* 比＝100 : 0）及び検体③：原体（*syn/anti* 比＝0 : 100）：それぞれ 0、500、2,000 及び 5,000 ppm：平均検体摂取量は表 56 参照]投与による 28 日間亜急性毒性試験（構造異性体間比較試験）が実施された。

表 56 28 日間亜急性毒性試験（ラット、構造異性体間比較試験）の平均検体摂取量

検体	投与群（ppm）		500	2,000	5,000
①	平均検体摂取量 （mg/kg 体重/日）	雄	44.7	181	456
		雌	44.6	198	372
②		雄	47.0	179	449
		雌	46.8	182	459
③		雄	43.8	170	407
		雌	44.4	183	372

各投与群で認められた毒性所見は表 57～59 に示されている。

いずれの検体においても肝薬物代謝酵素（CYP、EROD 及び PROD）活性の増加が認められた。いずれの検体においても検体投与の影響は肝臓（小葉中心性肝細胞肥大等）に認められ、構造異性体間で毒性に差は認められなかった。（参照 1、73）

表 57 28 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

—検体①—

投与群	雄	雌
5,000 ppm		・円背位(投与 4～8 日)、立毛(投与 4～26 日) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・RBC 増加 ・Alb 及び TP 減少
2,000 ppm 以上	・体重増加抑制(投与 3 日以降)^a ・肝比及び補正重量増加	・体重増加抑制(投与 2 日以降) ・Chol 増加 ・肝比及び補正重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大
500 ppm	・小葉中心性肝細胞肥大	毒性所見なし

^a : 5,000 ppm 投与群では投与 2 日以降

1 表 58 28 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

2 —検体②—

投与群	雄	雌
5,000 ppm	・体重増加抑制(投与 2 日以降) ・WBC、PLT 及び Lym 減少 ・ALP 減少	・体重増加抑制(投与 2 日以降) ・Chol 及びカルシウム増加
2,000 ppm 以上	・肝絶対、比及び補正重量増加	・小葉中心性肝細胞肥大 ・肝絶対、比及び補正重量増加
500 ppm	・小葉中心性肝細胞肥大	毒性所見なし

3

4 表 59 28 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

5 —検体③—

投与群	雄	雌
5,000 ppm	・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・RBC 増加	・円背位(投与 6～8 日) ・Hb 及び Ht 増加 ・PT 延長 ・GGT 及び ALT 増加 ・カリウム及びリン増加
2,000 ppm 以上	・体重増加抑制(投与 2 日以降) ・TG 減少及び GGT 増加	・立毛(投与 10～26 日) ・体重増加抑制(投与 2 日以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・Alb 及び TP 減少 ・Chol 増加 ・小葉中心性肝細胞肥大
500 ppm	・小葉中心性肝細胞肥大	・APTT 短縮 ・肝絶対、比及び補正重量増加

6

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬「イソピラザム」の食品健康影響評価を実施した。なお、今回、国内作物残留試験（はくさい、キャベツ等）、一般薬理試験の成績等が新たに提出された。

^{14}C で標識したイソピラザムのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与されたイソピラザムの体内吸収率は低用量で 63.7～72.9%、高用量で 63.1～71.4%と算出された。 $T_{\max}$ は投与量にかかわらず 3～6 時間であり、その後血中濃度は速やかに減少した。投与放射能は投与後 48 時間以内に 90%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、組織への蓄積傾向はみられなかった。主に糞中に排泄された。主要代謝物はイソプロピル側鎖、及び/又はビシクロ環の水酸化体であり、胆汁中では生成した水酸基のグルクロン酸抱合体、尿糞中においては、雌で硫酸抱合体、雄ではカルボン酸誘導体が多く認められた。

ヤギ及びニワトリを用いた動物体内運命試験の結果、ヤギでは代謝物 G 及び J が、ニワトリでは代謝物 J が 10%TRR を超えて検出された。

植物体内運命試験の結果、残留放射能の大部分は未変化のイソピラザムで、10%TRR を超えて認められた代謝物は Fs（抱合体を含む）であった。後作物において 10%TRR を超えて認められた代謝物は Fs 及び Y（いずれも抱合体を含む）であった。

イソピラザム、代謝物 Fs 及び Fa を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。国内における試験では、イソピラザムの最大残留値は、可食部では結球レタス（茎葉）の 5.51 mg/kg であった。代謝物 Fs の最大残留値は、結球レタス（茎葉）における 0.038 mg/kg であった。代謝物 Fa については全て定量限界未満であった。海外における試験では、イソピラザムの最大残留値は、大麦（玄麦）で認められた 0.504 mg/kg であった。代謝物 Fs の最大残留値は、小麦（玄麦）で認められた 0.056 mg/kg であり、代謝物 Fa については全て定量限界未満であった。

イソピラザム、代謝物 Fs 及び Y を分析対象化合物とした後作物残留試験が海外で実施された。可食部における最大残留値は、イソピラザムはにんじん（根部）の 0.01 mg/kg、代謝物 Fs は大麦（玄麦）で認められた 0.031 mg/kg、代謝物 Y はほうれんそうで認められた 0.06 mg/kg であった。

乳牛を用いて、イソピラザム及び代謝物 J を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。イソピラザム及び代謝物 J の合計値は最大で 2.0 $\mu\text{g/g}$ （肝臓）であった。

各種毒性試験結果から、イソピラザム投与による影響は、主に体重（増加抑制）及び肝臓（肝細胞肥大、重量増加、好酸性変異肝細胞巣等）に認められた。神経毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

ラットの雌で肝細胞腺腫及び子宮内膜腺癌の発生頻度が増加したが、遺伝毒性試験では全て陰性の結果が得られており、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。

2 世代繁殖試験において、親動物に体重増加抑制のみられた用量で着床数の低下が認められた。

発生毒性試験（ラット）において、母動物に毒性の認められる用量で骨化遅延及び骨格変異が認められたが、奇形は認められなかった。一方、発生毒性試験（ウサギ）においては 400 mg/kg 体重/日以上の高用量で小眼球が認められた。

植物体内運命試験において代謝物 Fs 及び Y が、畜産動物を用いた動物体内運命試験において代謝物 G 及び J がそれぞれ 10%TRR を超えて認められた。これらはラットにおいて認められていないが、代謝物 Fs の急性毒性は弱く（LD₅₀ : 2,000 mg/kg 体重超）、28 日間亜急性毒性試験において認められた所見の内容及び用量はイソピラザムと同様であり、遺伝毒性試験の結果は陰性であった。代謝物 Y の急性毒性は弱く（LD₅₀ : 2,000 mg/kg 体重超）、28 日間亜急性毒性試験において検体投与による影響は認められず、遺伝毒性試験の結果は陰性であった。また、代謝物 J と同様にジヒドロキシ体である代謝物 I がラットにおいて認められていること、代謝物 G は代謝物 I などのジ又はトリヒドロキシ体の生成過程において生成されることが考えられることから、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をイソピラザム（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 60 に、単回経口投与等により惹起されると考えられる毒性影響等は表 61 にそれぞれ示されている。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値がラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 5.5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.055 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

また、イソピラザムの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の 30 mg/kg 体重であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.3 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

なお、ADI 及び ARfD の設定根拠とされた用量と小眼球の認められた用量との間には十分なマージンが存在することから、追加の安全係数は不要と考えられた。

ADI	0.055 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	5.5 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

1	ARfD	0.3 mg/kg 体重
2	(ARfD 設定根拠資料)	急性神経毒性試験
3	(動物種)	ラット
	(期間)	単回
	(投与方法)	強制経口
	(無毒性量)	30 mg/kg 体重
	(安全係数)	100
4	参考	
	<JMPR> (2011 年)	
	ADI	0.06 mg/kg 体重/日
	(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
	(動物種)	ラット
	(期間)	2 年間
	(投与方法)	混餌
	(無毒性量)	5.5 mg/kg 体重/日
	(安全係数)	100
5	ARfD	0.3 mg/kg 体重
6	(ARfD 設定根拠資料)	急性神経毒性試験
	(動物種)	ラット
	(期間)	単回
	(投与方法)	強制経口
	(無毒性量)	30 mg/kg 体重/日
	(安全係数)	100
7	<米国> (2011 年)	
	cRfD	0.055 mg/kg 体重/日
	(cRfD 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
	(動物種)	ラット
	(期間)	2 年間
	(投与方法)	混餌
	(無毒性量)	5.5 mg/kg 体重/日
	(不確実係数)	100
	aRfD	0.3 mg/kg 体重/日
	(aRfD 設定根拠資料)	亜急性毒性試験
	(動物種)	イヌ

1		(期間)	90 日間
2		(投与方法)	強制経口
		(無毒性量)	30 mg/kg 体重/日
		(不確実係数)	100
	<EU> (2012 年)		
	ADI		0.03 mg/kg 体重/日
	(ADI 設定根拠資料)		慢性毒性/発がん性併合試験
	(動物種)		ラット
	(期間)		2 年間
	(投与方法)		混餌
	(無毒性量)		5.5 mg/kg 体重/日
	(安全係数)		200
			(LOAEL のため)
3	ARfD		0.2 mg/kg 体重/日
	(ARfD 設定根拠資料)		発生毒性試験
	(動物種)		ラット
	(期間)		17 日間
	(投与方法)		強制経口
	(無毒性量)		20 mg/kg 体重/日
	(安全係数)		100
4			
5			(参考 74、75、77)
6			

1

表60 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考
ラット	90日間 亜急性 毒性試験 ①	0、300、1,500、 6,000 ppm	雄：21.3 雌：23.8	雄：106 雌：118	雌雄：小葉中心 性肝細胞肥大 等
		雄：0、21.3、106、 463 雌：0、23.8、118、 484			
	90日間 亜急性毒 性試験② (構造異 性体間比 較試験)	(<i>syn/anti</i> 比＝ 92.8：7.2) 0、 100、250、2,000	雄：20.3 雌：24.1	雄：159 雌：193	雌雄：小葉中心 性肝細胞肥大 等
		雄：0、8.30、20.3、 159 雌：0、9.87、24.1、 193			
		(<i>syn/anti</i> 比＝ 69.7：30.3) 0、 100、250、2,000	雄：20.8 雌：24.2	雄：163 雌：197	
		雄：0、8.24、20.8、 163 雌：0、9.49、24.2、 197			
	90日間 亜急性神 経毒性試 験	0、300、1,500、 6,000 ppm	雄：382 雌：114	雄：— 雌：468	雄：毒性所見な し 雌：体重増加抑 制等 (神経毒性は認 められない)
		雄：0、20.3、98.0、 382 雌：0、24.9、114、 468			
	2年間慢 性毒性/ 発がん性 併合試験	0、100、500、 3,000 ppm	雄：5.5 雌：6.9	雄：27.6 雌：34.9	雌雄：好酸性変 異肝細胞巢等 (雌の肝細胞腺 腫及び子宮内 膜腺癌の発生 頻度増加)
		雄：0、5.5、27.6、 174 雌：0、6.9、34.9、 233			
	2世代 繁殖試験	0、100、500、 3,000 ppm	親動物及び児動 物 P雄：8.3 P雌：9.3 F ₁ 雄：9.5 F ₁ 雌：10.2	親動物及び児動 物 P雄：41.2 P雌：46.6 F ₁ 雄：47.8 F ₁ 雌：50.1	親動物 雌雄：小葉中心 性/び慢性肝細 胞肥大等 児動物：肝絶 対、比及び補正 重量増加 (着床数の低 下)
		P雄：0、8.3、 41.2、250 P雌：0、9.3、 46.6、277 F ₁ 雄：0、9.5、 47.8、289 F ₁ 雌：0、10.2、	繁殖能 P雄：41.2 P雌：46.6	繁殖能 P雄：250 P雌：277	

		50.1、301	F ₁ 雄：47.8 F ₁ 雌：50.1	F ₁ 雄：289 F ₁ 雌：301	
	発生毒性試験①	0、20、75、250	母動物：20 胎児：20	母動物：75 胎児：75	母動物：妊娠子宮重量低下 胎児：骨化遅延等 (催奇形性は認められない)
	発生毒性試験②	0、20、75、200	母動物：20 胎児：20	母動物：75 胎児：75	母動物：体重増加抑制等 胎児：低体重等 (催奇形性は認められない)
マウス	18か月間発がん性試験	0、70、500、3,500 ppm 雄：0、7.8、56.2、433 雌：0、9.9、74.9、554	雄：56.2 雌：9.9	雄：433 雌：74.9	雄：体重増加抑制等 雌：小葉周辺性肝細胞肥大等 (発がん性は認められない)
ウサギ	発生毒性試験①	0、100、200、400	母動物：400 胎児：200	母動物：— 胎児：400	母動物：毒性所見なし 胎児：小眼球等
	発生毒性試験②	0、600、800、1,000	母動物：1,000 胎児：—	母動物：— 胎児：600	母動物：毒性所見なし 胎児：小眼球等
	発生毒性試験③	0、400、700、1,000	母動物：— 胎児：700	母動物：400 胎児：1,000	母動物：肝絶対及び比重量増加等 胎児：小眼球等
	発生毒性試験④	0、30、150、500	母動物：30 胎児：150	母動物：150 胎児：500	母動物：肝絶対及び比重量増加等 胎児：小眼球等
	発生毒性試験①～④の総合評価		母動物：30 胎児：150		
イヌ	90日間亜急性毒性試験①	0、30、100、300	雄：30 雌：30	雄：100 雌：100	雌雄：ALP増加等
	90日間亜急性毒性試験②	0、10、30、250	雄：30 雌：30	雄：250 雌：250	雌雄：体重増加抑制等

	1年間 慢性毒性 試験	0、25、100、250	雄：25 雌：25	雄：100 雌：100	雌雄：ALP 増 加等
ADI			NOAEL: 5.5 SF: 100 ADI: 0.055		
ADI 設定根拠資料			ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験		

ADI：一日摂取許容量、SF：安全係数、NOAEL：無毒性量

－：無毒性量又は最小毒性量は設定できなかった。

備考には最小毒性量で認められた毒性所見の概要を示した。

1 表61 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に関連する エンドポイント ¹⁾ (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)
ラット	一般薬理試験 (一般状態)	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 雄: 0、30、250、2,000	雄: 2,000 雄: 毒性所見なし
	急性毒性試験	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 雌: 175、275、2,000	雌: - 雌: 立毛
		<i>syn/anti</i> 比=69.7:30.3 雌: 175、550、2,000	雌: - 雌: 立毛
		<i>syn/anti</i> 比=100:0 雌: 2,000	雌: - 雌: 立毛、円背位、鎮静、運動失調
		<i>syn/anti</i> 比=0:100 雌: 175、550、2,000	雌: - 雌: 立毛、円背位、鎮静、運動失調
		<i>syn/anti</i> 比=50:50 雌: 175、550、2,000	雌: - 雌: 立毛、円背位、腹臥位、鎮静、運動失調
	急性神経毒性 試験	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 雌雄: 0、30、250、2,000 (強制経口)	雌雄: 30 雄: 活動低下及び立ち上がり回数減少 雌: 活動低下、衰弱、立ち上がり回数減少、 横臥位、よろめき歩行、体重増加抑制及び自 発運動量(移動距離、中央部からの移動時間、 立ち上がり回数)減少
	発生毒性試験 ①	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 母動物: 0、20、75、250 (強制経口)	母動物: 75 母動物: 体重及び摂餌量減少
	発生毒性試験 ②	<i>syn/anti</i> 比=69.7:30.3 母動物: 0、20、75、200 (強制経口)	母動物: 75 母動物: 体重及び摂餌量減少、腹臥位、鎮静
ウサギ	発生毒性試験 ①	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 母動物: 0、100、200、 400 (強制経口)	胎児: 200 胎児: 小眼球等
	発生毒性試験 ②	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 母動物: 0、600、800、 1,000 (強制経口)	胎児: - 胎児: 小眼球
	発生毒性試験 ③	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 母動物: 0、400、700、 1,000 (強制経口)	胎児: 700 胎児: 小眼球

	発生毒性試験 ④	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 母動物：0、30、150、500 (強制経口)	胎児：150 胎児：小眼球
イヌ	90日間亜急性 毒性試験①	<i>syn/anti</i> 比=92.8:7.2 雌雄：0、30、100、300 (カプセル経口)	雄：100 雄：活動性の低下、異常行動（左右首振り／ 身震い）、ふらつき、異常発声、運動失調、 起立不能、緩慢なよろめき前進／後退、振戦、 前肢反射の消失、攻撃性、興奮性
	90日間亜急性 毒性試験②	<i>syn/anti</i> 比=69.7:30.3 雌雄：0、10、30、250 (カプセル経口)	雌雄：30 雄：流涎、活動性の低下 雌：流涎
	90日間亜急性毒性試験①及び②の総合評価		雌雄：100
ARfD			NOAEL: 30 SF: 100 ARfD: 0.3
ARfD 設定根拠資料			ラット急性神経毒性試験

ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量

①：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙1:代謝物/分解物略称>

記号	略号	化学名
As	SYN534969 [AS]	3-(ジフルオロメチル)-1-メチル- <i>N</i> -[(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-イソプロピル-1,4-メタノナフタレン-5-イル]ピラゾール-4-カルボキサミド (<i>syn</i> -異性体)
Aa	SYN534968 [AA]	3-(ジフルオロメチル)-1-メチル- <i>N</i> -[(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-イソプロピル-1,4-メタノナフタレン-5-イル]ピラゾール-4-カルボキサミド (<i>anti</i> -異性体)
B	[Ah] Hydroxylated SYN520453	イソピラザムのヒドロキシ体
B-glu	[Ah-glu]	Bのグルクロン酸抱合体
B-sul	[Ah-Sul] Hydroxylated Sulphate Conjugate of SYN520453	Bの硫酸抱合体
C	[Ah1] Hydroxylated SYN520453	イソピラザムのヒドロキシ体 (イソプロピル部位のヒドロキシ化)
D	[Ah1a] CSCD563691	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [9-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
Ds	[Ah1aS-1] CSCD610195	3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [9-((<i>R</i>)-2-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)- (1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>syn</i> -異性体)
Da	[Ah1aA-2] CSCD573363	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [9-((<i>S</i>)-2-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)- (1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>anti</i> 異性体)
Es	[Ah1bS] CSCD120604	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 ((<i>S</i>)-9-ヒドロキシ-9-イソプロピル-(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル)-アミド (<i>syn</i> -異性体)
Fs	[Ah1cS] CSCD459488 SYN545364	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [9-(1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)--(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>syn</i> -異性体)
Fa	[Ah1cA] CSCD459489 SYN545449	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [9-(1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)--(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>anti</i> 異性体)

G	[Ah2] CSCD563692	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 (2-ヒドロキシ-9-イソプロピル-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタ ノ-ナフタレン-5-イル)-アミド (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
H	[Ad] Dihydroxylated SYN520453	イソピラザムのジヒドロキシ体
I	[Ad1] Dihydroxylated SYN520453	イソピラザムのジヒドロキシ体
I-glu	[Ad-glu] Glucuronic Acid Conjugate of Dihydroxylated SYN520453	I のグルクロン酸抱合体
I-sul	[Ad-sul] Dihydroxylated Sulphate Conjugate of SYN520453	I の硫酸抱合体
J	[Ad1a] CSCD656800	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 [2-ヒドロキシ-9-(1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)-1,2,3,4-テ トラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-アミド (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
K	[At] Trihydroxylated SYN520453	イソピラザムのトリヒドロキシ体
L	[B]	3-ジフルオロメチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 (9-イソプ ロピル-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル)- アミド (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
Ls	[BS] CSCD539372	3-ジフルオロメチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 (9-イソプ ロピル-(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナ フタレン-5-イル)-アミド (<i>syn</i> 異性体)
La	[BA] CSCD539391	3-ジフルオロメチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボン酸 (9-イソプ ロピル-(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナ フタレン-5-イル)-アミド (<i>anti</i> 異性体)
M	[Bh] Hydroxylated CSCD539372	L のヒドロキシ体
M-glu	[Bh-glu] Glucuronic Acid Conjugate of Hydroxylated CSCD539372	M のグルクロン酸抱合体
M-sul	[Bh-sul] Sulphate	M の硫酸抱合体

	Conjugate of Hydroxylated CSCD539372	
P	[Bd] Dihydroxylated CSCD539372	Lのジヒドロキシ体
P-glu	[Bd-gul] Glucuronic Acid Conjugate of Dihydroxylated CSCD539372	Pのグルクロン酸抱合体
P-sul	[Bd-sul] Sulphate Conjugate of Dihydroxylated CSCD539372	Pの硫酸抱合体
Q	[Bt] Trihydroxylated CSCD539372	Lのトリヒドロキシ体
R	[C1] CSCC230729	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸 (9-イソプロピリデン-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル)-アミド
S	[D] CSCD662024	2-{5-[(3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボニル)-アミノ]-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-9-イル}-プロピオン酸 (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
S-glu	[D-glu] CSCD676513	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-(2-{5-[(3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボニル)-アミノ]-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-9-イル}-プロピオニルオキシ)-3,4,5-トリヒドロキシ-テトラヒドロ-ピラン-2-カルボン酸 (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
T	[Dh] Hydroxylated CSCD662024	Sのヒドロキシ体
U	[E] CSCD676318	2-{5-[(3-ジフルオロメチル-1 <i>H</i> -ピラゾール-4-カルボニル)-アミノ]-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,4-メタノ-ナフタレン-9-イル}-プロピオン酸 (<i>syn</i> 及び <i>anti</i> 異性体)
V	[Eh] Hydroxylated CSCD676318	Uのヒドロキシ体
W	[F] CSAA798670	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸
X	[G] CSCC210616	3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-アミド
Y	[H] CSCD465008 SYN545720	3-ジフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸

＜別紙 2：検査値等略称＞

略称	名称
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量 (active ingredient)
Alb	アルブミン
ALP	アルカリフォスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
ATP	アデノシン三リン酸
AUC	薬物濃度曲線下面積
Baso	好塩基球数
BBCH	B iologische B undesanstalt B undessortenamt and C hemical industry 植物成長の段階を表す
BrdU	5-ブロモ-2'-デオキシウリジン
BROD	ベンジルオキシレゾルフィン <i>O</i> -ベンジラーゼ
BUN	血液尿素窒素
Ca	カルシウム
Chol	コレステロール
CK	クレアチンキナーゼ
Cl	クロール
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
Cre	クレアチニン
CYP	シトクロム P450 アイソザイム
DMSO	ディメチルスルフォキシド
EROD	エトキシレゾルフィン <i>O</i> -デエチラーゼ
GDH	グルタミン酸脱水素酵素
GGT	γ-グルタミルトランスフェラーゼ [=γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ (γ-GTP)]
Glob	グロブリン
Glu	グルコース (血糖)
Hb	ヘモグロビン (血色素量)
Ht	ヘマトクリット値 [=血中血球容積 (PCV)]
K	カリウム
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
Lym	リンパ球数

Mon	単球数
Na	ナトリウム
Neu	好中球数
P	リン
P450	シトクロム P450
PB	フェノバルビタール（ナトリウム）
PHI	最終使用から収穫までの日数
PLT	血小板数
PROD	ペントキシレゾルフィン <i>O</i> -デペンチラーゼ
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与（処理）放射能
T.Bil	総ビリルビン
TG	トリグリセリド
T _{max}	最高濃度到達時間
TP	総蛋白質
TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成
Ure	尿素
WBC	白血球数

<別紙 3：作物残留試験成績（国内）>

作物名 (栽培形態) 【分析部位】 実施年度	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	分析結果 (mg/kg)								
					イソピラザム (<i>syn</i> 体)		イソピラザム (<i>anti</i> 体)		含量値	代謝物 Fs		代謝物 Fa	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値
はくさい (露地) 【茎葉】 平成 23 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	7	1.49	1.46	0.419	0.412	1.87	0.032	0.032	<0.005	<0.005
			3	14	0.236	0.231	0.094	0.092	0.32	0.011	0.011	<0.005	<0.005
			3	21	0.019	0.019	0.007	0.007	0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	359 ^{SC} 散布	3	7	0.229	0.227	0.067	0.066	0.29	0.027	0.026	<0.005	<0.005
			3	14	0.029	0.029	0.011	0.011	0.04	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	21	0.009	0.009	<0.005	<0.005	0.01	0.005	0.005	<0.005	<0.005
キャベツ (露地) 【葉球】 平成 23 年度	1	374 ^{SC} 散布	3	7	0.506	0.505	0.148	0.145	0.65	0.005	0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.117	0.116	0.035	0.035	0.15	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	468 ^{SC} 散布	3	7	1.19	1.19	0.211	0.211	1.40	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.373	0.370	0.083	0.082	0.45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	21	0.316	0.314	0.064	0.064	0.38	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
結球レタス (施設) 【茎葉】 平成 23 年度	1	281 ^{SC} 散布	3	1	2.00	1.98	0.327	0.320	2.30	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	3	1.75	1.72	0.291	0.290	2.01	0.011	0.010	<0.005	<0.005
			3	7	0.803	0.788	0.179	0.172	0.96	0.013	0.012	<0.005	<0.005
			3	14	0.562	0.551	0.119	0.117	0.67	0.014	0.014	<0.005	<0.005

	1	561 ^{SC} 散布	3	1	4.77	4.76	0.811	0.754	5.51	0.024	0.024	<0.005	<0.005
			3	3	3.02	2.95	0.454	0.443	3.39	0.024	0.024	<0.005	<0.005
			3	7	1.93	1.90	0.291	0.288	2.19	0.038	0.037	<0.005	<0.005
			3	14	0.532	0.532	0.089	0.088	0.62	0.018	0.018	<0.005	<0.005
ミニトマト （施設） 【果実】 平成 23 年度	1	374 ^{SC} 散布	3	1	0.592	0.590	0.100	0.099	0.69	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.561	0.560	0.094	0.093	0.65	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.536	0.531	0.090	0.090	0.62	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.368	0.370	0.063	0.063	0.43	0.006	0.006	<0.005	<0.005
	1	555 ^{SC} 散布	3	1	1.19	1.19	0.202	0.201	1.39	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	1.04	1.04	0.178	0.178	1.22	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	1.17	1.16	0.204	0.202	1.36	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.996	0.984	0.144	0.143	1.13	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
なす （施設） 【果実】 平成 23 年度	1	555 ^{SC} 散布	3	1	0.280	0.268	0.050	0.049	0.32	0.012	0.012	<0.005	<0.005
			3	3	0.215	0.214	0.045	0.044	0.26	0.012	0.012	<0.005	<0.005
			3	7	0.083	0.082	0.017	0.017	0.10	0.007	0.006	<0.005	<0.005
			3	14	0.013	0.012	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	524 ^{SC} 散布	3	1	0.509	0.496	0.085	0.084	0.58	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.323	0.318	0.058	0.056	0.37	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.141	0.139	0.026	0.026	0.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.011	0.011	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
きゅうり	1	546 ^{SC}	3	1	0.363	0.352	0.065	0.064	0.42	0.014	0.014	<0.005	<0.005

(施設) 【果実】 平成 23 年度		散布	3	3	0.161	0.160	0.032	0.031	0.19	0.013	0.013	<0.005	<0.005
			3	7	0.024	0.024	0.006	0.006	0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	374 ^{SC} 散布	3	1	0.074	0.072	0.013	0.013	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.033	0.032	0.006	0.006	0.04	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
メロン (施設) 【果肉】 平成 23 年度	1	522 ^{SC} 散布	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	466 ^{SC} 散布	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
メロン (施設) 【果皮】 平成 23 年度	1	522 ^{SC} 散布	3	1	9.29	9.17	1.51	1.50	10.7	0.028	0.028	<0.005	<0.005
			3	3	8.52	8.48	1.39	1.36	9.84	0.029	0.028	<0.005	<0.005
			3	7	9.47	9.44	1.56	1.54	11.0	0.040	0.040	<0.005	<0.005
	1	466 ^{SC} 散布	3	1	4.33	4.28	0.770	0.750	5.03	0.009	0.008	<0.005	<0.005
			3	3	3.47	3.44	0.592	0.588	4.03	0.007	0.007	<0.005	<0.005
			3	7	1.92	1.90	0.325	0.324	2.22	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
りんご (露地・無袋) 【果実(しんを除く)】 平成 24 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.658	0.658	0.121	0.118	0.78	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.654	0.654	0.121	0.120	0.77	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.885	0.881	0.160	0.158	1.04	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.600	0.596	0.127	0.127	0.72	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.860	0.858	0.183	0.182	1.04	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

	1		3	1	1.99	1.98	0.348	0.344	2.32	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	1.57	1.54	0.278	0.277	1.82	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	1.24	1.24	0.216	0.212	1.45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.495	0.489	0.098	0.096	0.59	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.905	0.904	0.188	0.188	1.09	0.008	0.008	<0.005	<0.005
りんご (露地・無袋) 【しん(花落ち、 しん果梗部)】 平成 24 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.845	0.838	0.159	0.158	1.00	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	1.08	1.06	0.201	0.198	1.26	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.771	0.762	0.140	0.138	0.90	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	1.08	1.06	0.232	0.231	1.29	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.979	0.968	0.209	0.204	1.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1		3	1	2.30	2.30	0.388	0.387	2.69	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	1.82	1.80	0.307	0.307	2.11	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	1.99	1.98	0.334	0.331	2.31	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.492	0.489	0.091	0.090	0.58	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	1.10	1.10	0.212	0.211	1.31	0.007	0.007	<0.005	<0.005
日本なし (露地・無袋) 【果実(しんを除く)】 平成 24 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.629	0.624	0.109	0.106	0.73	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.645	0.630	0.115	0.113	0.74	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.551	0.528	0.103	0.102	0.63	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.448	0.438	0.079	0.078	0.52	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.314	0.312	0.055	0.054	0.37	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	539 ^{SC} 散布	3	1	0.949	0.926	0.145	0.138	1.06	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.620	0.600	0.101	0.100	0.70	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

			3	7	0.801	0.767	0.121	0.120	0.89	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.680	0.660	0.104	0.101	0.76	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.367	0.366	0.059	0.058	0.42	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
日本なし (露地・無袋) 【しん(花落ち、 しん果梗部)】 平成 24 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.421	0.420	0.068	0.068	0.49	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.394	0.390	0.064	0.064	0.45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.312	0.312	0.050	0.050	0.36	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.311	0.306	0.056	0.054	0.36	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.149	0.147	0.024	0.024	0.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	539 ^{SC} 散布	3	1	0.817	0.810	0.134	0.132	0.94	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.765	0.756	0.123	0.123	0.88	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.857	0.836	0.134	0.132	0.97	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.602	0.596	0.095	0.092	0.69	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.322	0.320	0.061	0.060	0.38	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
もも (露地・無袋) 【果肉】 平成 24 年度	1	436 ^{SC} 散布	3	1	0.020	0.020	<0.005	<0.005	0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.010	0.010	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.009	0.009	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.006	0.006	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.012	0.012	<0.005	<0.005	0.02	0.009	0.009	<0.005	<0.005
	1	390 ^{SC} 散布	3	1	0.009	0.008	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.010	0.010	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

			3	28	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	0.005	0.005	<0.005	<0.005
もも (露地・無袋) 【果皮】 平成 24 年度	1	436 ^{SC} 散布	3	1	12.4	12.2	1.85	1.84	14.0	0.022	0.022	<0.005	<0.005
			3	3	4.24	4.24	0.645	0.642	4.88	0.009	0.009	<0.005	<0.005
			3	7	2.77	2.76	0.390	0.380	3.14	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	14	1.02	0.980	0.163	0.157	1.14	0.005	0.005	<0.005	<0.005
			3	28	3.44	3.42	0.578	0.577	4.00	0.030	0.030	<0.005	<0.005
	1	390 ^{SC} 散布	3	1	3.76	3.75	0.719	0.718	4.47	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	3	3.15	3.10	0.604	0.604	3.70	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	7	2.15	2.14	0.408	0.396	2.54	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	14	2.71	2.70	0.553	0.552	3.25	0.019	0.018	<0.005	<0.005
			3	28	0.945	0.942	0.206	0.206	1.15	0.025	0.024	<0.005	<0.005
すもも (露地) 【果実】 平成 24 年度	1	467 ^{SC} 散布	3	1	0.428	0.426	0.085	0.084	0.51	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.304	0.300	0.060	0.060	0.36	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.308	0.297	0.064	0.064	0.36	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.142	0.140	0.033	0.032	0.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.257	0.250	0.055	0.052	0.30	0.008	0.008	<0.005	<0.005
	1	440 ^{SC} 散布	3	1	0.764	0.763	0.138	0.137	0.90	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.714	0.713	0.136	0.132	0.85	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.388	0.378	0.068	0.068	0.45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.506	0.496	0.092	0.090	0.59	0.006	0.006	<0.005	<0.005
			3	28	0.451	0.444	0.081	0.080	0.52	0.008	0.008	<0.005	<0.005
うめ	1	499 ^{SC}	3	1	1.98	1.98	0.363	0.360	2.34	0.006	0.006	<0.005	<0.005

(露地) 【果実】 平成 24 年度		散布	3	3	1.20	1.20	0.235	0.235	1.44	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.972	0.972	0.216	0.216	1.19	0.006	0.006	<0.005	<0.005
			3	14	1.07	1.06	0.241	0.240	1.30	0.008	0.008	<0.005	<0.005
			3	28	0.550	0.542	0.128	0.124	0.67	0.009	0.008	<0.005	<0.005
	1	467 ^{SC} 散布	3	1	2.38	2.36	0.442	0.436	2.80	0.008	0.008	<0.005	<0.005
			3	3	2.41	2.40	0.457	0.449	2.85	0.008	0.008	<0.005	<0.005
			3	7	1.98	1.97	0.381	0.373	2.34	0.008	0.008	<0.005	<0.005
			3	14	1.05	1.04	0.197	0.196	1.24	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	28	0.691	0.683	0.146	0.144	0.83	0.007	0.006	<0.005	<0.005
いちご (施設) 【果実】 平成 23 年度	1	350 ^{SC} 散布	3	1	1.52	1.52	0.244	0.243	1.76	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	1.25	1.24	0.200	0.200	1.44	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	1.01	1.01	0.163	0.162	1.17	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.466	0.462	0.071	0.070	0.53	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1	337 ^{SC} 散布	3	1	1.09	1.09	0.176	0.176	1.27	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.865	0.858	0.137	0.136	0.99	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.646	0.640	0.097	0.097	0.74	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.440	0.436	0.066	0.065	0.50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ぶどう (大粒種) (施設・無袋) 【果実】 平成 24 年度	1	415 ^{SC} 散布	3	7	0.268	0.258	0.045	0.044	0.30	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.324	0.321	0.056	0.055	0.38	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	0.537	0.528	0.089	0.088	0.62	0.007	0.006	<0.005	<0.005
			3	42	0.512	0.509	0.086	0.086	0.60	0.022	0.022	<0.005	<0.005
ぶどう	1	375 ^{SC}	3	7	2.67	2.64	0.480	0.476	3.12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

(小粒種) (施設・無袋) 【果実】 平成 24 年度		散布	3	14	2.52	2.51	0.455	0.452	2.96	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	28	3.07	3.06	0.535	0.534	3.59	0.019	0.018	<0.005	<0.005
			3	42	1.63	1.57	0.290	0.278	1.85	0.037	0.036	<0.005	<0.005
ぶどう (小粒種) (施設・無袋) 【果実】 平成 25 年度	1	389 ^{SC} 散布	3	7	2.74	2.72	0.466	0.466	3.19	0.009	0.008	<0.005	<0.005
			3	14	1.55	1.53	0.320	0.311	1.84	0.007	0.007	<0.005	<0.005
			3	28	0.899	0.892	0.175	0.171	1.06	0.010	0.010	<0.005	<0.005
			3	42	2.04	1.98	0.388	0.368	2.35	0.031	0.030	<0.005	<0.005
	1	399 ^{SC} 散布	3	7	0.738	0.732	0.141	0.138	0.87	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.942	0.942	0.173	0.172	1.11	0.008	0.008	<0.005	<0.005
			3	28	0.970	0.962	0.185	0.184	1.15	0.025	0.024	<0.005	<0.005
			3	42	0.521	0.514	0.108	0.102	0.62	0.029	0.027	<0.005	<0.005
かき (露地) 【果実】 平成 24 年度	1	499 ^{SC} 散布	3	1	0.625	0.624	0.110	0.110	0.73	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.513	0.508	0.090	0.090	0.60	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.505	0.500	0.090	0.090	0.59	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.623	0.620	0.116	0.116	0.74	0.007	0.006	<0.005	<0.005
			3	28	0.471	0.470	0.087	0.086	0.56	0.009	0.009	<0.005	<0.005
	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.391	0.389	0.071	0.070	0.46	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.219	0.218	0.039	0.039	0.26	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.228	0.227	0.043	0.042	0.27	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.148	0.147	0.032	0.032	0.18	0.009	0.009	<0.005	<0.005
			3	28	0.131	0.130	0.027	0.027	0.16	0.010	0.010	<0.005	<0.005

かき (露地) 【果実】 平成 25 年度	1	561 ^{SC} 散布	3	1	0.198	0.196	0.041	0.040	0.24	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.227	0.226	0.045	0.045	0.27	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.114	0.113	0.023	0.023	0.14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.159	0.156	0.032	0.032	0.19	0.007	0.007	<0.005	<0.005
			3	28	0.099	0.096	0.021	0.020	0.12	0.011	0.011	<0.005	<0.005
	1	520 ^{SC} 散布	3	1	0.459	0.454	0.087	0.086	0.54	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	3	0.434	0.434	0.083	0.083	0.52	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	7	0.596	0.583	0.117	0.115	0.70	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	14	0.305	0.304	0.072	0.071	0.38	0.007	0.007	<0.005	<0.005
			3	28	0.286	0.275	0.065	0.064	0.34	0.009	0.009	<0.005	<0.005

SC : フロアブル

<別紙4：作物残留試験成績(海外)>

作物名 (栽培形態) (分析部位)	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	最大残留値 (mg/kg)		
					イソピラザム (<i>syn</i> 体： <i>anti</i> 体)	代謝物 Fs	代謝物 Fa
大麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn</i> : <i>anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	54	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			48	0.024 (0.019 : <0.005)	0.019	<0.005
	1			54	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			48	0.014 (0.009 : <0.005)	0.006	<0.005
	1			60	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			54	0.028 (0.023 : <0.005)	0.02	<0.005
	1	125 ^{EC} (<i>syn</i> : <i>anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	2	48	0.015 (0.010 : 0.005)	0.011	<0.005
	1			48	0.014 (0.008 : 0.006)	0.006	<0.005
	1			54	0.035 (0.02 : 0.015)	0.023	<0.005
大麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn</i> : <i>anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	52	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			45	0.026 (0.021 : <0.005)	0.022	<0.005
	1	125 ^{EC} (<i>syn</i> : <i>anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	2	45	0.022 (0.014 : 0.008)	0.02	<0.005
大麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn</i> : <i>anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	2	45	0.02 (0.012 : 0.008)	0.012	<0.005
	1			38	0.016 (0.009 : 0.007)	0.013	<0.005
	1			42	0.016 (0.011 : 0.005)	0.006	<0.005
	1			61	0.017 (0.01 : 0.007)	0.012	<0.005

	1			42	0.026 (0.015 : 0.011)	0.02	<0.005
大麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	53	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			45	0.016 (0.011 : <0.005)	0.016	<0.005
	1			57	0.014 (0.009 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			42	0.17 (0.154 : 0.016)	0.041	<0.005
	1			52	0.011 (0.006 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			41	0.173 (0.168 : <0.005)	0.046	<0.005
	1			56	0.015 (0.010 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			50	<0.01 (<0.005 : <0.005)	0.006	<0.005
	1			50	<0.01 (<0.005 : <0.005)	0.006	<0.005
大麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	2	30	0.504 (0.338 : 0.166)	0.03	<0.005
	1			42	0.233 (0.19 : 0.08)	0.09	<0.005
	1			43	0.046 (0.03 : 0.016)	0.016	<0.005
	1			45	0.024 (0.014 : 0.01)	0.028	<0.005
	1			45	<0.01 (<0.005 : <0.005)	0.008	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	61	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			62	0.013 (0.008 : <0.005)	0.005	<0.005
	1			61	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1		3	51	0.012 (0.007 : <0.005)	0.006	<0.005
	1			51	0.017 (0.012 : <0.005)	0.009	<0.005

	1			41	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	3	51	0.012 (0.007 : <0.005)	0.007	<0.005
	1			51	0.013 (0.008 : <0.005)	0.006	<0.005
	1			41	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	51	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1		3	29	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	3	29	0.011 (0.006 : <0.005)	<0.005	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	3	43	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			43	0.01 (0.005 : 0.005)	<0.005	<0.005
	1			42	0.014 (0.009 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			30	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			30	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =92.8:7.2) 茎葉散布	2	52	0.014 (0.009 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			51	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			67	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			55	0.01 (0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1		3	41	0.03 (0.025 : <0.005)	0.006	<0.005
				35	0.028 (0.023 : <0.005)	0.008	<0.005
	1			43	0.019 (0.014 : <0.005)	0.006	<0.005

	1			46	0.018 (0.013 : <0.005)	<0.005	<0.005
小麦 (玄麦)	1	125 ^{EC} (<i>syn:anti</i> =69.7:30.3) 茎葉散布	3	30	0.086 (0.059 : 0.027)	0.005	<0.005
	1			42	0.116 (0.08 : 0.036)	0.038	<0.005
	1			53	0.041 (0.027 : 0.014)	0.021	<0.005
	1			41	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			45	0.041 (0.025 : 0.016)	0.056	<0.005
サマースカッ シュ	5	75 ^{EC} 茎葉散布	2	14	<0.0239 (0.0189 : <0.005)	<0.008	<0.006
				14	<0.014 (<0.006 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
	5	150 ^{EC} 茎葉散布		14	<0.030 (0.025 : <0.005)	<0.008	<0.006
				14	<0.014 (<0.006 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.0158 (0.0078 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.016 (0.0110 : <0.005)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
ウィンタース カッシュ/か ぼちゃ	3	75 ^{EC} 茎葉散布	2	14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.014 (<0.006 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006

	3	150 ^{EC} 茎葉散布		14	<0.0164 (0.0114 : <0.005)	<0.008	<0.006
				14	<0.013 (<0.005 : <0.008)	<0.008	<0.006
				14	<0.018 (0.0058 : <0.005)	<0.008	<0.006
バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	3	0.053 (0.032 : 0.021)	0.017	<0.005
	1			0	0.017 (0.012 : <0.005)	0.01	<0.005
	1			0	0.015 (0.01 : <0.005)	0.012	<0.005
	1			0	0.012 (0.007 : <0.005)	0.008	<0.005

バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	3	0.063 (0.043 : 0.020)	0.016	<0.005
	1			0	0.031 (0.02 : 0.011)	0.013	<0.005
	1			0	0.045 (0.031 : 0.014)	0.016	<0.005
	1			0	0.029 (0.019 : 0.01)	0.01	<0.005
バナナ (果肉) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	0.015 (0.005 : 0.01)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	0.01 (0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005

	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	0.013 (0.008 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	0.016 (0.01 : 0.006)	<0.005	<0.005
	1			0	0.012 (0.007 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	1	0.043 (0.029 : 0.014)	0.009	<0.005
	1			0	0.016 (0.01 : 0.006)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : 0.01)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005

バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	6	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	0.046 (0.029 : 0.017)	0.013	<0.005
	1			0	0.022 (0.014 : 0.008)	<0.0145	<0.005
バナナ (外皮) (無袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	0.048 (0.031 : 0.017)	0.01	<0.005
	1			0	0.037 (0.024 : 0.013)	<0.007	<0.005
バナナ (果肉)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005

(無袋)	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (果実全体) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
バナナ (外皮) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.021 (0.014 : 0.007)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.084 (0.057 : 0.027)	0.01	<0.005
バナナ (果肉) (有袋)	1	~75 ^{EC} 茎葉散布	5	0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005
	1			0	<0.01 (<0.005 : <0.005)	<0.005	<0.005

- ・試験には EC : 乳剤を用いた。
- ・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

<別紙 5：後作物残留試験成績（海外）>

作物名 (栽培形態) (分析部位)	PBI (日)	最大残留値 (mg/kg)		
		イソピラザム	Fs	Y
大麦 (玄麦)	30	<0.01	<0.005	<0.01
	60	<0.01	<0.005~0.031	<0.01
	365	<0.01	<0.005~0.008	<0.01
大麦 (わら)	30	<0.01	0.017~0.054	<0.01
	60	<0.01	0.018~0.052	<0.01~0.04
	365	<0.01	0.008~0.049	<0.01
にんじん (根部)	30	0.01	<0.005	<0.01
	60	<0.01	<0.005	<0.01
	365	<0.01	<0.005	<0.01
にんじん (葉部)	30	<0.01	<0.005	0.02~0.07
	60	<0.01	<0.005	0.03~0.15
	365	<0.01	<0.005	<0.01~0.07
ほうれんそう	30	<0.01	<0.005~0.006	0.01~0.02
	60	<0.01	<0.005~0.015	0.01~0.06
	365	<0.01	<0.005~0.006	<0.01~0.02

PBI：最終使用から植え付けまでの日数

＜別紙 6：畜産物残留試験＞

飼料への添 加量 (mg/kg/乾燥 重量)	摂取量* (mg/kg 体重/日)	試料	残留値 (μg/g)			
			イソピラザム		イソピラザム+代謝物 J	
			平均値	最高値	平均値	最高値
15	0.545	筋肉	<0.01	<0.01	0.02	0.03
		脂肪	<0.01	<0.01	0.02	0.05
		肝臓	0.01	0.01	0.22	0.24
		腎臓	<0.01	<0.01	0.06	0.07
		乳汁	<0.01	<0.01	0.03	0.05
42	1.53	筋肉	<0.01	0.01	0.05	0.06
		脂肪	0.03	0.05	0.07	0.1
		肝臓	0.03	0.04	0.6	0.66
		腎臓	0.01	0.01	0.16	0.17
		乳汁	<0.01	<0.01	0.07	0.14
140	5.09	筋肉	0.02	0.03	0.16	0.21
		脂肪	0.09	0.15	0.28	0.58
		肝臓	0.13	0.17	1.9	2.0
		腎臓	0.03	0.04	0.66	0.68
		乳汁	<0.01	0.02	0.19	0.38

*：体重 550 kg の乳牛が一日に 20 kg の飼料を摂取するとして算出

<別紙7：推定摂取量>

作物名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：55.1 kg)		小児（1～6歳） (体重：16.5 kg)		妊婦 (体重：58.5 kg)		高齢者（65歳以上） (体重：56.1 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
はくさい	1.87	17.7	33.1	5.1	9.65	16.6	31.0	21.6	40.4
キャベツ（含芽キャベツ）	1.4	24.1	33.7	11.6	16.2	19	26.6	23.8	33.3
レタス（含サラダ菜及びちしゃ）	5.51	9.6	52.9	4.4	24.2	11.4	62.8	9.2	50.7
トマト	1.39	32.1	44.6	19	26.4	32.0	44.5	36.6	50.9
なす	0.58	12	6.96	2.1	1.22	10	5.80	17.1	9.92
きゅうり（含ガーキン）	0.42	20.7	8.69	9.6	4.03	14.2	5.96	25.6	10.8
りんご	2.32	24.2	56.1	30.9	71.7	18.8	43.6	32.4	75.2
日本なし	1.06	6.4	6.78	3.4	3.60	9.1	9.65	7.8	8.27
もも	0.03	3.4	0.10	3.7	0.11	5.3	0.16	4.4	0.13
すもも（含プルーン）	0.9	1.1	0.99	0.7	0.63	0.6	0.54	1.1	0.99
うめ	2.85	1.4	3.99	0.3	0.86	0.6	1.71	1.8	5.13
いちご	1.76	5.4	9.50	7.8	13.7	5.2	9.15	5.9	10.4
ぶどう	3.59	8.7	31.2	8.2	29.4	20.2	72.5	9	32.3
かき	0.74	9.9	7.33	1.7	1.26	3.9	2.89	18.2	13.5
牛・筋肉と脂肪	0.09	15.3	1.38	9.7	0.87	20.9	1.88	9.9	0.89
牛・肝臓	0.13	0.1	0.01	0	0.00	1.4	0.18	0	0.00
牛・腎臓	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計			297		204		319		343

- ・農産物の残留値は、申請されている使用時期・回数のイソピラザムの含量値の最大値を、畜産物の残留値は、イソピラザムの平均残留値のうちの最大値を用いた。（参照：別紙3及び6）
- ・ff：平成17年～19年の食品摂取頻度・摂取量調査（参照107）の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）
- ・摂取量：残留値から求めたイソピラザムの推定摂取量（μg/人/日）
- ・メロン（果実）は、全データが定量限界未満であったため摂取量の計算には用いなかった。
- ・乳のデータは、定量限界未満であったため摂取量の計算には用いなかった。

<参照>

1. 農薬抄録 イソピラザム（殺菌剤）（平成 21 年 12 月 26 改訂）：シンジェンタ
ジャパン株式会社、一部公表
2. SYN520453: Pharmacokinetics in the Rat following Single Oral
Administration of [¹⁴C]-SYN520453 (1 and 75 mg/kg) (GLP) : Charles River
Laboratories、2009 年、未公表
3. SYN520453: The Excretion and Tissue Distribution of [¹⁴C]-SYN520453 in
the Rat Following Single Oral Administration (1 and 75 mg/kg) (GLP) :
Charles River Laboratories、2008 年、未公表
4. SYN520453: The Tissue Depletion of [¹⁴C]-SYN520453 in the Rat Following
Single Oral Administration (1 and 75 mg/kg) (GLP) : Charles River
Laboratories、2008 年、未公表
5. SYN520453: The Biliary Elimination of Total Radioactivity in the Rat
Following Single Oral Administration of [¹⁴C]-SYN520453 (1 and 75 mg/kg)
(GLP) : Charles River Laboratories、2008 年、未公表
6. SYN520453: The Biliary Elimination of Total Radioactivity in the Rat
Following Single Oral Administration of Syn or Anti [¹⁴C]-SYN520453 (2 and
75 mg/kg) (GLP) : Charles River Laboratories、2008 年、未公表
7. SYN520453: Whole Body Autoradiography And Expired Air Study In TheRat
(GLP) : Syngenta Central Toxicology Laboratories、2007 年、未公表
8. SYN520453: The Tissue Distribution and Elimination of [¹⁴C]-SYN520453 in
the Rat Following Multiple Oral Administration (1 mg/kg) (GLP) : Charles
River Laboratories、2008 年、未公表
9. SYN520453: Investigation of the Nature and Identity of Radiolabelled
Metabolites Present in Plasma, Urine, Faeces and Bile Collected from Rats
Following Oral Administration of [¹⁴C]-SYN520453 (GLP) : Charles River
Laboratories、2009 年、未公表
10. SYN520453: Metabolism in Wheat (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill
International Research Centre (英国)、2007 年、未公表
11. SYN520453: Metabolism in Grapes (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill
International Research Centre (英国) 及び、Charles River Laboratories (英
国)、2008 年、未公表
12. SYN520453: Metabolism in Lettuce (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008
年、未公表
13. Route and Rate of Degradation of ¹⁴C-Phenyl-Labelled SYN520453 in Four
Soils Under Aerobic Conditions at 20 °C (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's
Hill International Research Centre (英国) 及び、Syngenta Crop Protection AG
(スイス)、2009 年、未公表

14. SYN520453- Rate and Route of Degradation of [^{14}C]-Pyrazole Labelled SYN520453 Under Aerobic Laboratory Conditions in One Soil at 20° C (GLP) : Charles River Laboratories、2008 年、未公表
15. ^{14}C -Phenyl Labelled SYN520453-Rate of Degradation in Four Soils (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
16. SYN520453- Rate and Route of Degradation of [^{14}C]-Pyrazole Labelled SYN520453 under Anaerobic Laboratory Conditions in One Soil at 20° C. : Charles River Laboratories、2008 年、未公表
17. Soil Photolysis Study (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill International Research Centre (英国) 2006 年、修正報告書 2007、未公表
18. ^{14}C -Phenyl - SYN520453 Soil Photolysis Study (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill International Research Centre (英国) 2007 年、未公表
19. SYN520453 Adsorption/Desorption Properties in Six Soils (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill International Research Centre (英国) 2006 年、未公表
20. SYN520453 Hydrolysis of [Pyrazole-5- ^{14}C]-labelled Material under Laboratory Conditions (GLP 対応) : Syngenta Crop Protection AG (スイス)、2007 年、未公表
21. SYN520453 : Aqueous Photolysis in Sterile Buffer and Sterile Natural Water (GLP 対応) : Syngenta Ltd, Jealott's Hill International Research Centre (英国) 2008 年、未公表
22. イソピラザム 海外にて実施された作物残留試験、シンジェンタジャパン 2006～2008 年、未公表
23. SYN520453 : Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down Procedure) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2007 年、未公表
24. SYN520453 : Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down Procedure) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
25. SYN 534969 (Pure Syn), SYN 534968 (Pure Anti) and SYN 520453 (50% Syn:50% Anti) : Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down Procedure) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
26. SYN520453 : Acute Dermal Toxicity Study in the Rat (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2007 年、未公表
27. SYN520453 : 4 Hour Acute Inhalation Toxicity Limit Study In The Rat (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2006 年、未公表
28. CSCD465008—Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down Procedure) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
29. CSCD459488—Acute Oral Toxicity Study in the Rat (Up and Down Procedure) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表

30. SYN520453 : Acute Oral (Gavage) Neurotoxicity Study in Rats (GLP対応) : Harlan Laboratories Ltd. (former RCC Ltd) (スイス)、2009年、未公表
31. SYN520453 : Primary Eye Irritation Study in Rabbits (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2006 年、未公表
32. SYN520453 : Primary Skin Irritation Study in Rabbits (4-Hour Semi-Occlusive Application) (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2007 年、未公表
33. SYN520453 : Skin Sensitisation (Local Lymph Node Assay In The Mouse) (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2006 年、未公表
34. SYN520453 : 90 Day Dietary Toxicity Study In Rats (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2007 年、未公表
35. SYN520453—SYN520453 (89.5% Syn : 6.9% Anti) , SYN520453 (63.3% Syn : 27.5% Anti) -13 Week (GLP 対応) : Charles River Laboratories、2009 年、未公表
36. SYN520453 : 28 Day Dietary Toxicity Study In Rats KR1661/Regulatory/Report (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2007 年、未公表
37. SYN520453 : 28 Day Dietary Toxicity Study In Rats KR1579/Technical Toxicology/Report (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2007 年、未公表
38. SYN520453 : 90 Day Dietary Toxicity Study In Dogs (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2007 年、未公表
39. SYN520453 : 13-Week Oral (Capsule) Toxicity Study in the Dog (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
40. SYN520453 : 90 Day Neurotoxicity (Dietary) Study in the Rat (GLP 対応) : Harlan Laboratories Ltd. (former RCC Ltd) (スイス)、2009 年、未公表
41. CSCD465008 : A 28-Day Oral (Dietary) Toxicity Study in Wistar Rats (GLP 対応) : WIL Research Laboratories (米国)、2008 年、未公表
42. CSCD459488 : 28 Day Dietary Toxicity Study (GLP 対応) : Charles River Laboratories、2009 年、未公表
43. SYN520453 : 52-Week Oral (Capsule) Toxicity Study in the Beagle Dog (GLP 対応) : RCC Ltd (スイス)、2008 年、未公表
44. SYN520453 : 2 Year Dietary Toxicity And Carcinogenicity Study In Rats (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2008 年、未公表
45. SYN520453 : 80 Week Dietary Carcinogenicity Study In The Mouse (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories (英国)、2008年、未公表
46. SYN520453 : Multigeneration Reproduction Toxicity Study In Rats (GLP 対

- 応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2008年、未公表
47. SYN520453 : Prenatal Developmental Toxicity Study In Rats（GLP対応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2008年、未公表
48. SYN520453 (63.3% Syn : 27.5% Anti) : Prenatal Developmental Toxicity Study in the Han Wistar Rat（GLP 対応）：RCC Ltd（スイス）、2008 年、未公表
49. SYN520453—Dose Range—Finding Prenatal Developmental Toxicity Study in the Himalayan Rabbit（GLP 対応）：RCC Ltd（スイス）、2008 年、未公表
50. SYN520453 : — Second Dose Range — Finding Prenatal Developmental Toxicity Study in the Himalayan Rabbit（GLP 対応）：RCC Ltd（スイス）、2008 年、未公表
51. SYN520453—A Dose Range—Finding Prenatal Developmental Toxicity Study in New Zealand White Rabbits（GLP 対応）：WIL Research Laboratories（米国）、2008 年、未公表
52. SYN520453—A Prenatal Developmental Toxicity Study in New Zealand White Rabbits（GLP 対応）：WIL Research Laboratories（米国）、2008 年、未公表
53. SYN520453 : Bacterial Mutation Assay in *S.typhimurium* and *E.coli*（GLP 対応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2006 年、未公表
54. SYN520453 : Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse Mutation Assay（GLP 対応）：RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008 年、未公表
55. Isopyrazam Technical : Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse Mutation Assay（GLP 対応）：Harlan Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2010 年、未公表
56. SYN520453 : L5178Y TK +/- Mouse Lymphoma Mutation Assay（GLP 対応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2006 年、未公表
57. SYN520453 : Cell Mutation Assay at the Thymidine Kinase Locus (TK^{+/+}) in Mouse Lymphoma L5178Y Cells（GLP 対応）：RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008 年、未公表
58. SYN520453 : *IN VITRO* CYTOGENETIC ASSAY IN HUMAN LYMPHOCYTES（GLP 対応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2006 年、未公表
59. SYN520453 : Chromosome Aberration Study in Human Lymphocytes（GLP 対応）：RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008 年、未公表
60. SYN520453 : In Vivo Rat Liver Unscheduled DNA Synthesis Assay（GLP 対応）：Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2006 年、未公表
61. SYN520453 : Rat Bone Marrow Micronucleus Test（GLP 対応）：Syngenta

- Central Toxicology Laboratories（英国）、2006年、未公表
62. CSCD465008 : Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse Mutation Assay (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH（ドイツ）、2008年、未公表
 63. CSCD465008 : Cell Mutation Assay at the Thymidine Kinase Locus (TK^{+/+}) in Mouse Lymphoma L5178Y Cells (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008年、未公表
 64. CSCD465008 : Chromosome Aberration Study in Human Lymphocytes *In Vitro* (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008年、未公表
 65. CSCD459488 : Salmonella Typhimurium and Escherichia Coli Reverse Mutation Assay (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH（ドイツ）、2008年、未公表
 66. CSCD459488 : Cell Mutation Assay at the Thymidine Kinase Locus (TK^{+/+}) in Mouse Lymphoma L5178Y Cells (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008年、未公表
 67. CSCD459488 : Chromosome Aberration Study in Human Lymphocytes *In Vitro* (GLP 対応) : RCC Cytotest Cell Research GmbH (RCC-CCR)（ドイツ）、2008年、未公表
 68. Isopyrazam—14 Day Dietary Liver Mode of Action Study in Rats (GLP 対応) : Charles River Laboratories、2011年、未公表
 69. Isopyrazam— Enzyme and DNA Synthesis Induction in Cultured Female Rat Hepatocytes : CXR Biosciences（英国）、2011年、未公表
 70. Isopyrazam— Enzyme and DNA Synthesis Induction in Cultured Female Human Hepatocytes : CXR Biosciences（英国）、2011年、未公表
 71. Isopyrazam—Uterotrophic Assay in Ovariectomized Wistar Hanover Rats (GLP 対応) : WIL Research Laboratories（米国）、2011年、未公表
 72. Isopyrazam—Stably Transfected Human Estrogen Receptor Alpha Transcriptional Activation Assay (GLP 対応) : Cee Tox（英国）、2011年、未公表
 73. SYN520453 (49.5% Syn:48.7% Anti), SYN534969 & SYN534968 28 Day Comparative Study In The Rat KR1662/Regulatory/Report (GLP 対応) : Syngenta Central Toxicology Laboratories（英国）、2007年、未公表
 74. JMPR: “ISOPYRAZAM”, Pesticide residues in food - 2011. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and WHO the Core Assessment Group. P165-187(2011)
 75. US EPA : Isopyrazam ; Human Health Risk Assesment for the establishment of a Tolerance for Isopyrazam(SYN52043) Fungicide in/on Imported Banana.

PC Code: 129222. Petition 9E7606. DP Barcode:392681(2011)

76. EFSA : Setting of new MRLs for isopyrazam in several cereals and food commodities of animal origin. 8(9)1975:(2010)
77. EFSA: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isopyrazam, *EFSA Journal* (2012) 10(3), 2600.
78. 食品健康影響評価について（平成 23 年 10 月 6 日付け厚生労働省発食安 1006 第 14 号）
79. イソピラザム 海外にて実施された作物残留試験（バナナ）、シンジェンタジャパン 2007～2010 年、未公表
80. 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 24 年 11 月 26 日付け府食第 1023 号）
81. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 25 年 10 月 22 日付け平成 25 年厚生労働省告示第 337 号）
82. イソピラザム（syn 体及び anti 体）の土壌吸着性に関する試験（GLP 対応）：一般財団法人残留農薬研究所、2012 年、未公表
83. イソピラザム（NC-233）の土壌残留分析結果報告書：日産化学工業株式会社、2012 年、未公表
84. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 はくさい 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
85. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 キャベツ 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
86. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 結球レタス 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
87. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 ミニトマト 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
88. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 なす 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
89. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 きゅうり 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
90. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 メロン 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
91. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 りんご 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
92. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 日本なし 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
93. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 もも 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
94. イソピラザム作物残留分析結果報告（すもも）、一般財団法人残留農薬研究所、

2012 年、未公表

95. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 うめ 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
96. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 いちご 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2012 年、未公表
97. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 ぶどう 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
98. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 かき 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2013 年、未公表
99. イソピラザム（NC-233）フロアブル 20 かき 作物残留試験、一般社団法人日本植物防疫協会、2014 年、未公表
100. イソピラザムの海外にて実施された作物残留試験成績（3）（ニュージーランド：かぼちゃ）、シンジェンタジャパン株式会社 2012 年、未公表
101. Isopyrazam technical – Modified Irwin Screen Test in the Rat（GLP 対応）：Harlan Laboratories Ltd（スイス）、2012 年、未公表
102. Isopyrazam technical – Effect on the Cardiovascular and Respiratory Systems in Anaesthetized Rat（GLP 対応）：Harlan Laboratories Ltd（スイス）、2012 年、未公表
103. Isopyrazam technical – Effect on Renal Function in the Rat（GLP 対応）：Harlan Laboratories Ltd（スイス）、2012 年、未公表
104. JMPR：“ISOPYRAZAM”，Pesticide residues in food: Toxicological evaluations. 387-440 (2011)
105. 農薬抄録 イソピラザム（殺菌剤）（平成 26 年 2 月 6 日改訂）：シンジェンタジャパン株式会社、一部公表予定
106. 食品健康影響評価について（平成 27 年 6 月 23 日付け厚生労働省発食安 0623 第 1 号）
107. 平成 17～19 年の食品摂取頻度・摂取量調査（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物医薬品部会資料、2014 年 2 月 20 日