

AA摂取量推定対象食品グループ名	摂取者数	全体の平均摂取量 g/kg-bw/day	AA濃度 (平均値) ng/g	AA摂取量 (平均値) ng/kg-bw/day	備考
もやし(素揚げ・炒め)	2,385	0.088	752	66	代替
じゃがいも(炒め)	507	0.028	463	13	代替
レギュラーコーヒー(浸出液)	4,203	0.78	16	12	
インスタントコーヒー(粉末)	7,159	0.018	668	12	
れんこん(素揚げ・炒め)	848	0.0231	455	11	追加
小麦系菓子類	2,273	0.058	174	10	
ポテトチップス	568	0.020	471	9.4	
キャベツ(素揚げ・炒め)	3,739	0.18	50	9.0	代替
成形ポテトスナック	171	0.0066	1187	7.8	
じゃがいも(素揚げ)	497	0.028	269	7.5	
たまねぎ(下炒め)	3,914	0.18	37	6.7	
ハヤシ・カレー・ビーフシチュールウ	2,847	0.060	101	6.1	
緑茶・ウーロン茶(浸出液)	12,497	4.40	1.2	5.3	
たまねぎ(素揚げ・炒め)	7,432	0.21	25	5.3	
米菓類	2,284	0.052	99	5.1	
炊飯米	23,605	6.6	0.59	3.9	
ほうじ茶(浸出液)	1,329	0.41	7.6	3.1	
ピーマン(素揚げ・炒め)	3,929	0.068	43	2.9	代替
フライこも	5,916	0.12	24	2.9	
ごぼう(素揚げ・炒め)	1,684	0.0344	80	2.8	追加
麦茶(浸出液)	3,593	1.3	2.0	2.6	
麦茶(PET)	955	0.36	7	2.5	
かりんとう(含みつ糖使用)	141	0.0033	731	2.4	
炒りごま	5,843	0.015	152	2.3	
にんじん(素揚げ・炒め)	9,691	0.1443	16	2.3	追加
コーヒー飲料	1,198	0.22	9.1	2.0	
ロールパン等(トーストしない、含みつ糖不使用)	2,152	0.13	13	1.7	
じゃがいも(下炒め)	2,502	0.15	11	1.7	
インスタント麺	1,019	0.065	26	1.7	
コーンスナック	312	0.0097	142	1.4	
ロールパン等(トーストしない、含みつ糖使用)	239	0.014	91	1.3	
食パン(トースト、含みつ糖不使用)	5,459	0.33	3.3	1.1	
シリアル類	270	0.011	93	1.0	
ロールインパン・フランスパン等	1,117	0.062	16	1.0	
根深ねぎ(素揚げ・炒め)	1,979	0.0221	43	1.0	追加
含みつ糖(和三盆糖除く)	364	0.0025	387	0.97	
アーモンド	373	0.0029	324	0.94	
まんじゅう(含みつ糖使用)	100	0.0042	194	0.81	
ココア(粉末)	679	0.0065	123	0.80	
アスパラガス(素揚げ・炒め)	92	0.0020	400	0.80	代替
なす(素揚げ、炒め)	1,067	0.056	12	0.67	代替
かぼちゃ(素揚げ・炒め)	370	0.017	34	0.58	代替
米みそ	14,671	0.19	3.0	0.57	
菓子パン類	1,247	0.089	6.2	0.55	
乾燥果実	685	0.011	47	0.52	
さやいんげん(素揚げ・炒め)	417	0.0079	63	0.50	代替
にんにく(素揚げ・炒め)	2,332	0.0031	173	0.5	追加
しょうゆ	21,001	0.26	1.9	0.49	
食パン(トーストしない、含みつ糖不使用)	2,340	0.14	3.4	0.48	
落花生	496	0.0060	75	0.45	
ブロッコリー(素揚げ・炒め)	842	0.020	20	0.40	代替
さやえんどう(素揚げ・炒め)	188	0.00093	393	0.37	
芋けんぴ	67	0.0021	166	0.35	
にら(素揚げ・炒め)	738	0.0114	30	0.3	追加
きな粉	656	0.0039	75	0.29	
飴(含みつ糖使用)	27	0.00024	1046	0.25	
カレー粉	418	0.00033	423	0.14	
クリームシチュールウ	786	0.017	8.0	0.14	
紅茶(浸出液)	1,880	0.39	0.29	0.11	
フライビーンズ	19	0.00049	120	0.059	
豆みそ	362	0.0035	9.0	0.032	
イングリッシュマフィン・ナン	124	0.0083	3.3	0.027	
ボーロ	29	0.0011	20	0.022	
麦こがし	8	0.000040	236	0.0094	
和三盆糖	14	0.000066	85	0.0056	
ピスタチオ	15	0.00011	34	0.0037	

推定AA総摂取量 (ng/kg-bw/day) 240

※備考欄に「追加」と記載しているれんこん、ごぼう、にんじん、にら、にんにく、根深ねぎについては、資料2-2 IV. ヒトにおけるばく露(案) 別添2に計上されていない品目であることから、別添2の点推定結果に別添3表1に示すAA摂取量を追加した。

※備考欄に「代替」と記載している品目のうち、もやし、ピーマン、キャベツ、アスパラガス、さやいんげん、じゃがいも(炒め)については、資料2-2 IV. ヒトにおけるばく露(案) 別添2に計上されている品目であることから、別添2における同一品目のAA摂取量の代わりに別添3表2に示すAA摂取量を用いた。  
また、かぼちゃ、なす、ブロッコリーについては、資料2-2 IV. ヒトにおけるばく露(案) 表4-4に示すAA濃度の各々の平均値を用いた。