

（案）

農薬評価書

メタラキシル及びメフェノキサム （第4版）

2017年8月24日

食品安全委員会農薬専門調査会

目次

	頁
1	
2	
3	○ 審議の経緯..... 4
4	○ 食品安全委員会委員名簿..... 5
5	○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿..... 6
6	○ 要約..... 11
7	
8	I. 評価対象農薬の概要..... 12
9	1. 用途..... 12
10	2. 有効成分の一般名..... 12
11	3. 化学名..... 12
12	4. 分子式 <メタラキシル及びメタラキシル M 共通>..... 13
13	5. 分子量 <メタラキシル及びメタラキシル M 共通>..... 13
14	6. 構造式..... 13
15	7. 開発の経緯..... 13
16	
17	II. 安全性に係る試験の概要..... 14
18	1. 動物体内運命試験..... 14
19	(1) ラット（メタラキシル M 及びメタラキシル）..... 14
20	(2) ラット（メタラキシル）..... 15
21	(3) ラット（メタラキシル M）..... 18
22	(4) ヤギ（メタラキシル）..... 18
23	(5) ニワトリ（メタラキシル）..... 20
24	2. 植物体内運命試験..... 22
25	(1) 水稻（メタラキシル M）..... 22
26	(2) 水稻（メタラキシル）..... 23
27	(3) レタス（メタラキシル M 及びメタラキシルの代謝比較試験）..... 23
28	(4) レタス（メタラキシル）..... 24
29	(5) ぶどう（メタラキシル）..... 24
30	(6) ばれいしょ（メタラキシル）..... 25
31	(7) たばこ（メタラキシル）..... 25
32	(8) トマト（メタラキシル M）..... 26
33	3. 土壌中運命試験..... 27
34	(1) 好氣的湛水土壌中運命試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）..... 27
35	(2) 好氣的土壌中運命試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）..... 28
36	(3) 好氣的、好氣的及び嫌氣的湛水並びに滅菌好氣的土壌中運命試験（メタラキシル）
37 29
38	(4) 好氣的土壌中運命試験（分解物 C1）..... 29

1	(5) 土壌吸着試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）	30
2	(6) 土壌吸脱着試験（メタラキシル M）	30
3	4. 水中運命試験	30
4	(1) 加水分解試験	30
5	(2) 水中光分解試験	31
6	5. 土壌残留試験	33
7	(1) メタラキシル M 及びメタラキシル	33
8	(2) メタラキシル	33
9	6. 作物等残留試験	33
10	(1) 作物残留試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）	34
11	(2) 畜産物残留試験（メタラキシル）	34
12	(3) 魚介類における最大推定残留値	35
13	(4) 推定摂取量	36
14	7. 一般薬理試験	36
15	(1) メタラキシル M 及びメタラキシル	36
16	(2) メタラキシル	39
17	8. 急性毒性試験	41
18	(1) 急性毒性試験	41
19	(2) 急性神経毒性試験（ラット、メタラキシル M）	45
20	9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	46
21	(1) メタラキシル M	46
22	(2) メタラキシル	46
23	10. 亜急性毒性試験	47
24	(1) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル M とメタラキシルの比較試験）	
25		47
26	(2) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）	48
27	(3) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ、メタラキシル M）	50
28	(4) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット、メタラキシル M）	50
29	(5) 28 日間亜急性経皮毒性試験（ラット、メタラキシル M）	51
30	(6) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 C1）	51
31	(7) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 J）	52
32	11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	52
33	(1) 6 か月間慢性毒性試験（イヌ、メタラキシル）	52
34	(2) 2 年間慢性毒性試験（イヌ、メタラキシル）	53
35	(3) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、メタラキシル）	53
36	(4) 2 年間発がん性試験（マウス、メタラキシル）	54
37	12. 生殖発生毒性試験	54
38	(1) 3 世代繁殖試験（ラット、メタラキシル）	54

1	(2) 発生毒性試験（ラット）	55
2	(3) 発生毒性試験（ウサギ）	57
3	1 3. 遺伝毒性試験	57
4	(1) メタラキシル M 原体	57
5	(2) メタラキシル原体	58
6	(3) 代謝物	59
7	(4) 原体混在物	61
8	1 4. その他の試験	62
9	(1) ラットの肝臓における酵素誘導試験（メタラキシル）	62
10	(2) メタラキシルの <i>in vitro</i> 肝細胞毒性試験	62
11	(3) ラットの心臓に対する影響（ <i>in vivo</i> ）	62
12	(4) ラットの心臓に対する影響（ <i>in vitro</i> ）	63
13	(5) 28 日間免疫毒性試験（マウス、メタラキシル M）	63
14		
15	Ⅲ. 食品健康影響評価	64
16		
17	・別紙 1：代謝物/分解物/原体混在物略称	77
18	・別紙 2：検査値等略称	78
19	・別紙 3：作物残留試験成績（国内）	80
20	・別紙 4：作物残留試験成績（海外）	98
21	・別紙 5：畜産物残留試験成績	101
22	・別紙 6：畜産物残留試験成績	104
23	・別紙 7：推定摂取量	106
24	・参照	108
25		
26		
27		

1 <審議の経緯>

2 ー第1版関係ー

3 ・清涼飲料水関係

- 1984年 2月 3日 メタラキシル（ラセミ体制剤）初回農薬登録
- 2003年 7月 1日 厚生労働大臣から清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0701015号）
- 2003年 7月 3日 関係書類の接受（参照1）
- 2003年 7月 18日 第3回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2003年 10月 8日 追加資料受理（参照2）
（メタラキシルを含む要請対象93農薬を特定）
- 2003年 10月 27日 第1回農薬専門調査会
- 2004年 1月 28日 第6回農薬専門調査会
- 2005年 1月 12日 第22回農薬専門調査会

4

5 ・メフェノキサム^{注)}登録申請及びポジティブリスト制度関連

- 2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照3）
- 2007年 5月 10日 農林水産省から厚生労働省へメタラキシル M の農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：ピーマン、みょうが等）
- 2007年 5月 22日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0522004号）、関係書類の接受（参照4～15）
- 2007年 5月 24日 第191回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2008年 6月 9日 第16回農薬専門調査会確認評価第一部会
- 2008年 12月 9日 第46回農薬専門調査会幹事会
- 2009年 1月 29日 第271回食品安全委員会（報告）
- 2009年 1月 29日 から2月27日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2009年 3月 3日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2009年 3月 5日 第276回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照16）
- 2010年 8月 10日 残留農薬基準告示（参照17）

6

7 ー第2版関係ー

- 2010年 8月 5日 農林水産省から厚生労働省へ基準値設定依頼（魚介類）
- 2010年 9月 9日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安0909第11号）
- 2010年 9月 13日 関係書類の接受（参照18～21）
- 2010年 9月 16日 第348回食品安全委員会（要請事項説明）

- 2010 年 12 月 20 日 インポートトレランス設定の要請（しゅんぎく、セロリ等）
2010 年 12 月 21 日 追加資料受理（参照 22）
2011 年 5 月 13 日 第 72 回農薬専門調査会幹事会
2011 年 7 月 5 日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
2011 年 7 月 7 日 第 389 回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 23）
2012 年 11 月 2 日 残留農薬基準告示（参照 24）

1

2 ー第 3 版関係ー

- 2012 年 8 月 30 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び
基準値設定依頼（適用拡大：ごぼう及びだいこん）
2013 年 11 月 11 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に
ついて要請（厚生労働省発食安 1111 第 8 号）
2013 年 11 月 14 日 関係書類の接受（参照 25～27）
2013 年 11 月 18 日 第 494 回食品安全委員会（要請事項説明）
2014 年 1 月 20 日 第 500 回食品安全委員会（審議）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）
2015 年 2 月 20 日 残留農薬基準告示（参照 47）

ー第 4 版関係ー

- 2016 年 12 月 13 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び
基準値設定依頼（適用拡大：アスパラガス）
2017 年 2 月 15 日 インポートトレランス設定の要請（にんにく）
2017 年 3 月 15 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に
ついて要請（厚生労働省発生食 0315 第 9 号）、関係書類の
接受（参照 28～45、52）
2017 年 3 月 21 日 第 643 回食品安全委員会（要請事項説明）
2017 年 6 月 23 日 第 65 回農薬専門調査会評価第二部会
2017 年 7 月 28 日 第 66 回農薬専門調査会評価第二部会
2017 年 8 月 24 日 第 152 回農薬専門調査会幹事会

3 注) 「メフェノキサム」は、メタラキシル M の別名である。本評価書中においては、
4 ISO 名に従い「メタラキシル M」で統一した。

5

6 <食品安全委員会委員名簿>

(2006 年 6 月 30 日まで) (2006 年 12 月 20 日まで) (2009 年 6 月 30 日まで)
寺田雅昭 (委員長) 寺田雅昭 (委員長) 見上 彪 (委員長)

寺尾允男（委員長代理）	見上 彪（委員長代理）	小泉直子（委員長代理*）
小泉直子	小泉直子	長尾 拓
坂本元子	長尾 拓	野村一正
中村靖彦	野村一正	畑江敬子
本間清一	畑江敬子	廣瀬雅雄**
見上 彪	本間清一	本間清一

*：2007年2月1日から

**：2007年4月1日から

1

(2011年1月6日まで)	(2012年6月30日まで)	(2015年6月30日まで)
小泉直子（委員長）	小泉直子（委員長）	熊谷 進（委員長）
見上 彪（委員長代理*）	熊谷 進（委員長代理*）	佐藤 洋（委員長代理）
長尾 拓	長尾 拓	山添 康（委員長代理）
野村一正	野村一正	三森国敏（委員長代理）
畑江敬子	畑江敬子	石井克枝
廣瀬雅雄	廣瀬雅雄	上安平冽子
村田容常	村田容常	村田容常

*：2009年7月9日から

*：2011年1月13日から

(2017年1月7日から)

佐藤 洋（委員長）
山添 康（委員長代理）
吉田 緑
山本茂貴
石井克枝
堀口逸子
村田容常

2

3 <食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2006年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	小澤正吾	出川雅邦
廣瀬雅雄（座長代理）	高木篤也	長尾哲二
石井康雄	武田明治	林 真
江馬 眞	津田修治*	平塚 明
太田敏博	津田洋幸	吉田 緑

*：2005年10月1日から

4

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	三枝順三	根岸友恵
廣瀬雅雄（座長代理）	佐々木有	林 真
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 眞	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤正吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

1

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	三枝順三	西川秋佳**
林 真（座長代理*）	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友恵
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 啓介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司
江馬 眞	津田洋幸	柳井徳磨
大澤貫寿	出川雅邦	山崎浩史
太田敏博	長尾哲二	山手丈至
大谷 浩	中澤憲一	與語靖洋
小澤正吾	納屋聖人	吉田 緑
小林裕子	成瀬一郎***	若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

2

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	佐々木有	平塚 明
林 真（座長代理）	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清

赤池昭紀
石井康雄
泉 啓介
今井田克己
上路雅子
臼井健二
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
川合是彰
小林裕子
三枝順三***

玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
中澤憲一*
永田 清
納屋聖人
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄

堀本政夫
松本清司
本間正充
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦**
吉田 緑
若栗 忍

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

1

(2012年3月31日まで)

納屋聖人（座長）
林 真（座長代理）
相磯成敏
赤池昭紀
浅野 哲**
石井康雄
泉 啓介
上路雅子
臼井健二
太田敏博
小澤正吾
川合是彰
川口博明
小林裕子
三枝順三

佐々木有
代田眞理子
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
永田 清
長野嘉介*
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄
八田稔久

平塚 明
福井義浩
藤本成明
細川正清
堀本政夫
本間正充
増村健一**
松本清司
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦
吉田 緑
若栗 忍

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

(2014年3月31日まで)

・幹事会

納屋聖人（座長）

上路雅子

松本清司

西川秋佳*（座長代理）	永田 清	山手丈至**
三枝順三（座長代理**）	長野嘉介	吉田 緑
赤池昭紀	本間正充	
・評価第一部会		
上路雅子（座長）	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀（座長代理）	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍
・評価第二部会		
吉田 緑（座長）	桑形麻樹子	藤本成明
松本清司（座長代理）	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充
・評価第三部会		
三枝順三（座長）	小野 敦	永田 清
納屋聖人（座長代理）	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一
・評価第四部会		
西川秋佳*（座長）	川口博明	根本信雄
長野嘉介（座長代理*； 座長**）	代田眞理子	森田 健
山手丈至（座長代理**）	玉井郁巳	與語靖洋
井上 薫**		*：2013年9月30日まで **：2013年10月1日から

（2016年4月1日から）

・幹事会		
西川秋佳（座長）	三枝順三	長野嘉介
納屋聖人（座長代理）	代田眞理子	林 真
浅野 哲	清家伸康	本間正充
小野 敦	中島美紀	與語靖洋
・評価第一部会		
浅野 哲（座長）	桑形麻樹子	平林容子
平塚 明（座長代理）	佐藤 洋	本多一郎
堀本政夫（座長代理）	清家伸康	森田 健
相磯成敏	豊田武士	山本雅子
小澤正吾	林 真	若栗 忍
・評価第二部会		
三枝順三（座長）	高木篤也	八田稔久
小野 敦（座長代理）	中島美紀	福井義浩

納屋聖人（座長代理）	中島裕司	本間正充
腰岡政二	中山真義	美谷島克宏
杉原数美	根岸友恵	義澤克彦
・評価第三部会		
西川秋佳（座長）	加藤美紀	高橋祐次
長野嘉介（座長代理）	川口博明	塚原伸治
與語靖洋（座長代理）	久野壽也	中塚敏夫
石井雄二	篠原厚子	増村健一
太田敏博	代田眞理子	吉田 充

<第 65 回農薬専門調査会評価第二部会専門参考人名簿>

永田 清 松本清司

<第 66 回農薬専門調査会評価第二部会専門参考人名簿>

永田 清 松本清司

<第 152 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

赤池昭紀 永田 清 松本清司
上路雅子

要 約

アシルアラニン誘導体の殺菌剤である「メタラキシル」（CAS No. 57837-19-1）及び「メタラキシル M」（CAS No. 70630-17-0）について、各種資料等を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、動物体内運命試験（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内運命試験（トマト）、作物残留試験（アスパラガス及びたまねぎ）、畜産物残留試験（ウシ及びニワトリ）、急性神経毒性試験（ラット）、遺伝毒性試験の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内運命（レタス、ぶどう等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット及びイヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、3世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、免疫毒性（マウス）、遺伝毒性等の試験成績である。

試験結果から、メタラキシル及びメタラキシル M 投与による影響は、主に肝臓（重量増加等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、免疫毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をメタラキシル及びメタラキシル M（親化合物のみ）、畜産物中の暴露評価対象物質をメタラキシル及びメタラキシル M 並びに 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物と設定した。

メタラキシル及びメタラキシル M の各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた 90 日間亜急性毒性試験の 7.25 mg/kg 体重/日であったが、6 か月間慢性毒性試験の無毒性量は 7.41 mg/kg 体重/日及び 2 年間慢性毒性試験の無毒性量は 8.0 mg/kg 体重/日が得られており、この差は用量設定の違いによるものであると考えられた。したがって、食品安全委員会農薬専門調査会はイヌにおける無毒性量を 8.0 mg/kg 体重/日と判断し、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.08 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

また、メタラキシル及びメタラキシル M の単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 28 日間亜急性毒性試験及びマウスを用いた一般薬理試験の 50 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.5 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

1 **I. 評価対象農薬の概要**

2 **1. 用途**

3 殺菌剤

4

5 **2. 有効成分の一般名**

6 <メタラキシル>

7 和名：メタラキシル

8 英名：metalaxyl (ISO名)

9

<メタラキシル M>

和名：メタラキシル M

英名：metalaxyl-M (ISO名)

10 **3. 化学名**

11 <メタラキシル>

12 **IUPAC**

13 和名：メチル=*N*-(メトキシアセチル)-*N*-(2,6-キシリル)-DL-アラニナート

14 英名：methyl *N*-(methoxyacetyl)-*N*-(2,6-xylyl)-DL-alaninate

15 又は

16 和名：メチル=2- $\{[(2,6\text{-ジメチルフェニル})\text{メトキシアセチル}]\text{アミノ}\}$

17 プロピオナート

18 英名：methyl 2- $\{[(2,6\text{-dimethylphenyl})\text{methoxyacetyl}]\text{amino}\}$

19 propionate

20 **CAS (No. 57837-19-1)**

21 和名：メチル=*N*-(2,6-ジメチルフェニル)-*N*-(メトキシアセチル)-DL-

22 アラニナート

23 英名：methyl *N*-(2,6-dimethylphenyl)-*N*-(methoxyacetyl)-DL-

24 alaninate

25

26 <メタラキシル M>

27 **IUPAC**

28 和名：メチル=*N*-(メトキシアセチル)-*N*-(2,6-キシリル)-D-アラニナート

29 英名：methyl *N*-(methoxyacetyl)-*N*-(2,6-xylyl)-D-alaninate

30 又は

31 和名：メチル= (*R*)-2- $\{[(2,6\text{-ジメチルフェニル})\text{メトキシアセチル}]\text{アミノ}\}$

32 プロピオナート

33 英名：methyl (*R*)-2- $\{[(2,6\text{-dimethylphenyl})\text{methoxyacetyl}]\text{amino}\}$

34 propionate

35

36 **CAS (No. 70630-17-0)**

37 和名：メチル=*N*-(2,6-ジメチルフェニル)-*N*-(メトキシアセチル)-D-

38 アラニナート

1 英名：methyl *N*-(2,6-dimethylphenyl)-*N*-(methoxyacetyl)-D-
2 alaninate

3

4 **4. 分子式 <メタラキシル及びメタラキシル M 共通>**

5 C₁₅H₂₁NO₄

6


7 **5. 分子量 <メタラキシル及びメタラキシル M 共通>**

8 279.34

9

10 **6. 構造式**

<メタラキシル>




(D : L = 1 : 1)

11

12

<メタラキシル M>



(D 体)

13

14 **7. 開発の経緯**

15 メタラキシルは、1973年にスイスのチバガイギー社によって開発されたアシル
16 アラニン誘導体の殺菌剤であり、作用機構は、菌体内におけるウリジンのRNAへ
17 の取り込み、又はRNA、DNA及び脂質の合成阻害による病原菌の菌糸伸長並びに
18 胞子形成の阻害である。

19 今回、農薬取締法に基づく農薬登録申請（適用拡大：アスパラガス）及びインポ
20 ートトレランス設定の要請（にんにく）がなされている。

21

11 II. 安全性に係る試験の概要

12 各種運命試験 [II.1~4] は、メタラキシル M、メタラキシル及び分解物 C1 の
 13 フェニル基炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「 ^{14}C -メタラキシル M」、「 ^{14}C -
 14 メタラキシル」及び「 ^{14}C -C1」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代
 15 謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からメタラキシル又は
 16 メタラキシル M の濃度（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。

17 代謝物/分解物/原体混在物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。

18 1. 動物体内運命試験

19 (1) ラット（メタラキシル M 及びメタラキシル）

20 ① 吸収

21 a. 血中濃度推移

22 SD ラット（一群雌雄各 3~4 匹）に、 ^{14}C -メタラキシル M 又は ^{14}C -メタラキ
 23 シルを 1 mg/kg 体重（以下[1. (1)]において「低用量」という。）若しくは 100 mg/kg
 24 体重（以下[1. (1)]において「高用量」という。）で単回経口投与して、血中濃
 25 度推移について検討された。

26 薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

27 全血中放射能は、 ^{14}C -メタラキシル高用量群の雌を除き、投与後 0.5~1.0 時間
 28 で C_{max} に達した。その後、急速に減少し、 $T_{1/2}$ は全ての群で 8.5~13.7 時間であ
 29 った。（参照 19）

30 表 1 薬物動態学的パラメータ

投与量 (mg/kg 体重)	^{14}C -メタラキシル M				^{14}C -メタラキシル			
	1		100		1		100	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
T_{max} (hr)	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	4.0
C_{max} ($\mu\text{g/g}$)	0.07	0.21	25.6	16.8	0.08	0.23	17.8	28.1
$T_{1/2}$ (hr)	13.7	11.5	10.6	10.4	12.4	9.4	10.7	8.5
AUC_{0-48} ($\mu\text{g}\cdot\text{hr/g}$)	0.9	1.4	119	133	0.9	1.5	82.6	268

31 b. 吸収率

32 排泄試験 [1. (1)④] で得られた尿中排泄率及び組織中残存率の合計から、メ
 33 タラキシル M 及びメタラキシルの吸収率は、それぞれ少なくとも 38.0%及び
 34 48.4%と算出された。（参照 19）

35 ② 分布

36 SD ラット（一群雌雄各 3~4 匹）に、 ^{14}C -メタラキシル M 又は ^{14}C -メタラキ
 37 シルを低用量若しくは高用量で単回経口投与して、投与 168 時間後における体内
 38 分布試験が実施された。

1 低用量群における体内分布は両化合物で差がなく、血液より高い濃度を示した
2 のは雌雄の肝臓（0.004～0.009 µg/g）及び雌の肺（0.009～0.010 µg/g）であっ
3 た。体内における総残留放射能は0.16%TAR～0.55%TARであった。

4 高用量群で血液より高い濃度を示したのは、¹⁴C-メタラキシル M では雌雄とも
5 肝臓（0.456～0.562 µg/g）のみ、¹⁴C-メタラキシルでは雌雄とも肝臓（0.307～
6 0.743 µg/g）及び脂肪（0.246～0.286 µg/g）であった。低用量群と比較すると、
7 脂肪以外の組織では、投与量の増加（100倍）と同じ割合で残留放射能の増加が
8 認められたが、脂肪では雄及び雌でそれぞれ166及び122倍高くなった。体内
9 における総残留放射能は0.17%TAR～0.43%TARであった。（参照19）

11 ③ 代謝

12 SDラット（一群雌雄各3～4匹）に、¹⁴C-メタラキシル M 又は¹⁴C-メタラキ
13 シルを低用量若しくは高用量で単回経口投与して、投与168時間後の代謝物同
14 定・定量試験が実施された。

15 ¹⁴C-メタラキシル M 及び¹⁴C-メタラキシル投与群で代謝物の種類に差は認め
16 られず、尿中で16種類、糞中で13種類の代謝物が認められた。未変化のメタラ
17 キシル M 又はメタラキシルは、尿中で0.3%TAR～1.3%TAR認められたが、糞
18 中では認められなかった。（参照19）

20 ④ 排泄

21 SDラット（一群雌雄各3～4匹）に、¹⁴C-メタラキシル M 又は¹⁴C-メタラキ
22 シルを低用量若しくは高用量で単回経口投与して、排泄試験が実施された。

23 投与後168時間の糞及び尿中排泄率並びに組織中残存率は表2に示されている。

24 ¹⁴C-メタラキシル M 及び¹⁴C-メタラキシルともに急速に排泄され、投与後72
25 時間以内に90%TAR以上が排泄された。投与後168時間の糞中に32.9%TAR～
26 59.0%TAR、尿中に37.8%TAR～63.3%TARが排泄されたが、雌では雄に比べて
27 尿中排泄が僅かに高かった。（参照19）

29 表2 投与後168時間の糞及び尿中排泄率並びに組織中残存率（%TAR）

投与量 (mg/kg 体重)		¹⁴ C-メタラキシル M				¹⁴ C-メタラキシル			
		1		100		1		100	
性別		雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
投与後 168時間	糞	48.5	36.7	59.0	49.7	50.3	32.9	52.1	36.5
	尿*	50.9	63.3	37.8	48.0	48.2	63.3	49.0	60.7
	組織	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4

30 *：尿の値はケージ洗浄液を含む。

32 (2) ラット（メタラキシル）

33 ① 吸収

1 胆汁中排泄及び腸肝循環試験 [1. (2)④b.] の結果から、投与後 24 時間における
2 吸収率は 69%~95%と推定された。（参照 19、20）

3 4 ② 分布

5 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に、¹⁴C-メタラキシルを 1.0 mg/kg 体重（以下
6 [1. (2)]において「低用量」という。）若しくは 200 mg/kg 体重（以下[1. (2)]
7 において「高用量」という。）で単回経口投与又は低用量で単回静脈内投与若し
8 くは非標識体を低用量で 14 日間反復経口投与後、標識体を低用量で単回経口投
9 与（以下[1. (2)]において「反復投与」という。）して、体内分布試験が実施さ
10 れた。

11 主要組織における放射能濃度は、低用量投与群では腸管（0.018~0.045 µg/g）
12 及び肝臓（0.0037~0.010 µg/g）で比較的高く、いずれの投与方法でも差は認め
13 られなかった。高用量投与群でも、同じく腸管（2.67~3.53 µg/g）及び肝臓（0.64
14 ~0.98 µg/g）で高かった。いずれの投与量でも性差は認められず、投与 7 日後に
15 組織から回収された放射能は 1%TAR 未満であった。赤血球及び血漿中の放射能
16 濃度は低かった。（参照 19、20）

17 18 ③ 代謝

19 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に、¹⁴C-メタラキシルを低用量若しくは高用量
20 で単回経口投与又は低用量で単回静脈内投与若しくは反復経口投与して、投与後
21 4~36 時間の尿及び投与後 24~72 時間の糞を用いて、代謝物同定・定量試験が
22 実施された。

23 尿中の代謝物パターンは、性別、投与方法又は投与量による差は認められな
24 かった。未変化のメタラキシルは、雄では 0.1%TAR 未満、雌では 1.8%TAR 以下
25 であった。主要代謝物は D であり、雄で 3.2%TAR~6.1%TAR、雌で 10.3%TAR
26 ~20.3%TAR であった。ほかに、代謝物 B、C1、E、F、I、L、M 及び N がい
27 ずれも 5.7%TAR 以下で認められた。また、これら代謝物の抱合体（未同定代謝
28 物の抱合体を含む。）が 16.2%TAR~32.2%TAR 認められ、多くはグルクロン酸
29 抱合体又は硫酸抱合体であった。

30 糞中の代謝物パターンは尿と同様であった。未変化のメタラキシルは
31 0.2%TAR~0.8%TAR であり、主要代謝物として D 及び I が含量で 7.1%TAR~
32 11.0%TAR 認められた。他の代謝物は 4.9%TAR 以下、抱合体は 3.6%TAR~
33 17.8%TAR であった。

34 ラットにおけるメタラキシルの主要代謝経路は、①フェニル基の水酸化による
35 代謝物 B の生成、②フェニル基に結合したメチル基の酸化による代謝物 E の生
36 成、③O-脱メチル化による代謝物 C1 の生成とそれに続くメトキシアセチル基の
37 酸化による代謝物 D の生成、さらに、N-脱アルキル化による代謝物 L の生成、
38 ④その後のグルクロン酸抱合又は硫酸抱合であると考えられた。（参照 19、20）

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄試験

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に、¹⁴C-メタラキシルを低用量若しくは高用量で単回経口投与又は低用量で単回静脈内投与若しくは反復経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与放射能は、全投与群において投与後 48 時間以内に 89%TAR 以上、投与 7 日以内に 95%TAR 以上が排泄された。雄では主に糞中に排泄され、投与後 7 日に 54.2%TAR～63.6%TAR が糞中に、32.0%TAR～46.7%TAR が尿中に排泄された。雌では主に尿中に排泄され、投与後 7 日に 65.6%TAR～74.1%TAR が尿中に、31.3%TAR～35.7%TAR が糞中に排泄された。静脈内投与と経口投与で同程度の放射能が尿中に排泄されたことから、投与量のほぼ全量が吸収されたものと考えられた。また、静脈内投与でも糞中への排泄率が高いことから、胆汁を介して糞中へ排泄されることが示唆された。（参照 19、20）

b. 胆汁中排泄及び腸肝循環試験

胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雌雄各 3～5 匹）に、¹⁴C-メタラキシルを 2 若しくは 80 mg/kg 体重で単回経口投与又は 2 mg/kg 体重で単回静脈内投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

胆汁中排泄率は表 3 に示されている。

いずれの投与群でも、投与初期に性差が認められ、特に 80 mg/kg 体重投与群で顕著であった。経口投与後 24 時間の尿中排泄率は、2 mg/kg 体重投与群の雄で 24.4%TAR、雌で 29.1%TAR、80 mg/kg 体重投与群の雄で 22.3%TAR、雌で 14.3%TAR であった。

表 3 胆汁中排泄率 (%TAR)

投与量 (mg/kg 体重)	¹⁴ C-メタラキシル					
	経口投与				静脈内投与	
	2		80		2	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
投与後 10 分	—	—	—	—	30.2	9.1
投与後 5 時間	64.9	58.8	42.9	22.8	90.7	91.2
投与後 24 時間	71.0	65.8	69.4	54.5	—	—

—：試料なし

また、80 mg/kg 体重投与群の雄の投与後 6 時間までの胆汁を 0.4 mL（メタラキシルとして 1.39 mg）採取し、胆管カニューレを施した別の SD ラット（雌雄各 3 匹）の十二指腸内に投与して、腸肝循環試験が実施された。

雄では投与後 1 及び 24 時間にそれぞれ 0.9%TAR 及び 46.2%TAR、雌ではそ

1 それぞれ0.8%TAR及び18.7%TARが胆汁中に排泄され、腸肝循環が示唆された。
2 なお、尿中排泄率は雄で9.1%TAR、雌で6.3%TARであった。（参照19、20）

3 4 (3) ラット（メタラキシルM）

5 Wistar Hannover ラット（雌3匹）に、¹⁴C-メタラキシルMを2.0 mg/kg 体
6 重/日の用量で14日間反復経口投与して、体内分布試験が実施された。

7 全血、血漿及び組織中の放射能濃度は、投与開始10日の24時間後又は最終投
8 与24時間後に最高値となり、肝臓(0.625 µg/g)、腎臓(0.432 µg/g)、肺(0.232
9 µg/g)及び全血(0.172 µg/g)の順に高かった。他の組織における最高値は0.040
10 ~0.129 µg/gであった。最終投与後から放射能濃度は減少し、最終投与56日後
11 には肺(0.014 µg/g)、脾臓(0.009 µg/g)、肝臓(0.008 µg/g)、腎臓(0.006 µg/g)
12 及び心臓(0.003 µg/g)を除く全ての組織で検出限界未満となった。最終投与後
13 77日までの全期間を通して、全血中濃度は血漿中濃度より高かった。メタラキ
14 シルMの半減期は全血中で7.41日、血漿中で1.03日、組織中で1.84日(卵巣)
15 ~37.4日(肺)と算出された。（参照28、30）

16 17 (4) ヤギ（メタラキシル）

18 ① 分布

19 泌乳ヤギ（アルパイン種、2頭）に、¹⁴C-メタラキシルを150 mg/頭/日（76.9
20 mg/kg 飼料相当）で1日1回、4日間カプセル経口投与して、動物体内運命試験
21 が実施された。尿及び糞は毎日、乳汁は毎日2回、全血並びに臓器及び組織は最
22 終投与6時間後にと殺して採取された。

23 4日間反復経口投与後の各試料中の放射能分布は表4に示されている。

24 尿、糞、乳汁、全血並びに臓器及び組織中から80.7%TARの放射能が回収さ
25 れた。投与放射能の大部分が尿中へ排泄され、乳汁中の放射能は4日間の合計で
26 0.10%TARであり、反復投与による蓄積性は認められなかった。（参照28、29、
27 31、32）

28
29 表4 4日間反復経口投与後の各試料中の放射能分布

試料	%TAR	µg/g
尿	66.6	—
糞	9.26	—
乳汁	0.10	—
全血	0.16	0.341 ^a
胃及び消化管内容物	3.78	—
筋肉(肢)	0.28	0.106 ^a
筋肉(腰)	0.25	0.094 ^a
肝臓	0.20	1.64

胃	0.04	0.291
腎臓	0.03	1.68
大網脂肪	0.03	0.123 ^a
胆嚢	<0.01	0.656
腎周囲脂肪	<0.01	0.251
心臓	<0.01	0.174
合計	80.7	—

a：各組織の総重量は全血、筋肉（腰及び肢）及び大網脂肪がそれぞれ体重の40%、40%、4%及び7.3%と推定し算出した。

—：算出せず

② 代謝

分布試験[1. (4)①]において得られた尿、乳汁、臓器及び組織を用いて、代謝物同定・定量試験が実施された。

各試料中の代謝物は表5に示されている。

未変化のメタラキシルは尿、乳汁並びに臓器及び組織のいずれにおいても検出されなかった。主な代謝物は乳汁ではHの脂肪酸(C10)抱合体、尿並びに臓器及び組織ではDであった。ほかに、尿では代謝物Eの異性体(b)、腎臓では代謝物Eの異性体(a及びb)、筋肉(肢)では代謝物C1が10%TRRを超えて認められた。なお、尿中の代謝物D及びEの異性体(a及びb)は、主にグルクロン酸抱合体として認められた。(参照28、29、31、32)

表5 各試料中の代謝物 (%TRR)

標識体	試料	メタラキシル	代謝物
14C-メタラキシル	乳汁	ND	Hの脂肪酸(C10)抱合体(55.9)*、B+L(8.7)、Hの脂肪酸(C8)抱合体(8.2)、D(4.6)、H(4.3)、Eの異性体b(3.8)、Eの異性体a(2.3)、Hの脂肪酸抱合体(1.6)、C1(0.4)、未同定代謝物(2.3)
	尿	ND	D(42.8)、Eの異性体b(19.3)、Eの異性体a(8.7)、H(3.9)、B+L(1.7)、C(1.6)、未同定代謝物(9.6)
	肝臓	ND	D(13.5)、B+L(5.1)、Eの異性体b(4.5)、Eの異性体a(3.5)、H(1.8)、C1(1.6)、未同定代謝物(3.9)
	腎臓	ND	D(31.5)、Eの異性体b(22.5)、Eの異性体a(11.7)、H(3.4)、B(2.7)、C1(0.7)、L(0.7)、未同定代謝物(6.1)
	筋肉(肢)	ND	D(18.4)、C1(10.9)、H(8.7)、L(8.3)、Eの異性体b(8.2)、B(5.4)、Eの異性体a(3.9)、未同定代謝物(3.8)
	筋肉(腰)	ND	D(17.4)、B+L(17.0)、C1(9.1)、H(6.4)、Eの異性体b(5.6)、Eの異性体a(3.9)、未同定代謝物(7.5)
	腎周囲脂肪	ND	D(20.5)、H(9.1)、Eの異性体b(7.0)、Eの異性体a(4.6)、L(4.0)、B(2.4)、C1(2.1)、未同定代謝物(9.0)

ND：検出されず

*：異性体を含む。

1 (5) ニワトリ（メタラキシル）

2 ① 分布

3 産卵鶏（レグホン種、第1試験：5羽、第2試験：4羽）に、¹⁴C-メタラキシ
4 ルを6 mg/kg 体重/日（100 mg/kg 飼料相当）で1日1回、4日間経口投与（第1
5 試験）又は6.9 mg/kg 体重/日（100 mg/kg 飼料相当）で1日1回、5日間経口投
6 与（第2試験）して、動物体内運命試験が実施された。排泄物及び卵は毎日、臓
7 器及び組織は最終投与6時間後にと殺して採取された。

8 4日間反復経口投与後の各試料中の放射能分布は表6に示されている。

9 排泄物、卵白、卵黄並びに臓器及び組織中から92.0% TARの放射能が回収さ
10 れた。投与放射能の大部分が排泄され、卵白及び卵黄中の放射能は4日間の合計
11 で0.06% TARであり、反復投与による蓄積性は認められなかった。（参照28、
12 29、33、34）

13
14 表6 4日間反復経口投与後の各試料中の放射能分布（第1試験）

試料	%TAR ^a	µg/g
排泄物	91.0	—
卵白	0.04	0.632
卵黄	0.02	0.424
後肢筋	0.31	0.674 ^a
胸筋	0.25	0.554 ^a
肝臓	0.14	1.39
砂囊	0.08	1.42
皮膚及び脂肪	0.05	0.318 ^a
腎臓	0.04	1.47
脂肪(腹膜部)	0.02	0.254 ^a
心臓	0.01	0.568
合計	92.0	—

15 ^a：各組織の総重量は筋肉（後肢筋及び胸筋）、皮膚・脂肪及び脂肪（腹膜部）
16 が23.3%、皮膚・脂肪が8.0%及び脂肪（腹膜部）が3.5%と推定し算出した。
17 —：算出せず

18
19 ② 代謝

20 分布試験 [1. (5)①] において得られた排泄物、卵白、卵黄並びに臓器及び組
21 織を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

22 各試料中の代謝物は表7及び表8に示されている。

23 第1試験では、未変化のメタラキシルは砂囊で18.6% TRR認められた。代謝
24 物として排泄物及び筋肉（胸）ではC1、卵黄ではE、肝臓、砂囊及び腹膜部脂
25 肪ではD、砂囊、腎臓及び筋肉（肢）ではM+Q+Rが10% TRRを超えて認めら
26 れた。

27 第2試験では、未変化のメタラキシルは卵白で7.00% TRR及び卵黄で

2.68%TRR 認められたが、筋肉（肢）及び腹膜部脂肪では検出されなかった。代謝物は卵白、卵黄及び肢筋のいずれにおいても代謝物 P の異性体 a 及び b が、ほかに卵黄及び腹膜部脂肪で代謝物 D が、筋肉（肢）で代謝物 E の硫酸抱合体が 10%TRR を超えて認められた。（参照 28、29、33、34）

表7 各試料中の代謝物（第1試験）（%TRR）

標識体	投与量 (mg/kg 体重/日)	試料	メタラ キシル	代謝物
¹⁴ C-メタ ラキシル	6	排泄物	3.5	C1(10.0)、D(8.0)、H(5.8)、E(3.6)、I(2.3)、M+Q+R(1.3)、J+未同定代謝物(7.4)、未同定代謝物(55.2)
		卵白	4.9	E(4.4)、C1(1.7)、J+M+Q+R+未同定代謝物(24.8)、未同定代謝物(6.4)
		卵黄	7.9	E(22.2)、未同定代謝物(8.9)
		肝臓	1.3	D(17.1)、M+Q+R(3.5)、E(1.0)、H(0.7)、C1(0.4)、J+未同定代謝物(12.0)、未同定代謝物(1.7)
		砂嚢	18.6	M+Q+R(21.7)、D(11.0)、H(2.1)、I(1.0)、C1(0.8)、E(0.4)、J+未同定代謝物(7.8)、未同定代謝物(22.1)
		腎臓	ND	M+Q+R(11.5)、J(10.0)、D(5.1)、H(1.3)、I(0.7)、C1(0.4)、未同定代謝物(7.6)
		心臓	ND	M+Q+R(4.8)、D(2.1)、E(1.2)、J+未同定代謝物(10.9)、未同定代謝物(6.8)
		筋肉 (胸)	0.4	C1(15.1)、M+Q+R(3.5)、E(2.0)、J+未同定代謝物(17.8)、未同定代謝物(55.4)
		筋肉 (肢)	ND	M+Q+R(43.8)、C1(3.0)、E(0.6)、J+未同定代謝物(21.6)、未同定代謝物(23.9)
		皮膚及 び脂肪	ND	M+Q+R(7.6)、J+未同定代謝物(8.7)、未同定代謝物(67.3)
腹膜部 脂肪	ND	D(49.8)、C1(8.0)、M+Q+R(0.6)、J+未同定代謝物(0.6)、未同定代謝物(16.6)		

ND：検出されず

表8 各試料中の代謝物（第2試験）（%TRR）

標識体	投与量 (mg/kg 体重/日)	試料	メタラ キシル	代謝物
¹⁴ C-メタ ラキシル	6.9	卵白	7.00	P の異性体 a(17.8)、P の異性体 b(13.2)、E の硫酸抱合体(7.75)、F(6.20)、E の異性体 b(5.42)、E の異性体 a(3.87)、未同定代謝物(13.2)
		卵黄	2.68	D(14.5)、P の異性体 a(10.6)、P の異性体 b(9.57)、E の硫酸抱合体(4.10)、E の異性体 b(4.02)、P の異性体 a+b(3.62)、I(2.01)、H のグルクロン酸抱合体(1.72)、F(1.34)、E の異性体 a(0.67)

	筋肉 (肢)	<0.01	Pの異性体 a(37.3)、Eの硫酸抱合体(29.9)、Pの異性体 b(9.13)、未同定代謝物(2.5)
	腹膜部 脂肪	<0.01	D(40.3)、Pの異性体 a+b(26.9)、Eの硫酸抱合体(8.23)、Pの異性体 a(5.31)、Pの異性体 b(1.77)、Hのグルクロン酸抱合体(0.89)、未同定代謝物(0.89)

Pの異性体 a+b：代謝物 Pの異性体 a 及び異性体 bの混合物

ヤギ及びニワトリにおけるメタラキシルの主要代謝経路は、ラットにおける代謝経路と類似していると考えられた。

【上路専門参考人より】

代謝物（分解物）C について：C1 はメタラキシルを用いた試験のみ、C2 はメタラキシル M の試験のみで確認された代謝物（分解物）とされています。このことから、評価書中の C1 及び C2 の記載を見直してみました。気になる C1 及び C2 の部分に波線を付けましたが、他の箇所も含めて確認いただきたいと思います。

【與語専門委員より】

メタラキシルはラセミ体（D：L=1：1）、メタラキシル M は D 体なので、メタラキシル M の場合は、体内で異性化が起らなければ代謝物 C2 のみ。少なくとも植物においては、鏡像異性体比は試験期間を通して安定とあるので、上記の可能性が高い。具体的には、代謝物 C1 については、メタラキシルを用いた動物（ヤギ、ニワトリ）体内運命試験で 10%TRR 超、メタラキシル又はメタラキシル M を用いた植物体内運命試験で 10%TRR 超とある。代謝物 C2 については、評価書では、レタスにおける両者の代謝比較試験の表 9 で示されている。このメタラキシル M の分析対象は「代謝物 C2」とすべき。

土壤中運命試験においても、C1 と C2 を区別して記載しており、28 頁の 8 行目と 29 頁の 12 行目に、C1（ラセミ体）とあるが、この「C1」がラセミ体であることを早めに明記した方がよい。

水中光分解試験の「④メタラキシル（自然水）」において、「メタラキシル及び C1 の鏡像異性体比」とあるので、ここでは「C1」をラセミ体扱いしている。

さらに、異性体が表示されているのは C から P への代謝のみで、他の代謝系には異性体は示されていない。それは、他の代謝においもて、D 又は L のいずれかに異性化することは考えにくいので、区別せずに測定していると思われる。

2. 植物体内運命試験

(1) 水稻（メタラキシル M）

¹⁴C-メタラキシル M 3.77 mg を混和した土壤に、水稻（品種：コシヒカリ）の種子を土壤混和 2 日後に播種した。さらに播種 4 日後に 3.35 mg の用量で灌注処理し、土壤混和 21 日後（移植時）、55 日後（出穂前）、97 日後（出穂後）及び 147 日後（収穫期）に根部、茎葉部及び穂を採取して、植物体内運命試験が実施された。

残留放射能は、移植時には根部で 0.223 mg/kg、茎葉部で 0.395 mg/kg 認められたが、経時的に減少し、出穂後及び収穫期の各部位では 0.0004～0.003 mg/kg であった。収穫期玄米中の残留放射能は 0.0008 mg/kg であった。移植時及び出

1 穂前の茎葉部及び根部における主要成分は未変化のメタラキシル M で、茎葉部
 2 で 48.1%TRR～55.0%TRR、根部で 8.78%TRR～79.8%TRR 認められた。代謝
 3 物として、茎葉部では移植時に C1 及び D（合計 13.6%TRR）及び出穂前に C1
 4 （23.3%TRR）が認められた。根部では同定された代謝物は認められなかった。
 5 （参照 19）

7 **（2）水稻（メタラキシル）**

8 ¹⁴C-メタラキシル約 1.26 mg 及びヒドロキシイソキサゾール 9.6 mg を処理し
 9 た 120 mL の土壤に、発芽した水稻（品種：日本晴）の種子を約 130 粒播種した
 10 後、処理 3 及び 5 週後に稲苗を採取して、植物体内運命試験が実施された。

11 処理された放射能の水稻体内への吸収は、処理 3 週後で 3.2%TRR、処理 5 週
 12 後で 12.7%TRR であった。

13 茎葉部では、処理 3 週後の総残留放射能濃度は 4.68 mg/kg であり、うち未変
 14 化のメタラキシルが 51.9%TRR（2.43 mg/kg）であった。代謝物として C1、E、
 15 F、I 及び J が 0.5%TRR～7.0%TRR 認められた。処理 5 週後では、総残留放射
 16 能濃度は 12.2 mg/kg であり、うちメタラキシルが 56.7%TRR（6.90 mg/kg）で
 17 あった。代謝物の種類は処理 3 週後と同じであり、E が 12.3%TRR、ほかはそれ
 18 ぞれ 0.8%TRR～6.0%TRR 認められた。いずれの時点でも、未変化のメタラキシ
 19 ルは遊離体として認められ、代謝物は遊離体又は抱合体として認められた。

20 根部については、総残留放射能濃度は処理 3 及び 5 週後でそれぞれ 1.07 及び
 21 0.62 mg/kg であり、代謝物は分析されなかった。（参照 20）

23 **（3）レタス（メタラキシル M 及びメタラキシルの代謝比較試験）**

24 レタス（品種：Sunny）に、¹⁴C-メタラキシル M 又は ¹⁴C-メタラキシルを 10
 25 日間隔で 3 回（1 回目は定植 8 日後）、各 200 g ai/ha の用量で散布処理（総処
 26 理量：600 g ai/ha）して、植物体内運命試験が実施された。

27 各試料における鏡像異性体比は表 9 に示されている。

28 メタラキシル M 処理区における鏡像異性体比は、レタス及び土壤中ともに試
 29 験期間を通して安定であった。一方、メタラキシル処理区については、鏡像異性
 30 体比はレタス中ではほぼ一定であったが、L 体の方が D 体よりも若干多く存在し
 31 ていた。土壤中では、鏡像異性体比に変化が認められ、D 体の分解速度が L 体に
 32 比べて速く、それに伴って、代謝物 C1（ラセミ体）の鏡像異性体比に変化が認
 33 められ、L 体の比率が高くなった。 與語専門委員コメントに基づき事務局修正

35 表 9 各試料における鏡像異性体比

36 上路専門参考人、與語専門委員コメントに基づき事務局修正

試料	処理化合物	分析対象	鏡像異性体比（D：L）
----	-------	------	-------------

			処理 1 時間後	処理 14 日後	処理 21 日後
レタス 結球部	メタラキシル M	メタラキシル M	99.5 : 0.5	99.0 : 1.0	97.7 : 2.3
	メタラキシル	メタラキシル	48.6 : 51.4	39.0 : 61.0	46.2 : 53.8
土壌層 0~10 cm	メタラキシル M	メタラキシル M	94.5 : 5.5	—	93.0 : 7.0
		代謝物 C1 C2	96.8 : 3.2	—	96.7 : 3.3
	メタラキシル	メタラキシル	16.4 : 83.6	—	14.0 : 86.0
		代謝物 C1	71.6 : 28.4	—	64.0 : 36.0

1 - : 分析せず

2
3 レタスにおける総残留放射能濃度は表 10 に示されている。

4 総残留放射能濃度は、両処理区でほとんど差が認められなかった。また、放射
5 能の抽出率についても差はなく、いずれも 96%TRR 以上であった。さらに、メ
6 タラキシル M 及びメタラキシルの代謝物の数及び種類は同じであり、主に代謝
7 物 C1(C2 : C1 の D-鏡像異性体)、E 及び E の抱合体が認められた。上路専門参
8 考人及び與語専門委員コメントに基づき事務局追記

9 以上より、メタラキシル M 及びメタラキシルの植物体における代謝経路は同
10 等であると考えられた。(参照 19)

11
12 表 10 レタスにおける総残留放射能濃度 (mg/kg)

処理化合物	処理 1 時間後	処理 14 日後	処理 21 日後
メタラキシル M	8.73	2.44	0.615
メタラキシル	7.22	1.83	1.07

13
14 (4) レタス (メタラキシル)

15 温室栽培のレタス (品種 : Suzanne) に、¹⁴C-メタラキシルを 2 週間隔で 2 回、
16 各 250 g ai/ha の用量で散布処理 (総処理量 : 500 g ai/ha) して、植物体内運命
17 試験が実施された。

18 最終散布 2 週間後に採取されたレタスの総残留放射能濃度は 5.47 mg/kg であ
19 った。このうち、未変化のメタラキシルは 18.6%TRR (1.02 mg/kg) であった。
20 主要代謝物は D 及び E であり、それぞれ抱合体も含めて 10.1%TRR 及び
21 22.1%TRR であった。ほかに、代謝物 B、C1、H、I 及び L が 1.2%TRR~8.9%TRR
22 認められ、抽出残渣は 23.6%TRR であった。(参照 19、20)

23
24 (5) ぶどう (メタラキシル)

25 ぶどう (品種 : Riesling 種及び Sylvaner 種) に、¹⁴C-メタラキシルを 2 週間
26 隔で 6 回、総処理量 0.366 g ai/株となるように散布処理し、最終処理 68 日後に
27 果実 (果汁及び搾りかす) 及び葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

28 ぶどう各試料における放射能分布は表 11 に示されている。

29 いずれの試料からも、未変化のメタラキシルが 7.8%TRR~56.3%TRR 認めら

れた。代謝物として B、C1、D 及び E が検出され、それらの抱合体も認められた。主要代謝物は E であった。（参照 19、20）

表 11 ぶどう各試料における放射能分布

試料	総残留放射能濃度	メタラキシル (%TRR)	代謝物 (%TRR*)
果実	1.4 mg/kg	64.1 (0.90 mg/kg)	E(20.4)、B(4.3)、C1+D(1.8)
(果汁)	0.9 mg/kg	7.8 (0.07 mg/kg)	E(7.0)、B(1.7)、C1+D(1.0)
(搾りかす)	1.7 mg/kg	56.3 (0.96 mg/kg)	E(13.4)、B(2.6)、C1+D(0.8)
葉	19.8 mg/kg	22.4 (4.44 mg/kg)	E(55.4)、B(13.0)、C1+D(5.0)

*：いずれの代謝物についても抱合体を含む値

(6) ばれいしょ（メタラキシル）

ばれいしょ（品種：Green Mountain）に、¹⁴C-メタラキシルを 1,280 g ai/ha の用量で、2 週間隔で 6 回（総処理量 7,680 g ai/ha）（1 回目は移植 6 週間後）茎葉処理し、初回処理 24 時間後に葉部並びに最終処理 1 週間後に葉部及び塊茎を採取して、植物体内運命試験が実施された。

ばれいしょ各試料における放射能分布は表 12 に示されている。

葉部では、メタラキシルは速やかに代謝され、最終処理 1 週間後には未変化のメタラキシルは 2.2%TRR であった。代謝物として、メタラキシルの加水分解又は酸化により生成した B、D 及び E 並びにそれらと糖との抱合体が生成していた。

塊茎中の総残留放射能は、葉部と比較して非常に低く、51.0%TRR が未変化のメタラキシルであり、代謝物として葉部と同じく B、D 及び E 並びにそれらと糖との抱合体が生成していた。（参照 19、20）

表 12 ばれいしょ各試料における放射能分布

採取時期	処理量 (kg ai/ha)	試料	総残留放射能濃度	メタラキシル (%TRR)	代謝物 (%TRR*)
初回処理 24 時間後	1.28	葉部	3.7 mg/kg	19.8 (0.73 mg/kg)	E(27.2)、B(8.9)、 D(2.6)、I(<0.2)
最終処理 1 週間後	7.68	葉部	31.9 mg/kg	2.2 (0.70 mg/kg)	E(50.6)、B(2.7)、 D(1.9)、I(<0.2)
		塊茎	0.5 mg/kg	51.0 (0.26 mg/kg)	E(11.2)、D(2.0)、B(1.4)、 I(<0.2)、J(<0.2)

*：いずれの代謝物についても抱合体を含む値

(7) たばこ（メタラキシル）

¹⁴C-メタラキシルをブライトタバコ（品種：Coker319）に 280 若しくは 560 g ai/ha の用量で移植時に植穴処理又はバーレータバコ（品種：MS21XKY10）に、672 g ai/ha の用量で移植前に土壌混和処理して、植物体内運命試験が実施された。

1 各試料における総残留放射能濃度は表13に示されている。
 2 未変化のメタラキシルは、処理12週後までの試料中でいずれも26.9%TRR～
 3 64.7%TRRを占めた。ほかに、酸化により生成した少量の代謝物C1（乾燥前重
 4 量で1.5%TRR以下）が同定され、多くの極性又は非極性代謝物も認められた。
 5 たばこの品種、処理法及び処理量にかかわらず、代謝パターンはほぼ同様であっ
 6 た。（参照19、20）

7
 8 表13 各試料における総残留放射能濃度 (mg/kg)

処理量 (g ai/ha)	処理3週後	処理6週後	処理12週後 (乾燥下葉)	最終採取 (乾燥上葉)
280	35.3	15.2	69.3	36.6 (処理20週後)
560	73.9	32.6	148	93.7 (処理19週後)
672	23.4	31.3	162	80.2 (処理16週後)

9
 10 (8) トマト (メタラキシルM)

11 温室栽培のトマト（品種：Bush Beefstreak）に、¹⁴C-メタラキシルMを7日
 12 間隔で3回、各160 g ai/haの用量で散布処理し、最終処理3及び14日後に成
 13 熟果実及び葉部を採取して、植物体内運命試験が実施された。

14 トマト各試料における放射能分布は表14に示されている。

15 成熟果実では65.7%TRR～66.5%TRRの残留放射能が果汁中に認められた。い
 16 ずれの試料においても主な成分は未変化のメタラキシルMであり、成熟果実で
 17 76.5%TRR～87.9%TRR、葉部で51.4%TRR認められた。10%TRRを超える代
 18 謝物は認められなかった。（参照28、35）

19
 20 表14 トマト各試料における放射能分布 (mg/kg)

採取時期	分析部位	果汁	搾りかす又は葉部		総残留 放射能	メタラキ シルM (%TRR)	代謝物 (%TRR)
			抽出性 放射能	非抽出性 放射能			
最終処理 3日後	成熟果実	0.051 (65.7)	0.026 (33.0)	0.001 (1.3)	0.078	87.9	未同定代謝物(10.8) ^a
	葉部	/	1.65 (96.1)	0.067 (3.9)	1.72	51.4	E(9.1)、L(0.5)、B(0.4)、C1(0.3)、 S(0.3)、未同定代謝物(33.5) ^b
最終処理 14日後	成熟果実	0.017 (66.5)	0.008 (32.2)	0.0003 (1.3)	0.025	76.5	未同定代謝物(22.2) ^c

21 ()内は%TRR

22 / : 分析せず

23 ^a : 少なくとも7種の画分からなり、各画分は2.9%TRR未満であった。

24 ^b : 少なくとも30種の画分からなり、各画分は4.3%TRR未満であった。

25 ^c : 少なくとも11種の画分からなり、各画分は6.0%TRR未満であった。

26
 27 メタラキシル及びメタラキシルMの植物体内における主な代謝経路は、①フ
 28 ェニル基の水酸化による代謝物Bの生成、②フェニル基に結合したメチル基の酸

1 化による代謝物 E の生成、③メチルエステルの加水分解による代謝物 C1(C2)の
 2 生成とそれに続くメトキシアセチル基の酸化による代謝物 D の生成、④生成した
 3 代謝物と糖との抱合体形成であると考えられた。 上路専門参考人修正

5 3. 土壌中運命試験

6 (1) 好氣的湛水土壌中運命試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）

7 シルト質埴土〔河川底及び池底より採取（スイス）〕に、¹⁴C-メタラキシル M
 8 及び ¹⁴C-メタラキシルを 0.1 g ai/ha となるように処理し、水深約 6 cm の湛水条
 9 件下、20±2℃の暗所で最長 212 日間インキュベートして、好氣的湛水土壌中運
 10 命試験が実施された。試験設計は表 15 に示されている。

11 表 15 好氣的湛水土壌中運命試験の試験設計

試験系	供試土壌	供試水	標識体
①	河川底質 (シルト質埴土、スイス)	河川水 (スイス、ライン川)	¹⁴ C-メタラキシル M
②	池底質 (シルト質埴土、スイス)	池水 (スイス)	¹⁴ C-メタラキシル M
③	河川底質 (シルト質埴土、スイス)	河川水 (スイス、ライン川)	¹⁴ C-メタラキシル
④	池底質 (シルト質埴土、スイス)	池水 (スイス)	¹⁴ C-メタラキシル

13 各試験系の放射能回収率は 96.6%TAR～98.4%TAR であり、¹⁴CO₂ の生成は
 14 1.2%TAR～2.9%TAR であった。各試験系における放射能分布は表 16 に示され
 15 ている。

16 ①の河川底質土壌中において、メタラキシル M の割合は、処理直後に 1.8%TAR
 17 であったが、処理 7 日後には 23.9%TAR と最大になり、試験終了時（処理 212
 18 日後）には 3.9%TAR に減少した。認められた分解物は C2 のみであり、処理直
 19 後には検出されなかったものの、経過日数とともに増加し、試験終了時には
 20 24.2%TAR に達した。

21 ②の池底質土壌中におけるメタラキシル M の割合は、処理直後は 27.0%TAR
 22 であったが、処理 7 日後には 28.8%TAR と最大になり、試験終了時には 1.3%TAR
 23 に減少した。分解物は同じく C2 であり、処理直後には 0.4%TAR であったが、処
 24 理 126 日後には 28.9%TAR と最大になった。

25 ③の河川底質土壌中では、メタラキシルは処理直後に 5.3%TAR であったが、
 26 処理 14 日後に 21.6%TAR と最大になり、試験終了時には 10.5%TAR に減少し
 27 した。認められた分解物は C1 のみであった。C1 は、処理直後には検出限界未満
 28 であったが、試験終了時には 16.2%TAR に達した。

29 ④の池底質土壌中におけるメタラキシルの割合は、処理直後に 7.5%TAR であ
 30 ったが、処理 3 日後には 22.7%TAR と最大になり、試験終了時には 3.8%TAR
 31 に減少した。分解物は同じく C1 であり、処理直後には検出限界未満であったが、
 32

1 処理126日後には19.4%TARと最大になった。

2 いずれの試験系においても、抽出残渣は底質中のフルボ酸及びフミン酸可溶成
3 分として存在又は不溶性フミンに結合していた。推定半減期（水相+底質）は、
4 河川系の①及び③ではそれぞれ44.8及び43.3日、池系の②及び④ではそれぞれ
5 22.8及び21.4日であった。

6 好氣的湛水土壤におけるメタラキシル M 及びメタラキシルの分解は、メチル
7 エステルの加水分解により進行し、それぞれ C2-(C1のD-鏡像異性体)及び C1
8 -(ラセミ体)となると考えられた。（参照19）與語専門委員コメントを踏まえ
9 事務局修文

11 表16 各試験系における放射能分布（%TAR）

試験系	処理後 日数	水相	底質	
			抽出成分	抽出残渣
①	0日	99.5	1.8	0
	212日	54.6	28.4	11.0
②	0日	71.2	27.5	0.5
	212日	50.3	23.9	26.3
③	0日	96.4	5.3	0.1
	212日	51.7	26.9	11.2
④	0日	95.4	7.5	0.2
	212日	40.3	20.1	27.2

12
13 (2) 好氣的土壤中運命試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）

14 砂壤土（米国）に、¹⁴C-メタラキシル M 及び¹⁴C-メタラキシルを1.51 mg/kg
15 となるように処理し、約25°Cの暗所下で最長160日間インキュベートして、好
16 氣的土壤中運命試験が実施された。

17 メタラキシル M 及びメタラキシルともに、好氣的土壤中徐々に分解し、いず
18 れも二相性の減衰が認められた。メタラキシル M 及びメタラキシルの推定半減
19 期は、それぞれ83.5及び66.6日であった。土壤における放射能の回収率は、
20 95.4%TAR～109%TARであった。

21 メタラキシル M 処理土壤では、メタラキシル M は処理直後に100%TARであ
22 ったが、試験終了時（処理160日後）には8.0%TARまで減少した。それに伴っ
23 て分解物 C1が生成し、試験終了時には78.0%TARと最大になった。

24 メタラキシル処理土壤においても、処理直後に95.1%TARであったメタラキ
25 シルは、試験終了時には6.8%TARまで減少した。同じく、C1が経過日数に伴
26 って増加し、処理130日後に71.8%TARと最大になった。

27 メタラキシル M 及びメタラキシルの主要分解経路は、ともにメチルエステルの
28 加水分解による C1(C2)の生成であり、メタラキシル M 及びメタラキシルの分
29 解経路は同等であると考えられた。上路専門参考人修正（参照19）

（3）好氣的、好氣的及び嫌氣的湛水並びに滅菌好氣的土壤中運命試験（メタラキシル）

壤質砂土（ドイツ）に、 ^{14}C -メタラキシルを 10 mg/kg 乾土となるように処理し、 25°C の暗所下で 360 日間インキュベートして好氣的土壤中運命試験、好氣的条件下で 30 日間インキュベート後に蒸留水で湛水し、窒素通気により嫌氣的湛水条件とし、 25°C の暗所下で合計 89 日間インキュベートして好氣的及び嫌氣的湛水土壌中運命試験並びにメタラキシル処理前に土壌を滅菌し、89 日間インキュベートして、滅菌好氣的土壤中運命試験が実施された。

好氣的土壌では、試験終了時（処理 360 日後）に残留していたメタラキシルは 2%TAR 未満であった。主要分解物はエステル結合の開裂によって生じる C1 ~~（ラセミン体）~~であり、処理 66 日後には 53.6%TAR に達したが、その後減少し、試験終了時には 23.0%TAR であった。抽出残渣及び $^{14}\text{CO}_2$ が経時的に増加し、試験終了時にはそれぞれ 38.3%TAR 及び 25.3%TAR であった。推定半減期は 40 日であった。 與語専門委員コメントに基づき事務局修文

好氣的及び嫌氣的湛水土壌では、嫌氣的湛水条件下においてメタラキシルの分解速度は低下し、試験終了時（処理 89 日後）のメタラキシルは 32.5%TAR であった。推定半減期は 68 日であった。好氣的土壌と同様、主要分解物は C1 であり、試験終了時には 52.4%TAR に達していた。抽出残渣及び $^{14}\text{CO}_2$ の増加はみられなかったことから、これらの生成は好氣的条件下に限られると考えられた。

滅菌好氣的土壌では、メタラキシルの分解はほとんど認められなかったことから、メタラキシルの分解は土壌中の微生物に依存するものと考えられた。（参照 20）

（4）好氣的土壤中運命試験（分解物 C1）

本試験は、メタラキシル M 及びメタラキシルの好氣的土壤中運命試験 [3. (2)] において、分解物 C1 の割合が試験終了時には 71.8%TAR~78.0%TAR に達し、減衰が認められなかったことから、追加試験として実施された。

^{14}C -C1 を、砂壤土（ドイツ）に 0.18 mg/kg 乾土となるように添加した後、最大容水量の約 40%の水分量に調整し、暗所下、 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ で最長 118 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

試験期間中の抽出性放射能の割合は、処理直後では 97.3%TAR であったが、試験終了時（処理 118 日後）には 28.1%TAR に減少していた。一方、非抽出性放射能の割合は、試験終了時に 43.3%TAR に達していた。また、多量の $^{14}\text{CO}_2$ の発生が認められ、試験終了時には 21.9%TAR に達した。ほかの揮発性物質の生成はごく僅かであった。

抽出性放射能中の C1 の割合は、経時的に低下し、試験終了時には 25.4%TAR であった。唯一の分解物である J は、処理 42 日後までは検出されなかったが、

1 処理64日後に2.6%TAR検出され、試験終了時までほぼ一定に保たれていた。

2 好氣的土壌におけるC1の主要分解経路は、CO₂への変換であると考えられた。
3 また、副経路として、Jを経由したCO₂への変換も考えられた。推定半減期は、
4 直接CO₂へ変化した場合には260日、J及び土壌結合残留物へ変化した場合には
5 68.5日、この両方を考慮した場合には54.2日、土壌結合残留物がさらにCO₂に
6 変化した場合には276日と算出された。（参照19）

8 (5) 土壌吸着試験（メタラキシルM及びメタラキシル）

9 ① メタラキシルM

10 メタラキシルM（非標識）を用い、4種類の国内土壌〔軽埴土（宮城及び高知）、
11 重埴土（茨城）及び砂質埴壤土（愛知）〕における土壌吸着試験が実施された。

12 Freundlichの吸着係数K^{ads}は0.679～19.2、有機炭素含有率により補正した
13 吸着係数K_{oc}は44.1～646であった。（参照19）

15 ② メタラキシル

16 メタラキシル（非標識）を用い、6種類の国内土壌〔軽埴土（宮城、茨城及び
17 高知）、火山灰土・埴壤土（北海道）、火山灰土・シルト質埴壤土（茨城）及び
18 砂質埴壤土（愛知）〕における土壌吸着試験が実施された。

19 Freundlichの吸着係数K^{ads}は0.35～16.3、有機炭素含有率により補正した吸
20 着係数K_{oc}は14～483であった。（参照20）

22 (6) 土壌吸脱着試験（メタラキシルM）

23 ¹⁴C-メタラキシルMを用い、4種類の海外土壌〔砂壤土2種類（ドイツ及びス
24 イス）及びシルト質壤土2種類（スイス）〕における土壌吸脱着試験が実施され
25 た。

26 Freundlichの吸着係数K^{ads}は0.34～0.72、有機炭素含有率により補正した吸
27 着係数K^{ads}_{oc}は30.8～40.5、脱着係数K^{des}は0.53～1.38、有機炭素含有率によ
28 り補正した脱着係数K^{des}_{oc}は38.3～121であった。（参照19）

30 4. 水中運命試験

31 (1) 加水分解試験

32 ① メタラキシルM

33 pH1（塩酸緩衝液）、pH5（酢酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）及びpH9
34 （ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に、¹⁴C-メタラキシルMを5.0mg/Lとなるよ
35 うに添加し、50℃（pH9はさらに25及び60℃）でインキュベートして、加水
36 分解試験が実施された。

37 メタラキシルMはpH1～7の緩衝液中では安定であった。pH9における推定
38 半減期は、25、50及び60℃でそれぞれ116、7.7及び2.7日であった。同定され

1 た唯一の分解物は C2 であった。25℃では、試験終了時（処理 32 日後）にメタ
 2 ラキシル M は 79.7%TAR、C2 は 16.0%TAR であった。50℃では、試験終了時
 3 （処理 15 日後）にメタラキシル M が 26.2%TAR、C2 が 69.5%TAR を占めた。
 4 60℃では、試験終了時（処理 11 日後）のメタラキシル M は 7.1%TAR、C2 は
 5 91.3%TAR であった。

6 推定分解経路は、エステル結合の加水分解による C2 の生成であると考えられ
 7 た。（参照 19）
 8

9 ② メタラキシル（i）

10 pH 5、7、9 及び 10 の各緩衝液（組成不明）に、メタラキシルを 100 mg/L と
 11 なるように添加し、30、50 及び 70℃で最長 28 日間インキュベートして、加水
 12 分解試験が実施された。

13 各試験条件下における推定半減期は表 17 に示されている。

14 メタラキシルは、酸性及びアルカリ性の高温条件で分解し、分解物として C1
 15 が生成した。30、50 及び 70℃の 3 段階の温度で速度定数を測定し、20℃におけ
 16 る推定半減期を算出した結果、pH 1～7 で 200 日超、pH 9 で 115 日、pH 10 で
 17 12 日であった。（参照 20）
 18

19 表 17 各試験条件下における推定半減期（日）

	pH 1	pH 5	pH 7	pH 9	pH 10
30℃	>200	>200	>200	36	4.2
50℃	64	>200	>200	5	0.6
70℃	13	>200	30	0.8	0.1

20 ③ メタラキシル（ii）

21 pH 5（酢酸緩衝液）、pH 7（リン酸緩衝液）及び pH 9（ホウ酸緩衝液）の各
 22 滅菌緩衝液に、¹⁴C-メタラキシルを 10 mg/L となるように添加し、25±1℃で 30
 23 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

24 pH 5 では、加水分解は認められなかった。pH 7 では僅かな分解が認められ、
 25 推定半減期は 1,000 日であった。pH 9 では加水分解が認められ、推定半減期は
 26 88 日であった。主要分解物は C1 であり、試験終了時（処理 30 日後）の生成量
 27 は pH 5、7 及び 9 でそれぞれ 1.7%TAR、2.4%TAR 及び 21.8%TAR であった。
 28 （参照 20）
 29

30 (2) 水中光分解試験

31 ① メタラキシル M（緩衝液）

32 pH 7 の滅菌リン酸緩衝液に、¹⁴C-メタラキシル M を 2.16 mg/L となるように
 33 添加し、25～26℃で 10 日間、キセノン光（光強度：49.8 及び 54.7 W/m²、測定
 34

1 波長：290 nm 未満をカット）を照射して、水中光分解試験が実施された。

2 光照射区及び暗所対照区ともに、メタラキシル M は安定であり、半減期は求
3 められなかった。極めて少量の分解物が認められ、試験終了時に平均で
4 0.22% TAR～1.8% TAR を占めていた。量的に極めて僅かであったため、特性は
5 検討されなかった。（参照 19）

7 ② メタラキシル M（蒸留水及び自然水）

8 滅菌蒸留水及び自然水（河川水、埼玉、pH 7.4）に、¹⁴C-メタラキシル M を
9 5.0 mg/L となるように添加し、25±1 及び 2°C で最長 14 日間、キセノン光（光
10 強度：36.5 W/m²、測定波長：290 nm 未満をカット又は光強度：401 W/m²、測
11 定波長：290 nm 未満をカット）を照射して、水中光分解試験が実施された。

12 滅菌蒸留水における光分解は緩慢であり、推定半減期は 207 日（東京の春期太
13 陽光換算で 971 日）であった。自然水中では比較的速やかに分解し、推定半減期
14 は 6.7 日（東京の春期太陽光換算で 31.4 日）であった。いずれにおいても分解
15 物 C1 は検出限界（0.01 µg/mL）未満であった。暗所対照区での分解は認められ
16 なかった。（参照 19）

17 ③ メタラキシル（緩衝液）

18 pH 7 の滅菌緩衝液（組成不明）に、¹⁴C-メタラキシルを 9.6 mg/L となるよう
19 に添加し、31±7.9°C で 28 日間、北緯 41 度 46 分における 6～7 月の太陽光を照
20 射（光強度：2～75 W/m²）して、水中光分解試験が実施された。

21 試験終了時において、光照射区では 83.8% TAR がメタラキシルとして存在し
22 ていた。暗所対照区でも 88.2% TAR がメタラキシルとして認められ、光分解は
23 僅かであったと考えられた。主要分解物は C1 が光照射区及び暗所対照区でそれ
24 ぞれ最大 5.4% TAR 及び 6.0% TAR 認められた。推定半減期は約 263 日（東京の
25 春期太陽光換算で約 763 日）であった。（参照 20）

26 ④ メタラキシル（自然水）

27 滅菌自然水（池水、スイス、pH 8.1）に、¹⁴C-メタラキシルを 0.647 mg/L と
28 なるように添加し、約 25°C で最長 15 日間、キセノン光（光強度：48.0 W/m²、
29 測定波長：290 nm 未満をカット）を照射して、水中光分解試験が実施された。

30 光照射区及び暗所対照区ともに、メタラキシルの分解はほとんど認められな
31 かった。同定された分解物は C1 のみであり、光照射区で最大 2.5% TAR、暗所対
32 照区で最大 3.4% TAR 認められた。¹⁴CO₂ の発生は 0.3% TAR 以下であった。

33 メタラキシル及び C1 の鏡像異性体の比は、ほぼ一定（1:1）であった。15 日
34 間の観察では、メタラキシルは滅菌自然水中で光に対して安定であり、鏡像異性
35 体の選択的な分解は観察されなかった。（参照 20）

1 **5. 土壌残留試験**

2 **(1) メタラキシル M 及びメタラキシル**

3 火山灰土・軽埴土（茨城）及び沖積土・埴壤土（高知）を用いて、メタラキシル
4 ル M、メタラキシル及び分解物 C1 を分析対象化合物とした畑地状態における土
5 壌残留試験（容器内及びほ場）が実施された。

6 結果は表 18 に示されている。（参照 19）

8 **表 18 土壌残留試験成績（推定半減期）**

試験	土壌	メタラキシル M			メタラキシル		
		濃度*	推定半減期 (日)		濃度*	推定半減期 (日)	
			メタラキシル M	メタラキシル M + C1		メタラキシル	メタラキシル + C1
容器内試験	火山灰土・軽埴土	2.5 mg/kg	約 30	約 72	5.0 mg/kg	約 23	約 55
	沖積土・埴壤土		約 42	約 120		約 50	約 135
ほ場試験	火山灰土・軽埴土	2.0 kg ai/ha	約 12	約 13	4.0 kg ai/ha	約 10	約 10
	沖積土・埴壤土		約 9	約 12		約 6	約 20

9 *：容器内試験では純品、ほ場試験では 1.0 又は 2.0% 粒剤を使用

10

11 **(2) メタラキシル**

12 火山灰土・埴壤土（茨城）及び沖積土・埴土（滋賀）を用いて、メタラキシル
13 及び分解物 C1 を分析対象化合物とした水田又は畑地状態における土壌残留試験
14 （容器内及びほ場）が実施された。

15 結果は表 19 に示されている。（参照 29）

16

17 **表 19 土壌残留試験成績（推定半減期）**

試験	土壌	濃度*	推定半減期 (日)	
			メタラキシル	メタラキシル + C1
容器内試験	水田状態	2.5 mg/kg	約 25	約 89
			約 21	約 66
	畑地状態	5.0 mg/kg	約 30	約 71
			約 45	約 66
ほ場試験	水田	0.5 g ai/L 種子浸漬 +1.6 g ai/育苗箱処理 +2.5 kg ai/ha 湛水散布	約 5	約 5
			約 82	約 86
	畑地	5.0 kg ai/ha	約 50	約 50
			約 83	約 85

18 *：容器内試験では純品、ほ場試験では 25% 水和剤又は 2% 粒剤を使用

19

20 **6. 作物等残留試験**

1 (1) 作物残留試験（メタラキシル M 及びメタラキシル）

2 国内において、果実、野菜等を用いて、メタラキシル M 又はメタラキシルを
3 分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙3に示されている。
4 メタラキシル M の最大残留値は、最終散布14日後に収穫しただいこん（つまみ
5 菜）で認められた0.80 mg/kgであり、メタラキシルの最大残留値は、最終散布
6 14日後に収穫した温州みかん（果皮）で認められた1.69 mg/kgであった。（参
7 照19、27、28、29、36）

8 また、海外において、レタス、セロリ等を用いて、メタラキシル及び2,6-ジメ
9 チルアニリン基を有する代謝物を分析対象化合物とした作物残留試験が実施さ
10 れた。結果は別紙4に示されている。メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基
11 を有する代謝物の含量の最大残留値は、最終散布7日後に収穫しただいこん（葉）
12 で認められた14 mg/kgであった。（参照22、37）

13
14 (2) 畜産物残留試験（メタラキシル）

15 ① 泌乳牛 ①

16 泌乳牛（ホルスタイン種、対照群2頭、投与群3頭）に、メタラキシルを1.50
17 g/頭/日（75 mg/kg 飼料相当）の用量で14、21及び28日間混餌投与して、メタ
18 ラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を分析対象化合物とした
19 畜産物残留試験が実施された。乳汁は投与1、4、7、12、20及び27日の午後及
20 び翌朝に、可食部組織は投与14日の4時間後、21日の23.5時間後及び28日の
21 23.5時間後に1頭ずつと殺し採取した。

22 結果は別紙5-①に示されている。

23 乳汁におけるメタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の合
24 量の残留値は、投与1日には0.02 µg/gに達し定常状態となった。筋肉（腰）、
25 筋肉（肢）、肝臓及び腎臓における残留値は、いずれも投与14日に最大（それ
26 ぞれ0.09、0.17、1.1及び5.5 µg/g）となったが、その後速やかに減少した。脂
27 肪（大網及び腎周囲）における残留値は全て定量限界未満であった。（参照28、
28 29、38）

29
30 ② 泌乳牛 ②

31 泌乳牛（ホルスタイン種、対照群2頭、投与群3～4頭）に、メタラキシルを
32 30及び300 mg/頭/日（1.5及び15.0 mg/kg 飼料相当）の用量で28日間及び150
33 mg/頭/日（7.5 mg/kg 飼料相当）の用量で40日間混餌投与して、メタラキシル
34 及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を分析対象化合物とした畜産物残
35 留試験が実施された。乳汁は投与1、3、5、7、10、14、21、28及び40日に、
36 可食部組織は投与14、21、28及び40日の3～5時間後にと殺し採取した。

37 結果は別紙5-②に示されている。

38 メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の含量の残留値は、

1 乳汁では全て定量限界（0.01 µg/g）未満であった。筋肉及び脂肪においては定量
2 限界（0.05 µg/g）以下であった。肝臓及び腎臓における含量の最大残留値は、肝
3 臓で 0.22 µg/g、腎臓で 0.83 µg/g であり、メタラキシルのみを測定した場合には
4 肝臓で最大 0.06 µg/g 認められ、腎臓では全て定量限界（0.05 µg/g）未満であっ
5 た。（参照 28、29、39）

7 ③ 産卵鶏 ①

8 産卵鶏（白色レグホン種、一群 15 羽）に、メタラキシルを 10、30 及び 100 mg/kg
9 飼料相当の用量で 28 日間混餌投与して、メタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリ
10 ン基を有する代謝物を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。卵は
11 投与 1、3、7、14、21 及び 28 日に、可食部組織は投与 7、14、21 及び 28 日に
12 と殺し採取した。

13 結果は別紙 6-①に示されている。

14 卵中のメタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の含量の残
15 留値は、全て定量限界（0.05 µg/g）未満であった。組織における最大残留値はい
16 ずれも 100 mg/kg 飼料相当投与群で認められ、筋肉（胸筋、後肢筋）及び肝臓で
17 は投与 7 日にそれぞれ 0.13 及び 0.16 µg/g、皮膚及び脂肪並びに脂肪（腹膜部）
18 では投与 21 日にそれぞれ 0.40 及び 0.34 µg/g であった。（参照 28、29、40）

20 ④ 産卵鶏 ②

21 産卵鶏（白色レグホン種、一群 15 羽）に、メタラキシルを 0.5、1.5 及び 5.0 mg/kg
22 飼料相当の用量で 28 日間混餌投与して、メタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリ
23 ン基を有する代謝物を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。卵は
24 投与 1、3、5、7、10、14、17、21、24、25 及び 28 日に、可食部組織は投与 7、
25 14、21 及び 28 日にと殺し採取した。

26 結果は別紙 6-②に示されている。

27 卵及び可食部組織におけるメタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有す
28 る代謝物の含量の残留値は全ての試料で定量限界未満であった。（参照 28、29、
29 41）

31 (3) 魚介類における最大推定残留値

32 メタラキシル M 及びメタラキシルの公共用水域における予測濃度である水産
33 PEC 及び BCF を基に魚介類における最大推定残留値が算出された。

34 メタラキシルの水産 PEC は 2.6 µg/L（水田）、BCF は 7.6（計算値）、魚介
35 類における最大推定残留値は 0.099 mg/kg であった。

36 メタラキシル M の水産 PEC は 0.0079 µg/L（非水田）、BCF は 7.0（計算値）、
37 魚介類における最大推定残留値は 0.00028 mg/kg であった。（参照 21）

38 注）メタラキシル M は水田で使用されないため非水田における最大推定残留

1 値を算出。なお、メタラキシルの水産 PEC（非水田）は 0.015 µg/L であった。

3 (4) 推定摂取量

4 別紙 3 の作物残留試験成績、別紙 5 及び 6 の畜産物残留試験成績並びに魚介類
 5 における最大推定残留値に基づき、農産物及び魚介類ではメタラキシル M 及び
 6 メタラキシル、畜産物ではメタラキシル M 及びメタラキシル並びに 2,6-ジメチ
 7 ルアニリン基を有する代謝物を暴露評価対象物質として食品中から摂取される
 8 推定摂取量が表 20 に示されている（別紙 7 参照）。なお、本推定摂取量の算定
 9 は、登録されている又は申請された使用方法からメタラキシル M 及びメタラキ
 10 シル並びに 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物が最大の残留を示す使用条
 11 件で、全ての適用作物に使用され、かつ、魚介類への残留が上記の最大推定残留
 12 値を示し、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。

14 表 20 食品中から摂取されるメタラキシル M 及びメタラキシルの推定摂取量

	国民平均 (体重：55.1 kg)	小児（1~6 歳） (体重：16.5 kg)	妊婦 (体重：58.5 kg)	高齢者(65 歳以上) (体重：56.1 kg)
摂取量 (µg/人/日)	77.3	45.1	77.6	86.6

16 7. 一般薬理試験

17 (1) メタラキシル M 及びメタラキシル

18 メタラキシル M 及びメタラキシルのラット、マウス、モルモット及びウサギ
 19 を用いた一般薬理試験が実施された。結果は表 21 に示されている。（参照 19）

表 21 一般薬理試験概要（メタラキシル M 及びメタラキシル）

試験の種類	動物種	動物数 匹/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)*	メタラキシル M			メタラキシル			
				最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢 神経系	一般状態 (Irwin 法)	ICR マウス	雄 3	0、30、100、 300、1,000 (経口)	100	300	1,000 mg/kg 体重：警戒性、受 動性、毛づくろい、運動性減少、 接触刺激反応及び疼痛反応低 下、運動協調障害、筋緊張度及 び握力低下、角膜及び耳介反射 抑制、正向反射消失、散瞳、閉 眼、体温低下等、24 時間後に 1 例死亡 300 mg/kg 体重：自発運動低下	100	300	1,000 mg/kg 体重：警戒性、受 動性、毛づくろい、運動性減少、 接触刺激反応及び疼痛反応低 下、運動協調障害、筋緊張度及 び握力低下、角膜及び耳介反射 抑制、正向反射消失、散瞳、閉 眼、呼吸異常、体温低下等、死 亡例なし 300 mg/kg 体重：自発運動低下
	睡眠時間 (ヘキソバルビタ ール誘発睡眠)	ICR マウス	雄 8	0、100、 300、1,000 (経口)	100	300	1,000 mg/kg 体重：対照群より 約 4.2 倍の延長、2 例死亡 300 mg/kg 体重：対照群より約 1.8 倍の延長	100	300	1,000 mg/kg 体重：対照群より 約 4.6 倍の延長、2 例死亡 300 mg/kg 体重：対照群より約 2.0 倍の延長
	痙攣誘発 (電撃痙攣)	ICR マウス	雄 10	0、100、 300、1,000 (経口)	1,000	—	影響なし	1,000	—	影響なし
	正常体温	Wistar ラット	雄 6	0、100、 300、1,000 (経口)	1,000	—	影響なし	300	1,000	1,000 mg/kg 体重：投与 30 分 後から 6 時間後まで体温上昇
自律 神経系	摘出回腸	Hartley モルモ ット	4 標本	3×10^{-7} 、 3×10^{-6} 、 3×10^{-5} g/mL (<i>in vitro</i>)	3×10^{-6} g/mL	3×10^{-5} g/mL	3×10^{-5} g/mL：ACh、His 及 びバリウムによる回腸の収縮 反応をそれぞれ 10%、20%及 び 13%抑制	3×10^{-6} g/mL	3×10^{-5} g/mL	3×10^{-5} g/mL：ACh、His 及び バリウムによる回腸の収縮反 応をそれぞれ 16%、10%及び 27%抑制
循環 器系	呼吸数 血圧 心拍数 心電図 (麻酔下)	日本 白色種 ウサギ	雄 4	0、30、 100、300 (十二指腸内)	30	100	300 mg/kg 体重：4 例死亡 100 mg/kg 体重：投与前と比較 して血圧低下、呼吸数及び心拍 数減少	30	100	300 mg/kg 体重：投与前と比較 して血圧低下、心拍数減少及び 呼吸数増加、1 例死亡 100 mg/kg 体重：投与前と比較 して血圧低下、心拍数減少及び 呼吸数増加、1 例死亡

骨格筋	摘出横隔膜神経標本	Wistarラット	4標本	3×10 ⁻⁷ 、 3×10 ⁻⁶ 、 3×10 ⁻⁵ g/mL (<i>in vitro</i>)	3×10 ⁻⁵ g/mL	—	影響なし	3×10 ⁻⁵ g/mL	—	影響なし
消化器系	腸管輸送能	ICRマウス	雄8	0、100、 300、1,000 (経口)	100	300	1,000 mg/kg 体重：6例死亡、 2例は、対照群より70%の抑制 300 mg/kg 体重：対照群より 49%抑制	100	300	1,000 mg/kg 体重：7例死亡、1 例は、対照群より80%の抑制 300 mg/kg 体重：対照群より 49%抑制
血液	血液凝固	Wistarラット	雄6	0、100、 300、1,000 (経口)	300	1,000	1,000 mg/kg 体重：APTT 延長 PTに影響なし	1,000	—	APTT及びPTに影響なし

*： *in vitro* の試験を除き、溶媒として0.5%CMC水溶液を用いた。

—：最小作用量は設定できなかった。

1 (2) メタラキシル

2 メタラキシルのラット、マウス、モルモット及びウサギを用いた一般薬理試験
3 が実施された。結果は表22に示されている。（参照29）

4

5

表22 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数 (匹/群)	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢神経系	ddy マウス	雄 5	0、50、200 (経口)	200	—	影響なし	
		自発運動(ホイール ケージ法)		雄 5	50	200	200 mg/kg 体重： 自発運動量減少
		運動機能(懸垂、 ロータロッド及 び傾斜板法)		雄 5~6	200	—	影響なし
		抗痙攣作用(ペン チレンテトラゾ ール及びストリ キニーネ誘発法)		雄 5	200	—	影響なし
		鎮痛作用(酢酸ラ イジング法)		雄 5	50	200	200 mg/kg 体重： ライジング反応を抑制
		睡眠時間(ペント バルビタール誘 発法)		雄 5	200	—	影響なし
	体温	Wistar ラット		雌 5	200	—	影響なし
呼吸・循環器系	日本 白色種 ウサギ	雄 3、雌 1	0.1、1.0、10 (静脈内)	1.0	10	10 mg/kg 体重： 血圧低下及び心拍数減少 血流量影響なし	
		雄 2、雌 1	0.1、1.0 (静脈内)	1.0	—	影響なし	
	摘出心房	Hartley モルモ ット	雄 1、雌 3	10 ⁻⁶ ~10 ⁻³ g/mL (<i>in vitro</i>)	10 ⁻⁶ g/mL	10 ⁻⁵ g/mL	10 ⁻³ g/mL：心拍数減少 10 ⁻⁵ g/mL 以上：心収縮力 低下
		日本 白色種 ウサギ	雄 1、雌 1		10 ⁻⁵ g/mL	10 ⁻⁴ g/mL	10 ⁻³ g/mL：心拍数減少 10 ⁻⁴ g/mL 以上：心収縮力 低下
摘出耳介の 血管灌流	日本 白色種 ウサギ	雄 7、 雌 2	10 ⁻⁵ ~10 ⁻¹ g/mL (<i>in vitro</i>)	10 ⁻¹ g/mL	—	影響なし	
消化器	ddy マウス	雄 7	0、10、50、 100 (経口)	100	—	影響なし	

系	胃粘膜	Wistar ラット	雌 5	0、10、100 を各2回投 与 (経口)	100×2回	—	影響なし
自律 神経 系	摘出回腸	Hartley モルモ ット	単独作 用： 雄 14～ 19 相互作 用： 雄 3～7	単独作用： $10^{-5} \sim 10^{-3}$ g/mL 相互作用： $10^{-7} \sim 10^{-3}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	単独作用： — 相互作用： ① 10^{-7} g/mL ② 10^{-5} g/mL ③ 10^{-3} g/mL	単独作用： 10^{-5} g/mL 相互作用： ① 10^{-6} g/mL ② 10^{-4} g/mL ③ —	単独作用： 10^{-5} g/mL 以上で弛緩反 応 相互作用： ①経壁電気刺激： 10^{-6} g/mL 以上で低頻度及び 高頻度経壁刺激収縮を抑制 ②カリウム、ACh、His 及びDMPP： 10^{-4} g/mL 以上でカリウム、ACh、 His 及びDMPP 収縮を抑制 ③テトロドトキシン：影 響なし
	摘出胃条片	Wistar ラット	雌 3	$10^{-6} \sim 10^{-3}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	10^{-5} g/mL	10^{-4} g/mL	10^{-4} g/mL 以上で自発運 動を抑制
	摘出大動脈	日本 白色種 ウサギ	雄 3	$10^{-6} \sim 10^{-3}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	単独作用： 10^{-3} g/mL 相互作用： 10^{-3} g/mL	単独作用： — 相互作用： —	単独作用： 影響なし 相互作用： NA、His 及びカリウム収 縮に影響なし
	摘出気管	Hartley モルモ ット	雄 3	$10^{-5} \sim 10^{-3}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	単独作用： 10^{-3} g/mL 相互作用： 10^{-4} g/mL	単独作用： — 相互作用： 10^{-3} g/mL	単独作用： 影響なし 相互作用： 10^{-3} g/mL で His 収縮を 抑制
	摘出輸精管	Hartley モルモ ット	雄 3	$10^{-7} \sim 10^{-3}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	10^{-3} g/mL	—	影響なし
	摘出子宮 (非妊娠)	Wistar ラット	雌 3	$10^{-6} \sim 10^{-4}$ g/mL (<i>in vitro</i>)	10^{-5} g/mL	10^{-4} g/mL	10^{-4} g/mL で自発運動を 抑制
尿排 泄	尿量及び尿中 電解質排泄	Wistar ラット	雌 5	0、10、100 (経口)	—	10	10 mg/kg 体重以上： 尿量減少及び尿中ナトリ ウム及びクロール増加
局 所 麻 酔	角膜及び 結膜反射	Hartley モルモ ット	雄 3	1、10 g/mL (点眼)	10 g/mL	—	影響なし

1 溶媒として、経口投与及び *in vitro* 試験では 1%CMC 水溶液、静脈内投与及び点眼試験では 1%食塩液が

1 用いられた。
 2 ー：最大無作用量又は最小作用量は設定されなかった。

3

4 **8. 急性毒性試験**

5 **(1) 急性毒性試験**

6 **① メタラキシル M 原体**

7 メタラキシル M を用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 23 に示されて
 8 いる。（参照 10、17、19、28、42）

9

10 **表 23 急性毒性試験結果概要（メタラキシル M 原体）**

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	SD ラット① ^a 雌雄各 5 匹	953	375	投与量：雄：500、1,000、2,000 mg/kg 体重、雌：200、500 mg/kg 体重 雄： 2,000 mg/kg 体重投与群：異常発声・呼吸音及びチアノーゼ 1,000 mg/kg 体重以上投与群：腹臥 500 mg/kg 体重以上投与群：立毛、横臥、呼吸困難、自発運動低下、痙攣、振戦*及び円背位** (*：500 mg/kg 体重投与群のみで認められた所見、**：500 及び 1,000 mg/kg 体重投与群で認められた所見) 雌： 500 mg/kg 体重投与群：横臥、腹臥、痙攣（強直性痙攣を含む）及び過敏性亢進 200 mg/kg 体重以上投与群：立毛、円背位、呼吸困難、自発運動低下及び歩行失調* (*：200 mg/kg 体重投与群のみで認められた所見) 雄：1,000 mg/kg 体重以上投与群で死亡例 雌：500 mg/kg 体重投与群で死亡例
	SD ラット② ^b 雌雄各 5 匹	1,670	490	投与量：雄：1,000、1,500、2,000 mg/kg 体重、雌：200、400、600 mg/kg 体重 雄： 2,000 mg/kg 体重投与群：散瞳 1,500 mg/kg 体重以上投与群：痙攣様動作、振戦、握り反射消失及び顔面の赤色汚れ* (*：1,500 mg/kg 体重投与群のみで認められた所見) 1,000 mg/kg 体重以上投与群：自発運動低下、歩行失調、呼吸困難、虚脱、流涙**、筋弛緩**、削瘦***及び円背位*** (**：1,000 及び 1,500 mg/kg 体重投与群で認められた所見、***：1,000 mg/kg 体重投与群のみで認められた所見) 雌： 600 mg/kg 体重投与群：正向反射消失、筋弛緩、散瞳及び線維束性収縮

				<p>400 mg/kg 体重以上投与群：流涙、呼吸困難、痙攣様動作、流涎過多、虚脱、振戦、握り反射消失、顔面の赤色汚れ*、泌尿生殖器部位の湿潤及び黄色汚れ*及び右眼周囲の暗色汚れ*（*：400 mg/kg 体重投与群のみで認められた所見）</p> <p>200 mg/kg 体重以上投与群：自発運動低下、歩行失調及び円背位**（**：200 及び 400 mg/kg 体重投与群で認められた所見）</p> <p>雄：1,500 mg/kg 体重以上投与群で死亡例</p> <p>雌：400 mg/kg 体重以上投与群で死亡例</p>
	Tif:MAG マウス ^a 雌雄各 5 匹	>1,000	500～ 1,000	<p>投与量：雄：500、1,000 mg/kg 体重、雌：200、500、1,000 mg/kg 体重</p> <p>雄： 500 mg/kg 体重以上投与群：腹臥、横臥、呼吸困難、自発運動低下、痙攣、振戦、強直性痙攣、円背位、立毛及び歩行失調</p> <p>雌： 1,000 mg/kg 体重投与群：振戦</p> <p>500 mg/kg 体重以上投与群：横臥、呼吸困難、自発運動低下及び痙攣(強直性痙攣含む)</p> <p>200 mg/kg 体重以上投与群：円背位*及び立毛*（*：200 及び 500 mg/kg 体重投与群で認められた所見）</p> <p>雄：1,000 mg/kg 体重投与群で死亡例</p> <p>雌：500 mg/kg 体重以上投与群で死亡例</p>
経皮	SD ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし
吸入	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		<p>暴露中及び暴露終了直後：軽度の浅呼吸、不穩、軽微な呼吸数減少、円背位及び運動失調</p> <p>観察期間中（14 日間）：被毛の脂性黄色化及び右前肢の脱毛（雌 1 例）</p> <p>死亡例なし</p>
		>2.29	>2.29	

1 a：溶媒として 0.1%Tween80 含有 0.5%CMC 水溶液が用いられた。

2 b：溶媒としてコーン油が用いられた。

3

4 ② メタラキシル原体

5 メタラキシルを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 24 に示されてい
6 る。（参照 20）

7

8

表 24 急性毒性試験結果概要（メタラキシル原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	

経口	SD ラット① ^{a, c} 雌雄各 5 匹	669	669	投与量：215、464、775、1,000、1,290及び2,150 mg/kg体重 雌雄： 464 mg/kg体重以上投与群：横臥及び腹臥 215 mg/kg体重以上投与群：沈静化、呼吸困難、眼球突出、粗毛、強直性間代性痙攣及び弯曲姿勢*（*：2,150 mg/kg体重投与群を除く） 雄：464 mg/kg体重以上で死亡例 雌：775 mg/kg体重以上で死亡例
	SD ラット② ^b 雌雄各 10 匹	1,880	1,080	投与量：雄：0、1,080、1,296、1,555、1,866、2,239 mg/kg体重、雌：0、750、900、1,080、1,296、1,555 mg/kg体重 雄： 1,296 mg/kg体重以上投与群：うずくまり姿勢、振戦及び流涙及び間代性痙攣 1,080 mg/kg体重以上投与群：自発運動低下及び流涎 雌： 1,296 mg/kg体重以上投与群：流涙 900 mg/kg体重以上投与群：うずくまり姿勢、振戦及び間代性痙攣 750 mg/kg体重以上投与群：自発運動低下及び流涎 雄：1,296 mg/kg体重以上で死亡例 雌：900 mg/kg体重以上で死亡例
	Tif:MAG マウス① ^{a, c} 雌雄各 5 匹	788	788	投与量：317、464、600、1,000及び2,150 mg/kg体重 雌雄： 600 mg/kg体重以上投与群：強直性間代性痙攣 317 mg/kg体重以上投与群：沈静化、呼吸困難、眼球突出、弯曲姿勢又は腹臥位及び粗毛 雄：600 mg/kg体重以上で死亡例 雌：464 mg/kg体重以上で死亡例
	ICR マウス② ^b 雌雄各 10 匹	818	835	投与量：0、600、720、864、1,037及び1,244 mg/kg体重 雌雄： 720 mg/kg体重以上投与群：挙尾、よろめき歩行、間代性痙攣及び苦悶症状 600 mg/kg体重以上投与群：自発運動低下、うずくまり姿勢、横臥*及び腹臥（*：600 mg/kg体重投与群のみで認められた所見） 雌雄：720 mg/kg体重以上で死亡例
経皮	SD ラット 雌雄各 3 匹	>3,100	>3,100	症状及び死亡例なし
	SD ラット 雌雄各 10 匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし
腹腔内	SD ラット 雌雄各 10 匹	259	210	自発運動低下、うずくまり、振戦、流涎、流涙、間代性痙攣及び腹臥位姿勢 雄：208 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：174 mg/kg 体重以上で死亡例

	ICR マウス 雌雄各 10 匹	450	470	自発運動低下、よろめき歩行、挙尾反応、間代性痙攣、腹臥又は横臥位姿勢 雌雄：403 mg/kg 体重以上で死亡例
皮下	SD ラット 雌雄各 10 匹	1,110	427	自発運動低下、うずくまり、振戦、流涎、流涙、間代性痙攣及び腹臥位姿勢 雄：864 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：417 mg/kg 体重以上で死亡例
	ICR マウス 雌雄各 10 匹	540	490	自発運動低下、よろめき歩行、うずくまり、腹臥位姿勢、挙尾反応及び間代性痙攣 雌雄：460 mg/kg 体重以上で死亡例
吸入	SD ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		立毛、うずくまり、呼吸困難及び自発運動低下が観察されたが、暴露後 3 日以内に回復死亡例なし
		>3.6	>3.6	

1 a：溶媒として 2%CMC 水溶液が用いられた。

2 b：溶媒として 0.5%CMC 水溶液が用いられた。

3 c：検体純度不明

5 ③ 代謝物

6 メタラキシル M 及びメタラキシルの代謝物 B、C1、D、E 及び J を用いた急性
7 毒性試験が実施された。結果は表 25 に示されている。（参照 19）

8
9 表 25 急性毒性試験結果概要（代謝物）

被験物質	投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
B	経口	ICR マウス ^a 雄 5 匹	1,000～ 2,000		自発運動低下、鎮静及び呼吸困難 2,000 mg/kg 体重で死亡例
C1	経口	SD ラット ^b 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし
	経皮	SD ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし
D	経口	ICR マウス ^a 雄 5 匹	>2,000		自発運動低下 1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
E	経口	ICR マウス ^a 雄 5 匹	1,000～ 2,000		自発運動低下、鎮静、呼吸困難及び振戦 2,000 mg/kg 体重で死亡例
J	経口	SD ラット ^c 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	立毛、円背位及び呼吸困難 死亡例なし
	経皮	SD ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	適用部位に軽度の紅斑 死亡例なし

10 a：溶媒として 0.5%CMC 水溶液が用いられた。

11 b：溶媒として蒸留水が用いられた。

12 c：溶媒として 0.1%Tween80 含有 0.5%CMC/水溶液が用いられた。

14 ④ 原体混在物

15 メタラキシル M の原体混在物[2]、[5]、[8]、[9]、[10]及び[12]を用いた急性経
16 口毒性試験が実施された。結果は表 26 に示されている。（参照 19）

1 表 26 急性経口毒性試験結果概要（原体混在物）

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
[2]	SD ラット ^a 雌 5 匹	/		>2,000 円背位、死亡例なし
[5]	SD ラット ^b 雌雄各 5 匹	500～ 1,000	500～ 1,000	眼球突出、呼吸困難、自発運動低下、痙攣、強直性痙攣、チアノーゼ、開口障害、運動失調、強直性間代性痙攣、振戦、腹臥位、異常発声、立毛及び円背位 雌雄：1,000 mg/kg 体重で死亡例
[8]	SD ラット ^a 雌 5 匹	/		>2,000 症状及び死亡例なし
[9]	Wistar ラット ^b 雌雄各 5 匹	>1,000	>1,000	痙攣、異常呼吸音、運動失調、強直性痙攣、自発運動低下、横臥位、腹臥位、流涎、振戦、呼吸困難及び円背位 雄：1,000 mg/kg 体重で死亡例 雌：600 mg/kg 体重以上で死亡例
[10]	Wistar ラット ^b 雌雄各 5 匹	1,800～ 2,000	200～ 1,000	自発運動低下、筋線維束性収縮、筋緊張度の低下又は亢進、横臥位、体表温低下、呼吸困難、立毛、円背位、眼瞼下垂、運動失調、腹臥位、流涎及び痙攣 雄：2,000 mg/kg 体重で死亡例 雌：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
[12]	Wistar ラット ^b 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし

2 [5]はメタラキシル M 固有の原体混在物、ほかはメタラキシルと共通の原体混在物
3 溶媒として、a：ラッカセイ油、b：0.1%Tween80 含有 0.5%CMC 水溶液が用いられた。

4
5 (2) 急性神経毒性試験（ラット、メタラキシル M）

6 SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口（原体：雄：0、250、500
7 及び 1,000 mg/kg 体重、雌：0、87.5、175 及び 350 mg/kg 体重、溶媒：0.1%Tween80
8 含有 0.5%CMC 水溶液）投与による急性神経毒性試験が実施された。

9 各投与群で認められた毒性所見は表 27 に示されている。

10 神経病理組織学的検査において検体投与による影響は認められなかった

11 本試験において、250 mg/kg 体重以上投与群の雄及び 87.5 mg/kg 体重以上投
12 与群の雌で自発運動量（総運動量及び歩行運動量）減少が認められたので、無毒
13 性量は雄で 250 mg/kg 体重未満、雌で 87.5 mg/kg 体重未満であると考えられた。

14 （参照 28、43）

15
16 表 27 急性神経毒性試験（ラット、メタラキシル M）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 mg/kg 体重	<ul style="list-style-type: none"> ・死亡(1 例) ・摂餌量減少 ・間代性痙攣、頭を低く垂れて座った状態、活動性低下、振戦、呼吸数減少、流涎、横臥及び衰弱（投与当日） 	/

	<ul style="list-style-type: none"> ・眼を大きく開いている状態の低下、歩き始めるまでの時間延長、運動性の異常、筋協調運動低下、眼瞼下垂^a、流涙^a、呼吸数減少^a、歩行障害^a、立ち上がり回数減少^a及び空中立ち直り反応低下^a(投与当日)(FOB) 	
500 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制 ・カタレプシー及び体温低下(投与当日)(FOB) 	
350 mg/kg 体重		<ul style="list-style-type: none"> ・切迫と殺(1例) ・体重増加抑制及び摂餌量減少 ・間代性痙攣、振戦、頭を低く垂れて座った状態、活動性低下、呼吸数減少及び流涙(投与当日) ・頭を低く垂れて座った状態、流涙、眼を大きく開いている状態の低下、眼瞼下垂、呼吸数減少、歩き始めるまでの時間延長、運動性の異常、歩行異常、覚醒度低下、排尿回数増加、空中立ち直り反応低下、前肢握力低下及び筋強調運動低下、接近/接触反応消失^a、驚愕反応消失^a及び痛覚反応消失^a(投与当日)(FOB)
250 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none"> ・自発運動量(総運動量及び歩行運動量)減少(投与当日)(FOB) 	
175 mg/kg 体重以上		<ul style="list-style-type: none"> ・カタレプシー及び体温低下(投与当日)(FOB)
87.5 mg/kg 体重以上		<ul style="list-style-type: none"> ・自発運動量(総運動量及び歩行運動量)減少及び立ち上がり回数減少(投与当日)(FOB)

^a : 統計学的有意差はないが検体投与による影響と判断した。

/ : 実施せず

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

(1) メタラキシル M

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に対して刺激性が認められたが、皮膚に対する刺激性は認められなかった。

Pirbright White モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Magnusson & Kligman の Maximization 法) 及び Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Closed Patch 法) が実施された。いずれの試験においても、皮膚感作性は陰性であった。(参照 6、19)

(2) メタラキシル

ロシアンウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に対して極めて軽度の刺激性、皮膚に対して軽度の刺激性が認められた。

1 Pirbright White モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maurer らの
2 Optimization 法）が実施された。陽性率が 35%であったことから、皮膚感作性
3 を有する可能性があると考えられた。（参照 20）

5 10. 亜急性毒性試験

6 (1) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル M とメタラキシルの比較試験）

7 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いたメタラキシル M 又はメタラキシルの強
8 制経口（原体：各検体 0、10、50、150 及び 300 mg/kg 体重/日、溶媒：0.1%Tween80
9 含有 0.5%CMC 水溶液）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

10 各投与群で認められた毒性所見は表 28 に示されている。

11 メタラキシル M 投与群の初回投与後 2 時間以内に、150 mg/kg 体重/日以上投
12 与群の全例に自発運動の低下が認められ、300 mg/kg 体重/日投与群の雌 2 例は
13 虚脱に陥った。しかし、投与 2 日目以降の投与後及びメタラキシル投与群には、
14 一般状態及び行動に異常は認められなかった。

15 メタラキシル M 投与群では 300 mg/kg 体重/日投与群の雄及び 150 mg/kg 体重
16 /日投与群の雌で小葉中心性肝細胞肥大、メタラキシル投与群では 300 mg/kg 体
17 重/日投与群の雄で肝絶対及び比重量¹増加が認められたが、肝毒性を示唆する血
18 液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化がみられなかったことから
19 適応性変化であると考えられた。

20 本試験において、メタラキシル M では、150 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄
21 で自発運動低下が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日
22 であると考えられた。メタラキシルについては、雄ではいずれの投与群においても
23 毒性所見が認められず、雌では 150 mg/kg 体重/日以上投与群で脾髄外造血亢進
24 等が認められたことから、無毒性量は雄で本試験の最高用量 300 mg/kg 体重/日、
25 雌で 50 mg/kg 体重/日であると考えられた。また、本試験において、メタラキシ
26 ル M 及びメタラキシルは同様の毒性プロファイルを示した。（参照 6、13、19）

27
28 表 28 28 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	メタラキシル M		メタラキシル	
	雄	雌	雄	雌
300 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none"> ・ナトリウム減少 ・クロール増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・TP 及び Glob 増加 ・A/G 比低下 ・肝絶対及び比重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大 	300 mg/kg 体重/日 以下 毒性所見なし	<ul style="list-style-type: none"> ・Alb 増加 ・肝絶対及び比重量増加 ・小葉中心性肝細胞肥大
150 mg/kg 体重/日 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・自発運動低下(投与 1 日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・自発運動低下(投与 1 日) 		<ul style="list-style-type: none"> ・TP 及び Glob 増加 ・A/G 比低下

¹ 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。

			・脾髄外造血亢進
50 mg/kg 体重/日 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし

1

2 (2) 90日間亜急性毒性試験（ラット）

3 ① メタラキシル M

4 SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いたメタラキシル M の混餌（原体：0、
5 25、50、250、625 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 29 参照）投与による
6 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、対照群及び 1,250 ppm 投与群は雌
7 雄各 20 匹とし、うち各 10 匹は 4 週間の回復試験に用いた。

8

9 表 29 90 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル M）の平均検体摂取量

投与群		25 ppm	50 ppm	250 ppm	625 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.72	3.50	16.8	44.8	90.5
	雌	1.86	3.71	17.9	49.2	95.0

10

11 病理組織学的検査において、625 ppm 以上投与群の雄で肝細胞内封入体が認め
12 られた。この封入体は、小葉周辺性肝細胞肥大を伴い、輪状又は渦巻状を呈した
13 好酸性小体として小葉周辺性肝細胞の細胞質内に観察された。また、625 ppm 以
14 上投与群の雌で小葉中心性肝細胞肥大が認められた。肝細胞肥大及び肝細胞封入
15 体は、回復期間終了時には認められず、可逆性の変化と考えられた。また、雌で
16 みられた小葉中心性肝細胞肥大は肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの
17 変化及び病理組織学的変化がみられなかったことから適応性変化であると考え
18 られた。

19 本試験において、625 ppm 以上投与群の雄で肝細胞内封入体等が認められ、雌
20 ではいずれの投与群においても毒性所見が認められなかったことから、無毒性量
21 は雄で 250 ppm (16.8 mg/kg 体重/日)、雌で本試験の最高用量 1,250 ppm (95.0
22 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 13、19）

23

24 ② メタラキシル (i)

25 SD ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、
26 250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 30 参照）投与による 90 日間亜急性毒
27 性試験が実施された。なお、対照群及び 1,250 ppm 投与群は雌雄各 25 匹とし、
28 うち各 5 匹は 4 週間の回復試験に用いた。

29

30 表 30 90 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル）(i) の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.2	16.2	79.3
	雌	3.5	17.7	85.6

1
2 1,250 ppm 投与群の雄で体重増加抑制（投与 7 週以降）及び摂餌量減少（投与
3 2 週以降）、250 ppm 以上投与群の雌で軽度の肝細胞肥大が認められた。肝細胞
4 肥大は、1,250 ppm 投与群の回復期間終了後には認められず可逆性の変化と考え
5 られ、肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化が
6 みられなかったことから適応性変化であると考えられた。

7 本試験における無毒性量は、雄で 250 ppm（16.2 mg/kg 体重/日）、雌で本試
8 験の最高用量 1,250 ppm（85.6 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 20）
9

10 ③ メタラキシル（ii）

11 SD ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、10、
12 50、250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 31 参照）投与による 90 日間亜
13 急性毒性試験が実施された。
14

15 表 31 90 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル）（ii）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	50 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.66	3.51	15.4	71.8
	雌	0.67	3.56	15.8	73.9

16
17 50 ppm 以上投与群の雄で副腎絶対及び比重量並びに対脳重量比²の増加が認
18 められたが、雌ではみられていないこと、また、血液生化学的検査及び病理組織
19 学的検査において関連した所見が得られていないことから、雄でみられた副腎重
20 量増加には毒性学的意義がないと考えられた。

21 本試験において、雌雄ともに毒性所見は認められなかったことから、無毒性量
22 は雌雄とも本試験の最高用量 1,250 ppm（雄：71.8 mg/kg 体重/日、雌：73.9 mg/kg
23 体重/日）であると考えられた。（参照 20）
24

25 ④ メタラキシル（iii）

26 SD ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、
27 250、1,250 及び 9,380 ppm：平均検体摂取量は表 32 参照）投与による 90 日間
28 亜急性毒性試験が実施された。
29

30 表 32 90 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル）（iii）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm	9,380 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.15	15.6	79.8	605
	雌	3.43	17.5	87.0	646

31
² 脳重量に比した重量を対脳重量比という（以下同じ。）。

1 各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。
 2 本試験において、1,250 ppm 投与群の雌雄で肝比重量増加が認められたが、肝
 3 毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化がみられ
 4 なかったことから適応性変化であると考えられた。

5 9,380 ppm 投与群雄及び 1,250 ppm 以上投与群雌で体重増加抑制等が認めら
 6 れたことから、無毒性量は雄で 1,250 ppm (79.8 mg/kg 体重/日)、雌で 250 ppm
 7 (17.5 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 20）
 8

9 表 33 90 日間亜急性毒性試験（ラット、メタラキシル）（iii）
 10 で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
9,380 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制(投与 1 週以降)、摂餌量減少(投与 1 日)及び食餌効率低下 ・ Ht 及び Hb 減少 ・ A/G 比低下 ・ T.Chol 及びカリウム増加 ・ 肝絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 摂餌量減少(投与 1 日) ・ RBC 及び Ht 減少 ・ A/G 比、TP 及び Alb 減少 ・ Glu 及び T.Chol 増加 ・ 肝絶対及び比重量増加
1,250 ppm 以上	1,250 ppm 以下 毒性所見なし	・ 体重増加抑制 ^a 及び食餌効率低下
250 ppm 以下		毒性所見なし

11 ^a : 1,250 ppm 投与群では投与 9 週以降、9,380 ppm 投与群では投与 1 週以降
 12

13 (3) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ、メタラキシル M）

14 ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたメタラキシル M の混餌（原体：0、50、
 15 125、250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 34 参照）投与による 90 日間亜
 16 急性毒性試験が実施された。
 17

18 表 34 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	125 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.57	4.07	7.25	38.6
	雌	1.56	4.33	7.93	39.5

19
 20 本試験において、1,250 ppm 投与群の雌雄で ALP 増加並びに肝絶対及び比重量
 21 増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 250 ppm（雄：7.25 mg/kg
 22 体重/日、雌：7.93 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 6、13、19）
 23

24 (4) 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット、メタラキシル M）

25 Wistar ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いたメタラキシル M の混餌（原体：0、
 26 50、250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 36 参照）投与による 90 日間亜
 27 急性神経毒性試験が実施された。

1
2

表 36 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.8	19.3	96.2
	雌	4.4	21.4	109

3

4 1,250 ppm 投与群の雌で体重増加抑制（投与 3～4 週）及び摂餌量減少（投与
5 1～2 週）が認められた。1,250 ppm 投与群の雄で脳絶対重量が低値であったが、
6 病理組織学的検査で脳に投与と関連した所見がみられなかったことから、毒性学
7 的意義はないと考えられた。

8 詳細な症状観察及び FOB において、検体投与に関連した影響は認められな
9 かった。また、1,250 ppm 投与群の雌雄において、投与に関連した神経病理学的変
10 化が認められなかったことから、250 ppm 以下投与群の神経病理組織学的検査は
11 実施されなかった。

12 本試験において、雄では毒性所見が認められず、雌では 1,250 ppm 投与群で
13 体重増加抑制及び摂餌量減少が認められたことから、無毒性量は雄で本試験の最
14 高用量 1,250 ppm（96.2 mg/kg 体重/日）、雌で 250 ppm（21.4 mg/kg 体重/日）
15 であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 19）

16

17 (5) 28 日間亜急性経皮毒性試験（ラット、メタラキシル M）

18 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いたメタラキシル M の経皮（原体：0、50、
19 250 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.1%Tween80 含有 0.5%CMC 水溶液）投
20 与による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

21 1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄で統計学的有意差のない体重増加抑制がみ
22 られた。また、同群の雄で脾絶対重量低下及び肝比重量増加、雌で肝比重量増加が
23 認められたが、剖検又は病理組織学的所見は認められなかったことから、毒性学
24 的意義はないと考えられた。

25 本試験における無毒性量は、雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日
26 であると考えられた。（参照 6、19）

27

28 (6) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 C1）

29 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた代謝物 C1 の強制経口（代謝物 C1：0、
30 10、50、200 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.1%Tween80 含有 0.5%CMC
31 水溶液）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、対照群並びに
32 200 及び 1,000 mg/kg 体重/日投与群は雌雄各 10 匹とし、うち各 5 匹は 28 日間
33 の回復試験に用いた。

34 対照群の雄 2 例及び 10 mg/kg 体重/日投与群の雌 1 例が試験 5 日に死亡したが、
35 検体投与との関連はみられなかった。

1 1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄で肝比重量の軽度な増加、50 及び 1,000 mg/kg
2 体重/日投与群の雌で肝比重量の増加傾向がみられ、50 mg/kg 体重/日投与群の雌、
3 200 及び 1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄雌で軽度な肝細胞肥大が認められたが、
4 いずれも 28 日間の回復期間終了後には認められず、可逆的な変化と考えられ、
5 肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化がみら
6 れなかったことから適応性変化であると考えられた。

7 本試験において、雌雄ともに毒性所見は認められなかったことから、C1 の無
8 毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。
9 (参照 6、19、20)

11 (7) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 J）

12 SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた代謝物 J の強制経口（代謝物 J：0、10、
13 50、200 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.1%Tween80 含有 0.5%CMC 水溶液）
14 投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、対照群並びに 200 及び
15 1,000 mg/kg 体重/日投与群は雌雄各 10 匹とし、うち各 5 匹は 28 日間の回復試
16 験に用いた。

17 200 mg/kg 体重/日投与群において、雄 1 例及び雌 2 例が死亡したが、病理組
18 織学的所見から、検体投与時の投与ミスによるものと考えられた。

19 本試験において、雌雄ともに毒性所見は認められなかったことから、無毒性量
20 は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 6、
21 19、20）

23 1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

24 (1) 6 か月間慢性毒性試験（イヌ、メタラキシル）

25 ビーグル犬（一群雌雄各 6 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、
26 250 及び 1,000 ppm：平均検体摂取量は表 35 参照）投与による 6 か月間慢性毒
27 性試験が実施された。なお、対照群及び 1,000 ppm 投与群は雌雄各 8 匹とし、
28 うち各 2 匹は 1 か月間の回復試験に用いた。

30 表 35 6 か月間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.57	7.80	30.6
	雌	1.71	7.41	32.4

31
32 1,000 ppm 投与群の雌雄で ALP 増加、雌で肝対脳重量比増加が認められたこ
33 とから、本試験における無毒性量は雌雄とも 250 ppm（雄：7.80 mg/kg 体重/日、
34 雌：7.41 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 6、8、13、14、20）
35

1 (2) 2年間慢性毒性試験（イヌ、メタラキシル）

2 ビーグル犬（一群雌雄各6匹）を用いたメタラキシルのカプセル経口（原体：
3 0、0.8、8.0、80 mg/kg 体重/日）投与による2年間慢性毒性試験が実施された。
4 各投与群で認められた毒性所見は表37に示されている。

5 80 mg/kg 体重/日投与群の雌雄各4匹において、投与10～30分後に一過性の
6 強直性痙攣及び流涎が観察された。これらの動物のうち雌雄各2匹が投与20～
7 52週の間死亡した。8.0及び0.8 mg/kg 体重/日投与群では、このような症状並
8 びに死亡及び切迫と殺例はなかった。

9 80 mg/kg 体重/日投与群の雌雄では、肝臓に軽度の局所性炎症反応、結合組織
10 増生、色素沈着等が散見されたが、いずれも有意な増加ではなかった。なお、貧
11 血を示唆する血液学的所見は、急性暴露とは関連性がなく、長期暴露後にのみ観
12 察された。

13 本試験において、80 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で強直性痙攣、流涎を伴う死
14 亡等が認められたことから、無毒性量は雌雄ともに8.0 mg/kg 体重/日であると考
15 えられた。（参照6、13、19、20）

16
17 表37 2年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
80 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none"> ・強直性痙攣(投与1週以降)及び流涎(投与1週以降)(うち2例死亡) ・Ht、Hb及びRBC減少 ・ALP、ALT、Alb、TP、A/G比及びカルシウム増加 ・Glob減少 ・肝及び腎絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・強直性痙攣(投与1週以降)及び流涎(投与1週以降)(うち2例死亡) ・Ht、Hb及びRBC減少 ・ALP、ALT、Alb、TP、A/G比及びカルシウム増加 ・Glob減少 ・肝比重量増加
8.0 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	毒性所見なし

18
19 (3) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、メタラキシル）

20 SDラット（一群雌雄各80匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、
21 250及び1,250 ppm：平均検体摂取量は表38参照）投与による2年間慢性毒性/
22 発がん性併合試験が実施された。

23
24 表38 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.9	9.4	46.6
	雌	2.2	11.1	55.1

25
26 検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

250 ppm 以上投与群の雄及び 1,250 ppm 投与群の雌で肝比重量増加が認められたが、肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化がみられなかったことから、適応性変化であると考えられた。

本試験において、雌雄ともにいずれの投与群においても毒性所見が認められなかったため、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,250 ppm（雄：46.6 mg/kg 体重/日、雌：55.1 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 13、19、20）

（4）2年間発がん性試験（マウス、メタラキシル）

ICI Swiss マウス（一群雌雄各 60 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 39 参照）投与による 2 年間発がん性試験が実施された。

表 39 2 年間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	4.5	22.8	119
	雌	5.0	24.9	132

死亡率は、投与 78 週時までは各群とも 50%以下であったが、投与 104 週時では 0、50、250 及び 1,250 ppm 投与群について雄で 92%、90%、90%及び 83%、雌で 87%、87%、92%及び 90%であった。死因の主なものとしては、悪性リンパ腫、加齢による腎障害が考えられた。

1,250 ppm 投与群の雄で体重増加抑制（投与 18 週以降）及び食餌効率低下³（投与 11～30 週）が認められた。雌では毒性所見は認められなかった。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験における無毒性量は、雄で 250 ppm（22.8 mg/kg 体重/日）、雌で本試験の最高用量 1,250 ppm（132 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 6、13、19、20）

12. 生殖発生毒性試験

（1）3 世代繁殖試験（ラット、メタラキシル）

SD ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いたメタラキシルの混餌（原体：0、50、250 及び 1,250 ppm：平均検体摂取量は表 40 参照）投与による 3 世代繁殖試験が実施された。なお、親動物の P 世代及び F₁ 世代雌については、一部（10～15 匹）を妊娠 20 日にと殺し、胎児（F_{1C} 及び F_{2B}）に及ぼす影響が検討された。

表 40 3 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

³ 統計学的検定は行われていないが、検体投与による影響と判断した。

投与群		50 ppm	250 ppm	1,250 ppm	
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	P	3.1	15.6	77.6
		F ₁	4.1	20.9	106
		F ₂	4.0	19.7	99.2
	雌	P	3.6	17.5	92.9
		F ₁	4.8	23.0	127
		F ₂	4.7	23.2	124

1
2 親動物において、1,250 ppm 投与群の F₁ 世代雄で体重増加抑制が認められた
3 が、F₂ 世代では認められなかったことから、検体投与の影響ではないと考えられ
4 た。児動物及び胎児でも検体投与の影響は認められなかった。

5 本試験において、親動物、児動物ともに毒性所見は認められなかったことから、
6 無毒性量は親動物及び児動物で本試験の最高用量 1,250 ppm (P 雄：77.6 mg/kg
7 体重/日、P 雌：92.9 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：106 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：127 mg/kg
8 体重/日、F₂ 雄：99.2 mg/kg 体重/日、F₂ 雌：124 mg/kg 体重/日) であると考え
9 られた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照 6、8、13、19、20)

10 11 (2) 発生毒性試験 (ラット)

12 ① メタラキシル M

13 SD ラット (一群雌 24 匹) の妊娠 6~15 日にメタラキシル M を強制経口 (原
14 体：0、10、50 及び 250 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%CMC 水溶液) 投与して発
15 生毒性試験が実施された。

16 母動物では、250 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制 (妊娠 6~11 日)、摂
17 餌量減少 (妊娠 6~11 日) が認められた。

18 胎児では、~~検体投与に関連した所見は認められなかった。~~250 mg/kg 体重/日
19 投与群で第 1 中足骨及び第 5 指末節骨の未骨化の発生頻度が有意に増加したが、
20 背景データの範囲内 (第 1 中足骨：胎児発現率 23.6%に対し背景データは 0.6%
21 ~25.9%、腹発現率 45.5%に対し背景データは 4.5%~66.7%、末節骨：胎児発現率
22 3.1%に対し背景データは 0%~3.6%、腹発現率 13.6%に対し背景データは 0%~
23 16.7%) であったことから、検体投与の影響とは判断されなかった。検体が特異的
24 な奇形を誘発することを示すものではないと考えられた。代田専門委員修文

25 本試験において、母動物では 250 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制及び摂
26 餌量減少が認められ、胎児では毒性所見が認められなかったことから、無毒性量
27 は母動物で 50 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 250 mg/kg 体重/日であ
28 ると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 6、19)

【代田専門委員より】

(網掛け部分) 未骨化は変異に分類される変化なので、奇形と関連付けた考察は不要と
考えられますので、記載を整理しました。背景データの上限に近い値であり、[③メタ
ラキシル ii] の試験では 250 mg/kg 体重/日投与群で同じ影響が認められていますので、

投与の影響を全く否定できるものではありませんが、重版ですのでこれまでの版での判断は変更しませんでした。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

② メタラキシル（i）

SD ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～15 日にメタラキシルを強制経口（原体：0、20、60 及び 120 mg/kg 体重/日、溶媒：2%CMC 水溶液）投与して発生毒性試験が実施された。

母動物では、120 mg/kg 体重/日投与群で軽度の嗜眠（妊娠 9～15 日）、体重増加抑制（妊娠 9 日以降）及び摂餌量減少（妊娠 6～10 日）が認められた。60 mg/kg 体重/日投与群でも体重増加抑制が認められたが、この群では検体投与開始前から体重が低かったため、検体投与による影響とは考えられなかった。

胎児では検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、母動物では 120 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制等が認められ、胎児では毒性所見が認められなかったことから、無毒性量は母動物で 60 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 120 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 20）

③ メタラキシル（ii）

先のラットを用いた発生毒性試験[12. (2)②]よりも高い用量における催奇形性の有無を検討するため、SD ラット（一群雌 27 匹、最高用量群は 38 匹）の妊娠 6～15 日にメタラキシルを強制経口（原体：0、50、250 及び 400 mg/kg 体重/日⁴、溶媒：1%CMC 水溶液）投与して発生毒性試験が実施された。

母動物では、250 mg/kg 体重/日以上投与群で鎮静、痙攣（250 及び 400 mg/kg 体重/日投与群とも妊娠 6 日以降）、正向反射の消失（250 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 13 日、400 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 6 日以降）、活動性低下（250 及び 400 mg/kg 体重/日投与群とも妊娠 6 日以降）及び切迫と殺又は死亡（250 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 13 日、400 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 6 日以降）が認められた。体重増加抑制（250 及び 400 mg/kg 体重/日投与群とも妊娠 6～9 日）は、統計学的有意差は認められなかったが、検体投与の影響と考えられた。

胎児では、250 mg/kg 体重/日以上投与群で骨化遅延を示す胎児数の増加が認められ、検体投与との関連が示唆された。

本試験において、250 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で死亡及び体重増加抑制等、胎児で骨化遅延を示す胎児数の増加が認められたことから、無毒性量は母動物及び胎児で 50 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 8、13、20）

⁴ 最高用量は試験開始時には 575 mg/kg 体重/日であったが、母動物に死亡が認められ、次に 500 mg/kg 体重/日に投与量を下げたものの、この用量でも死亡が認められた。よって、最終的には、最高用量を 400 mg/kg 体重/日とした。

1
2 **(3) 発生毒性試験（ウサギ）**

3 **① メタラキシル（i）**

4 チンチラウサギ（一群雌20匹）の妊娠6～18日にメタラキシルを強制経口（原
5 体：0、5、10及び20 mg/kg 体重/日、溶媒：2%CMC水溶液）投与して発生毒
6 性試験が実施された。

7 本試験において、母動物及び胎児ともに毒性所見は認められなかったことから、
8 無毒性量は母動物及び胎児で本試験の最高用量20 mg/kg 体重/日であると考えら
9 れた。催奇形性は認められなかった。（参照19、20）

10
11 **② メタラキシル（ii）**

12 先のウサギを用いた発生毒性試験[12.(3)①]より高い投与量における催奇形
13 性の有無を検討するため、Dutch Belted ウサギ（一群雌18匹）の妊娠7～19日
14 にメタラキシルを強制経口（原体：0、30、150及び300 mg/kg 体重/日、溶媒：
15 1%CMC水溶液）投与して発生毒性試験が実施された。

16 母動物では、300 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制（妊娠7～13日）及び
17 摂餌量減少（妊娠7日）が認められた。胎児では検体投与の影響はみられなかつ
18 た。

19 本試験において、母動物では300 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制及び摂
20 餌量減少が認められ、胎児では毒性所見が認められなかったことから、無毒性量
21 は母動物で150 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量300 mg/kg 体重/日であ
22 ると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照6、8、19、20）

23
24 **13. 遺伝毒性試験**

25 **(1) メタラキシルM原体**

26 メタラキシルMの細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター
27 卵巣由来培養細胞（CHO）を用いた染色体異常試験、ラット肝初代培養細胞を
28 用いた不定期DNA合成（UDS）試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。

29 試験結果は表41に示されており、全て陰性であったことから、メタラキシル
30 Mに遺伝毒性はないと考えられた。（参照6、13、19、28、44）

31
32 **表41 遺伝毒性試験概要（メタラキシルM原体）** 事務局修正

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
in vitro	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2uvrA 株)	313～5,000 µg/プレート(+/-S9)	陰性
	染色体異常	チャイニーズハムスター卵巣由来培養細胞 (CHO)	① 127～508 µg/mL (-S9: 18時間処理) 254～1,020 µg/mL (+S9: 3時間処理、	陰性

	試験④		15 時間培養) ② 254~1,020 µg/mL (-S9) (18 及び 42 時間処理) 508~2,030 µg/mL (+S9) (3 時間処理、15 及び 39 時間培養)	
	染色体異常試験④	チャイニーズハムスター 卵巣由来培養細胞 (CHO)	① 313~1,250 µg/mL (+/-S9) (-S9 : 18 時間処理、+S9 : 3 時間処理、15 時間培養) ② 469~938 µg/mL (-S9 : 18 時間処理) 938~1,880 (+S9 : 3 時間処理、15 時間培養)	陰性
	UDS 試験	ラット肝初代培養細胞	4.88~625 µg/mL	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験	ICR マウス (骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	雄 : 200, 400, 800 mg/kg 体重 (投与 24 時間後採取) 500 mg/kg 体重 (投与 48 時間後採取) 雌 : 125, 250 mg/kg 体重 (投与 24 時間後採取) 500 mg/kg 体重 (投与 24 及び 48 時間後採取) (全て単回経口投与)	陰性

1 +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

2

3 (2) メタラキシル原体

4 メタラキシルの細菌を用いた DNA 修復試験、復帰突然変異試験及び復帰突然
5 変異試験/染色体有糸分裂交差試験、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異
6 試験、チャイニーズハムスター肺線維芽細胞 (CHL/IU) を用いた染色体異常試
7 験、チャイニーズハムスター及びマウスを用いた小核試験並びにマウスを用いた
8 優性致死試験が実施された。

9 試験結果は表 42 に示されており、全て陰性であったことから、メタラキシル
10 に遺伝毒性はないと考えられた。(参照 6、20)

11

12 表 42 遺伝毒性試験概要 (メタラキシル原体) 事務局修正

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験④	<i>Bacillus subtilis</i> (H17, M45 株)	20~5,000 µg/ディスク (-S9)	陰性
	DNA 修復試験④	<i>B. subtilis</i> (H17, M45 株)	10~5,000 µg/ディスク (+/-S9)	陰性
	復帰突然変異試験④	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535、 TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 _{hcr} 株)	10~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	復帰突然変異試験④	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535、 TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 _{hcr} 株)	5,000~25,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

	復帰突然変異試験③	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>hcr</i> 株)	10~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	復帰突然変異試験④	<i>S. typhimurium</i> (TA100, TA102, TA1535, TA1537 株)	20~5,000 µg/プレート (S9 の存在、 非存在は不明)	陰性
	復帰突然変異試験/染色 体有糸分裂交差試験	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (D7 株)	①400~10,000 µg/mL ②2,000~8,000 µg/mL (①、②とも S9 の存在、非存在は不明)	陰性
	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y <i>Tk</i> ⁺) (<i>Tk</i> 遺伝子座)	0.12~1 mg/mL (-S9) 0.062~0.5 mg/mL (+S9)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター 肺線維芽細胞 (CHL/IU)	156~625 µg/mL (-S9 : 24 及び 48 時 間処理) 625~2,500 µg/mL (+/-S9 : 6 時間処 理)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験①	チャイニーズハムスター (骨 髄細胞) (一群雌雄各 3 匹)	595, 1,190, 2,380 mg/kg 体重/日(最終 投与 24 時間後採取) (2 回経口投与)	陰性
	小核試験②	Tif:MAGf マウス (骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	78.1, 156, 313 mg/kg 体重(対照群及び 313 mg/kg 体重投与群 : 投与 16, 24 及び 48 時間後採取、78.1 及び 156 mg/kg 体重投与群 : 投与 24 時間後採 取) (単回経口投与)	陰性
	優性致死試験	NMRI マウス (一群雄 20 匹)	65, 200 mg/kg 体重 (単回経口投与)	陰性

1 +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

2

【林専門委員より】

- (1)試験欄の①、②・・・と、処理濃度欄の①、②・・・の意味合いがはっきりしません。表記方法を変えた方がよいのではないかと。
- (2)復帰突然変異試験は重要な試験のみを記載することでよいのではないかと。また、①及び③は同じ試験ではないでしょうか。②の試験は現行のガイドラインから考えてほぼ不要と考えます。
- (3)遺伝子突然変異試験の対象欄中にある *Tk* 遺伝子座の「座」（網掛け部分）は必要でしょうか。座は遺伝子の位置で、違和感があります（表 43 についても同様）。本間専門委員に確認をお願いします。

【事務局より】

- (1)試験欄は、報告書単位で記載しており、処理濃度欄は、濃度など条件を変更して実施した実験ごとに分けて記載されています。両方の欄に同様の①、②・・・の記載があり、まぎらわしいので他の評価書にあわせて試験欄の①、②・・・を削除しました。
- (2)復帰突然変異試験①及び③については、別々の試験機関において実施されていました。
- (3)本間専門委員から、「どちらでも構いません。これまでの評価書でも使っていたかと思しますので残したままでもよろしいかと思ます。」とのご意見をいただきました。

3

4 (3) 代謝物

メタラキシル及びメタラキシル M の代謝物 B、D 及び E（動物及び植物由来）、C1（動物、植物、土壌及び水中由来）、H（植物由来）並びに J（植物及び土壌由来）の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。ほかに B、C1 及び E の細菌を用いた DNA 修復試験、C1 及び J のチャイニーズハムスターV79 細胞又はマウスリンパ腫細胞を用いた突然変異試験並びに J のチャイニーズハムスターV79 細胞を用いた染色体異常試験が実施された。

結果は表 43 に示されているとおり、全て陰性であった。（参照 6、19、20）

表 43 遺伝毒性試験概要（代謝物）事務局修正

被験物質	試験	対象	処理濃度	結果
B	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17, M45 株)	75~2,500 µg/ディスク (-S9)	陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100 株)	100~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
C1	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17, M45 株)	150~10,000 µg/ディスク (-S9)	陰性
	復帰突然変異試験①	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	10~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	復帰突然変異試験②	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター V79 細胞 (<i>Hprt</i> 遺伝子座)	111~4,000 µg/mL (-S9) 92.6~3,000 µg/mL (+S9)	陰性
D	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
E	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17, M45 株)	75~2,500 µg/ディスク (-S9)	陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100 株)	100~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
H	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	156~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
J	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター V79 細胞 (<i>Hprt</i> 遺伝子座)	37.0~1,200 µg/mL (-S9) (21 時間処理) 55.6~2,000 µg/mL (+S9) (5 時間処理)	陰性

	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y <i>Tk</i> ^{+/+}) (<i>Tk</i> 遺伝子座)	500~2,950 µg/mL (+/-S9) (4時間処理)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター V79 細胞	188~3,000 µg/mL (+/-S9) (-S9 : 4、18、28 時間処理、+S9 : 4 時間処理)	陰性

1 +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

3 (4) 原体混在物

4 メタラキシル M の原体混在物[2]、[5]、[8]、[9]、[10]及び[12]の細菌を用いた
5 復帰突然変異試験並びに[12]のマウスリンパ腫細胞を用いた突然変異試験及びヒ
6 トリンパ球を用いた染色体異常試験が実施された。

7 結果は表 44 に示されているとおり、全て陰性であった。（参照 19）

8
9 表 44 遺伝毒性試験概要（原体混在物）

被験物質*	試験	対象	処理濃度	結果
[2]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2, WP2uvrA 株)	100~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
[5]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
[8]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2, WP2uvrA 株)	100~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
[9]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
[10]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
[12]	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y <i>Tk</i> ^{+/+}) (<i>Tk</i> 遺伝子座)	250~3,510 µg/mL (+/-S9) (4 時間処理)	陰性
	染色体異常試験	ヒトリンパ球	125~1,500 µg/mL (-S9) 1,000~2,500 µg/mL (+S9) (3、20 時間処理、68 時間培養)	陰性

10 +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

11 * : [5]はメタラキシル M 固有の原体混在物、ほかはメタラキシルと共通の原体混在物。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14. その他の試験

(1) ラットの肝臓における酵素誘導試験（メタラキシル）

SDラット（一群雄5匹）に、メタラキシルを40 mg/kg 体重/日（溶媒：0.6%MC水溶液）で7日間若しくは80 mg/kg 体重/日（溶媒：0.6%MC水溶液）で3又は7日間反復強制経口投与、陽性対照としてフェノバルビタール（PB）を80 mg/kg 体重/日で3日間、反復腹腔内投与し、肝薬物代謝酵素活性〔チトクローム b_5 及び P450（CYP）含量、アミノピリン *N*-デメチラーゼ（APDM）活性、*p*-ニトロアニソール *O*-デメチラーゼ活性、NADPH-チトクローム *c* リダクターゼ活性、*p*-ニトロフェノール UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ活性並びに DNCB GSH-*S* トランスフェラーゼ活性〕について検討された。

PB投与群では、全ての酵素活性が有意に上昇した。80 mg/kg 体重/日の3及び7日間投与群では、チトクローム b_5 含量を除くいずれの酵素活性も有意に上昇した。また、40 mg/kg 体重/日の7日間投与群では、チトクローム b_5 含量及び NADPH-チトクローム *c* リダクターゼ活性を除くいずれの酵素活性も僅かに上昇した。（参照6、20）

(2) メタラキシルの *in vitro* 肝細胞毒性試験

SDラット（雄）から採取した肝細胞、ミトコンドリア及びミクロゾーム分画にメタラキシルを0.1、1.0又は10 mmol（溶媒：DMSO）加えて培養し、非タンパクスルフヒドリル（NPSH）、LDH、マロンジアルデヒド（MDA）及びATP含有量について検討された。

メタラキシルによる影響は認められず、本試験条件下においてメタラキシルは肝細胞毒性を示さなかった。（参照13）

(3) ラットの心臓に対する影響（*in vivo*）

Wistarラット（一群雄5～6匹）を用い、メタラキシル、クロニジン、フェントラミン、ヨヒンビン及びプラゾシンが心臓活動に及ぼす影響について検討された。試験設計は表45に示されている。

表45 ラットの心臓に対する影響試験の試験設定

観察項目	投与化合物・投与量（いずれも単回腹腔内投与）
心電図解析	①メタラキシル（0、200、250及び300 mg/kg 体重）
	②クロニジン（20 mg/kg 体重）
	③フェントラミン（25 mg/kg 体重）単独投与又はメタラキシル（250 mg/kg 体重）の前投与
	④ヨヒンビン（10 mg/kg 体重）単独投与又はメタラキシル（250 mg/kg 体重）の前投与
	⑤プラゾシン（5 mg/kg 体重）単独投与又はメタラキシル（250 mg/kg 体重）の前投与

メタラキシル又はクロニジンの単独投与では、投与5分後から心拍数が減少し、少なくとも1時間は持続した。ヨヒンビン単独投与でも、投与30～60分後から心拍数が減少した。フェントラミン単独投与でも軽度の心拍数減少が認められたが、投与60分後には投与前の値まで回復した。プラゾシン単独投与による心拍数への影響は認められなかった。また、①では、メタラキシル投与により用量相関的に心拍数が減少した。

また、メタラキシル投与によって生じる心拍数減少は、フェントラミン又はプラゾシンの前投与により明らかに軽減されたが、ヨヒンビン前投与では軽減されなかった。（参照6、13）

（4）ラットの心臓に対する影響（*in vitro*）

Wistar ラット（雄）の心臓ホモジェネートにメタラキシルを4～40 μmol（溶媒：DMSO）加え、室温で30分間培養後、モノアミノオキシダーゼ（MAO）活性について検討された。

メタラキシルにより、MAO活性は用量相関的に阻害された。（参照13）

（5）28日間免疫毒性試験（マウス、メタラキシルM）

ICR マウス（一群雌10匹）に、メタラキシルMを28日間混餌（原体：0、200、2,000及び5,000 ppm：平均検体摂取量は表46参照）投与し、投与24日ヒツジ赤血球を静脈内投与して免疫毒性試験が実施された。陽性対照としてシクロホスファミド（投与24日から4日間、50 mg/kg 体重/日を腹腔内投与）が用いられた。

表46 28日間免疫毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		200 ppm	2,000 ppm	5,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雌	40	406	1,080

PFC アッセイ法によりヒツジ赤血球に対する液性抗体反応を測定した結果、脾臓細胞数、脾臓細胞数当たりのIgM抗体産生細胞数及び脾臓当たりのIgM抗体産生細胞数に影響は認められなかった。

本試験において、5,000 ppm投与群で肝絶対及び補正⁵重量の増加が認められた。本試験条件下において免疫毒性は認められなかった。（参照28、45）

⁵ 最終体重を共変数とした共分散分析値を補正重量という。

1 III. 食品健康影響評価

2 参照に挙げた資料を用いて、農薬「メタラキシル及びメタラキシル M」の食品健
3 康影響評価を実施した。なお、今回、動物体内運命試験（ラット、ヤギ及びニワト
4 リ）、植物体内運命試験（トマト）、作物残留試験（アスパラガス及びたまねぎ）、
5 畜産物残留試験（ウシ及びニワトリ）、急性神経毒性試験（ラット）、遺伝毒性試
6 験の成績等が新たに提出された。

7 ¹⁴Cで標識したメタラキシル及びメタラキシル M のラットを用いた動物体内運命
8 試験の結果、経口投与されたメタラキシル及びメタラキシル M はいずれも速やか
9 に吸収及び排泄され、吸収率はそれぞれ少なくとも 48.4%及び 38.0%であった。両
10 化合物とも、雄では糞中、雌では尿中への排泄がやや高かった。尿及び糞中で認め
11 られたメタラキシルは 1.8%**TAR** 以下と低く、メタラキシルの主要代謝物は D であ
12 った。体内における両化合物の投与 168 時間後の総残留放射能は 0.16%**TAR**～
13 0.55%**TAR** であった。メタラキシル及びメタラキシル M の吸収、体内分布、代謝
14 及び排泄に差は認められなかった。

15 ¹⁴C で標識したメタラキシルの泌乳ヤギ及び産卵鶏を用いた動物体内運命試験の
16 結果、泌乳ヤギでは乳汁で代謝物 H の脂肪酸（C10）抱合体、可食部組織で代謝物
17 B+L、C1、D 並びに E の異性体 a 及び b、産卵鶏では卵黄、卵白及び可食部組織
18 で代謝物 C1、D、E（抱合体を含む）、J、M+Q+R 並びに P の異性体 a 及び b が
19 それぞれ 10%**TRR** を超えて認められた。¹⁴C で標識したメタラキシル及びメタラキ
20 シル M の植物体内運命試験の結果、未変化のメタラキシル及びメタラキシル M の
21 代謝物の数及び種類は同じであり、10%**TRR** を超える代謝物として B、C1(C2)、D
22 （抱合体を含む）及び E（抱合体を含む）が認められた。また、鏡像異性体比は試
23 験期間を通して安定であった。植物体内でも、メタラキシル及びメタラキシル M
24 の代謝経路は同等であると考えられた。 上路専門参考人修正

25 メタラキシル及びメタラキシル M を分析対象化合物とした作物残留試験が国内
26 で、メタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を分析対象化合物と
27 した作物残留試験が海外で実施された。国内におけるメタラキシルの最大残留値は
28 温州みかん（果皮）で認められた 1.69 mg/kg であった。メタラキシル M の最大残
29 留値はだいこん（つまみ菜）で認められた 0.80 mg/kg であった。海外におけるメ
30 タラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の含量の最大残留値はだ
31 いこん（葉）で認められた 14 mg/kg であった。

32 泌乳牛及び産卵鶏を用いて、メタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有する
33 代謝物を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。メタラキシル及び
34 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の含量の最大残留値は 5.5 µg/g（泌乳牛に
35 おける腎臓）であった。

36 また、魚介類における最大推定残留値はメタラキシルで 0.099 mg/kg（水田）、
37 メタラキシル M で 0.00028 mg/kg（非水田）であった。

38 各種毒性試験結果から、メタラキシル及びメタラキシル M 投与による影響は、

1 主に肝臓（重量増加等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、
2 免疫毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

3 植物体内運命試験において代謝物 B、C1(C2)、D（抱合体を含む）及び E（抱合
4 体を含む）が 10%TRR 以上認められたが、これらはラットにおける動物体内運命
5 試験でも代謝物として認められ、急性毒性が弱く（LD₅₀：1,000～2,000 mg/kg 体
6 重又は 2,000 mg/kg 体重超）、遺伝毒性試験の結果が陰性であった。上路専門参考

7 人修正

8 畜産動物を用いた動物体内運命試験において、代謝物 B+L、C1、D、E の異性体
9 a 及び b、H の脂肪酸（C10）抱合体、J、M+Q+R 並びに P の異性体 a 及び b が
10 10%TRR 以上認められ、これらのうち H、J、P、Q 及び R はラットでは認められ
11 なかった。代謝物 H はメタラキシルから代謝物 D への中間代謝物と考えられ、代
12 謝物 J は急性毒性が弱く（LD₅₀：2,000 mg/kg 体重超）、遺伝毒性試験の結果が陰
13 性であるが、代謝物の残留量がメタラキシルに比べて高いこと、畜産物残留試験で
14 はメタラキシル及び 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物が一括して分析され
15 ていることを勘案し、農産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をメタラキシル及び
16 メタラキシル M（親化合物のみ）、畜産物中の暴露評価対象物質をメタラキシル及
17 びメタラキシル M 並びに 2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物と設定した。

【與語専門委員より】

網掛け部分について、「これらのうち H、J、P、Q 及び R はラットでは認められなかつた。」とあります。その後の暴露評価対象物質選定の文章で、代謝物 H 及び J は取り上げているものの、代謝物 P、Q 及び R に言及していないのは、その 3 つの化合物が、2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物ということでしょうか？代謝物 P、Q 及び R は、<別紙 1>に記載されていなかったもので、確認できませんでした。

【事務局より】

代謝物 P、Q 及び R について別紙 1 に追記しました。

【與語専門委員より】

事務局のご提案通りで結構です。

18 各試験における無毒性量等は表 47 に、単回経口投与等により惹起されると考え
19 られる毒性影響等は表 48 にそれぞれ示されている。

20 食品安全委員会農薬専門調査会は、メタラキシル及びメタラキシル M について
21 毒性プロファイルが同様と考えられたことから、それぞれを用いた各試験で得られ
22 た無毒性量のうち最小値を一日摂取許容量（ADI）及び急性参照用量（ARfD）の
23 設定根拠とするのが適当であると判断した。

24 メタラキシル及びメタラキシル M の各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、
25 イヌを用いた 90 日間亜急性毒性試験の 7.25 mg/kg 体重/日であったが、6 か月間慢
26 性毒性試験の無毒性量は 7.41 mg/kg 体重/日及び 2 年間慢性毒性試験の無毒性量は
27 8.0 mg/kg 体重/日が得られており、この差は用量設定の違いによるものであると考
28 えられた。したがって、食品安全委員会農薬専門調査会はイヌにおける無毒性量を

1 8.0 mg/kg 体重/日と判断し、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.08 mg/kg
2 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

3 また、メタラキシル及びメタラキシル M の単回経口投与等により生ずる可能性
4 のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ラットを用いた
5 28 日間亜急性毒性試験及びマウスを用いた一般薬理試験の 50 mg/kg 体重/日であ
6 ったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.5 mg/kg 体重を急性参
7 照用量（ARfD）と設定した。

8

ADI	0.08 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	亜急性毒性試験（メタラキシル M）及び慢性 毒性試験（メタラキシル）の総合評価
(動物種)	イヌ
(期間)	90 日間、6 か月間及び 2 年間
(投与方法)	経口及び混餌
(無毒性量)	8.0 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

9

ARfD	0.5 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料①)	亜急性毒性試験（メタラキシル M 及びメタラ キシル）
(動物種)	ラット
(期間)	28 日間
(投与方法)	経口
(ARfD 設定根拠資料②)	一般薬理試験（メタラキシル）
(動物種)	マウス
(期間)	単回
(投与方法)	経口
(無毒性量)	50 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

10 <参考>

11 <JMPR、2002 年>（メタラキシル及びメタラキシル M）

ADI	0.08 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験（メタラキシル）
(動物種)	イヌ
(期間)	2 年間

(投与方法) カプセル経口
 (無毒性量) 8 mg/kg 体重/日
 (安全係数) 100

ARfD 設定の必要なし

1 <米国>

2 メタラキシル（1994年）

cRfD 0.08 mg/kg 体重/日
 (cRfD 設定根拠資料) 亜急性毒性試験（メタラキシル）
 (動物種) イヌ
 (期間) 6 か月間
 (投与方法) 混餌
 (無毒性量) 7.8 mg/kg 体重/日
 (不確実係数) 100

3 メタラキシル M（2010年）

cRfD 0.074 mg/kg 体重/日
 (cRfD 設定根拠資料) 亜急性毒性試験（メタラキシル）
 (動物種) イヌ
 (期間) 6 か月間
 (投与方法) 混餌
 (無毒性量) 7.41 mg/kg 体重/日
 (不確実係数) 100

aRfD 設定の必要なし

4 <EU、2010年、メタラキシル>

5 <EFSA、2015年、メタラキシル M>

ADI 0.08 mg/kg 体重/日
 (ADI 設定根拠資料) 亜急性毒性試験（メタラキシル M）
 及び慢性毒性試験（メタラキシル）
 の総合評価
 (動物種) イヌ
 (期間) 90 日間、6 か月間及び 2 年間
 (投与方法) 混餌又は経口
 (無毒性量) 7.25、7.41 及び 8.0 mg/kg 体重/日
 (安全係数) 100

ARfD	0.5 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	発生毒性試験 (メタラキシル)
(動物種)	ラット
(期間)	妊娠 6~15 日
(投与方法)	経口
(無毒性量)	50
(安全係数)	100

1 <豪州、2005年> (メタラキシル)

ADI	0.03 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験 (メタラキシル)
(動物種)	ラット
(期間)	2年間
(投与方法)	混餌
(無影響量)	3 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	設定の必要なし
------	---------

2 <カナダ、2007年> (メタラキシル及びメタラキシル M)

cRfD	0.074 mg/kg 体重/日
(cRfD 設定根拠資料)	慢性毒性試験 (メタラキシル)
(動物種)	イヌ
(期間)	6 か月
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	7.4 mg/kg 体重/日
(不確実係数)	100

3

aRfD	設定の必要なし
------	---------

4

5

(参照 6、8、14、46、49、50、51)

1

表47 各試験における無毒性量等

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
ラット	28日間 亜急性 毒性試験	メタラキシル M	0、10、50、150、 300	300	300			雌雄：50 雌雄：自発運動低下	雌雄：50 雌雄：自発運動低下
		メタラキシル	0、10、50、150、 300	300	50 脾髄外造血亢進			雄：300 雌：50 雄：毒性所見なし 雌：脾髄外造血亢進	雄：300 雌：50 雄：毒性所見なし 雌：脾髄外造血亢進
	90日間 亜急性 毒性試験	メタラキシル M	0、25、50、250、625、 1,250 ppm 雄：0、1.72、3.50、 16.8、44.8、90.5 雌：0、1.86、3.71、 17.9、49.2、95.0	91 毒性所見なし		17 雄：肝細胞封入体 雌：肝細胞肥大		雄：16.8 雌：95.0 雄：肝細胞内封入 体等 雌：毒性所見なし	雄：16.8 雌：17.9 雄：肝細胞内封入 体 雌：肝細胞肥大
		メタラキシル (i)	0、50、250、1,250 ppm 雄：0、3.2、16.2、 79.3 雌：0、3.5、17.7、 85.6	79 毒性所見なし	17 雄：摂餌量減少 雌：肝細胞肥大		雄：16.2 雌：85.6 雄：体重増加抑制 及び摂餌量減少 雌：毒性所見なし	雄：16.2 雌：3.5 雄：体重増加抑制 及び摂餌量減少 雌：肝細胞肥大	
		メタラキシル (ii)	0、10、50、250、 1,250 ppm	0.66 (参考)		0.7		雄：71.8 雌：73.9	雄：71.8 雌：73.9

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
			雄：0、0.66、3.51、 15.4、71.8 雌：0、0.67、3.56、 15.8、73.9	副腎重量増加 注) 評価に用いず		副腎重量増加		毒性所見なし	毒性所見なし
		メタラキシル (iii)	0、50、250、1,250、 9,380 ppm 雄：0、3.15、15.6、 79.8、605 雌：0、3.43、17.5、 87.0、646					雄：79.8 雌：17.5 雌雄：体重増加抑制等	雄：15.6 雌：17.5 雌雄：肝比重量増加等
	90 日間 亜急性 神経毒性 試験	メタラキシル M	0、50、250、1,250 ppm 雄：0、3.8、19.3、 96.2 雌：0、4.4、21.4、109					雄：96.2 雌：21.4 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制 及び摂餌量減少 (亜急性神経毒性 は認められない)	雄：96.2 雌：21.4 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制 及び摂餌量減少 (亜急性神経毒性 は認められない)
	2 年間 慢性毒性 /発がん 性併合 試験	メタラキシル	0、50、250、1,250 ppm 雄：0、1.9、9.4、46.6 雌：0、2.2、11.1、 55.1	43 毒性所見なし (発がん性は認め られない)	13 肝比重量増加等 (発がん性は認め られない)	3 肝重量増加等 (発がん性は認め られない)		雄：46.6 雌：55.1 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認め られない)	雄：46.6 雌：2.2 雄：毒性所見なし 雌：肝細胞脂肪化 (発がん性は認め られない)
	3 世代 繁殖試験	メタラキシル	0、50、250、1,250 ppm P 雄：0、3.1、15.6、 77.6	親動物及び児動物 96 毒性所見なし	親動物及び児動物 63 毒性所見なし	親動物及び児動物 100 毒性所見なし		親動物及び児動物 P 雄：77.6 P 雌：92.9 F ₁ 雄：106	親動物及び児動物 P 雄：77.6 P 雌：92.9 F ₁ 雄：106

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
			P 雌 : 0、3.6、17.5、 92.9 F ₁ 雄 : 0、4.1、20.9、 106 F ₁ 雌 : 0、4.8、23.0、 127 F ₂ 雄 : 0、4.0、19.7、 99.2 F ₂ 雌 : 0、4.7、23.2、 124	(繁殖能に対する 影響は認められな い)	(繁殖能に対する 影響は認められな い)	(繁殖能に対する 影響は認められな い)		F ₁ 雌 : 127 F ₂ 雄 : 99.2 F ₂ 雌 : 124 毒性所見なし (繁殖能に対する 影響は認められな い)	F ₁ 雌 : 127 F ₂ 雄 : 99.2 F ₂ 雌 : 124 毒性所見なし (繁殖能に対する 影響は認められな い)
発生毒性 試験		メタラキシル M	0、10、50、250	母動物 : 50 胎 児 : 250 母動物 : 体重増加 抑制等 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	/	母動物 : 10 胎 児 : 50 母動物 : 体重増加 抑制等 胎児 : 中足骨及び 末節骨の未骨化増 加	/	母動物 : 50 胎 児 : 250 母動物 : 体重増加 抑制及び摂餌量減 少 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	母動物 : 50 胎 児 : 250 母動物 : 体重増加 抑制及び摂餌量減 少 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない)
		メタラキシル	0、20、60、120	母動物 : 20 胎 児 : 120 母動物 : 体重増加 抑制 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない) 注) 参考試験	/	/	/	母動物 : 60 胎 児 : 120 母動物 : 体重増加 抑制等 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	母動物 : 60 胎 児 : 120 母動物 : 体重増加 抑制等 胎児 : 毒性所見な し (催奇形性は認め られない)

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
		メタラキシル (追加試験)	0、50、250、400	母動物：50 胎児：400 母動物：死亡等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物及び胎児： 50	50 母動物：死亡等 胎児：骨化遅延を示す胎児数の増加 (催奇形性は認められない)		母動物及び胎児： 50 母動物：死亡及び体重増加抑制等 胎児：骨化遅延を示す胎児数の増加 (催奇形性は認められない)	母動物及び胎児： 50 母動物：死亡及び体重増加抑制等 胎児：骨化遅延を示す胎児数の増加 (催奇形性は認められない)
マウス	2年間 発がん性 試験	メタラキシル	0、50、250、1,250 ppm 雄：0、4.5、22.8、119 雌：0、5.0、24.9、132	19 雄：体重増加抑制等 雌：毒性所見なし (発がん性は認められない)		25 体重低下 (発がん性は認められない)		雄：22.8 雌：132 雄：体重増加抑制及び食餌効率低下 雌：毒性所見なし (発がん性は認められない)	雄：22.8 雌：132 雄：体重増加抑制及び食餌効率低下 雌：毒性所見なし (発がん性は認められない)
ウサギ	発生毒性 試験	メタラキシル	0、5、10、20	母動物：5 胎児：20 母動物：体重増加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)		5 母動物：体重低下等 胎児：毒性所見なし		母動物及び胎児： 20 毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物及び胎児： 20 毒性所見なし (催奇形性は認められない)

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
		メタラキシル (追加試験)	0、30、150、300	母動物：150 胎児：300 母動物：体重増加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：150 胎児：300 母動物：体重増加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	30 母動物：体重増加抑制 胎児：毒性所見なし		母動物：150 胎児：300 母動物：体重増加抑制及び摂餌量減少 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：150 胎児：300 母動物：体重増加抑制及び摂餌量減少 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
イヌ	90 日間 亜急性 毒性試験	メタラキシル M	0、50、125、250、 1,250 ppm 雄：0、1.57、4.07、 7.25、38.6 雌：0、1.56、4.33、 7.93、39.5	7.3 ALP 増加等		7.6 ALP 増加等		雄：7.25 雌：7.93 雌雄：ALP 増加並びに肝絶対及び比重量増加	雄：7.25 雌：7.93 雌雄：ALP 増加並びに肝絶対及び比重量増加
	6 か月間 慢性 毒性試験	メタラキシル	0、50、250、1,000 ppm 雄：0、1.57、7.80、 30.6 雌：0、1.71、7.41、 32.4	7.8 ALP 増加等	7.4 ALP 増加等	8.0 ALP 増加等	7.41	雄：7.80 雌：7.41 雄：ALP 増加 雌：ALP 及び肝対脳重量比増加	雄：7.80 雌：7.41 雄：ALP 増加 雌：ALP 及び肝対脳重量比増加
	2 年間 慢性毒性 試験	メタラキシル	雌雄：0、0.8、8.0、80	8 強直性痙攣及び流涎を伴う死亡等		8 強直性痙攣及び流涎を伴う死亡等		雌雄：8.0 雌雄：強直性痙攣及び流涎を伴う死亡等	雌雄：8.0 雌雄：強直性痙攣及び流涎を伴う死亡等

動物種	試験	検体	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾					
				JMPR	米国	豪州	カナダ	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
			亜急性毒性試験及び慢性毒性試験の総合評価	/	/	/	/	8.0	/
			ADI (cRfD)	NOAEL : 8 SF : 100 ADI : 0.08	NOAEL : 7.4 UF : 100 cRfD : 0.074	NOAEL : 3.0 SF : 100 ADI : 0.03	NOAEL : 7.41 UF : 100 cRfD : 0.074	NOAEL : 8.0 SF : 100 ADI : 0.08	NOAEL : 2.2 SF : 100 ADI : 0.022
			ADI 設定根拠資料	イヌ 2 年間慢性毒性試験	イヌ 6 か月間亜急性毒性試験	ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験	イヌ 6 か月間亜急性毒性試験	イヌ 90 日間亜急性毒性試験、6 か月間慢性毒性試験及び 2 年間慢性毒性試験の総合評価	ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験

1 / : 用いた資料に記載なし

2 ADI : 一日摂取許容量 NOAEL : 無毒性量 cRfD : 慢性参照用量 SF : 安全係数 UF : 不確実係数

3 1) 無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

1

表48 単回経口投与により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	検体	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に 関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ^a
ラット	メタ ラキ シル M	急性毒性試験①	雄：500、1,000、2,000 雌：200、500	雌雄：－ 雄：立毛、横臥、呼吸困難、自発運動低下、 痙攣、振戦及び円背位 雌：立毛、円背位、呼吸困難、自発運動低 下及び歩行失調
		急性毒性試験②	雄：1,000、1,500、2,000 雌：200、400、600	雌雄：－ 雄：自発運動低下、歩行失調、呼吸困難、 虚脱、流涙、筋弛緩、削瘦及び円背位 雌：自発運動低下、歩行失調及び円背位
		急性神経毒性試験	雄：0、250、500、1,000 雌：0、87.5、175、350	雌雄：－ 雄：自発運動量（総運動量及び歩行運動量） 減少 雌：自発運動量（総運動量及び歩行運動量） 減少及び立ち上げ利回数減少
		28日間亜急性毒性 試験	0、10、50、150、300	雌雄：50 雌雄：自発運動低下（メタラキシルM）
	メタ ラキ シル	急性毒性試験①	215、464、775、1,000、 1,290、2,150	雌雄：－ 雌雄：沈静化、呼吸困難、眼球突出、粗毛、 強直性間代性痙攣及び彎曲姿勢
		急性毒性試験②	雄：0、1,080、1,296、1,555、 1,866、2,239 雌：0、750、900、1,080、 1,296、1,555	雌雄：－ 雌雄：自発運動低下及び流涎
		発生毒性試験②	0、20、60、120	母動物：120 母動物：毒性所見なし
		発生毒性試験③	0、50、250、400	母動物：50 母動物：痙攣、振戦、歩行失調等
		発生毒性試験②及び③の総合評価		母動物：120
	マウス	メタ ラキ シル M	一般薬理試験	0、30、100、300、1,000
急性毒性試験			雄：500、1,000 雌：200、500、1,000	雌雄：－ 雄：腹臥、横臥、呼吸困難、自発運動低下、 痙攣、振戦、強直性痙攣、円背位、立毛 及び歩行失調 雌：円背位及び立毛

動物種	検体	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に 関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ^a
	メ タ ラ キ シル	一般薬理試験	0、50、200	雄：50 雄：自発運動量減少
		急性毒性試験①	317、464、600、1,000、 2,150	雌雄：－ 雌雄：沈静化、呼吸困難、眼球突出、彎曲 姿勢又は腹臥位及び粗毛
		急性毒性試験②	0、600、720、864、1,037、 1,244	雌雄：－ 雌雄：自発運動低下、うずくまり姿勢、横 臥及び腹臥
ウサギ	メ タ ラ キ シル	発生毒性試験②	0、30、150、300	母動物：150 母動物：体重増加抑制及び摂餌量減少
ARfD				NOAEL：50 SF：100 ARfD：0.5
ARfD 設定根拠資料				ラット 28 日間亜急性毒性試験 マウス一般薬理試験

1 ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量

2 ^a：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

3 －：無毒性量は設定されなかった。

4

5

6

1 <別紙 1：代謝物/分解物/原体混在物略称> 與語専門委員コメントに基づき事務局追記

2

記号	略称	化学名	
代謝物／分解物	B	CGA 100255	2-[(3-ヒドロキシ-2,6-ジメチルフェニル)-(2-メトキシアセチル)アミノ]プロピオン酸メチルエステル
	C1	CGA 62826	2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-メトキシアセチル)アミノ]プロピオン酸
	C2	NOA 409045 (C1 の D-鏡像異性体)	D-2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-メトキシアセチル)-アミノ]-プロピオン酸
	D	CGA107955	2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸
	E	CGA94689	2-[(2-ヒドロキシメチル-6-メチルフェニル)-(2-メトキシアセチル)アミノ]プロピオン酸メチルエステル
	F	HMA	2-[(2-ヒドロキシメチル-6-メチルフェニル)-(2-メトキシアセチル)アミノ]プロピオン酸
	H	CGA 67869	2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸メチルエステル
	I	CGA 108905	2-[(2-カルボキシ-6-メチルフェニル)-(2-メトキシ-アセチル)アミノ]プロピオン酸メチルエステル
	J	CGA 108906	2-[(2-カルボキシ-6-メチルフェニル)-(2-メトキシ-アセチル)アミノ]プロピオン酸
	L	CGA 37734	<i>N</i> -(2,6-ジメチルフェニル)-2-ヒドロキシアセトアミド
	M	CGA 79353	<i>N</i> -(カルボキシカルボニル)- <i>N</i> -(2,6-ジメチルフェニル)アラニンメチルエステル
	N	CGA 67867	<i>N</i> -(2,6-ジメチルフェニル)アラニン
	P	<u>P1 又は P2</u>	<u><i>N</i>-(2-(ヒドロキシメチル)-6-メチルフェニル)-<i>N</i>-(ヒドロキシアセチル)アラニン</u> P1 及び P2 はそれぞれ a 及び b 異性体
	Q	<u>CGA78532</u>	<u><i>N</i>-(カルボキシカルボニル)-<i>N</i>-(2,6-ジメチルフェニル)アラニン</u>
R	<u>CGA68124</u>	<u>(2,6-ジメチルフェニル)オキサミン酸</u>	
原体混在物	[2]	—	—
	[5]	—	—
	[8]	—	—
	[9]	—	—
	[10]	—	—
	[12]	—	—

3
4

1 <別紙2：検査値等略称>

略称	名称
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ACh	アセチルコリン
ai	有効成分量 (active ingredient)
Alb	アルブミン
ALP	アルカリホスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ (=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT))
APDM	アミノピリン <i>N</i> -デメチラーゼ
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間
ATP	アデノシン三リン酸
AUC	薬物濃度曲線下面積
BCF	生物濃縮係数
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
CYP	チトクローム P450 アイソザイム
DMPP	1,1-ジメチル-4-フェニルピペラジニウムヨージド
DMSO	ジメチルスルホキシド
DNCB	2,4-ジニトロクロロベンゼン
FOB	機能観察総合検査
Glob	グロブリン
Glu	グルコース (血糖)
Hb	ヘモグロビン (血色素量)
His	ヒスタミン
Ht	ヘマトクリット値
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
LDH	乳酸脱水素酵素
MAO	モノアミンオキシダーゼ
MC	メチルセルロース
MDA	マロンジアルデヒド
NA	ノルアドレナリン
NADPH	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
NPSH	非タンパクスルフヒドリル
PB	フェノバルビタール
水産 PEC	水産動植物被害予測濃度
PFC	プラーク形成細胞
PHI	最終使用から収穫までの日数
PT	プロトロンビン時間
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与 (処理) 放射能
T.Chol	総コレステロール
T _{max}	最高濃度到達時間
TP	総蛋白質

TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成

1

2

1 <別紙3：作物残留試験成績（国内）>

2 ①メタラキシル M を用いた作物残留試験成績

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル M			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
だいず (露地) [乾燥子実] 2006年	1	160~200 ^{WG} (散布)	3	7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		3	7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
だいず (露地) [乾燥子実] 2008年	1	0.136 mL ai/kg 種子 ^{SC} (種子塗布)	1	125	/		<0.01	<0.01
	1		1	127			<0.01	<0.01
あずき (露地) [乾燥子実] 2006年	1	96~160 ^{WG} (散布)	3	7 ^a	0.02	0.02	0.01	0.01
				14 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		3	7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
あずき (露地) [乾燥子実] 2009年	1	0.136 mL ai/kg 種子 ^{SC} (種子塗布)	1	125	/		<0.01	<0.01
	1		1	112			<0.01	<0.01
いんげんまめ (露地) [乾燥子実] 2011年	1	0.136 mL ai/kg 種子 ^{SC} (種子塗布)	1	94	/		<0.01	<0.01
	1		1	91			<0.01	<0.01
べにばないんげん (露地) [乾燥子実] 2008年	1	0.01 g ai/株 ^G (株元散布)	1	89	<0.02	<0.02	/	
				96	<0.02	<0.02		
	1		1	91	<0.02	<0.02		
				98	<0.02	<0.02		
ばれいしょ (露地) [塊茎] 1999年	1	152 ^{SC} (散布)	3	7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		3	7	0.01	0.01	<0.01	<0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
てんさい (露地) [根部] 2009年	1	0.136 mL ai/10万 粒種子 ^{SC、a} (種子塗布)	1	208	/		<0.01	<0.01
	1		1	188			<0.01	<0.01
だいこん (露地) [つまみ菜] 2007年	1	900 ^G (土壌混和)	1	14	/		0.08	0.08
	1		1	14			0.80	0.78
1				1			20	0.02

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年 (露地) [間引き菜] 2007年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					メタラキシル M				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
	1		1	23			0.14	0.14	
わさびだいこん (露地) [根部] 2006年	1	60~80 ^{WG} (散布)	3	7 ^a	/		<0.01	<0.01	
				14			<0.01	<0.01	
		21	<0.01	<0.01					
	1	3	7 ^a	0.01			0.01		
			14	0.01			0.01		
		20	<0.01	<0.01					
はくさい (露地) [茎葉] 2005年	1	145~198 ^{SC} (散布)	3	3 ^a	0.05	0.04	0.04	0.04	
					7	0.02	0.02	0.03	0.02
					14	0.01	0.01	0.02	0.02
	1		3	3 ^a	0.04	0.04	0.06	0.06	
					7	0.03	0.03	0.03	0.03
					14	0.03	0.03	0.03	0.03
キャベツ (露地) [葉球] 2007年	1	198 ^{SC} ・ ^a (散布)	3	7	0.10	0.10	0.04	0.04	
					14	0.04	0.04	0.03	0.02
					21	0.04	0.04	0.03	0.03
	1		3	7	0.11	0.11	0.11	0.11	
					14	0.10	0.10	0.12	0.12
					21	0.05	0.05	0.09	0.08
ブロッコリー (露地) [花蕾] 2008年	1	103~124 ^{SC} (散布)	2	14 ^a	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
					21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
					28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1		2	14 ^a	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
					21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
					28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ごぼう (露地) [根部] 2009年	1	1,800 ^G (播種前作条土壌 混和)	1	141	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
					148	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
					155	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
	1		1	148	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
					155	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
					162	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
レタス (施設) [茎葉] 2005年	1	132 ^{SC} (散布)	3	3 ^a	0.17	0.16	0.33	0.33	
					7	0.07	0.07	0.07	0.07
					14	0.02	0.02	<0.01	<0.01
	1		3	3 ^a	0.06	0.06	0.08	0.08	
					7	0.07	0.06	0.20	0.20
					14	0.04	0.04	0.09	0.09
リーフレタス (露地) [茎葉] 2008年	1	124 ^{SC} (散布)	2	14 ^a	/		0.01	0.01	
							21	<0.01	<0.01
							28	<0.01	<0.01
	1		2	14 ^a			0.46	0.46	
							21	0.19	0.19
							28	0.14	0.14
たまねぎ (露地) [鱗茎] 2005年	1	132~165 ^{SC} (散布)	3	3 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
					7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
					14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		3	3 ^a	0.02	0.02	0.02	0.02	
					7	0.01	0.01	0.01	0.01
					14	0.01	0.01	0.01	0.01

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル M			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ねぎ (露地) [茎葉部] 2005年	1	132~198 ^{SC} (散布)	3	3 ^a	0.02	0.02	0.02	0.02
				7 ^a	0.03	0.02	0.02	0.02
	14		0.02	0.02	0.02	0.02		
	1		3	3 ^a	0.20	0.20	0.12	0.12
7 ^a		0.04	0.04	0.03	0.03			
14	0.03	0.03	0.03	0.03				
ねぎ (露地) [茎葉部] 2011年	1	900 ^G (土壌混和1回) + 181~200 ^{SC, a} (散布3回)	4	7 ^a	/	/	0.04	0.04
				14			0.05	0.04
	21		0.05	0.05				
	1		4	7 ^a			0.02	0.02
14		<0.01	<0.01					
21	<0.01	<0.01						
アスパラガス (露地) [若茎] 2010年	1	50~66 ^{SC} (散布)	3	1	/	/	<0.01	<0.01
				3			<0.01	<0.01
	7		<0.01	<0.01				
	1		3	1			0.04	0.04
3		0.02	0.02					
7	<0.01	<0.01						
わけぎ (露地) [茎葉] 2013年	1	73~74 ^{SC} (散布)	2	14	/	/	<0.01	<0.01
				21			<0.01	<0.01
	28		<0.01	<0.01				
	1		2	14			<0.01	<0.01
21		<0.01	<0.01					
28	<0.01	<0.01						
らっきょう (露地) [鱗茎] 2007年	1	137~198 ^{SC, a} (散布)	3	7 ^a	/	/	<0.01	<0.01
				14			<0.01	<0.01
	21		<0.01	<0.01				
	1		3	7 ^a			<0.01	<0.01
14		<0.01	<0.01					
21	<0.01	<0.01						
にんじん (露地) [根部] 2009年	1	1,800 ^G (土壌混和)	1	89	0.023	0.022	0.026	0.026
				96	0.013	0.013	0.020	0.020
	103		0.014	0.014	0.009	0.008		
	1		1	94	0.023	0.022	0.022	0.022
101		0.020	0.020	0.016	0.016			
108	0.017	0.017	0.020	0.020				
トマト (施設) [果実] 2000年	1	131~137 ^{SC} (散布)	4	1	0.09	0.09	0.05	0.04
				3	0.04	0.04	0.05	0.04
	7		0.01	0.01	0.01	0.01		
	1		4	1	0.15	0.15	0.14	0.14
3		0.08	0.08	0.05	0.04			
7	0.03	0.03	0.03	0.03				
ミニトマト (施設) [果実] 2010年	1	78~83 ^{SC} (散布)	4	1 ^a	0.03	0.03	0.02	0.02
				3 ^a	0.03	0.03	0.02	0.02
	7		0.03	0.03	0.02	0.02		
	1		4	14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1 ^a		0.02	0.02	0.02	0.02			
3 ^a	0.02	0.02	0.02	0.02				
7	<0.01	<0.01	0.01	0.01				
14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
ピーマン	1	0.03 g ai/株 ^G	3	1	0.08	0.08	0.07	0.06

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年 (施設) [果実] 1999年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法) (株元散布)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					メタラキシル M						
					公的分析機関		社内分析機関				
					最高値	平均値	最高値	平均値			
ピーマン (施設) [果実] 2009年	1	86~132 ^{SC} (散布)	3	3	0.11	0.11	0.09	0.09			
				7	0.11	0.10	0.09	0.08			
			4 ^a	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
				7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
				14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	1		4 ^a	21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
				28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
			4 ^a	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
				7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
				14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
なし (施設) [果実] 2005年	1	86~132 ^{SC} (散布)	3	1	0.05	0.05	0.09	0.08			
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
			14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	1		3	1	0.17	0.16	0.18	0.18			
				7	0.04	0.04	0.05	0.04			
			14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
ししとう (施設) [果実] 2008年	1	0.03 g ai/株 ^G (株元散布)	4 ^a	1			<0.1	<0.1			
				7			<0.1	<0.1			
				14			<0.1	<0.1			
				21			<0.1	<0.1			
	1		4 ^a	28			<0.1	<0.1			
				1			<0.1	<0.1			
				7			<0.1	<0.1			
				14			<0.1	<0.1			
甘長とうがらし (露地又は施設) [果実] 2009年	1	0.03 g ai/株 ^G (株元散布)	4 ^a	1	0.6	0.5					
				3	0.4	0.4					
				7	0.3	0.3					
				14	0.2	0.2					
	1		4 ^a	1	<0.1	<0.1					
				3	<0.1	<0.1					
				7	<0.1	<0.1					
				14	<0.1	<0.1					
きゅうり (施設) [果実] 1999年	1	152 ^{SC} (散布)	3	1	0.13	0.12	0.09	0.09			
				3	0.08	0.08	0.07	0.06			
				7	0.04	0.04	0.03	0.03			
	1		3	1	0.13	0.13	0.12	0.12			
				3	0.17	0.17	0.12	0.12			
			7	7	0.05	0.05	0.03	0.03			
				きゅうり (施設) [果実] 2005年	145 ^{SC} (散布)	3	1	0.19	0.18	0.18	0.18
							3	0.19	0.18	0.17	0.17
7	0.11	0.11	0.09	0.08							

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					メタラキシル M				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
かぼちや (施設) [果実] 2010~2011年	1	73~94 ^{WP} (散布)	3	3 ^a	<0.01	<0.01	0.01	0.01	
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				14	<0.01	<0.01	0.01	0.01	
	1		3	3 ^a	0.02	0.02	0.01	0.01	
					7	0.01	0.01	<0.01	<0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
すいか (施設) [果肉] 1999年	1	102~152 ^{SC} (散布)	3	7	0.01	0.01	0.01	0.01	
				14	0.01	0.01	0.01	0.01	
				21	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1		3	7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
					14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
メロン (施設) [果肉] 2005年	1	165~198 ^{SC} (散布)	3	1 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	1		3	1 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
					7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
オクラ (施設) [果実] 2013年	1	1,800 ^G (土壌混和) + 900 ^G (株元散布)	4	15	/	/	/	0.02	0.02
								17	0.01
				21				<0.01	<0.01
				28				<0.01	<0.01
		1	0.02	0.02					
		3	0.01	0.01					
		7	0.01	0.01					
		14	<0.01	<0.01					
	1	1,800 ^G (土壌混和) + メタラキシル 2,000 ^G (株元散布)	4	1	0.11	0.11			
				3	0.09	0.09			
				7	0.16	0.16			
				14	0.06	0.06			
	1	1,800 ^G (土壌混和) + 900 ^G (株元散布)	4	15	<0.01	<0.01			
				17	<0.01	<0.01			
				21	<0.01	<0.01			
				28	<0.01	<0.01			
			4	1	0.02	0.02			
					3	0.02	0.02		
				7	0.01	0.01			
				14	<0.01	<0.01			
	1	1,800 ^G (土壌混和) + メタラキシル 2,000 ^G (株元散布)	4	1	0.30	0.28			
				3	0.23	0.22			
				7	0.18	0.17			
				14	0.02	0.02			
葉しょうが (露地) [茎葉・根茎]	1	1,800 ^G (土壌表面散布)	3	14 ^a	<0.01	<0.01	/		
				21	<0.01	<0.01			
				28	<0.01	<0.01			
				35	<0.01	<0.01			

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル M			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
2013 年	1		3	14 ^a	<0.01	<0.01		
				21	<0.01	<0.01		
				28	<0.01	<0.01		
				35	<0.01	<0.01		
えだまめ (露地) [さや] 2008 年	1	0.136 mL ai/kg 種子 ^{SC} (種子塗布)	1	83	/		<0.01	<0.01
	1		69	<0.01			<0.01	
いちご (施設) [果実] 2006 年	1	0.002 ^{WG} mL ai/株 (散布 3 回) + メタラキシル 2,000 ^G (土壌混和)	4	96	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				103	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		4	63	0.05	0.05	0.06	0.06
				70	0.05	0.05	0.05	0.05
			77	0.04	0.04	0.04	0.04	
ぶどう (施設) [果実] 1999 年	1	152 ^{SC} (散布)	2	42 ^a	0.01	0.01	0.01	0.01
				56 ^a	0.01	0.01	0.01	0.01
			70	0.02	0.02	0.04	0.04	
	1			2	42 ^a	0.01	0.01	0.01
56 ^a		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
			70	<0.01	<0.01	0.01	0.01	

- 1 G：粒剤、SC：フロアブル、WG：顆粒水和剤、WP：水和剤、/：実施せず
- 2 ・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。
- 3 ・農薬の使用量、使用回数及び使用時期（PHI）が、登録又は申請された使用方法から逸脱している
- 4 場合は、使用量、回数又は PHI に^aを付した。
- 5

1 ②メタラキシルを用いた作物残留試験成績

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稲 (露地) [玄米] 1982年	1	①0.125 g ai/L 溶液 WP、a(種子浸漬) + 1.6 g ai/箱 ^G (育苗箱処理) ②0.125 g ai/L 溶液 WP(種子浸漬) + 1.6 g ai/箱 ^G (育苗箱処理1回) + 2,500 ^{G、a} (本田湛水散布2回)	2 ^①	134	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			4 ^②	93	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		2 ^①	142	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			4 ^②	70	0.03	0.02	0.02	0.02
水稲 (露地) [稲わら] 1982年	1	①0.125 g ai/L 溶液 WP、a(種子浸漬) + 1.6 g ai/箱 ^G (育苗箱処理1回) + 2,500 ^{G、a} (本田湛水散布2回)	2 ^①	134	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01
			4 ^②	93	<0.04	<0.04	0.01	0.01
	1		2 ^①	142	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01
			4 ^②	70	0.18	0.18	0.24	0.22
水稲 (露地) [玄米] 2006年	1	0.04 g ai/箱 ^D (育苗箱処理1回) + 0.04 g ai/箱 ^{SL} (育苗箱処理2回) + 1,200 ^G (湛水散布2回)	5 ^a	45 ^a 60 ^a 89 ^a	0.04 <0.01 <0.01	0.04 <0.01 <0.01	0.060 0.007 0.001	0.060 0.007 0.001
			5 ^a	45 ^a 60 ^a 89 ^a	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.028 0.006 <0.001	0.028 0.006 <0.001
	1		5 ^a	45 ^a 60 ^a 89 ^a	0.2 <0.1 <0.1	0.2 <0.1 <0.1	0.2 <0.1 <0.1	0.2 <0.1 <0.1
			5 ^a	45 ^a 60 ^a 89 ^a	<0.1 <0.1 <0.1	<0.1 <0.1 <0.1	0.1 <0.1 <0.1	0.1 <0.1 <0.1
だいず (露地) [えだまめ] 1987年	1	0.75 g ai/kg 種子 WP、a (粉衣)	1	108	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			1	100	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1		1	143	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			1	130	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
だいず (露地) [乾燥子実] 2006年	1	200~400 ^{WP} (処理方法不明)	3	7 ^a 14 ^a 21 ^a	0.007 0.008 <0.005	0.007 0.008 <0.005	<0.005 0.007 <0.005	<0.005 0.007 <0.005
			3	7 ^a 14 ^a 21 ^a	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005
	1		3	7 ^a 14 ^a 21 ^a	0.014 0.014 0.014	0.014 0.014 0.014	0.009 0.011 0.010	0.009 0.011 0.010
			3	7 ^a 14 ^a 21 ^a	0.029 0.025 0.025	0.028 0.025 0.025	0.019 0.016 0.019	0.018 0.016 0.019

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					メタラキシル				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
ばれいしょ (露地) [塊茎] 1980年	1	250~1,250 ^{WP} (散布)	4 ^a	6	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	
				14	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	
				21	0.01	0.01	<0.05	<0.05	
			1	6 ^a	7	<0.01	<0.01	0.13	0.11
	14				0.01	0.01	<0.05	<0.05	
	21				<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	
	1			4 ^a	6	0.03	0.03	<0.05	<0.05
			14		0.03	0.03	0.06	0.06	
21		0.03	0.02		<0.05	<0.05			
1		6 ^a	7	0.05	0.05	0.18	0.16		
	14		0.11	0.10	0.19	0.15			
	21		0.08	0.08	0.09	0.08			
	こんにゃくいも (露地) [球茎] 1986年	1	①1,500~3,000 ^D (作条処理)	1 ^①	139	0.01	0.01	0.01	0.01
1 ^②				139	<0.01	<0.01	0.01	0.01	
1		②3,000 ^D (土壌混和)		1 ^①	168	0.02	0.02	<0.01	<0.01
				1 ^②	168	<0.01	<0.01	0.06	0.06
こんにゃくいも (露地) [球茎] 1989年	1		①3,000 ^G (植付時土壌混和) ②1,000 ^G (植付時植溝処理) ③2,000 ^G (植付時植溝処理) ④1,000 ^G (植付時植溝処理) + 1,000 ^G (培土時株元散布)	1 ^①	149	<0.008	<0.008	/	
				1 ^②	149	<0.008	<0.008		
		1 ^③		149	<0.008	<0.008			
		2 ^{④a}		114	<0.008	<0.008			
	1	1 ^①		158	<0.008	<0.008			
		1 ^②		158	<0.008	<0.008			
		1 ^③		158	<0.008	<0.008			
		2 ^{④a}		133	<0.008	<0.008			
1	1 ^②	141	<0.008	<0.008					
	2 ^{④a}	103	<0.008	<0.008					
こんにゃくいも (露地) [球茎] 2006年	1	1,000 ^G (培土時土壌表面 散布)	1	151	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
				158	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
				165	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	1		1	99	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
				106	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
				113	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
さとうきび (露地) [茎部] 1989年	1	250 ^D (処理方法不明)	1	243	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				334	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	1		1	243	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				334	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
だいこん (露地) [根部] 1991年	1	1.25 g ai/kg 種子 ^{WP} _a (粉衣)	1	47	<0.04	<0.04	<0.005	<0.005	
				64	<0.04	<0.04	<0.005	<0.005	
	1		1	47	<0.04	<0.04	<0.005	<0.005	
				64	<0.04	<0.04	<0.005	<0.005	

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					メタラキシル				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
だいこん (露地) [根部] 2005年	1	1,800 ^G (播種時作条土壌 混和処理)	1	53	0.02	0.02	0.03	0.03	
				60	<0.01	<0.01	0.02	0.02	
	67		0.01	0.01	0.02	0.02			
	1		1	50	0.02	0.02	0.05	0.05	
57				<0.01	<0.01	0.03	0.03		
64	<0.01		<0.01	0.04	0.04				
だいこん (露地) [葉部] 2005年	1		1,800 ^G (播種時作条土壌 混和処理)	1	53	0.04	0.04	0.03	0.03
					60	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	67	0.02		0.02	<0.01	<0.01			
	1	1		50	0.04	0.04	0.05	0.05	
57				0.02	0.02	<0.01	<0.01		
64	0.02	0.02		0.02	0.02				
かぶ (施設) [根部] 2005年	1	2,000 ^G (播種時土壌混和 処理)		1	91	0.05	0.05	<0.1	<0.1
					96	0.07	0.06	<0.1	<0.1
	101		0.06	0.06	<0.1	<0.1			
	1		1	85	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	
90				<0.05	<0.05	<0.1	<0.1		
95	<0.05		<0.05	<0.1	<0.1				
かぶ (施設) [葉部] 2005年	1		2,000 ^G (播種時土壌混和 処理)	1	91	0.07	0.07	<0.1	<0.1
					96	0.06	0.06	<0.1	<0.1
	101	0.08		0.08	<0.1	<0.1			
	1	1		85	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	
90				<0.05	<0.05	<0.1	<0.1		
95	<0.05	<0.05		<0.1	<0.1				
はくさい (露地) [茎葉] 1980年	1	500~1,250 ^{WP, a} (散布)		2	7 ^a	0.20	0.20	0.064	0.062
					14 ^a	0.03	0.03	0.031	0.030
			21 ^a		0.02	0.02	0.021	0.021	
			4 ^a	7	0.06	0.06	0.074	0.071	
				14	0.04	0.04	0.042	0.039	
				21	0.02	0.02	0.022	0.021	
	6 ^a		7	0.14	0.14	0.080	0.075		
			14	0.05	0.05	0.047	0.046		
			21	0.05	0.04	0.030	0.029		
	1		2	7 ^a	0.09	0.09	0.151	0.148	
				14 ^a	0.09	0.09	0.088	0.088	
				21 ^a	0.05	0.05	0.047	0.046	
4 ^a		7	0.21	0.21	0.085	0.079			
		14	0.08	0.08	0.128	0.126			
		21	0.09	0.08	0.120	0.112			
6 ^a	7	0.15	0.15	0.163	0.159				
	14	0.12	0.12	0.106	0.098				
	21	0.11	0.10	0.089	0.087				
はくさい (露地) [茎葉] 1991年	1	1回目: 1.25 g ai/kg 種子 ^{WP, a} (粉衣) + 2~4回目: 200 ^{WP} (処理方法不明)	4	3 ^a	0.02	0.02	0.045	0.044	
				7 ^a	0.02	0.02	0.012	0.012	
	14 ^a		0.01	0.01	0.026	0.026			
	1		4	3 ^a	0.07	0.06	0.090	0.089	
7 ^a		0.07		0.07	0.090	0.088			
14 ^a	0.06	0.06	0.057	0.056					
キャベツ (露地)	1	1.25 g ai/kg 種子 ^{WP} (粉衣)	1	83	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
[葉球] 1992年	1		1	115	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
キャベツ (露地) [葉球] 1998年	1	200~250 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a	0.02	0.02	0.023	0.022
				21 ^a	0.02	0.02	0.021	0.020
				30	0.02	0.02	0.020	0.018
	1		3	14 ^a	0.07	0.06	0.052	0.051
				21 ^a	0.07	0.07	0.049	0.048
				30	0.06	0.06	0.049	0.049
こまつな (施設) [茎葉] 2005年	1	2,000 ^G (播種前土壌混和 処理)	1	21	0.20	0.20	0.21	0.20
				28	0.09	0.08	0.09	0.09
				35	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	1		1	21	0.23	0.22	0.44	0.44
				28	0.40	0.39	0.39	0.36
				35	0.35	0.35	0.06	0.06
みずな (露地) [茎葉] 2006年	1	2,000 ^G (土壌混和処理)	1	21	1.06	1.02	/	
				26	0.92	0.92		
				31	0.47	0.47		
	1		1	21	0.40	0.40		
				26	0.23	0.22		
				31	0.06	0.06		
チンゲンサイ (施設) [茎葉] 2005年	1	1,800 ^G (土壌混和処理)	1	18	0.39	0.38	0.42	0.42
				25	0.54	0.52	0.23	0.22
				32	0.04	0.04	0.08	0.08
	1		1	18	0.16	0.16	0.09	0.08
				25	0.02	0.02	<0.05	<0.05
				32	0.02	0.02	<0.05	<0.05
ブロッコリー (露地) [花蕾] 2004年	1	100~300 ^{WP} (処理方法不明)	3	21	<0.01	<0.01	<0.1	<0.1
				28	<0.01	<0.01	<0.1	<0.1
				35	<0.01	<0.01	<0.1	<0.1
	1		3	21	0.03	0.02	<0.1	<0.1
				28	0.03	0.02	<0.1	<0.1
				35	0.02	0.02	<0.1	<0.1
わさびだいこん (露地) [根部] 1999年	1	400~800 ^{WP} (処理方法不明)	3	14	<0.02	<0.02	0.01	0.01
				21	<0.02	<0.02	0.01	0.01
				28	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01
	1		3	14	<0.02	<0.02	0.03	0.03
				21	<0.02	<0.02	0.02	0.02
				28	<0.02	<0.02	0.01	0.01
ひろしまな (露地) [茎葉] 2003年	1	200 ^{WP} (処理方法不明)	3	3 ^a	1.32	1.30	/	
				7	0.26	0.26		
				14	0.07	0.06		
	1		3	3 ^a	0.44	0.44		
				7	0.25	0.25		
				14	0.17	0.17		
クアサイ (施設) [茎葉] 2005年	1	1,800 ^{G, a} (定植時土壌混和 処理)	1	21	0.22	0.22	/	
				28	0.27	0.26		
				35	0.25	0.25		
	1		1	21	<0.05	<0.05		
				28	<0.05	<0.05		
				35	<0.05	<0.05		

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					メタラキシル				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
たまねぎ (露地) [鱗茎] 1984年	1	250~500 ^{WP} (散布)	5 ^a	7	<0.01	<0.01	<0.004	<0.004	
				14	<0.01	<0.01	<0.004	<0.004	
				21	<0.01	<0.01	<0.004	<0.004	
	1	250~500 ^{WP} (散布)	5 ^a	7	0.01	0.01	0.028	0.028	
14	0.02			0.02	0.021	0.021			
21	0.03			0.02	0.018	0.017			
たまねぎ (露地) [鱗茎] 1991年	1	①1.25 g ai/kg 種子 WP, a (湿粉衣) ②1.25 g ai/kg 種子 WP, a (湿粉衣)	1 ^①	166	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
			4 ^②	3 ^a	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
			4 ^②	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
			4 ^②	14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
	1	200~300 ^{WP} (散布3回)	+	1 ^①	245	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				4 ^②	3 ^a	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				4 ^②	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				4 ^②	14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
たまねぎ (露地) [鱗茎] 1996年	1	188~225 ^{WP} (空中散布)	3	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
	1		3	7	<0.01	<0.01	0.005	0.005	
葉ねぎ (露地) [茎葉] 1998年	1	150 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
				21 ^a	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
				30	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
	1	150 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	
21 ^a	<0.01			<0.01	<0.005	<0.005			
31	<0.01			<0.01	<0.005	<0.005			
根深ねぎ (露地) [茎葉] 1998年	1	150 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a	/	/	<0.005	<0.005	
				21 ^a			<0.005	<0.005	
				30			<0.005	<0.005	
	1	150 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a			0.011	0.011	
21 ^a	<0.005			<0.005					
30	<0.005			<0.005					
らっきょう (露地) [鱗茎] 1989年	1	300 ^{WP} (散布)	4 ^a	21	<0.05	<0.05	/		
らっきょう (露地) [鱗茎] 1989年	1	200~300 ^{WP} (散布)	3	186	<0.05	<0.05			
らっきょう (露地) [鱗茎] 1989年	1	200~300 ^{WP} (散布)	3	186	<0.05	<0.05	/		
らっきょう (露地) [鱗茎] 1994年	1	600 ^{WP} (散布)	4 ^a	14	0.16	0.16			
				21	0.18	0.17			
				30	0.18	0.17			
らっきょう (露地)	1	300~500 ^{WP} (処理方法不明)	3	14 ^a	/	/	<0.1	<0.1	
				21 ^a			<0.1	<0.1	
				30			<0.1	<0.1	

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					メタラキシル					
					公的分析機関		社内分析機関			
					最高値	平均値	最高値	平均値		
【鱗茎】 2005年	1		3	14 ^a			<0.1	<0.1		
				21 ^a			<0.1	<0.1		
				30			<0.1	<0.1		
にんじん (露地) [根部] 1991年	1	1.25 g ai/kg 種子 ^{WP, a} (粉衣)	1	107	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005		
	1		1	120	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005		
パセリ (露地) [展開葉] 1988年	1	2,000 ^G (株元散布)	3	22	0.23	0.22	/			
				32	0.15	0.14				
				41	0.16	0.16				
				41	0.16	0.16				
	1	4,000 ^G (株元散布)	3	22	0.36	0.34				
				32	0.40	0.40				
				41	0.24	0.23				
				41	0.24	0.23				
1	2,000 ^G (株元散布)	3	22	0.46	0.46					
			32	0.39	0.32					
			41	0.40	0.36					
			41	0.40	0.36					
1	4,000 ^G (株元散布)	3	22	0.60	0.56					
			32	0.57	0.52					
			41	0.48	0.46					
			41	0.48	0.46					
みつば (施設) [茎葉] 2005年	1	100~150 ^{WP} (処理方法不明)	1	3 ^a	1.40	1.40	/			
				7 ^a	1.13	1.09				
	14		0.75	0.74						
	14		0.75	0.74						
1	1	1	3 ^a	0.16	0.16					
			7 ^a	<0.05	<0.05					
1	1	1	14	<0.05	<0.05					
			14	<0.05	<0.05					
せり (露地) [茎葉] 2003年	1	1,200 ^G (湛水土壤散布)	1	22			0.16	0.15		
				28			0.12	0.11		
	1		1	1	35			0.05	0.05	
					35			0.05	0.05	
トマト (施設) [果実] 1980年	1	750~1,250 ^{WP, a} (散布)	5 ^a	1	0.30	0.30	0.35	0.34		
				3	0.09	0.08	0.09	0.09		
				7	0.02	0.02	0.02	0.02		
				1	0.26	0.26	0.31	0.30		
				3	0.11	0.11	0.12	0.11		
				7	0.04	0.04	0.04	0.04		
	1		1	1	5 ^a	1	0.20	0.20	0.32	0.31
					3	0.17	0.16	0.19	0.18	
					7	0.09	0.08	0.11	0.10	
					1	0.22	0.22	0.30	0.30	
					3	0.25	0.24	0.25	0.24	
					7	0.10	0.10	0.09	0.08	
ミニトマト (施設) [果実] 2006年	1	400~600 ^{WP} (処理方法不明)	3	1	0.2	0.2	0.18	0.18		
				7	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05		
				14	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05		
	1		1	3	1	0.6	0.6	0.67	0.66	
					7	0.2	0.2	0.05	0.05	
					14	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05	

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)						
					メタラキシル						
					公的分析機関		社内分析機関				
					最高値	平均値	最高値	平均値			
ピーマン (施設) [果実] 1981年	1	0.067 g ai/株 ^{WP, a} (株元灌注)	3	1	0.19	0.18	0.38	0.35			
				3	0.26	0.26	0.46	0.44			
				7	0.51	0.50	0.88	0.86			
				14	0.42	0.41	0.74	0.71			
				21	0.26	0.26	0.61	0.58			
	1		5 ^a	1	0.06	0.06	0.38	0.33			
				3	0.07	0.07	0.42	0.40			
				7	0.07	0.06	0.32	0.30			
			3	1	0.10	0.09	0.40	0.38			
				3	0.28	0.26	0.31	0.30			
				7	0.32	0.31	0.36	0.31			
				14	0.25	0.24	0.45	0.44			
ピーマン (施設) [果実] 1986年	1	0.08 g ai/株 ^{G, a} (株元処理)	3	1	0.24	0.24	0.28	0.28			
				3	0.25	0.24	0.30	0.30			
				7	0.35	0.34	0.39	0.38			
				15	0.39	0.37	0.34	0.32			
				21	0.22	0.22	0.28	0.28			
				30	0.18	0.18	0.18	0.18			
	1		3	1	0.05	0.05	0.05	0.04			
				3	0.02	0.02	0.03	0.03			
				7	0.03	0.03	0.03	0.02			
				15	0.03	0.03	0.02	0.02			
			3	21	0.04	0.04	0.03	0.03			
				30	0.02	0.02	0.02	0.02			
				ピーマン (施設) [果実] 1986年	1	3	1	0.24	0.24	0.23	0.22
							3	0.22	0.22	0.23	0.23
7	0.30	0.30	0.28				0.28				
15	0.32	0.31	0.28				0.28				
21	0.28	0.27	0.21				0.20				
1	30	0.18	0.18		0.20		0.20				
	1	0.56	0.54		0.59		0.58				
	3	0.61	0.60		0.59		0.59				
	7	0.55	0.54		0.59		0.59				
	15	0.45	0.43		0.50		0.50				
なす (施設) [果実] 2006年	1	200~220 ^{WG, a} (処理方法不明)	4	1	0.21	0.20	0.2	0.2			
				7	0.05	0.05	<0.1	<0.1			
				14	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1			
	1		4	1	0.44	0.44	0.5	0.5			
				7	0.10	0.10	0.2	0.2			
				14	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1			
ししとう (施設)	1	0.06 g ai/株 ^G (株元散布)	3	1	0.06	0.06	/				
				3	0.07	0.07					
				7	0.08	0.08					

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
[果実] 2004年	1		3	1	0.05	0.05		
				3	<0.05	<0.05		
				7	0.05	0.05		
きゅうり (施設) [果実] 1980年	1	250~625 ^{WP} (散布)	5 ^a	1	0.16	0.16	0.16	0.15
				3	0.16	0.16	0.16	0.14
				7	0.11	0.10	0.13	0.09
			7 ^a	1	0.19	0.19	0.23	0.20
				3	0.19	0.19	0.20	0.18
				7	0.16	0.16	0.13	0.12
	1		5 ^a	1	0.36	0.36	0.50	0.39
				3	0.31	0.30	0.20	0.19
				7	0.17	0.16	0.10	0.10
			7 ^a	1	0.33	0.32	0.64	0.50
				3	0.28	0.27	0.18	0.15
				7	0.17	0.17	0.15	0.10
かぼちゃ (露地) [果実] 1985年	1	375 ^{WP, a} (散布)	3	14	0.01	0.01	0.01	0.01
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1		3	14	0.01	0.01	<0.01	<0.01
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
かぼちゃ (施設) [果実] 2003年	1	293~300 ^{WG} (処理方法不明)	3	1 ^a	0.05	0.05	0.05	0.05
				7 ^a	0.05	0.05	0.03	0.03
				14	0.02	0.02	0.03	0.02
	1		3	1 ^a	0.03	0.03	0.03	0.03
				7 ^a	0.03	0.03	0.03	0.03
				14	0.02	0.02	0.03	0.03
すいか (施設) [果肉] 1991年	1	250~300 ^{WP} (処理方法不明)	3	7	<0.01	<0.01	0.007	0.007
				14	0.01	0.01	<0.005	<0.005
				20	0.02	0.02	0.010	0.010
	1		3	7	0.02	0.02	0.015	0.014
				14	0.02	0.02	0.017	0.016
				21	0.01	0.01	0.018	0.018
メロン (施設) [果肉] 1985年	1	250 ^{WP} (散布)	3	1 ^a	0.08	0.08	0.21	0.20
				3 ^a	0.12	0.12	0.23	0.23
				14	0.04	0.04	0.02	0.02
	1		3	30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				1 ^a	0.01	0.01	<0.01	<0.01
				3 ^a	0.01	0.01	0.01	0.01
ほうれんそう (施設) [茎葉] 1989年	1	1.25 g ai/kg 種子 ^{WP, a} (粉衣)	1	40	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				47	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	1		1	31	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				38	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
ほうれんそう (施設)	1	1,800 ^G (播種時土壌混和)	1	59	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1
				64	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1
				69	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
[茎葉] 2005年	1	処理)	1	113	0.32	0.32	0.3	0.3
				118	0.20	0.20	0.2	0.2
				123	0.12	0.12	0.1	0.1
しょうが (露地) [塊茎] 1987年	1	4,000 ^G (土壌表面散布)	3	30	0.23	0.22	0.11	0.11
				45	0.19	0.19	0.17	0.16
				60	0.15	0.14	0.31	0.30
	1		3	30	0.27	0.26	0.29	0.27
				46	0.32	0.31	0.31	0.30
				60	0.13	0.12	0.12	0.11
葉しょうが (施設) [茎部・塊茎] 2004年	1	4,000 ^G (土壌混和1回) + 4,000 ^G (土壌表面散布2回)	3	21	0.09	0.09	/	
				30	0.20	0.20		
				45	0.24	0.23		
	1		3	21	0.12	0.12		
				30	0.19	0.19		
				45	0.08	0.08		
くわい (露地) [塊茎] 2006年	1	1,200 ^G (湛水散布)	2	21	<0.05	<0.05	/	
				30	<0.05	<0.05		
				43	<0.05	<0.05		
	1		2	21	0.08	0.08		
				30	0.12	0.12		
				43	0.12	0.12		
たらのき (露地) [芽部] 1989年	1	4,000 ^G (土壌表面散布)	1	217	<0.01	<0.01	/	
				2	186	<0.01		<0.01
	1	①2,000 ^G 、 ^a ②4,000 ^G ③6,000 ^G 、 ^a (土壌表面散布)	2 ^①	229	<0.008	<0.008		
				229	0.015	0.015		
				229	0.015	0.015		
				229	0.048	0.046		
うど (施設) [茎葉部] 1991年	1	0.1 g ai/L ^{WP} 、 ^a ②0.2 g ai/L ^{WP} 、 ^a (根株浸漬)	1 ^①	25	0.26	0.26	/	
				1 ^②	25	0.49		0.48
うど (施設) [茎葉部] 1992年	1	0.1 g ai/L ^{WP} 、 ^a (根株浸漬)	1	25	0.26	0.26	/	
うど (施設) [茎葉部] 1993年	1	0.1 g ai/L ^{WP} 、 ^a (根株浸漬)	1	20	0.02	0.02	/	
				30	0.02	0.02		
うど (施設) [茎葉部] 2006年	1	0.1 g ai/L ^{WP} 、 ^a (根株浸漬)	1	25	/	/	<0.1	<0.1
				35			0.2	0.2
				45			0.2	0.2
	1		1	25			<0.1	<0.1
				35			<0.1	<0.1
				45			<0.1	<0.1
温州みかん (施設)	1	533~667 ^{WP} (処理方法不明)	2	14	0.04	0.04	0.03	0.03
				21	0.03	0.03	0.03	0.03
				28	0.03	0.03	0.03	0.03

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
[果肉] 1992年	1		2	14	0.02	0.02	0.02	0.02
				21	0.02	0.02	0.02	0.02
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
温州みかん (施設) [果皮] 1992年	1		2	14	1.3	1.2	1.26	1.26
				21	0.8	0.8	1.15	1.10
				28	0.9	0.9	1.19	1.17
	1		2	14	1.5	1.5	1.69	1.66
				21	1.1	1.1	1.38	1.30
				28	0.2	0.2	0.19	0.19
いちご (施設) [果実] 1991年	1	①2,000 ^G (定植前畝面土壌混 和処理)	2 ^②	89	0.14	0.13	0.13	0.13
	1	②2,000 ^G (定植前畝面土壌 混和処理) + 2,000 ^G (マルチ前土壌表面 処理)	1 ^① 2 ^②	118 63	0.03 0.25	0.03 0.25	0.03 0.21	0.03 0.21
いちご (施設) [果実] 2002年	1	300~1,000 ^{WP, a} (散布3回) +	4 ^a	77 109	0.010 0.011	0.010 0.011	0.026 0.011	0.026 0.011
	1	2,000 ^G (土壌混和1回)	4 ^a	86 116	0.107 0.066	0.107 0.066	0.152 0.075	0.146 0.069
小粒種ぶどう (施設) [果実] 1985年	1	600 ^{WP} (散布)	1	45 ^a	0.11	0.11	0.06	0.06
				60	0.11	0.11	0.04	0.04
			80	0.07	0.07	0.05	0.05	
	2	300 ^{WP} (散布)	45 ^a	0.38	0.37	0.25	0.25	
			60	0.16	0.16	0.09	0.09	
			80	0.09	0.09	0.08	0.07	
1	600 ^{WP} (散布)	1	44 ^a	0.14	0.14	0.08	0.08	
			59 ^a	0.10	0.10	0.02	0.02	
		75	0.01	0.01	0.02	0.02		
2	300 ^{WP} (散布)	44 ^a	0.08	0.08	0.08	0.08		
		59 ^a	0.08	0.08	0.06	0.06		
		75	0.01	0.01	0.03	0.02		
大粒種ぶどう (施設) [果実] 1985年	1	600 ^{WP} (散布)	1	49 ^a	0.17	0.16	0.11	0.10
				64	0.10	0.10	0.04	0.04
			83	0.02	0.02	0.01	0.01	
	2	300 ^{WP} (散布)	49 ^a	0.41	0.40	0.24	0.23	
			64	0.16	0.16	0.04	0.04	
			83	0.03	0.03	0.01	0.01	
1	600 ^{WP} (散布)	1	49 ^a	0.14	0.14	0.09	0.09	
			64	0.08	0.08	0.02	0.02	
		83	0.02	0.02	0.01	0.01		

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					メタラキシル			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
パッション フルーツ (露地) [果実] 2005年	1	300 ^{WP} (全面散布)	3	21 ^a	<0.05	<0.05	/	
				30	<0.05	<0.05		
			45	<0.05	<0.05			
1			21 ^a	<0.05	<0.05			
			30	<0.05	<0.05			
			45	<0.05	<0.05			
ホップ (施設) [乾花] 1984年	1	①0.4 g ai/株 ^G (株元処理 1回) ②0.4 g ai/株 ^G (株元処理 1回)	1 ^①	122	1.0	1.0	0.70	0.67
			5 ^{②a}	17	5.8	5.8	5.58	5.32
	1	+ 900~1,800 ^{WP, a} (処理方法不明 4回)	1 ^①	113	0.6	0.6	0.36	0.35
			5 ^{②a}	12	20.2	20.0	12.3	12.1
ホップ (露地) [乾花] 1986年	1	0.4 g ai/株 ^G (株元処理 1回) +	4 ^a	14	3.5	3.5	5.47	5.45
				21	2.6	2.6	1.70	1.62
				30	1.1	1.1	0.93	0.92
				44	0.5	0.4	0.79	0.78
	1	450~2,100 ^{WP, a} (散布 3回)	4 ^a	14	8.5	8.4	4.48	4.76
				21	6.1	6.0	9.19	8.63
				30	2.8	2.8	3.80	3.79
				44	0.2	0.2	0.60	0.57
みょうが (施設) [花蕾] 1983年	1	6,000 ^{G, a} (土壌表面散布)	2	23 ^a	1.19	1.14	/	
				30	1.03	1.02		
				37	0.79	0.71		
		2,000~6,000 ^G (土壌表面散布)	2	13 ^a	1.05	1.00		
	20 ^a			0.93	0.90			
			27 ^a	0.65	0.64			
	6,000 ^{G, a} (土壌表面散布)	1	23 ^a	0.89	0.89			
			30	0.60	0.60			
			37	0.32	0.31			
	4,000 ^G (土壌表面散布)	1	23 ^a	0.54	0.52			
30			0.45	0.44				
		37	0.24	0.23				
1	4,000 ^G (土壌表面散布)	4 ^a	28	1.16	1.16			
			47	0.81	0.74			
			62	0.39	0.39			
		2	39	0.23	0.20			
			58	0.25	0.24			
			73	0.36	0.35			
2	28 ^a	0.31	0.30					
	47	0.21	0.20					
		62	0.21	0.20				

- 1 G : 粒剤、WG : 顆粒水和剤、WP : 水和剤、D : 粉剤、SL : 液剤、/ : 実施せず
- 2 ・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。
- 3 ・農薬の使用量、使用回数及び使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している
- 4 場合は、使用量、回数又は PHI に a を付した。
- 5

1 ③メタラキシル M 含有剤とメタラキシル含有剤による作物残留比較試験

作物名 (栽培形態) [分析部位] 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha) (処理方法)	回数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					メタラキシル M				メタラキシル	
					公的分析機関		社内分析機関			
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
トマト (施設) [果実] 1999年度	1	メタラキシル M ^{WP} (5%) 95~135 又は	3	1	0.12	0.12	0.06	0.06	0.17	0.17
			3	3	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.07
			3	7	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
	1	メタラキシル ^{WP} (10%) 190~270 (散布)	4	1	0.11	0.11	0.10	0.10	0.30	0.30
			4	3	0.05	0.05	0.06	0.06	0.15	0.15
			4	7	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05
きゅうり (施設) [果実] 1999年度	1	メタラキシル M ^{WP} (5%) 150 又は	4	1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12
			4	3	0.08	0.08	0.07	0.07	0.12	0.12
			4	7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	1	メタラキシル ^{WP} (10%) 300 (散布)	4	1	0.10	0.10	0.11	0.11	0.24	0.24
			4	3	0.12	0.12	0.13	0.13	0.21	0.21
			4	7	0.03	0.03	0.02	0.02	0.06	0.06

2 WP : 水和剤

3

4

5

1 <別紙4：作物残留試験成績（海外）>

作物名 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	最大残留値* (mg/kg)
結球レタス 1982～87年	6	2,200 ^{EC} +	5	7	0.08～4.3
	6	220 ^{SP} ×4		14	0.06～4.0
	1	2,200 ^G +	5	4	0.44
	6			5	<0.05～3.3
	1			7	0.1
	1	4,400 ^G +	5	4	0.89
	4			5	0.12～4.9
	1			7	0.21
	5	2,200 ^{EC} +	5	7	0.08～4.25
	4			220 ^{SP} ×4	14
	1	2,200 ^{EC} +	6	7	0.50
	1			220 ^{SP} ×5	14
非結球レタス 1982～89年	9	2,200 ^{EC} +	5	5	0.71～3.8
	5	2,200 ^G +	5	5	0.82～3.6
	5	4,400 ^{EC} +	5	5	0.58～8.4
	2	4,400 ^G +	5	5	2.7～4.1
セロリ 1988～89年	7	2,200 ^{EC} +	5	5	0.42～2.1
	4	2,200 ^G +	5	5	0.42～11*
	4	4,400 ^{EC} +	5	5	1.1～2.5
	2	4,400 ^G +	5	5	1.3～11**
ばれいしょ (未成熟塊茎) 1985年	4	2,200 ^{EC} +	3	0	<0.05～0.51
ばれいしょ (未成熟塊茎) 1985年	1	4,400 ^{EC} +	3	0	0.28
		440 ^{SP} ×2			

作物名 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	最大残留値* (mg/kg)
ばれいしょ (成熟塊茎) 1985年	3	2,200 ^{EC} +	5	7	<0.05~0.07
	1	220 ^{SP} ×4		9	0.11
ばれいしょ (成熟塊茎) 1985年	2	4,400 ^{EC} +	5	7	<0.05~0.05
	1	440 ^{SP} ×4		9	0.16
ばれいしょ (成熟塊茎) 1985年	1	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×3 + 187 ^{SP} ×1	5	8	0.19
ばれいしょ (全塊茎) 1985年	1	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×4	5	7	<0.05
ばれいしょ (全塊茎) 1985年	1	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×4	5	7	<0.11
にんじん (葉) 1985年	4	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×4	5	7	1.7~6.7
にんじん (葉) 1985年	2	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×4	5	7	4.4~7.1
にんじん (根) 1985年	4	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×4	5	7	<0.05~0.22
にんじん (根) 1985年	2	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×4	5	7	0.26~0.9
だいこん (葉) 1985年	3	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×2	3	7	1.8~13
だいこん (葉) 1985年	1	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×2	3	7	14
だいこん (根) 1985年	3	2,200 ^{EC} + 220 ^{SP} ×2	3	7	0.28~0.35
だいこん (根) 1985年	1	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×2	3	7	0.57
てんさい (葉) 1985年	5	2,200 ^{EC} +	5	7	1.5~4.4
	1	220 ^{SP} ×4		8	1.1
てんさい (葉) 1985年	1	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×2	5	7	3.2
てんさい (根) 1985年	6	2,200 ^{EC} +	5	7	0.036~0.20
	1	220 ^{SP} ×4		8	<0.05
てんさい (根) 1985年	2	4,400 ^{EC} + 440 ^{SP} ×2	5	7	0.07~0.90

作物名 実施年	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	最大残留値* (mg/kg)
たまねぎ (鱗茎) 2012年	1	280 ^{EC}	5	7 ^a , 10	0.15
	1			21 ^a , 30	<0.05
	1			7 ^a , 11	<0.05
	1			21 ^a , 30	0.67
	1			8 ^a , 11, 15, 34	<0.05
	1	280 ^{EC}	9	7, 11 ^a	0.10
	1	509 ^{EC}	5	7, 10 ^a	0.22
	1			21 ^a , 30	0.06
	1			7 ^a , 11	<0.05
	1			21 ^a , 30	0.80
	1			8 ^a , 11, 15, 34	<0.05
	1	224 ^{WP}	5	7 ^a , 10, 14, 30	<0.05
	1			7 ^a , 10, 14, 34	<0.05
	1	224 ^{WP}		7, 10 ^a , 14	0.14
	1			7, 10 ^a , 14	0.10
	1			7 ^a , 10, 14, 30	0.20
	1	224 ^{WP} , #	6	7 ^a , 10, 14, 30	0.13
	1			7 ^a , 10, 14, 30	0.13
	1	224 ^{WP} , #	6	7, 11 ^a , 15, 30	0.09
	1			7 ^a , 11, 15, 30	<0.05
	1	2,240 ^{EC} + 224 ^{WP} ×5	6	7 ^a , 11	0.07
	1			7 ^a , 11	0.72
	1			7 ^a , 11	2.20
	1			7 ^a , 10	0.61
	1			7 ^a , 10	0.09
	1	224 ^{WP}	5	7	<0.05
	1			7	0.25
	1	224 ^{WP}		7	<0.05
1	7			0.07	

1 WP：水和剤、G：粒剤、SP：水溶剤、EC：乳剤

2 *：メタラキシルを使用し、最大残留値は「メタラキシル+2,6-ジメチルアニリン基を有する
3 代謝物」の和。

4 **：高温のため試料調製に不適切な条件であった。

5 a：最大使用条件下（当該使用農薬の申請の範囲内で最も多量の用い、かつ最終使用から収穫
6 までの期間を最短とした場合）

7 #：224 g ai/ha×6回のところ、5回目の処理で2倍量を散布したため、計 1,568 g ai/ha を散
8 布した。

9 全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

1 <別紙5：畜産物残留試験成績>

2 ① 泌乳牛①

3 ・乳汁

投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 a (µg/g)			
	投与期間 (日)			
	1	14	20	27
75	0.02、0.02、0.02	0.02、0.02、0.02	0.02、0.02	0.02

4 a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して定量し、メタラキシルに換算した。

5 定量限界：0.01 µg/g

6

7

8 ・組織

分析部位	投与群 (mg/kg 飼料)	反復	残留値 a (µg/g)			
			投与期間 (日)			
			13	14 ^b	21 ^c	28 ^c
血液	75	1	0.32	/	<0.05	0.05
筋肉(腰)	75	1	/	0.09	<0.05	0.06
筋肉(肢)	75	1	/	0.13(0.17) ^d	0.07(0.08) ^d	0.06(0.10) ^d
	75	2 ^f	/	0.14	0.07	0.07
大網脂肪	75	1	/	<0.05	<0.05	<0.05
腎周囲脂肪	75	1	/	<0.05	<0.05	<0.05
肝臓	75	1	/	0.82	0.14	0.12
	75	2 ^e	/	1.1	0.14	<0.10
腎臓	75	1	/	5.3	0.13	0.11
	75	2 ^e	/	5.5	0.11	0.11

9 a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して

10 定量し、メタラキシルに換算した。

11 b：血液は最終投与の1.5～2.0時間後、組織は4時間後に採取

12 c：血液は最終投与の19～20時間後、組織は23.5時間後に採取

13 d：GLC-MSにより再分析した結果

14 e：1頭の動物の各部位からそれぞれ2つのサンプルを採取して分析した。

15 /：試料採取せず

16 定量限界：筋肉及び脂肪 0.05 µg/g、肝臓及び腎臓 0.10 µg/g

17

18

19

1 ② 泌乳牛②

2 ・乳汁

投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (μg/g)				
	採取日				
	7	14	21	28	40
7.5	<0.01、<0.01 <0.01、<0.01	<0.01、<0.01 <0.01	<0.01、<0.01 <0.01	<0.01、<0.01	<0.01
15.0	<0.01、<0.01 <0.01	<0.01、<0.01 <0.01	<0.01、<0.01	<0.01	—

3 ^a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して定
4 量し、メタラキシルに換算した。

5 —：測定せず

6 定量限界：0.01 μg/g

7

8 ・組織

分析部位	投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (μg/g)			
		採取日			
		14	21	28	40
筋肉(腰)	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	<0.05	<0.05	<0.05	/
筋肉(肢)	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	0.05	<0.05	<0.05	/
大網脂肪	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	<0.05	<0.05	<0.05	/
腎周囲脂肪	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	<0.05	<0.05	<0.05	/
肝臓	1.5	0.11	<0.1、<0.1	<0.1、<0.1	/
	7.5	0.21	<0.1、0.11	0.14、<0.1	0.22
	15.0	0.20	0.17、0.13	0.17、0.13	/
腎臓	1.5	0.58、0.70 0.63	0.21	0.16	/
	7.5	0.35	0.32	0.32	0.47、0.57
	15.0	0.63、0.83	0.26	0.37	/

9 ^a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに
10 変換して定量し、メタラキシルに換算した。

11 組織は各投与期間終了の3～5時間後に採取

12 /：試料採取せず

13 定量限界：筋肉及び脂肪：0.05 μg/g、肝臓及び腎臓：0.10 μg/g

14

1 ・肝臓及び腎臓

分析部位	投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (µg/g)			
		採取日			
		14	21	28	40
肝臓	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	/
	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	0.06	0.05	0.06	/
腎臓	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	/
	7.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	15.0	<0.05	<0.05	<0.05	/

2 ^a : メタラキシルのみを抽出して測定した。
 3 組織は各投与期間終了の3~5時間後に採取
 4 / : 試料採取せず
 5 定量限界 : 0.05 µg/g

6

1 <別紙6：畜産物残留試験成績>

2 ① 産卵鶏①

3 ・卵

投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (µg/g)					
	採取日					
	1	3	7	14	21	28
10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
30	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
100	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

4 a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して定
5 量し、メタラキシルに換算した。

6 定量限界：0.05 µg/g

7

8 ・組織

分析部位	投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (µg/g)			
		採取日			
		7	14	21	28
筋肉 (胸筋、四肢筋)	10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	30	0.06	0.10	<0.05	<0.05
	100	0.13	0.13	<0.05	0.12
皮膚及び脂肪	10	<0.05 ^b	<0.05	<0.05	<0.05
	30	<0.05 ^b	0.07	0.10	0.08
	100	0.12 ^b	0.32 ^c	0.40	0.34
脂肪# (腹膜部)	10	<0.05 ^b	<0.05	<0.05	<0.05
	30	<0.05 ^b	0.07	0.08	0.07
	100	0.09 ^b	0.27 ^c	0.34	0.17
脂肪# (腹膜部)	10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	30	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	100	0.11	0.12	0.16	0.11
肝臓	10	<0.05	<0.05	0.08、0.18 ^d <0.05 ^d	0.05
	30	0.07	0.07	0.15、0.07 ^d <0.05 ^d	0.10
	100	0.16	0.10	0.10、0.12 ^d 0.06 ^d	0.11

9 #：異なる抽出法を用いた。

10 a：メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して定
11 量し、メタラキシルに換算した。

12 b：筋肉及び肝臓と同様の抽出法を用いた。

13 c：定量上限を超えたため、再測定した。

14 d：確認のため再測定を行った。

15 定量限界：0.05 µg/g

16

17

1 ② 産卵鶏②

2 ・卵

投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (μg/g)			
	採取日			
	7	14	21	28
1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
5.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

3 a : メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジ
4 メチルアニリンに変換して定量し、メタラキシルに換算した。

5 定量限界 : 0.05 μg/g

6
7 ・組織

分析部位	投与群 (mg/kg 飼料)	残留値 ^a (μg/g)			
		採取日			
		7	14	21	28
皮膚	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	5.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
脂肪	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	5.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
肝臓	1.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	5.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
筋肉 (胸筋、後肢筋)	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	5.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

8 a : メタラキシル及び2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物を2,6-ジメチルアニリンに変換して定
9 量し、メタラキシルに換算した。

10 定量限界 : 皮膚、脂肪及び筋肉 : 0.05 μg/g、肝臓 : 0.1 μg/g

11
12
13

1 <別紙7：推定摂取量>

農畜水産物名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：55.1 kg)		小児(1~6歳) (体重：16.5kg)		妊婦 (体重：58.5 kg)		高齢者(65歳以上) (体重：56.1 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
ばれいしょ	0.01	38.4	0.38	34.0	0.34	41.9	0.42	35.1	0.35
こんにゃくいも	0.06	1.2	0.07	0.4	0.02	0.8	0.05	1.3	0.08
だいこん類(根)	0.05	33	1.65	11.4	0.57	20.6	1.03	45.7	2.29
だいこん類(葉)	0.78	1.7	1.33	0.6	0.47	3.1	2.42	2.8	2.18
かぶ(根)	0.06	2.8	0.17	0.8	0.05	0.1	0.01	5.0	0.30
かぶ(葉)	0.08	0.3	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01	0.6	0.05
はくさい	0.03	17.7	0.53	5.1	0.15	16.6	0.50	21.6	0.65
キャベツ	0.06	24.1	1.45	11.6	0.70	19.0	1.14	23.8	1.17
こまつな	0.44	5.0	2.20	1.8	0.79	6.4	2.82	6.4	2.82
きょうな(みずな)	1.02	2.2	2.24	0.4	0.41	1.4	1.43	2.7	2.75
チンゲンサイ	0.52	1.8	0.94	0.7	0.36	1.8	0.94	1.9	0.99
ブロッコリー	0.02	5.2	0.10	3.3	0.07	5.5	0.11	5.7	0.11
その他のあぶらな科野菜	0.26	3.4	0.88	0.6	0.16	0.8	0.21	4.8	1.25
レタス	0.2	9.6	1.92	4.4	0.88	11.4	2.28	9.2	1.84
たまねぎ	0.01	31.2	0.31	22.6	0.23	35.3	0.35	27.8	0.28
ねぎ	0.03	9.4	0.28	3.7	0.11	6.8	0.20	10.7	0.32
アスパラガス	0.04	1.7	0.07	0.7	0.03	1.0	0.04	2.5	0.10
にんじん	0.026	18.8	0.49	14.1	0.37	22.5	0.59	18.7	0.49
パセリ	0.56	0.1	0.06	0.1	0.06	0.1	0.06	0.2	0.11
みつば	0.74	0.4	0.30	0.1	0.07	0.1	0.07	0.5	0.37
その他のせり科野菜	0.34	0.2	0.07	0.1	0.03	0.3	0.10	0.3	0.10
トマト	0.66	32.1	21.19	19.0	12.54	32.0	21.12	36.6	24.16
ピーマン	0.11	4.8	0.53	2.2	0.24	7.6	0.84	4.9	0.54
なす	0.18	12.0	2.16	2.1	0.38	10.0	1.80	17.1	3.08
その他のなす科野菜	0.08	1.1	0.09	0.1	0.01	1.2	0.10	1.2	0.10
きゅうり	0.18	20.7	3.73	9.6	1.73	14.2	2.56	25.6	4.61
かぼちゃ	0.03	9.3	0.28	3.7	0.11	7.9	0.24	13.0	0.39
すいか	0.02	7.6	0.15	5.5	0.110.00	0.1	0.29	11.3	0.23
メロン	0.04	3.5	0.14	2.7	0.11	4.4	0.18	4.2	0.17
ほうれんそう	0.32	12.8	4.10	5.9	1.89	14.2	4.54	17.4	5.57
オクラ	0.28	1.4	0.39	1.1	0.31	1.4	0.39	1.7	0.48
しょうが	0.31	1.5	0.47	0.3	0.09	1.1	0.34	1.7	0.53
みかん(果実)	0.04	17.8	0.71	16.4	0.66	0.6	0.02	26.2	1.05
いちご	0.25	5.4	1.35	7.8	1.95	5.2	1.30	5.9	1.48
ぶどう	0.16	8.7	1.39	8.2	1.31	20.2	3.23	9.0	1.44
ホップ	1.0	0.1	0.10	0.1	0.10	0.1	0.10	0.1	0.10

その他のスパイス	1.66	0.1	0.17	0.1	0.17	0.1	0.17	0.2	0.33
その他のハーブ	0.44	0.9	0.40	0.3	0.13	0.1	0.04	1.4	0.62
牛・筋肉と脂肪	0.17	15.3	2.60	9.7	1.65	20.9	3.55	9.9	1.68
牛・肝臓	1.1	0.1	0.11	0	0.00	1.4	1.54	0	0.00
牛・腎臓	5.5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鶏・筋肉と脂肪	0.34	18.7	6.36	13.6	4.62	19.8	6.73	13.9	4.73
鶏・肝臓	0.18	0.7	0.13	0.5	0.09	0	0.00	0.8	0.14
鶏・その他の食用部分	0.4	1.9	0.76	1.2	0.48	2.9	1.16	1.4	0.56
乳	0.02	264.1	5.28	332	6.64	364.6	7.29	216	4.32
魚介類	0.1	93.1	9.31	39.6	3.96	53.2	5.32	114.8	11.48
合計			77.3		45.1		77.6		86.6

- 1 残留値は、登録又は申請されている使用量・回数・使用時期のうちメタラキシル M 又はメタラキシルの最大の
- 2 残留を示す各試験区の平均残留量を用いた。
- 3 「ff」：平成17年～19年の食品摂取頻度・摂取量調査（参照48）の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）
- 4 「摂取量」：農水産物については残留値及び農水産物摂取量から求めたメタラキシル M 及びメタラキシルの推
- 5 定摂取量（ $\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$ ）、畜産物については残留値及び畜産物摂取量から求めたメタラキシル M 及びメタラキシ
- 6 ル並びに2,6-ジメチルアニリン基を有する代謝物の推定摂取量（ $\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$ ）
- 7 だいず、あずき（いんげんまめ、べにばないんげんを含む）、さとうきび、ごぼう、わけぎ、えだまめ、らっ
- 8 きょう、パッションフルーツ及びニワトリ卵は、全データが定量限界未満であったことから、摂取量の計算はし
- 9 ていない。
- 10 『その他のあぶらな科の野菜』については、ひろしまの値を用いた。
- 11 『その他のせり科野菜』については、せりの値を用いた。
- 12 『トマト』については、ミニトマトの値を用いた。
- 13 『その他のなす科野菜』については、ししとうの値を用いた。
- 14 『その他のスパイス』については、みかんの果皮の値を用いた。
- 15 『その他のハーブ』については、みょうがの値を用いた。
- 16 『鶏・その他の食用部分』については、皮膚と脂肪の値を用いた。
- 17

- 1 <参照>
- 2 1. 諮問書（平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号）
- 3 2. 7月1日に厚生労働省より意見の聴取要請のあった、清涼飲料水の規格基準の改
- 4 正について：第1回食品安全委員会農薬専門調査会資料6及び参考資料1～6
- 5 3. 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する
- 6 件（平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号）
- 7 4. 農薬抄録メタラキシルM（殺菌剤）（平成19年1月19日改訂）：シンジェンタ
- 8 ジャパン株式会社（2007年）一部公表
- 9 5. 農薬抄録メタラキシル（殺菌剤）（平成19年2月23日改訂）：シンジェンタ
- 10 ジャパン株式会社（2007年）一部公表
- 11 6. JMPR : Pesticide residues in food -2002 METALAXYL AND METALAXYL-M
- 12 (2002年)
- 13 7. JMPR : Pesticide residues in food -1982 METALAXYL (1982年)
- 14 8. US EPA : Reregistration Eligibility Decision (RED) for Metalaxyl (1994年)
- 15 9. US EPA : Federal Register / Vol. 60, No. 220 / Wednesday, November 15, 1995
- 16 /Rules and Regulations 57361 (1995年)
- 17 10. US EPA : Federal Register / Vol. 60, No. 239 / Wednesday, December 13, 1995/
- 18 Rules and Regulations 63958 (1995年)
- 19 11. US EPA : Federal Register / Vol. 60, No. 244 / Wednesday, December 20, 1995/
- 20 Rules and Regulations 65579 (1995年)
- 21 12. US EPA : Federal Register / Vol. 65, No. 186 / Monday, September 25, 2000
- 22 /Rules and Regulations 57550 (2000年)
- 23 13. Australia NRA : Toxicology Evaluation for Metalaxyl-M (1997年)
- 24 14. Health CANADA : Proposed Re-evaluation Decision for Metalaxyl and
- 25 Metalaxyl-M (2007年)
- 26 15. 食品健康影響評価について(平成19年5月22日付け厚生労働省発食安第0522004
- 27 号)
- 28 16. 食品健康影響評価の結果の通知について(平成21年3月5日付け府食第211号)
- 29 17. 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生労働省告示第370号）の一部を改正
- 30 する件（平成22年8月10日付け平成22年厚生労働省告示第326号）
- 31 18. 食品健康影響評価について（平成22年9月9日付け厚生労働省発食安0909第
- 32 11号）
- 33 19. 農薬抄録メタラキシルM（平成22年3月10日改訂）：シンジェンタ
- 34 ジャパン株式会社（2010年）、一部公表
- 35 20. 農薬抄録メタラキシル（殺菌剤）（平成22年4月20日改訂）：シンジェンタ
- 36 ジャパン株式会社（2010年）、一部公表
- 37 21. メタラキシル及びメタラキシルMの魚介類における最大推定残留値に係る資料
- 38 22. メタラキシル及びメタラキシルMの海外における残留基準値・適正農業規範：

- 1 シンジェンタ ジャパン株式会社（2010年）、非公表
- 2 23. 食品健康影響評価の結果の通知について（平成23年7月7日付け府食第556号）
- 3 24. 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する
- 4 件（平成24年11月2日付け厚生労働省告示第558号）
- 5 25. 食品健康影響評価について（平成25年11月11日付け厚生労働省発食安1111
- 6 第8号）
- 7 26. 農薬抄録メタラキシル M（殺菌剤）（平成24年6月18日改訂）：シンジェン
- 8 タ ジャパン株式会社（2012年）、一部公表
- 9 27. メタラキシル M 作物残留試験成績：シンジェンタ ジャパン株式会社（2010年）、
- 10 未公表
- 11 28. 農薬抄録メタラキシル M（殺菌剤）（平成28年1月27日改訂）：シンジェン
- 12 タ ジャパン株式会社（2016年）、一部公表予定
- 13 29. 農薬抄録メタラキシル（殺菌剤）（平成28年1月27日改訂）：シンジェンタ ジ
- 14 ャパン株式会社（2016年）、一部公表予定
- 15 30. Metalaxyl-M – Tissue Distribution and Elimination in the Rat Following
- 16 Repeated Daily Oral Administration of 2 mg [Phenyl-U-¹⁴C]-Metalaxyl-M/kg.
- 17 Charles River（2011年）、未公表
- 18 31. Metabolism of [Φ -¹⁴C]-Matalaxyl in Goats. CIBA-GEIGY Corporation（1990
- 19 年）、未公表
- 20 32. Supplemental Report on the Metabolism of [Φ -¹⁴C]-Matalaxyl in Goats
- 21 Identification of the Major Milk Metabolite “A”. CIBA-GEIGY Corporation
- 22（1991年）、未公表
- 23 33. Metabolism of [Φ -¹⁴C]-Matalaxyl in Hens. CIBA-GEIGY Corporation（1990年）、
- 24 未公表
- 25 34. Supplemental Report on the Metabolism of [Φ -¹⁴C]-Matalaxyl in Hens.
- 26 CIBA-GEIGY Corporation（1991年）、未公表
- 27 35. ¹⁴C-Metalaxyl-M: Metabolism in Tomatos. Ricerca Biosciences, LLC.（2012年）、
- 28 未公表
- 29 36. フォリアゴールドフロアブル処理におけるアスパラガス中のメタラキシル M の
- 30 残留分析試験. 日本エコテック株式会社（2010年）、未公表
- 31 37. メタラキシル及びメタラキシル M の海外にて実施された作物残留試験. シンジ
- 32 ェンタジャパン株式会社（2016年）、未公表
- 33 38. Residues of Metalaxyl and Metabolites in Tissues and Milk of Dairy Cows
- 34 Receiving metalaxyl in Their Diet. CIBA-GEIGY Corporation（1982年）、未
- 35 公表
- 36 39. Biological Report for CGA-48988 Residue Test in Lacting Cows. CIBA-GEIGY
- 37 Corporation（1980年）、未公表
- 38 40. Metalaxyl – Three level/28-Day Poultry Study. CIBA-GEIGY Corporation

- 1 (1991年)、未公表
- 2 41. Biological Report for CGA-48988 Residue Test inlaying Hens. CIBA-GEIGY
- 3 Corporation (1980年)、未公表
- 4 42. Acute Oral Toxicity Study of CGA-329351 Technical in Rats. Corning Hazleton
- 5 Inc. (1995年)、未公表
- 6 43. Mefenoxam-An Oral (Gavage) Acute Neurotoxicity Study in Rats. WIL
- 7 Research Laboratories, LLC. (2012年)、未公表
- 8 44. Cytogenetic Test on Chinese Hamster Cells *In Vitro*. CIBA-GEIGY Ltd. (1995
- 9 年)、未公表
- 10 45. Mefenoxam-A 28-Day Dietary Immunotoxicity Study in CD-1 Female Mice.
- 11 WIL Research Laboratories, LLC. (2012年)、未公表
- 12 46. APVMA: Permit to Allow the Application of Products Containing Metalaxyl in
- 13 *Rubus sp.* & *Ribes sp.* to Control *Phytophthora spp.* (2005年)
- 14 47. 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する
- 15 件（平成27年2月20日付け厚生労働省告示第30号）
- 16 48. 平成17～19年の食品摂取頻度・摂取量調査（薬事・食品衛生審議会食品衛生分
- 17 科会農薬・動物医薬品部会資料、2014年2月20日）
- 18 49. US EPA : Mefenoxam.Human Health Risk Assessment for Proposed Uses on
- 19 Snap Beans and the Caneberry Expanded Uses on the Bulb and Green Onion
- 20 Subgroups and the Bushberry Subgroup, and Amended Use on Spinach. (2010
- 21 年)
- 22 50. EU : Review report for active substance metalaxyl (2010年)
- 23 51. EFSA : Conclusion on pesticide peer review of the pesticide risk assessment of
- 24 the active substance metalaxyl-M. EFSA Journal 13 (3): 3999 (2015年)
- 25 52. 食品健康影響評価について（平成29年3月15日付け厚生労働省発生食0315第
- 26 9号）
- 27