

バシトラシンの推定摂取量(単位:µg/人/day)

食品名	基準値 (ppm)	暴露評価に 用いた値 (ppm)	国民平均 EDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) EDI
牛の筋肉	0.5	0.25 ^{※1}	3.8	2.4	5.2	2.5
牛の脂肪	0.5	0.25 ^{※1}				
牛の肝臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.0	0.4	0.0
牛の腎臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.0	0.0	0.0
牛の食用部分	0.5	0.25 ^{※1}	0.1	0.0	0.9	0.1
豚の筋肉	0.5	0.25 ^{※1}	10.5	8.4	10.8	7.7
豚の脂肪	0.5	0.25 ^{※1}				
豚の肝臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.1	0.0	0.0
豚の腎臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の食用部分	0.5	0.25 ^{※1}	0.2	0.1	0.0	0.1
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の筋肉	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の脂肪	0.2	0.2				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の肝臓	0.2	0.2				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の腎臓	0.2	0.2				
その他の陸棲哺乳類に 属する動物の食用部分	0.2	0.2				
乳	0.4	0.075 ^{※2}	19.8	24.9	27.3	16.2
鶏の筋肉	0.5	0.25 ^{※1}	4.7	3.4	5.0	3.5
鶏の脂肪	0.5	0.25 ^{※1}				
鶏の肝臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.2	0.1	0.0	0.2
鶏の腎臓	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の食用部分	0.5	0.25 ^{※1}	0.5	0.3	0.7	0.4
その他の家きんの筋肉	0.5	0.25 ^{※1}	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の家きんの脂肪	0.5	0.25 ^{※1}				
その他の家きんの肝臓	0.5	0.25 ^{※1}				
その他の家きんの腎臓	0.5	0.25 ^{※1}				
その他の家きんの食用部分	0.5	0.25 ^{※1}				
鶏の卵	0.5	0.25 ^{※1}	10.3	8.2	12.0	9.4
その他の家きんの卵	0.5	0.25 ^{※1}	0.1	0.1	0.1	0.1
計			50.3	48.0	62.4	40.2
計 (mg/kg体重/day)			0.00091	0.00291	0.00107	0.00072

EDI: 推定1日摂取量 (Estimate Daily Intake)

高齢者及び妊婦については摂取量データの一部がないため、国民平均の摂取量を参考とした。

※1 定量限界値を基にした基準値であることから、定量限界値の1/2の値を用いた。

※2 定量限界値を基にした基準値であること、日本国内で承認がないことから、定量限界値の1/2に乳の輸入割合30%を掛けた値を用いた。