

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」

に基づく報告について

令和3年6月17日

推定摂取量の対 ADI 比 ($EDI^{※1}/ADI$ (%))

	農薬名 許容一日摂取量：ADI (mg/kg 体重/日)	国民全体	幼小児 (1～6 歳)	妊婦	高齢者 (65 歳以上)
1	バリダマイシン 0.36 ^{※2}	0.2	0.4	0.2	0.2

※1 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定一日摂取量。各農産物等の作物残留試験成績の平均値×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

※2 バリダマイシン A 換算。

推定摂取量の対 ARfD 比 ($ESTI^{※3}/ARfD$ (%)) の最大値

	農薬名 急性参照用量：ARfD (mg/kg 体重)	一般	幼小児 (1～6 歳)	妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14～50 歳) ^{※4}
1	バリダマイシン 3.2 ^{※5}	1 (だいこん類の葉)	1 (ブロッコリー等)	

／：実施せず

※3 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。

※4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量が設定された場合に推定。

※5 バリダマイシン A 換算。