

ハザードの特定に係る検討（簡易）（マクロライド系）
マクロライド系が使用される主な養殖魚：すずき目（ぶり）

= Aと読み替えるもの

	菌属・種	①発生	②ばく露	③影響	検討結果
1	<i>Aeromonas hydrophila</i>	C	B	B	×
2	<i>Bacillus cereus</i>	C	C	C	×
3	<i>Bordetella pertussis</i>	C	C	A	×
4	<i>Campylobacter jejuni</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. fetus</i>	C	B	A	×
5	<i>Chlamydomydia psittaci</i> , <i>C. trachomatis</i> , <i>C. pneumoniae</i>	C	C	A	×
6	<i>Clostridium perfringens</i>	C	C	C	×
7	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	C	C	A	×
8	<i>Enterococcus faecalis</i> 、 <i>E. faecium</i> 等（VRE）	C	B	C	×
9	<i>Escherichia coli</i>	C	B	C	×
10	<i>Lactococcus garvieae</i>	A	A	C	×
11	<i>Legionella pneumophila</i>	C	C	A	×
12	<i>Listeria monocytogenes</i>	C	A	B	×
13	<i>Mycoplasma pneumonia</i>	C	C	A	×
14	NAG-Vibrio	C	A	C	×
15	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	C	C	B	×
16	<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>damsela</i>	B	B	C	×
17	<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>psicida</i>	A	C	C	×
18	<i>Salmonella enterica</i>	C	B	B	×
19	<i>Salmonella</i> Typhi, <i>S. Paratyphi</i> A	C	C	A	×
20	<i>Shigella dysenteriae</i> , <i>S. flexneri</i> , <i>S. boydii</i> , <i>S. sonnei</i>	C	C	B	×
21	<i>Staphylococcus aureus</i>	C	C	B	×
22	<i>Streptococcus agalactiae</i>	C	B	C	×
23	<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	C	C	B	×
24	<i>Streptococcus iniae</i>	C	C	B	×
25	<i>Streptococcus pyogenes</i>	C	C	B	×
26	<i>Treponema pallidum</i>	C	C	B	×
27	<i>Vibrio fluvialis</i>	C	B	C	×
28	<i>Vibrio furnissii</i>	C	B	C	×
29	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	A	A	C	×
30	<i>Vibrio vulnificus</i>	C	A	A	×
31	<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Y. pseudotuberculosis</i> , <i>Y. pestis</i>	C	C	B	×