

(案)

牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤に  
係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価

(第 5 版)

令和 5 年（2023 年）7 月

食品安全委員会



## 目次

|                                                                       | 頁  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 〈食品安全委員会委員名簿〉.....                                                    | 6  |
| 〈食品安全委員会動物用医薬品／肥料・飼料等／微生物・ウイルス合同専門調査会(薬剤耐性菌に関するワーキンググループ)専門委員名簿〉..... | 7  |
| 要 約.....                                                              | 9  |
| I. 評価の経緯及び範囲等.....                                                    | 11 |
| 1. はじめに.....                                                          | 11 |
| 2. 経緯.....                                                            | 11 |
| (1)評価対象動物用医薬品.....                                                    | 11 |
| (2)評価の範囲.....                                                         | 12 |
| II. 評価対象動物用医薬品の概要.....                                                | 14 |
| 1. 評価対象フルオロキノロン系抗菌性物質の名称、化学構造、効能・効果等.....                             | 14 |
| (1)名称等.....                                                           | 14 |
| (2)評価対象動物用医薬品の効能・効果、用法・用量等.....                                       | 15 |
| (3)有効成分の系統.....                                                       | 17 |
| 2. フルオロキノロン系抗菌性物質の使用状況、規制等.....                                       | 18 |
| (1)使用状況等.....                                                         | 18 |
| (2)フルオロキノロン系抗菌性物質に関する規制等.....                                         | 23 |
| 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の海外における評価状況等.....                                    | 24 |
| (1)国際機関.....                                                          | 24 |
| (2)米国食品医薬品庁(FDA)における評価事例.....                                         | 25 |
| (3)欧州医薬品庁(EMA)における評価事例.....                                           | 25 |
| III. ハザードの特定に関する知見.....                                               | 28 |
| 1. 対象家畜等におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の生体内薬物動態.....                               | 28 |
| (1)吸収・分布.....                                                         | 28 |
| (2)代謝・排泄.....                                                         | 31 |
| (3)残留.....                                                            | 32 |
| 2. フルオロキノロン系抗菌性物質における抗菌活性の作用機序.....                                   | 35 |
| (1)標的酵素である DNA ジャイレースに対する作用機序.....                                    | 35 |
| (2)標的酵素であるトポイソメラーゼIVに対する作用機序.....                                     | 35 |
| 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の抗菌スペクトル及び感受性分布.....                                 | 35 |
| (1)抗菌スペクトル.....                                                       | 35 |
| (2)家畜の病原菌におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布.....                              | 37 |
| (3)大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターにおけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布.....                 | 39 |
| (4)腸球菌におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布.....                                 | 41 |
| 4. フルオロキノロン系抗菌性物質における交差耐性の可能性及び医療分野における重要性.....                       | 42 |
| 5. フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌、薬剤耐性決定因子の耐性機序及                             |    |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| び遺伝学的情報.....                                                | 43 |
| (1)標的酵素(DNA ジャイレース及びトポイソメラーゼIV)の変異によるキノロン耐性...              | 44 |
| (2)膜透過性の変化によるキノロン耐性.....                                    | 44 |
| (3)伝達性キノロン耐性遺伝子.....                                        | 45 |
| 6. ハザードの特定に係る検討.....                                        | 47 |
| (1)感染症病原菌について.....                                          | 47 |
| (2)常在菌及びそのフルオロキノロン耐性菌による感染症の検討 .....                        | 54 |
| 7. ハザードの特定 .....                                            | 55 |
| IV. 発生評価に関する知見.....                                         | 56 |
| 1. 畜産現場におけるフルオロキノロン耐性の状況.....                               | 56 |
| (1)フルオロキノロン系抗菌性物質製剤の市販前後における耐性の状況(適用菌種)...                  | 56 |
| (2)健康家畜由来細菌の抗菌性物質感受性調査(JVARM) .....                         | 60 |
| (3)病畜由来細菌の抗菌性物質感受性調査(JVARM) .....                           | 65 |
| (4)動物用医薬品としてフルオロキノロン系抗菌性物質製剤を使用した農場における薬剤耐性の状況(公衆衛生) .....  | 67 |
| (5)家畜分野におけるフルオロキノロン耐性に関するその他の知見.....                        | 73 |
| 2. フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌及び薬剤耐性決定因子の出現並びに選択の可能性.....       | 76 |
| (1)フルオロキノロン耐性の獲得の可能性 .....                                  | 76 |
| (2)キノロン耐性遺伝子がフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC に与える影響.....                | 77 |
| (3)フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性決定因子の細菌間での伝達の可能性.....              | 78 |
| 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の使用状況.....                                 | 80 |
| V. ばく露評価に関する知見 .....                                        | 80 |
| 1. 牛及び豚由来食品の消費量.....                                        | 80 |
| 2. ハザードとなりうる当該細菌の生物学的特性.....                                | 81 |
| (1)腸管出血性大腸菌 .....                                           | 81 |
| (2)サルモネラ .....                                              | 82 |
| (3)カンピロバクター .....                                           | 83 |
| 3. 家畜及び畜産食品が農場から出荷され人に摂取されるまでの経路.....                       | 83 |
| 4. ハザードとなりうる当該細菌による牛及び豚由来食品の汚染 .....                        | 87 |
| (1)牛及び豚由来食品がハザードとなりうる当該細菌に汚染される可能性 .....                    | 87 |
| (2)ハザードとなりうる当該細菌による市販の牛及び豚由来食品の汚染状況 .....                   | 87 |
| (3)市販の国産牛肉及び豚肉から分離した大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターのフルオロキノロン耐性の状況 ..... | 92 |
| VI. 影響評価に関する知見.....                                         | 94 |
| 1. ハザードとなりうる細菌のばく露に起因して生じる可能性のある人の疾病 .....                  | 94 |
| (1)腸管出血性大腸菌感染症 .....                                        | 94 |
| (2)サルモネラ感染症 .....                                           | 96 |
| (3)カンピロバクター感染症.....                                         | 97 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 2. ハザードのばく露による人の疾病に対するフルオロキノロン系抗菌性物質による治療 | 98  |
| (1) 腸管出血性大腸菌感染症                           | 98  |
| (2) サルモネラ感染症                              | 98  |
| (3) カンピロバクター感染症                           | 99  |
| 3. 人臨床分野におけるフルオロキノロン耐性菌の状況等               | 99  |
| (1) 人臨床分野におけるフルオロキノロン耐性菌等の検出状況            | 99  |
| (2) フルオロキノロン耐性菌が人の健康に与える悪影響               | 104 |
| VII. 食品健康影響評価                             | 105 |
| 1. 発生、ばく露及び影響評価並びにリスクの推定の考え方              | 105 |
| 2. 発生評価について                               | 105 |
| (1) ハザードの出現(薬剤耐性機序、遺伝学的情報等)               | 105 |
| (2) ハザードの感受性分布                            | 105 |
| (3) 発生評価に係るその他要因(薬物動態、使用方法、使用量等)          | 106 |
| (4) 発生評価                                  | 106 |
| 3. ばく露評価について                              | 107 |
| (1) ハザードを含む当該細菌の生物学的特性                    | 107 |
| (2) ハザードを含む当該細菌による食品の汚染状況                 | 107 |
| (3) ばく露評価に係るその他要因(食肉処理工程、流通経路等)           | 107 |
| (4) ばく露評価                                 | 107 |
| 4. 影響評価について                               | 108 |
| (1) 当該疾病治療におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の重要度          | 108 |
| (2) 当該疾病の重篤性                              | 108 |
| (3) 影響評価に係るその他要因(代替薬の状況、医療分野における薬剤耐性の状況等) | 109 |
| (4) 影響評価                                  | 109 |
| 5. リスクの推定について                             | 109 |
| 6. 食品健康影響評価について                           | 111 |
| VIII. その他の考察                              | 112 |
| 1. リスク管理措置の徹底について                         | 112 |
| 2. 薬剤耐性菌に係るモニタリングについて                     | 112 |
| 3. フルオロキノロン系抗菌性物質耐性カンピロバクターの発生動向          | 113 |
| 4. 食品健康影響評価の見直しについて                       | 113 |
| <参照>                                      | 118 |

〈審議の経緯〉

第1版

○承認に係る案件

|                        |                             |                                                       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | オルビフロキサシンを有効成分とする豚の飲水添加剤    | マルボフロキサシンを有効成分とする牛及び豚の注射剤（マルボシル2%、同10%） <sup>*1</sup> |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2005年4月11日<br>(17消安第66号)    | 2006年11月6日<br>(18消安第8073号)                            |
| 要請事項説明                 | 2005年4月14日<br>(第90回食品安全委員会) | 2006年11月9日<br>(第167回食品安全委員会)                          |

○再審査に係る案件

|                        |                                                                                                               |                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                        | エンロフロキサシンを有効成分とする製造用原体（バイトリル原体）、牛の強制経口投与剤（バイトリル2.5%HV液）並びに牛及び豚の注射剤（バイトリル2.5%注射液、同5%注射液、同10%注射液） <sup>*2</sup> | 塩酸ジフロキサシンを有効成分とする製造用原体（塩酸ジフロキサシン）及び豚の飲水添加剤（ベテキノン可溶散25%） <sup>*3</sup> |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2004年10月29日<br>(16消安第5870号)                                                                                   | 2004年10月29日<br>(16消安第5870号)                                           |
| 要請事項説明                 | 2004年11月4日<br>(第68回食品安全委員会)                                                                                   | 2004年11月4日<br>(第68回食品安全委員会)                                           |

|                        |                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ノルフロキサシンを有効成分とする豚の経口投与剤（インフェック2%散） | <sup>*1~3</sup> ：ADI設定等に係る評価については答申済。<br><sup>*1</sup> 平成19年8月19日付 府食第768号<br><sup>*2</sup> 平成18年5月18日付 府食第401号<br><sup>*3</sup> 平成17年7月14日付 府食第692号 |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2006年4月21日<br>(17消安第13900号)        |                                                                                                                                                      |
| 要請事項説明                 | 2006年4月27日<br>(第141回食品安全委員会)       |                                                                                                                                                      |

|       |     |     |                                                               |
|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 2007年 | 3月  | 23日 | 第72回動物用医薬品／第22回肥料・飼料等／第22回微生物合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）      |
| 2007年 | 11月 | 6日  | 第83回動物用医薬品／第25回肥料・飼料等／第2回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）  |
| 2008年 | 11月 | 25日 | 第101回動物用医薬品／第29回肥料・飼料等／第4回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2009年 | 2月  | 10日 | 第106回動物用医薬品／第30回肥料・飼料等／第5回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2009年 | 12月 | 17日 | 第314回食品安全委員会（報告）                                              |
| 2009年 | 12月 | 17日 | より2010年1月15日 国民からの意見情報の募集                                     |
| 2010年 | 3月  | 23日 | 肥料・飼料等専門調査会座長及び微生物・ウイルス専門調査                                   |

会座長から食品安全委員会委員長へ報告  
 2010 年 3 月 25 日 第 325 回食品安全委員会（報告）  
 （同日付で農林水産大臣に通知）

## 第 2 版

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
|                        | エンロフロキサシンを有効成分とする豚の注射剤（バイトリル ワンジェクト注射液） |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2014 年 11 月 25 日<br>（26 消安第 4084 号）     |
| 要請事項説明                 | 2014 年 12 月 2 日<br>（第 540 回食品安全委員会）     |

2014 年 12 月 1 日 関係資料の接受  
 2014 年 12 月 15 日 第 97 回肥料・飼料等／第 58 回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）  
 2015 年 2 月 4 日 第 98 回肥料・飼料等／第 59 回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）  
 2015 年 4 月 6 日 第 101 回肥料・飼料等／第 61 回微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）  
 2015 年 5 月 20 日 肥料・飼料等専門調査会座長及び微生物・ウイルス専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告  
 2015 年 5 月 26 日 第 562 回食品安全委員会（報告）  
 （同日付け農林水産大臣に通知）

## 第 3 版

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
|                        | マルボフロキサシンを有効成分とする牛の注射剤（フォーシル）    |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2022 年 10 月 5 日（4 消安第 3453 号）    |
| 要請事項説明                 | 2022 年 10 月 11 日（第 875 回食品安全委員会） |

2022 年 10 月 5 日 関係資料の接受  
 2022 年 12 月 5 日 第 43 回薬剤耐性菌に関するワーキンググループ  
 2023 年 2 月 1 日 第 44 回薬剤耐性菌に関するワーキンググループ  
 2023 年 3 月 1 日 薬剤耐性菌に関するワーキンググループ座長から食品安全委員会委員長へ報告  
 2023 年 3 月 7 日 第 892 回食品安全委員会（報告）  
 （3 月 9 日付けで農林水産大臣に通知）

#### 第4版

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
|                        | マルボフロキサシンを有効成分とする牛及び豚の注射剤（マルボシル 2%、同 10%） |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2023 年 5 月 17 日（5 消安第 898 号）              |
| 要請事項説明                 | 2023 年 5 月 23 日（第 899 回食品安全委員会）           |

2023 年 5 月 17 日 関係資料の接受  
 2023 年 5 月 30 日 第 900 回食品安全委員会（審議）  
 （5 月 31 日付けで農林水産大臣に通知）

#### 第5版

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
|                        | マルボフロキサシンを有効成分とする豚の注射剤（フォーシル S） |
| 農林水産大臣から<br>食品健康影響評価要請 | 2023 年 7 月 5 日（5 消安第 2025 号）    |
| 要請事項説明                 | 2023 年 7 月 11 日（第 905 回食品安全委員会） |

2023 年 7 月 5 日 関係資料の接受  
 2023 年 7 月 25 日 第 907 回食品安全委員会（審議）

#### 〈食品安全委員会委員名簿〉

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| (2006 年 6 月 30 日まで) | (2006 年 12 月 20 日まで) | (2009 年 6 月 30 日まで) |
| 寺田 雅昭（委員長）          | 寺田 雅昭（委員長）           | 見上 彪（委員長）           |
| 寺尾 允男（委員長代理）        | 見上 彪（委員長代理）          | 小泉 直子（委員長代理*）       |
| 小泉 直子               | 小泉 直子                | 長尾 拓                |
| 坂本 元子               | 長尾 拓                 | 野村 一正               |
| 中村 靖彦               | 野村 一正                | 畑江 敬子               |
| 本間 清一               | 畑江 敬子                | 廣瀬 雅雄**             |
| 見上 彪                | 本間 清一                | 本間 清一               |

\* : 2007 年 2 月 1 日から

\*\* : 2007 年 4 月 1 日から

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| (2011 年 1 月 6 日まで) | (2012 年 6 月 30 日まで) | (2015 年 6 月 30 日まで) |
| 小泉 直子（委員長）         | 小泉 直子（委員長）          | 熊谷 進（委員長*）          |
| 見上 彪（委員長代理*）       | 熊谷 進（委員長代理*）        | 佐藤 洋（委員長代理*）        |
| 長尾 拓               | 長尾 拓                | 山添 康（委員長代理*）        |
| 野村 一正              | 野村 一正               | 三森 国敏（委員長代理*）       |
| 畑江 敬子              | 畑江 敬子               | 石井 克枝               |
| 廣瀬 雅雄              | 廣瀬 雅雄               | 上安平 洌子              |
| 村田 容常              | 村田 容常               | 村田 容常               |

\* : 2009 年 7 月 9 日から      \* : 2011 年 1 月 13 日から      \* : 2012 年 7 月 2 日から

(2021 年 7 月 1 日から)

山本 茂貴（委員長）  
浅野 哲（委員長代理 第一順位）  
川西 徹（委員長代理 第二順位）  
脇 昌子（委員長代理 第三順位）  
香西 みどり  
松永 和紀  
吉田 充

**〈食品安全委員会動物用医薬品／肥料・飼料等／微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）専門委員名簿〉**

（2009年9月30日まで）

|           |       |
|-----------|-------|
| 唐木 英明（座長） | 三森 国敏 |
| 青木 宙      | 池 康嘉  |
| 井上 松久     | 荒川 宜親 |
| 頭金 正博     | 岡部 信彦 |
| 戸塚 恭一     | 田村 豊  |
| 中村 政幸     | 渡邊 治雄 |

**〈食品安全委員会肥料・飼料等／微生物・ウイルス合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）専門委員名簿〉**

（2010年9月29日まで）

|           |       |
|-----------|-------|
| 青木 宙      | 荒川 宜親 |
| 池 康嘉      | 多田 有希 |
| 唐木 英明（座長） | 田村 豊  |
| 舘田 一博     | 中村 政幸 |
| 戸塚 恭一     | 渡邊 治雄 |
| 細川 正清     |       |

（2015年9月30日まで）

|             |           |
|-------------|-----------|
| 津田 修治（座長代理） | 吉川 泰弘（座長） |
| 荒川 宜親       | 甲斐 明美     |
| 池 康嘉        | 砂川 富正     |
| 今田 千秋       | 田村 豊      |
| 戸塚 恭一       | 豊福 肇      |
| 細川 正清       |           |

**〈食品安全委員会薬剤耐性菌に関するワーキンググループ専門委員名簿〉**

（2021年10月1日から）

|             |        |
|-------------|--------|
| 荒川 宜親（座長）   | 佐々木 一昭 |
| 浅井 鉄夫（座長代理） | 菅井 基行  |
| 今田 千秋       | 早川 佳代子 |
| 岡村 雅史       | 早山 陽子  |

木村 凡  
小西 典子

蒔田 浩平  
山岸 拓也

**<第 43 回、第 44 回食品安全委員会薬剤耐性菌に関するワーキンググループ専門参考人名簿>**

池 康嘉（一般社団法人薬剤耐性菌教育研究会代表理事 兼 群馬大学名誉教授）

## 要 約

牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする動物用医薬品の承認\*及び再審査\*\*に係る食品健康影響評価のうち、評価対象動物用医薬品が家畜等に使用された場合に選択される薬剤耐性菌に関する評価を、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」（2004年9月30日食品安全委員会決定）に基づき実施した。なお、第5版の改訂に当たり、マルボフロキサシンを有効成分とする豚用の注射剤の製造販売承認申請に伴うフルオロキノロン製剤の薬物動態試験や臨床試験の試験結果等の新たな知見等が提出された。

牛及び豚由来の畜産食品を介して伝播する可能性がある感染症であって、人の医療分野において、フルオロキノロン系抗菌性物質による治療が推奨されている腸管感染症は、腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症であると考えられる。また、カンピロバクター感染症に対しては、フルオロキノロン系抗菌性物質は推奨薬とはされていないが、感染性腸炎の初診時に、原因菌が特定されていない段階で投薬される場合がある。したがって、これらの感染症については、原因菌がフルオロキノロン耐性菌であった場合、人の治療に対して悪影響を及ぼすという可能性は否定できないと考えられた。そこで、評価すべきハザードとして、牛及び豚に対してフルオロキノロン系抗菌性物質を使用することにより薬剤耐性が選択された腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターを特定し、ハザードごとに発生評価、ばく露評価及び影響評価を行い、それらの結果からリスクを推定した。

発生評価では、評価対象動物用医薬品が家畜等に使用された場合に、ハザードが選択される可能性があるが、腸管出血性大腸菌及びサルモネラについては、その程度は低度と判断された。カンピロバクターについては、フルオロキノロンを投与すると速やかに耐性菌が選択されること等からハザードの出現についてその程度は中等度とされた。

ばく露評価では、人が牛及び豚由来食品を介してハザードのばく露を受ける可能性があるが、一般的な食中毒対策等により、牛及び豚由来食品が適切に管理及び消費される限りにおいては、その程度はいずれのハザードについても低度と考えた。

影響評価では、人の疾病治療におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の重要度やハザードによる人の疾病の重篤性等から、ハザードに起因する感染症に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の治療効果が減弱又は喪失する可能性があり、その程度は腸管出血性大腸菌及びサルモネラは高度、カンピロバクターについては中等度と考えた。

以上のことから、これまでに得られている科学的知見に基づく現時点での評価としては、評価対象動物用医薬品が、牛及び豚に使用された結果としてハザードが選択され、牛及び豚由来食品を介して人がハザードにばく露され、人用抗菌性物質による治療効果が減弱又は喪失する可能性は否定できず、リスクの程度は中等度であると考えた。

なお、薬剤耐性菌については、現時点では詳細な科学的知見や情報が必ずしも十分とはいえず、また、リスク評価の手法についても国際的にも十分確立されていないと考えられるため、国際機関における検討状況等を含め新たな科学的知見・情報の収集が必要である。

牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤については、今回の評価結果を踏まえ、現在のフルオロキノロン系抗菌性物質製剤の適正使用確保のための措置、薬剤耐性菌に関する情報収集等のリスク管理措置等の徹底が図られるとともに、薬剤耐性菌に関

する科学的知見・情報を収集した上で随時検証を行い、必要なリスク管理措置が講じられることが不可欠である。

- \* オルビフロキサシン（OBFX）を有効成分とする豚の飲水添加剤及びマルボフロキサシン（MBFX）を有効成分とする牛及び豚の注射剤
- \*\* エンロフロキサシン（ERFX）を有効成分とする牛の強制経口投与剤並びに牛及び豚の注射剤、塩酸ジフロキサシン（DFLX）を有効成分とする豚の飲水添加剤、ノルフロキサシン（NFLX）を有効成分とする豚の経口投与剤並びに ERFX 及び DFLX の製造用原体

## I. 評価の経緯及び範囲等

### 1. はじめに

本評価は、農林水産省から要請があった牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする動物用医薬品についての医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下、「医薬品医療機器等法」という。）に基づく承認に係る食品健康影響評価のうち、「当該動物用医薬品を使用することにより選択される薬剤耐性菌を介した影響」について、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」（平成 16 年 9 月 30 日食品安全委員会決定。以下「評価指針」という。）（参照 1）に基づき、評価を行った。

今般、Meiji Seika ファルマ株式会社（現明治アニマルヘルス株式会社）からマルボフロキサシン（MBFX）を有効成分とする豚の注射剤の承認申請がなされたことに伴い、2023 年 7 月 5 日に農林水産省から要請があった本剤剤の新規承認に係る薬剤耐性菌に関する食品を介した人の健康に及ぼす影響について、同様に評価指針に基づき評価を行った。

### 2. 経緯

#### （1）評価対象動物用医薬品

2023 年 7 月に、農林水産省から、MBFX を有効成分とする豚の注射剤について、医薬品医療機器等法第 83 条第 1 項の規定により読み替えて適用される同法第 14 条の 4 第 1 項の規定に基づく製造販売の承認に係る食品健康影響評価の要請がなされた（表 1）。

表 1 評価対象動物用医薬品（新規承認）

| 動物用医薬品           | 対象家畜 | 評価要請区分 |
|------------------|------|--------|
| MBFX を有効成分とする注射剤 | 豚    | 新規承認   |

他方、これまで、農林水産省から、医薬品医療機器等法に基づく承認及び再審査に係る食品健康影響評価の要請がなされたフルオロキノロン系抗菌性物質製剤は、オルビフロキサシン（OBFX）を有効成分とする豚の飲水添加剤、MBFX を有効成分とする牛及び豚の注射剤、エンロフロキサシン（ERFX）を有効成分とする豚の注射剤、ERFX を有効成分とする牛の強制経口投与剤並びに牛及び豚の注射剤、塩酸ジフロキサシン（DFLX）を有効成分とする豚の飲水添加剤、ノルフロキサシン（NFLX）を有効成分とする豚の経口投与剤並びに ERFX 及び DFLX の製造用原体であり、食品安全委員会において既に評価している（表 2）。

表 2 食品安全委員会において既に評価されているフルオロキノロン系抗菌性物質製剤

| 動物用医薬品             | 対象家畜 | 評価要請区分 | 答申日             |
|--------------------|------|--------|-----------------|
| OBFX を有効成分とする飲水添加剤 | 豚    | 新規承認   | 2010 年 3 月 25 日 |
| MBFX を有効成分とする注射剤   | 牛、豚  | 新規承認   | 2010 年 3 月 25 日 |
| ERFX を有効成分とする注射剤   | 豚    | 新規承認   | 2015 年 5 月 26 日 |

|                                 |     |      |                 |
|---------------------------------|-----|------|-----------------|
| MBFX を有効成分とする注射剤                | 牛   | 新規承認 | 2023 年 3 月 9 日  |
| ERFX を有効成分とする製造用原体              | —   | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| ERFX を有効成分とする強制経口投与剤            | 牛   | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| ERFX を有効成分とする注射剤                | 牛、豚 | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| DFLX を有効成分とする製造用原体 <sup>1</sup> | —   | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| DFLX を有効成分とする飲水添加剤 <sup>1</sup> | 豚   | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| NFLX を有効成分とする経口投与剤              | 豚   | 再審査  | 2010 年 3 月 25 日 |
| MBFX を有効成分とする注射剤                | 牛、豚 | 再審査  | 2023 年 5 月 31 日 |

また、現在動物用医薬品として承認されている牛及び豚に使用されるフルオロキノロン系抗菌性物質は、表 2 の動物用医薬品の他に OBFX を有効成分とする注射剤及びメシル酸ダノフロキサシン (DNFX) を有効成分とする注射剤があるが、それらの動物用医薬品については既に再審査が終了しており、農林水産省からの食品健康影響評価の要請はされていない (表 3)。

表 3 評価対象となっていない牛及び豚用のフルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする既承認動物用医薬品

| 動物用医薬品           | 対象家畜 | 評価要請区分 |
|------------------|------|--------|
| OBFX を有効成分とする注射剤 | 牛、豚  | —      |
| DNFX を有効成分とする注射剤 | 牛、豚  | —      |

フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌については、基本的に同系抗菌性物質において相互に交差耐性を示すと考えられることから、第 5 版改訂に当たってはこれらの動物用医薬品についても考慮するとともに、フルオロキノロン系抗菌性物質についての薬剤耐性菌に関する一般的な知見も含めて評価を行った。

## (2) 評価の範囲

本評価書は、(1) の評価対象動物用医薬品に係る食品健康影響評価のうち、「当該動物用医薬品を使用することにより選択される薬剤耐性菌が食品を介して人に伝播し、人が当該細菌に起因する感染症を発症した場合に、人用抗菌性物質による治療効果が減弱又は喪失する可能性及びその程度」について評価を行ったものである。

評価対象動物用医薬品は、牛及び豚の飼養過程において使用されることから、評価指針に基づき、評価の対象を「牛及び豚由来の畜産食品」が介在する場合とした。

なお、鶏を使用対象動物としたフルオロキノロン系抗菌性物質製剤の再審査に係る食品健康影響評価についても農林水産省から要請があった (2004 年 10 月及び 2006 年 4 月) が、鶏については、飼養形態や食肉の加工工程、動物用医薬品の使用方法や状況等が異なり、「牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質」とはリスク<sup>2</sup>

<sup>1</sup> DFLX を有効成分とする製造用原体及び飲水添加剤は、承認が整理された。

<sup>2</sup> 本評価におけるリスクとは、家畜等に動物用抗菌性物質を使用することにより選択される薬剤耐性菌が食品を介して人に伝播し、人が当該薬剤耐性菌に起因する感染症を発症した場合に、人用抗菌性物質による治療効果が減弱あるいは喪失する可能性及びその程度のことである。

評価も異なると考えられることから、本評価書では、「牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質である評価対象動物用医薬品」に限定した評価を行うこととし、「鶏に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質」については、別途、評価した。(2013年 11 月評価結果通知)





## II. 評価対象動物用医薬品の概要



### 1. 評価対象フルオロキノロン系抗菌性物質の名称、化学構造、効能・効果等

#### (1) 名称等

評価対象のフルオロキノロン系抗菌性物質は 6 成分（製剤 10 品目及び製造用原体 2 品目）であり、一般名、化学名、CAS 番号、分子式、分子量及び構造式を表 4 に示した。（参照 2、103）

表 4 評価対象フルオロキノロン系抗菌性物質 6 成分の概要

| 一般名    | オルビフロキサシン                                                                                                                                                                                            | マルボフロキサシン                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学名    | 1-シクロプロピル-5,6,8-トリフルオロ-1,4-ジヒドロ-7-(シス-3,5-ジメチル-1-ピペラジニル)-4-オキソキノリン-3-カルボン酸<br>1-cyclopropyl-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-7-( <i>cis</i> -3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid | 9-フルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-10-(4-メチル-1-ピペラジニル)-7-オキソ-7H-ピリド-(3,2,1-ij)(4,1,2)-ベンゾキサジアジン-6-カルボキシル酸<br>9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido-(3,2,1-ij)(4,1,2)-benzoxadiazine-6-carboxylic acid |
| CAS 番号 | 113617-63-3                                                                                                                                                                                          | 115550-35-1                                                                                                                                                                                                                  |
| 分子式    | C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> F <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                         | C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> FN <sub>4</sub> O <sub>4</sub>                                                                                                                                                               |
| 分子量    | 395.38                                                                                                                                                                                               | 362.36                                                                                                                                                                                                                       |
| 構造式    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 一般名    | エンロフロキサシン                                                                                                                                                                                            | 塩酸ジフロキサシン                                                                                                                                                                                                                    |
| 化学名    | 1-シクロプロピル-7-(4-エチル-1-ピペラジニル)-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸<br>1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid                                     | 6-フルオロ-1-(4-フルオロフェニル)-1,4-ジヒドロ-7-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸・一塩酸塩<br>6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid monohydrochlorid                            |
| CAS 番号 | 93106-60-6                                                                                                                                                                                           | 98106-17-3                                                                                                                                                                                                                   |
| 分子式    | C <sub>19</sub> H <sub>22</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                       | C <sub>21</sub> H <sub>19</sub> F <sub>2</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> ·HCl                                                                                                                                            |
| 分子量    | 359.39                                                                                                                                                                                               | 435.86                                                                                                                                                                                                                       |
| 構造式    |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 一般名    | ノルフロキサシン                                                                                                                                                                                             | メシル酸ダノフロキサシン                                                                                                                                                                                                                 |
| 化学名    | 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジニル)-3-キノリンカルボン酸                                                                                                                                                 | (1S)-1-シクロプロピル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-7-(5-メチル-2,5-ジアザビシクロ[2.2.1]                                                                                                                                                                   |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinoline-carboxylic acid  | ヘプト-2-イル)-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸・メタスルホン酸塩水和物<br>(1S)-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid<br>Methanesulphonate |
| CAS 番号 | 68077-27-0                                                                        | 112398-08-0                                                                                                                                                                             |
| 分子式    | C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub>                    | C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub> ·CH <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S                                                                                        |
| 分子量    | 319.33                                                                            | 453.49                                                                                                                                                                                  |
| 構造式    |  |                                                                                                       |

## (2) 評価対象動物用医薬品の効能・効果、用法・用量等

評価対象となる牛及び豚を使用対象動物とするフルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする動物用医薬品の効能・効果、用法・用量、使用禁止期間等の詳細は表 5 のとおりである。(参照 2、3、103、229)

表 5 評価対象フルオロキノロン系抗菌性物質製剤の使用方法等

| 薬剤名    | オルビフロキサシン                                    |                                                |                                           |                                 |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 対象家畜   | 豚                                            | 牛                                              | 牛                                         | 豚                               |
| 投与経路   | 経口（飲水）                                       | 注射（筋肉内）                                        | 注射（筋肉内）                                   | 注射（筋肉内）                         |
| 製剤名    | ビクタス水溶散<br>25 %                              | ビクタス注射液 5 %                                    | ビクタス注射液 5 %                               | ビクタス注射液 5 %                     |
| 対象疾病   | 大腸菌性下痢症、マイコプラズマ性肺炎                           | 細菌性肺炎、大腸菌性下痢症                                  | 細菌性肺炎                                     | 大腸菌性下痢症、胸膜肺炎、マイコプラズマ性肺炎         |
| 用法・用量  | 2.5～5 mg/kg 体重<br>(3 日間)<br>※生後 1 か月以下のものを除く | 2.5～5 mg/kg 体重<br>(3～5 日間)                     | 5 mg/kg 体重 (3 日間)                         | 2.5～5 mg/kg 体重<br>(3～5 日間)      |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 7 日間                          | 食用に供するためにと殺する前 21 日間<br>又は食用に供するために搾乳する前 72 時間 | 食用に供するためにと殺する前 2 日間又は食用に供するために搾乳する前 24 時間 | 食用に供するためにと殺する前 14 日間            |
| 使用上の注意 | 1 日当たり 8 時間以内で飲みきる飲水量に溶解させること                | —                                              | —                                         | —                               |
| 薬剤名    | マルボフロキサシン                                    |                                                |                                           |                                 |
| 対象家畜   | 牛                                            | 牛                                              | 豚                                         | 豚                               |
| 投与経路   | 注射（静脈内）                                      | 注射（静脈内、筋肉内）                                    | 注射（筋肉内）                                   | 注射（筋肉内）                         |
| 製剤名    | フォーシル                                        | マルボシル 2 %、同 10 %<br>マルボロック 2 %、                | フォーシル S                                   | マルボシル 2 %、同 10 %<br>マルボロック 2 %、 |

|        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                              | 同 10%                                                                                                                                                                                           |                                           | 同 10%               |
| 対象疾病   | 甚急性及び急性乳房炎                                                                   | 細菌性肺炎、甚急性及び急性乳房炎                                                                                                                                                                                | 大腸菌性下痢症                                   | 胸膜肺炎                |
| 用法・用量  | 10 mg/kg 体重 (単回)                                                             | 細菌性肺炎：<br>2 mg/kg 体重 (3～5 日間)<br>甚急性及び急性乳房炎：<br>2 mg/kg 体重 (2～3 日間)                                                                                                                             | 8 mg/kg 体重 (単回)                           | 2 mg/kg 体重 (3～5 日間) |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 3 日間又は食用に供するために搾乳する前 48 時間                                    | 食用に供するためにと殺する前 4 日間又は食用に供するために搾乳する前 48 時間                                                                                                                                                       | 食用に供するためにと殺する前 8 日間                       | 食用に供するためにと殺する前 4 日間 |
| 使用上の注意 | 開封後 28 日以内に使用すること                                                            | －                                                                                                                                                                                               | 開封後 28 日以内に使用すること                         | －                   |
| 薬剤名    | エンロフロキサシン                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
| 対象家畜   | 牛                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
| 投与経路   | 経口 (強制)                                                                      | 注射 (皮下)                                                                                                                                                                                         | 注射 (静注)                                   |                     |
| 製剤名    | バイトリル 2.5 %HV 液                                                              | バイトリル 2.5 %注射液、同 5 %注射液、同 10 %注射液、同ワンショット注射液、エンロフロキサシン注 50 「KS」、エンロフロキサシン注 100 「KS」、エンロフロックス注 10 %                                                                                              | バイトリル 10 %注射液、エンロフロキサシン注 100 「KS」         |                     |
| 対象疾病   | 肺炎、大腸菌性下痢症                                                                   | 肺炎、大腸菌性下痢症                                                                                                                                                                                      | 甚急性及び急性乳房炎                                |                     |
| 用法・用量  | 肺炎：2.5～5 mg/kg 体重 (3～5 日間)<br>大腸菌性下痢症：2.5 mg/kg 体重 (3 日間)<br>※3 か月齢を超える牛を除く。 | ①2.5 %注射液、同 5 %注射液、同 10 %注射液、エンロフロキサシン注 50 「KS」、エンロフロキサシン注 100 「KS」、エンロフロックス注 10 %<br>肺炎：2.5～5 mg/kg 体重 (3～5 日間)<br>大腸菌性下痢症：2.5 mg/kg 体重 (3 日間) ②ワンショット注射液<br>肺炎：7.5 mg/kg 体重 (1 回)<br>※搾乳牛を除く。 | 5 mg/kg 体重 (2 日間)                         |                     |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 12 日間                                                         | ①食用に供するためにと殺する前 14 日間又は食用に供するために搾乳する前 60 時間<br>②食用に供するためにと殺する前 14 日間                                                                                                                            | 食用に供するためにと殺する前 8 日間又は食用に供するために搾乳する前 60 時間 |                     |
| 使用上の注意 | －                                                                            | －                                                                                                                                                                                               | －                                         |                     |
| 薬剤名    | エンロフロキサシン                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
| 対象家畜   | 豚                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |

|        |                                                                                       |                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 投与経路   | 注射（筋肉内）                                                                               | 注射（筋肉内）                                                                |
| 製剤名    | バイトリル 2.5 %注射液、同 5 %注射液、同 10 %注射液、エンロフロキサシン注 50「KS」、エンロフロキサシン注 100「KS」、エンロフロックス注 10 % | バイトリル ワンジェクト注射液                                                        |
| 対象疾病   | 胸膜炎、大腸菌性下痢症                                                                           | 胸膜炎                                                                    |
| 用法・用量  | 胸膜炎：2.5～5 mg/kg 体重（3 日間）<br>大腸菌性下痢症：1.25～2.5 mg/kg 体重（1～3 日間）                         | 7.5 mg/kg 体重（1 回）<br>重症あるいは慢性の胸膜炎の場合で十分な効果が認められないときは、48 時間後に再度同量を注射する。 |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 14 日間                                                                  | 食用に供するためにと殺する前 12 日間                                                   |
| 使用上の注意 | －                                                                                     | －                                                                      |
| 薬剤名    | 塩酸ジフロキサシン                                                                             | ノルフロキサシン                                                               |
| 対象家畜   | 豚                                                                                     | 豚                                                                      |
| 投与経路   | 経口（飲水）                                                                                | 経口（混餌）                                                                 |
| 製剤名    | ベテキノノ可溶散 25 %                                                                         | インフェック 2 %散                                                            |
| 対象疾病   | 細菌性肺炎                                                                                 | 細菌性下痢症、胸膜炎                                                             |
| 用法・用量  | 2.5～5 mg/kg 体重（3 日間）                                                                  | 5～10 mg/kg 体重（5 日間）                                                    |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 7 日間                                                                   | 食用に供するためにと殺する前 7 日間                                                    |
| 使用上の注意 | －                                                                                     | －                                                                      |
| 薬剤名    | メシル酸ダノフロキサシン                                                                          |                                                                        |
| 対象家畜   | 牛                                                                                     | 豚                                                                      |
| 投与経路   | 注射（筋肉内）                                                                               | 注射（筋肉内）                                                                |
| 製剤名    | アドボシン注射液                                                                              | アドボシン注射液                                                               |
| 対象疾病   | 肺炎                                                                                    | 肺炎                                                                     |
| 用法・用量  | 1.25 mg/kg 体重（重症例に対しては 2.5 mg/kg 体重）3 日間                                              | 1.25 mg/kg 体重（重症例に対しては 2.5 mg/kg 体重）3 日間                               |
| 使用禁止期間 | 食用に供するためにと殺する前 6 日間又は食用に供するために搾乳する前 48 時間                                             | 食用に供するためにと殺する前 25 日間                                                   |
| 使用上の注意 | －                                                                                     | －                                                                      |

### （３）有効成分の系統

フルオロキノロン系抗菌性物質は、NFLX 以降に合成された塩基性環の 6 位にフッ素、7 位に環状塩基性基を有するキノロン系抗菌性物質の総称である。（参照 3）

日本では、牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質としては、ERFX（牛（経口、注射）、豚（注射））、OBFX（牛（注射）、豚（経口、注射））、DNFX（牛・豚（注射））、NFLX（豚（経口））及びMBFX（牛・豚（注射））が、承認されている。

関連する系統であるキノロン系抗菌性物質については、日本においては牛及び豚用としてはオキシリン酸が承認されている。

牛及び豚以外の動物種に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質として、鶏用の

ERFX、オフロキサシン（OFLX）及びNFLXを有効成分とする飲水添加剤が承認されている他、イヌ又はネコに使用するフルオロキノロン系抗菌性物質として、ERFX、OFLX、OBFX、MBFX及びロメフロキサシンを有効成分とする製剤が承認されている。

## 2. フルオロキノロン系抗菌性物質の使用状況、規制等

### （1）使用状況等

牛及び豚用のフルオロキノロン系抗菌性物質については、製剤の販売が1991～1992年頃から始まり（表6）、製剤製造用の原体として年間3,509kg（鶏を含めた食用動物全体としては7,542kg）（2021年）流通している（表7、表8）。（参照4、104、105、170）

表6 フルオロキノロン系抗菌性物質製剤（動物用）の販売開始時期

| 種類   | 経口剤      | 注射剤      |
|------|----------|----------|
| ERFX | 1991年11月 | 1992年6月  |
| OBFX | —        | 1994年2月  |
| DFLX | 1996年5月  | —        |
| DNFX | —        | 1993年9月  |
| NFLX | 1999年8月  | —        |
| MBFX | —        | 2010年10月 |

表7 フルオロキノロン系抗菌性物質の原体流通量（実量、単位：kg）

#### 【合計】

| 種類 | 年次   | 合計    | 牛   |     |       | 豚     | 鶏     |     |
|----|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
|    |      |       | 肉用牛 | 乳用牛 | 牛合計   |       | 肉用鶏   | 採卵鶏 |
| 合計 | 2001 | 5,704 | 333 | 240 | 573   | 1,293 | 3,581 | 256 |
|    | 2002 | 3,725 | 454 | 293 | 747   | 1,521 | 1,274 | 183 |
|    | 2003 | 5,795 | 313 | 431 | 744   | 1,290 | 3,584 | 177 |
|    | 2004 | 5,827 | 211 | 221 | 432   | 1,531 | 3,648 | 217 |
|    | 2005 | 5,000 | 260 | 252 | 512   | 2,017 | 2,374 | 97  |
|    | 2006 | 5,123 | 348 | 309 | 657   | 2,439 | 1,835 | 192 |
|    | 2007 | 5,298 | 261 | 258 | 519   | 2,411 | 2,141 | 227 |
|    | 2008 | 5,171 | 277 | 252 | 529   | 1,584 | 2,712 | 347 |
|    | 2009 | 4,516 | 389 | 362 | 751   | 1,661 | 1,907 | 197 |
|    | 2010 | 5,189 | 253 | 387 | 640   | 1,531 | 2,679 | 338 |
|    | 2011 | 6,407 | 277 | 412 | 689   | 1,990 | 3,237 | 490 |
|    | 2012 | 4,589 | 349 | 431 | 780   | 1,410 | 2,107 | 302 |
|    | 2013 | 4,640 | 361 | 350 | 711   | 1,421 | 2,173 | 335 |
|    | 2014 | 4,731 | 463 | 467 | 930   | 1,530 | 1,992 | 279 |
|    | 2015 | 6,410 | 550 | 523 | 1,073 | 2,826 | 2,211 | 300 |
|    | 2016 | 5,194 | 736 | 533 | 1,269 | 1,223 | 2,392 | 300 |
|    | 2017 | 5,926 | 890 | 427 | 1,317 | 1,918 | 2,348 | 343 |

|                     |      |       |       |       |       |       |         |         |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
|                     | 2018 | 5,804 | 958   | 419   | 1,377 | 1,878 | 2,259   | 289     |
|                     | 2019 | 6,660 | 1,058 | 433   | 1,491 | 1,938 | 2,867   | 364     |
|                     | 2020 | 6,180 | 1,041 | 520   | 1,561 | 1,118 | 3,078   | 423     |
|                     | 2021 | 7,542 | 1,053 | 540   | 1,593 | 1,916 | 3,570   | 463     |
| (参考) 家畜飼養頭羽数 (千頭、羽) | 2022 | -     | 2,614 | 1,371 | 3,985 | 8,949 | 139,230 | 182,661 |

【成分別】

| 種類   | 年次   | 合計    | 牛   |     | 豚   | 鶏     |     |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
|      |      |       | 肉用牛 | 乳用牛 |     | 肉用鶏   | 採卵鶏 |
| ERFX | 2001 | 2,021 | 171 | 176 | 223 | 1,450 | -   |
|      | 2002 | 2,236 | 180 | 162 | 216 | 1,678 | -   |
|      | 2003 | 2,720 | 245 | 239 | 246 | 1,990 | -   |
|      | 2004 | 2,459 | 164 | 185 | 216 | 1,894 | -   |
|      | 2005 | 1,939 | 199 | 209 | 216 | 1,314 | -   |
|      | 2006 | 1,716 | 207 | 210 | 234 | 1,065 | -   |
|      | 2007 | 1,903 | 205 | 216 | 244 | 1,237 | -   |
|      | 2008 | 1,997 | 211 | 204 | 256 | 1,326 | -   |
|      | 2009 | 1,787 | 208 | 209 | 254 | 1,117 | -   |
|      | 2010 | 1,967 | 199 | 212 | 234 | 1,322 | -   |
|      | 2011 | 1,906 | 187 | 206 | 241 | 1,272 | -   |
|      | 2012 | 1,585 | 214 | 236 | 235 | 900   | -   |
|      | 2013 | 1,467 | 195 | 217 | 202 | 852   | -   |
|      | 2014 | 1,684 | 255 | 317 | 239 | 874   | -   |
|      | 2015 | 1,922 | 295 | 372 | 242 | 1,013 | -   |
|      | 2016 | 2,289 | 466 | 400 | 232 | 1,191 | -   |
|      | 2017 | 2,119 | 509 | 397 | 241 | 972   | -   |
|      | 2018 | 2,279 | 545 | 394 | 240 | 1,100 | -   |
|      | 2019 | 2,619 | 573 | 407 | 228 | 1,411 | -   |
|      | 2020 | 2,664 | 540 | 474 | 265 | 1,386 | -   |
|      | 2021 | 3,039 | 549 | 492 | 280 | 1,718 | -   |
| OFLX | 2001 | 1,098 | -   | -   | -   | 1,098 | -   |
|      | 2002 | 751   | -   | -   | -   | 751   | -   |
|      | 2003 | 885   | -   | -   | -   | 885   | -   |
|      | 2004 | 892   | -   | -   | -   | 892   | -   |
|      | 2005 | 668   | -   | -   | -   | 668   | -   |
|      | 2006 | 469   | -   | -   | -   | 375   | 94  |
|      | 2007 | 443   | -   | -   | -   | 354   | 89  |
|      | 2008 | 653   | -   | -   | -   | 523   | 130 |
|      | 2009 | 748   | -   | -   | -   | 598   | 150 |
|      | 2010 | 912   | -   | -   | -   | 730   | 182 |
|      | 2011 | 904   | -   | -   | -   | 723   | 181 |
|      | 2012 | 621   | -   | -   | -   | 496   | 124 |

|      |      |        |     |     |        |     |     |
|------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|      | 2013 | 463    | -   | -   | -      | 370 | 93  |
|      | 2014 | 507    | -   | -   | -      | 406 | 101 |
|      | 2015 | 508    | -   | -   | -      | 406 | 102 |
|      | 2016 | 614    | -   | -   | -      | 491 | 123 |
|      | 2017 | 533    | -   | -   | -      | 427 | 107 |
|      | 2018 | 560    | -   | -   | -      | 448 | 112 |
|      | 2019 | 734    | -   | -   | -      | 587 | 147 |
|      | 2020 | 632    | -   | -   | -      | 505 | 126 |
|      | 2021 | 836    | -   | -   | -      | 669 | 167 |
| OBFX | 2001 | 494    | 147 | 49  | 298    | -   | -   |
|      | 2002 | 507    | 61  | 41  | 405    | -   | -   |
|      | 2003 | 500    | 57  | 38  | 406    | -   | -   |
|      | 2004 | 365    | 33  | 22  | 310    | -   | -   |
|      | 2005 | 550    | 53  | 35  | 463    | -   | -   |
|      | 2006 | 1,099  | 130 | 87  | 882    | -   | -   |
|      | 2007 | 551    | 41  | 27  | 483    | -   | -   |
|      | 2008 | 659    | 53  | 35  | 571    | -   | -   |
|      | 2009 | 1,101  | 169 | 142 | 791    | -   | -   |
|      | 2010 | 540    | 0   | 162 | 378    | -   | -   |
|      | 2011 | 654    | 0   | 196 | 458    | -   | -   |
|      | 2012 | 574    | 0   | 172 | 402    | -   | -   |
|      | 2013 | 405    | 0   | 121 | 283    | -   | -   |
|      | 2014 | 464    | 0   | 139 | 325    | -   | -   |
|      | 2015 | 718    | 0   | 145 | 573    | -   | -   |
|      | 2016 | 585    | 0   | 127 | 460    | -   | -   |
|      | 2017 | 798    | 70  | 23  | 705    | -   | -   |
|      | 2018 | 724    | 61  | 20  | 643    | -   | -   |
|      | 2019 | 780    | 66  | 22  | 693    | -   | -   |
|      | 2020 | 709    | 51  | 17  | 640    | -   | -   |
|      | 2021 | 758    | 60  | 20  | 678    | -   | -   |
| DFLX | 2001 | 1      | -   | -   | 1      | -   | -   |
|      | 2002 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |
|      | 2003 | 163    | -   | -   | 163    | -   | -   |
|      | 2004 | 102    | -   | -   | 102    | -   | -   |
|      | 2005 | 57     | -   | -   | 57     | -   | -   |
|      | 2006 | 0      | -   | -   | 0      | -   | -   |
|      | 2007 | 0      | -   | -   | 0      | -   | -   |
|      | 2008 | 0      | -   | -   | 0      | -   | -   |
|      | 2009 | 0      | -   | -   | 0      | -   | -   |
|      | 2010 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |
|      | 2011 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |
|      | 2012 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |
|      | 2013 | 0      | -   | -   | 0      | -   | -   |
|      | 2014 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |
|      | 2015 | (報告なし) | -   | -   | (報告なし) | -   | -   |

|      |      |        |    |    |        |       |     |
|------|------|--------|----|----|--------|-------|-----|
|      | 2016 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
|      | 2017 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
|      | 2018 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
|      | 2019 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
|      | 2020 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
|      | 2021 | (報告なし) | -  | -  | (報告なし) | -     | -   |
| DNFX | 2001 | 108    | 15 | 15 | 70     | 8     | -   |
|      | 2002 | 106    | 16 | 16 | 74     | -     | -   |
|      | 2003 | 80     | 12 | 12 | 56     | -     | -   |
|      | 2004 | 92     | 14 | 14 | 64     | -     | -   |
|      | 2005 | 54     | 8  | 8  | 38     | -     | -   |
|      | 2006 | 79     | 12 | 12 | 55     | -     | -   |
|      | 2007 | 101    | 15 | 15 | 71     | -     | -   |
|      | 2008 | 87     | 13 | 13 | 61     | -     | -   |
|      | 2009 | 78     | 12 | 12 | 54     | -     | -   |
|      | 2010 | 88     | 13 | 13 | 62     | -     | -   |
|      | 2011 | 67     | 10 | 10 | 47     | -     | -   |
|      | 2012 | 65     | 26 | 13 | 26     | 0     | -   |
|      | 2013 | 57     | 23 | 12 | 23     | -     | -   |
|      | 2014 | 55     | 22 | 11 | 22     | -     | -   |
|      | 2015 | 35     | 14 | 7  | 14     | -     | -   |
|      | 2016 | 32     | 13 | 6  | 13     | -     | -   |
|      | 2017 | 32     | 10 | 6  | 16     | -     | -   |
|      | 2018 | 25     | 8  | 5  | 13     | -     | -   |
|      | 2019 | 25     | 10 | 4  | 11     | -     | -   |
|      | 2020 | 26     | 12 | 4  | 11     | -     | -   |
|      | 2021 | 21     | 10 | 3  | 8      |       |     |
| NFLX | 2001 | 1,982  | -  | -  | 701    | 1,025 | 256 |
|      | 2002 | 1,828  | -  | -  | 914    | 731   | 183 |
|      | 2003 | 1,305  | -  | -  | 419    | 709   | 177 |
|      | 2004 | 1,917  | -  | -  | 838    | 863   | 217 |
|      | 2005 | 1,731  | -  | -  | 1,243  | 391   | 97  |
|      | 2006 | 1,760  | -  | -  | 1,267  | 394   | 99  |
|      | 2007 | 2,299  | -  | -  | 1,613  | 549   | 138 |
|      | 2008 | 1,775  | -  | -  | 695    | 863   | 216 |
|      | 2009 | 1,549  | -  | -  | 562    | 790   | 197 |
|      | 2010 | 1,625  | -  | -  | 847    | 627   | 156 |
|      | 2011 | 2,761  | -  | -  | 1,209  | 1,242 | 309 |
|      | 2012 | 1,571  | -  | -  | 683    | 710   | 178 |
|      | 2013 | 2,021  | -  | -  | 829    | 950   | 243 |
|      | 2014 | 1,730  | -  | -  | 839    | 713   | 178 |
|      | 2015 | 2,880  | -  | -  | 1,890  | 792   | 199 |
|      | 2016 | 1,306  | -  | -  | 418    | 711   | 178 |
|      | 2017 | 2,023  | -  | -  | 838    | 949   | 237 |
|      | 2018 | 1,728  | -  | -  | 839    | 711   | 178 |

|      |      |       |     |    |     |       |     |
|------|------|-------|-----|----|-----|-------|-----|
|      | 2019 | 1,924 | -   | -  | 837 | 870   | 217 |
|      | 2020 | 1,522 | -   | -  | 38  | 1,187 | 297 |
|      | 2021 | 2,268 | -   | -  | 789 | 1,183 | 296 |
| MBFX | 2010 | 57    | 41  | -  | 16  | -     | -   |
|      | 2011 | 115   | 80  | -  | 35  | -     | -   |
|      | 2012 | 173   | 110 | -  | 64  | -     | -   |
|      | 2013 | 227   | 143 | -  | 84  | -     | -   |
|      | 2014 | 291   | 186 | -  | 105 | -     | -   |
|      | 2015 | 348   | 241 | -  | 107 | -     | -   |
|      | 2016 | 367   | 257 | -  | 111 | -     | -   |
|      | 2017 | 420   | 302 | -  | 119 | -     | -   |
|      | 2018 | 489   | 345 | -  | 144 | -     | -   |
|      | 2019 | 579   | 409 | -  | 170 | -     | -   |
|      | 2020 | 628   | 438 | 25 | 165 | -     | -   |
|      | 2021 | 620   | 435 | 25 | 161 | -     | -   |

表 8 フルオロキノロン系抗菌性物質の製剤販売量（単位：L 又は kg）

| 種類   | 年次   | 合計     | 経口剤    |       |        |        | 注射剤    |       |       |
|------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|      |      |        | 合計     | 牛     | 豚      | 鶏      | 合計     | 牛     | 豚     |
| ERFX | 2001 | 24,936 | 15,939 | 1,442 | -      | 14,497 | 8,997  | 4,507 | 4,490 |
|      | 2002 | 27,424 | 18,234 | 1,454 | -      | 16,780 | 9,190  | 4,753 | 4,437 |
|      | 2003 | 32,658 | 21,857 | 1,954 | -      | 19,903 | 10,801 | 5,827 | 4,974 |
|      | 2004 | 24,892 | 15,431 | 1,272 | -      | 14,159 | 9,461  | 4,723 | 4,738 |
|      | 2005 | 24,698 | 14,397 | 1,256 | -      | 13,141 | 10,301 | 5,719 | 4,582 |
|      | 2006 | 21,791 | 11,775 | 1,126 | -      | 10,649 | 10,016 | 5,025 | 4,981 |
|      | 2007 | 23,837 | 13,496 | 1,118 | -      | 12,378 | 10,341 | 5,141 | 5,200 |
|      | 2008 | 24,527 | 14,307 | 1,048 | -      | 13,259 | 10,220 | 5,227 | 4,994 |
|      | 2009 | 22,390 | 12,173 | 1,002 | -      | 11,171 | 10,217 | 5,281 | 4,936 |
|      | 2010 | 23,912 | 14,340 | 1,114 | -      | 13,226 | 9,572  | 5,112 | 4,460 |
|      | 2011 | 23,281 | 13,693 | 968   | -      | 12,725 | 9,588  | 4,998 | 4,590 |
|      | 2012 | 20,022 | 10,106 | 1,101 | -      | 9,005  | 9,916  | 5,497 | 4,419 |
| OFLX | 2001 | 21,960 | 21,960 | -     | -      | 21,960 | -      | -     | -     |
|      | 2002 | 15,020 | 15,020 | -     | -      | 15,020 | -      | -     | -     |
|      | 2003 | 17,695 | 17,695 | -     | -      | 17,695 | -      | -     | -     |
| OBFX | 2001 | 9,890  | -      | -     | -      | -      | 9,890  | 3,920 | 5,970 |
|      | 2002 | 10,140 | -      | -     | -      | -      | 10,140 | 2,040 | 8,100 |
|      | 2003 | 10,004 | -      | -     | -      | -      | 10,004 | 1,887 | 8,117 |
| DFLX | 2001 | 4      | 4      | -     | 4*     | -      | -      | -     | -     |
|      | 2002 | (報告なし) | (報告なし) | -     | (報告なし) | -      | -      | -     | -     |
|      | 2003 | 652    | 652    | -     | 652*   | -      | -      | -     | -     |
| DNFX | 2001 | 4,048  | 48     | -     | -      | 48*    | 4,000  | 1,204 | 2,797 |
|      | 2002 | 4,200  | -      | -     | -      | -      | 4,200  | 1,260 | 2,940 |
|      | 2003 | 3,200  | -      | -     | -      | -      | 3,200  | 960   | 2,240 |

|              |      |         |        |        |         |        |        |       |        |
|--------------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|
| NFLX         | 2001 | 47,861  | 47,861 | -      | 35,052* | 12,810 | -      | -     | -      |
|              | 2002 | 54,840  | 54,840 | -      | 45,700* | 9,140  | -      | -     | -      |
|              | 2003 | 29,796  | 29,796 | -      | 20,929* | 8,867  | -      | -     | -      |
| MBFX         | 2011 | 2,320   | -      | -      | -       | -      | 2,320  | 916   | 1,404  |
|              | 2012 | 4,042   | -      | -      | -       | -      | 4,042  | 1,327 | 2,715  |
|              | 2013 | 5,310   | -      | -      | -       | -      | 5,310  | 1,734 | 3,576  |
|              | 2014 | 6,712   | -      | -      | -       | -      | 6,712  | 2,243 | 4,469  |
|              | 2015 | 7,106   | -      | -      | -       | -      | 7,106  | 2,781 | 4,325  |
|              | 2016 | 7,360   | -      | -      | -       | -      | 7,360  | 2,937 | 4,423  |
|              | 2017 | 8,026   | -      | -      | -       | -      | 8,026  | 3,401 | 4,626  |
|              | 2018 | 9,626   | -      | -      | -       | -      | 9,626  | 3,926 | 5,700  |
|              | 2019 | 11,376  | -      | -      | -       | -      | 11,376 | 4,653 | 6,723  |
|              | 2020 | 11,369  | -      | -      | -       | -      | 11,369 | 5,140 | 6,228  |
|              | 2021 | 11,125  | -      | -      | -       | -      | 11,125 | 5,086 | 6,039  |
| 合計           | 2001 | 108,729 | 85,812 | 1,442  | 35,056  | 49,315 | 22,917 | 9,699 | 13,219 |
|              | 2002 | 97,179  | 77,033 | 15,090 | 45,700  | 16,243 | 20,146 | 6,550 | 13,596 |
|              | 2003 | 100,283 | 75,709 | 7,663  | 21,581  | 46,465 | 24,574 | 9,295 | 15,280 |
| 全体に占める割合 (%) | 2003 | 100.0   | 75.5   | 7.6    | 21.5    | 46.3   | 24.5   | 9.3   | 15.2   |

\*：の製剤データの単位は kg

## (2) フルオロキノロン系抗菌性物質に関する規制等

フルオロキノロン系抗菌性物質を含有する動物用医薬品は次のような適正使用のための規制措置が講じられており、今後承認される製剤についても同様に取り扱われることとなる。

### ① 従来からの規制等

フルオロキノロン系抗菌性物質製剤を始めとする抗菌性物質を含有する動物用医薬品は、医薬品医療機器等法に基づき要指示医薬品に指定されているため、獣医師等の処方せん又は指示を受けた者以外には販売してはならないとされている。また、獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）により獣医師が要指示医薬品を投与したり、指示書を発行したりする際には自ら診察を行わなければならないとされており、それらの動物用医薬品の使用には必ず専門家としての獣医師の関与が義務付けられている。

さらに、フルオロキノロン系抗菌性物質は、人用医薬品としてもその重要性が高いことから、動物用医薬品としての承認は、薬剤耐性菌の発現や選択等を防止する観点から、用法・用量において投与期間を最長で 5 日以内に限定するとともに、医薬品医療機器等法に基づく使用上の注意事項として、用法・用量を厳守すること、第二次選択薬として使用すること、感受性を確認した上で適応症の治療に必要な最小限の期間の投与とすること等が規定されている。

フルオロキノロン系抗菌性物質について、共通して設定されている使用上の注意事項は以下のとおりである。（参照 2）

a. 本剤は要指示医薬品であるので、獣医師等の処方せん・指示により使用するこ

と。

- b. 本剤は第一選択薬が無効の症例のみに限り使用すること。
- c. 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- d. 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避けること。
- e. 本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
- f. 本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

## ② 第1版の評価を踏まえた規制等

第1版（2010年3月）の評価を踏まえ、以下のようなリスク管理措置が実施された。（参照 130）

- a. 承認された適応症の治療に限定した使用や第一次選択薬が無効な症例に限定した使用が行われるように添付文書（使用上の注意）の表記を統一。
- b. 従来の JVARM による農場における調査に加えて、と畜場及び食鳥処理場におけるモニタリングを開始。

さらに、生産現場における動物用抗菌性物質製剤の使用実態等を踏まえて以下の措置が講じられた。（参照 131、132）

- c. 直接の容器等に記載を追加し、第一次選択薬が無効な症例にのみ第二次選択薬として使用することを徹底。
- d. 用法及び用量の欄に記載を追加し、投与後一定期間内（3日程度）に効果判定を実施し、効果がみられない場合には獣医師の判断によって薬剤を変更することを徹底。
- e. 製造販売業者が実施するフルオロキノロン剤の適応菌及び公衆衛生上重要な菌種のモニタリングを充実。

また、生産者及び獣医師等によるフルオロキノロン系抗菌性物質製剤を含む動物用抗菌性物質製剤の慎重使用の徹底に関して、農林水産省は2013年に「畜産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方」を通知している。（参照 133）

## ③ 第2版、第3版及び第4版の評価を踏まえた規制等

2（2）②の管理措置を維持している。

## 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の海外における評価状況等

### （1）国際機関

#### ① WHO

WHOの「人医療において重要な抗菌性物質のリスト」は、MBFXやERFX等のキノロン（フルオロキノロン及びその他のキノロンを含む。以下、同じ。）の重要性を「Highest priority critically important antimicrobials」としており、その概要は以下のとおりである。（参照 171）

キノロンは、動物におけるキノロン耐性のサルモネラ属菌や大腸菌を選択するこ

とで知られている。他方、重大なサルモネラ属菌や大腸菌による感染症の数少ない治療薬の一つでもある。人においてサルモネラ属菌や大腸菌による感染症の高い発生率からすれば、重篤な症例の絶対数は相当であると推定している。

## （２）米国食品医薬品庁（FDA）における評価事例

FDA では、家禽に使用する ERFX が薬剤耐性菌の観点から評価されており、以下のような理由から、2005 年、家禽に使用する ERFX の飲水添加剤の承認が取り消されている。（参照 5）

- ①カンピロバクターは食品が媒介する胃腸炎の重要な原因菌である。
- ②人の胃腸炎の経験的治療に対し、フルオロキノロン系抗菌性物質が推奨されている。
- ③カンピロバクターは家禽等の腸管内に存在し、ERFX を家禽に投与するとフルオロキノロン耐性カンピロバクターの選択が起こる。
- ④フルオロキノロン耐性カンピロバクターが家禽由来の食肉に存在する場合がある。
- ⑤家禽に対する ERFX の使用が米国で承認されて以来、フルオロキノロン耐性カンピロバクターによる感染症が増加している。
- ⑥カンピロバクター感染症に対するフルオロキノロン系抗菌性物質による治療が失敗したり、カンピロバクターにおけるフルオロキノロン耐性率が増加した場合、罹患期間の長期化や合併症のリスクが増加したりする可能性がある。

また、人医療における抗菌性物質の重要度ランク付けにおいて、食中毒の原因となる腸管病原菌の治療薬、人医療で重要な感染症（多剤耐性グラム陰性菌による感染症）の唯一若しくは限定的又は必須の治療薬及び食品を媒介しない腸管病原菌による感染症の治療薬等であるとして、その重要度を３段階評価の１番上である「Critically important」としている。（参照 172）

## （３）欧州医薬品庁（EMA）における評価事例

EMA では、2006 年に家畜に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の使用が、薬剤耐性の発生並びに人及び動物の健康に与える影響について、以下のように結論付けられているとともに、今後における活動が提案されている。（参照 6）

- ①動物に対する（フルオロ）キノロン系抗菌性物質の使用は、動物の病原体及び食品由来人獣共通病原体の薬剤耐性を選択し、動物及び人におけるこれらの細菌による感染症の治療に悪影響を及ぼす可能性がある。
- ②フルオロキノロン系抗菌性物質は、人の重篤な侵襲性の感染症治療において非常に重要な抗菌剤であると考えられている。また、これらの主に院内の感染症は動物に関連しない病原体に主に起因している。人の医療における薬剤耐性問題のほとんどは人に対する抗菌剤使用に関連があると考えられる。
- ③サルモネラやカンピロバクターによる単純性急性胃腸炎に対する抗菌剤治療は推奨されておらず、国によっては禁忌とさえされている。合併症のある場合や患者が危険な状態にある場合におけるサルモネラ感染症の治療に対しては、フルオロキノロン系抗菌性物質が重要である。（フルオロ）キノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性は治療の選択肢に影響するが、セファロスポリン系等の抗菌性物質が代替の抗菌剤として存在する。合併症がある場合や患者が危険な状態にある場合のカンピロバク

ター感染症の治療には、マクロライド系抗菌性物質（エリスロマイシン、アジスロマイシン）が選択薬として考えられる。

- ④ナリジクス酸（NA）耐性 *Salmonella* Typhimurium による感染症は、入院や死亡率のリスクを増加させることが報告されている。また、フルオロキノロン系及びマクロライド系抗菌性物質に耐性のカンピロバクターによる感染症は入院や合併症のリスクを増加させることが報告されている。
- ⑤フルオロキノロン系抗菌性物質は動物においても重要で、価値の高い抗菌剤であり、動物のいくつかの重篤な適応症に対しては、唯一の有効な薬剤である。動物の疾病に対する（フルオロ）キノロン系抗菌性物質の治療効果が減弱又は喪失した場合、いくつかの疾病の治療は困難になり、動物の福祉や公衆衛生に影響し、経済的損失を与える可能性がある。
- ⑥最近においても、食用動物へのフルオロキノロンの使用条件に関して、EU 諸国で一致した方向性がなかった。国際機関（例えば、WHO、OIE 等）及び規制当局は、人及び動物の病原体における薬剤耐性の出現について懸念している。薬剤耐性菌は動物、畜産物及び人の国際的な動きを介して広がりうるため、薬剤耐性問題は国際的に取り組むべき課題である。
- ⑦サルモネラにおけるフルオロキノロン耐性をモニタリングする場合は、染色体性突然変異によるフルオロキノロン低感受性菌を検出する指標としては、NA を使用するべきである。また、腸内細菌目細菌（Enterobacterales）においてプラスミドを介したキノロン耐性の出現が最近知られてきたため、獲得したキノロン耐性を最適に検出するために、NA に加えてシプロフロキサシン（CPFX）のようなフルオロキノロンの疫学的なカットオフ値を使用するべきである。
- ⑧カンピロバクターにおけるフルオロキノロン耐性をモニタリングする場合には、NA 又はフルオロキノロン系のいずれかを使用することができる。
- ⑨抗菌剤の使用及び薬剤耐性の出現に関する利用可能なデータが増えてきているが、依然として、それらのデータを比較し、因果関係等について解釈できるようにデータのハーモナイズを進める必要がある。
- ⑩人及び動物に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の使用に関しては、リスク管理の介入が必要である。
- ⑪今後における活動の提案
  - ・ 薬剤耐性を極力選択させない抗菌薬の適正使用方法等の対策について獣医師を啓発するべきである。
  - ・ 病原菌及び指標菌における（フルオロ）キノロン耐性の出現の動向を各国において把握する必要がある。リスク管理の必要性が継続的に評価されるべきである。
  - ・ リスク管理の効果ををはかるため、（フルオロ）キノロン系抗菌性物質の使用状況（量）は動物種ごとに各国で調査されるべきである。
  - ・ 全ての加盟国は、抗菌剤の合理的で慎重な使用について国際的に認められている実施規範（CODEX 実施規範(CAC/RCP61-2005)；OIE 陸生動物衛生規約）を適用し実施するべきである。

また、EMA は人の医療における抗菌性物質の重要度ランク付けにおいて、キノロンは4段階中2番目にリスクが高い「カテゴリーB」としている。キノロン

は、多剤耐性腸内細菌目細菌や多剤耐性結核菌による感染症等の治療薬として使用され、人医療において必須の系統であるとしている。他方、動物においては、アミノグリコシドやテトラサイクリン等に耐性を持つ大腸菌による感染症や、魚類における特定の感染症の治療において代替薬がほとんどないことから動物用医薬品として使用されるとしている。(参照 173)

### Ⅲ. ハザードの特定に関する知見

評価指針の第2章第1 ハザードの特定に基づき、フルオロキノロン系抗菌性物質に関する情報から、当該物質を牛及び豚に使用した結果として出現し、食品を介して人に対して健康上の危害を与える可能性のあるハザード（薬剤耐性菌）を特定する。なお、薬剤耐性決定因子によって薬剤耐性形質を獲得した薬剤耐性菌については、当該因子についても考慮する。

#### 1. 対象家畜等におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の生体内薬物動態

##### (1) 吸収・分布

フルオロキノロン系抗菌性物質を牛及び豚に投与した場合の血漿中薬物動態パラメーターは、薬剤や供試動物の種類、投与経路、投与量等により異なるが、 $T_{max}$ はおおむね1時間、 $C_{max}$ はおおむね0.4～5.0 $\mu\text{g/mL}$ であった。MBFXの泌乳牛の投与では、 $T_{max}$ は0.73時間、 $C_{max}$ は8.20～32.48 $\mu\text{g/mL}$ であった（表9）。（参照8、103、170）

また、MBFX 8.0 mg/kg を肥育豚に筋肉注射した場合、 $T_{max}$ は0.95時間、 $C_{max}$ は6.3 $\mu\text{g/mL}$ であった。同様にMBFX 8.0 mg/kg を仔豚に筋肉注射した場合、 $T_{max}$ は0.93時間、 $C_{max}$ は5.6 $\mu\text{g/mL}$ であった（表9）。（参照229）

表9 フルオロキノロン系抗菌性物質投与による血漿中濃度

| 薬剤名  | 畜種        | 投与量<br>(mg/kg) | 投与経路 | $T_{max}$<br>(時間) | $C_{max}$<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | $T_{1/2}$<br>(時間) |
|------|-----------|----------------|------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ERFX | 牛         | 2.5            | 皮下注射 | 1.7               | 1.1                               | 5.4               |
|      | 牛         | 7.5            | 皮下注射 | 6.67              | 4.97                              | 9.5               |
|      | 牛         | 2.5            | 経口   | 1.0               | 1.5                               | —                 |
| OBFX | 牛         | 5.0            | 筋肉注射 | 1.0               | 2.04                              | —                 |
| DFLX | 豚         | 5.0            | 経口   | 1.9               | 3.5                               | 17.2              |
| DNLX | 牛         | 1.25           | 筋肉注射 | 1.0               | 0.35                              | 3.4               |
| MBFX | 牛（反すう開始前） | 2.0            | 筋肉注射 | 0.71 $\pm$ 0.19   | 1.56 $\pm$ 0.29                   | 9.12 $\pm$ 1.78   |
|      | 牛（反すう期）   | 2.0            | 筋肉注射 | 0.79 $\pm$ 0.26   | 1.47 $\pm$ 0.35                   | 7.73 $\pm$ 1.46   |
|      | 牛（泌乳牛）    | 10.0           | 静脈注射 | —                 | 32.48 $\pm$ 10.49<br>( $C_0$ )    | 13.61 $\pm$ 2.17  |
|      |           |                | 筋肉注射 | 0.73 $\pm$ 0.14   | 8.20 $\pm$ 1.99                   | 11.94 $\pm$ 1.05  |
|      | 肥育豚       | 4.0            | 筋肉注射 | 1.18 $\pm$ 0.46   | 3.379 $\pm$ 0.8659                | 15.36 $\pm$ 5.32  |
|      |           | 8.0            | 筋肉注射 | 0.95 $\pm$ 0.83   | 6.295 $\pm$ 1.805                 | 15.14 $\pm$ 4.16  |
|      |           |                | 静脈注射 | —                 | —                                 | 19.26 $\pm$ 4.53  |
|      |           | 16.0           | 筋肉注射 | 1.06 $\pm$ 0.91   | 15.49 $\pm$ 8.45                  | 15.20 $\pm$ 2.01  |
|      | 仔豚        | 8.0            | 筋肉注射 | 0.93 $\pm$ 0.86   | 5.550 $\pm$ 2.879                 | 13.23 $\pm$ 1.20  |
|      |           |                | 静脈注射 | —                 | —                                 | 13.47 $\pm$ 1.37  |

MBFXを牛に投与した場合の乳汁中薬物動態パラメーターは、投与経路により若干異なるが、 $T_{max}$ はおおむね2～3時間、 $C_{max}$ はおおむね4～5 $\mu\text{g/mL}$ であった（表10）。

(参照 170)

表 10 フルオロキノロン系抗菌性物質投与による乳汁中濃度

| 薬剤名  | 畜種      | 投与量<br>(mg/kg) | 投与経路 | T <sub>max</sub><br>(時間) | C <sub>max</sub><br>(μg/mL) | AUC<br>(μg・h/mL) |
|------|---------|----------------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| MBFX | 牛 (泌乳牛) | 10.0           | 静脈注射 | 2.20±1.03                | 5.29±1.61                   | 34.87±6.28       |
|      |         |                | 筋肉注射 | 2.80±1.03                | 4.13±0.71                   | 34.45±4.14       |

フルオロキノロン系抗菌性物質を牛及び豚に投与した場合の組織中濃度はおおむね 1 時間、尿中濃度は 4 時間以内にそれぞれ最大値となり、以降、減少した。

MBFX の泌乳牛の投与では、投与後 2 日目には 0.01～0.1 μg 当量/g、8 日目には 0.01～0.03 μg 当量/g であった (表 11)。(参照 8～11、170)

MBFX の豚の投与では、最終投与後 4 時間には 0.48～4.77 μg 当量/g、8 日目には LOD 未満～0.03 μg 当量/g であった (表 11)。(参照 229)

表 11 フルオロキノロン系抗菌性物質投与による組織中濃度

| 薬剤   | 畜種、投与方法等              | 組織中濃度 (単位: μg/mL、μg/g)                                                                                                                                                          |      |      |       |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| ERFX | 牛、2.5 mg/kg、筋肉注射      |                                                                                                                                                                                 | 1 時間 | 4 時間 | 12 時間 |
|      |                       | 血清                                                                                                                                                                              | 0.9  | 0.7  | 0.08  |
|      |                       | 胆汁                                                                                                                                                                              | 15.9 | 6.9  | 2.4   |
|      |                       | 尿                                                                                                                                                                               | 7.1  | 40.6 | 8.8   |
|      |                       | 肺                                                                                                                                                                               | 1.4  | 0.9  | 0.1   |
|      |                       | 腎臓                                                                                                                                                                              | 3.2  | 2.4  | 0.4   |
|      |                       | 肝臓                                                                                                                                                                              | 3.4  | 3.1  | 0.4   |
|      |                       | 腸管リンパ節                                                                                                                                                                          | 1.0  | 0.7  | 0.1   |
|      |                       | 腸管壁                                                                                                                                                                             | 1.1  | 0.8  | 0.1   |
| OBFX | 牛、5 mg/kg、筋肉内投与 1 時間後 | 腎臓: 9.11～10.6 μg/g、肝臓: 2.96～3.16 μg/g、肺: 1.62～1.77 μg/g、気管: 0.971～1.27 μg/g、鼻粘膜: 1.32～1.40 μg/g、筋肉: 1.67～1.86 μg/g、小腸: 1.28～1.57 μg/g、小腸内容物: 2.69～3.50 μg/g、胆汁: 2.95～3.19 μg/mL |      |      |       |
|      | 豚、5 mg/kg、筋肉内投与       |                                                                                                                                                                                 | 1 時間 | 3 時間 | 6 時間  |
|      |                       | 腎臓                                                                                                                                                                              | 12.4 | 10.7 | 9.23  |
|      |                       | 小腸内容物                                                                                                                                                                           | 8.53 | 8.95 | 6.27  |
|      |                       | 肝臓                                                                                                                                                                              | 5.04 | 5.08 | 3.27  |
|      |                       | 肺                                                                                                                                                                               | 2.67 | 2.81 | 2.08  |
|      |                       | 気管                                                                                                                                                                              | 1.47 | 2.57 | 2.16  |
|      |                       | 鼻粘膜                                                                                                                                                                             | 1.94 | 2.22 | 1.58  |
|      |                       | 小腸                                                                                                                                                                              | 2.16 | 2.20 | 1.72  |
|      |                       | 胆汁                                                                                                                                                                              | 3.62 | 10.8 | 4.98  |
|      | 豚、10 mg/kg、経口投与 2 時間後 | 胆汁: 50.7 μg/g、胃: 17.0 μg/g、肝臓: 15.3 μg/g、小腸: 11.3 μg/g、腎臓: 10.8 μg/g、脾臓: 10.8 μg/g                                                                                              |      |      |       |
|      | 豚、10 mg/kg、経口投与 1 時間後 | 小腸: 28.39 μg/mL、腎臓: 6.95 μg/mL、肝臓: 6.59 μg/mL、心臓: 2.17 μg/mL、肺: 1.98 μg/mL                                                                                                      |      |      |       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| MBFX                             | 牛 (反すう開始前)、<br>2 mg/kg/日、静脈内<br>投与 (3 日間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td></td><td>4 時間</td><td>26 時間</td><td>50 時間</td></tr><tr><td>肝臓</td><td>2.72</td><td>0.49</td><td>0.28</td></tr><tr><td>腎臓</td><td>5.32</td><td>1.19</td><td>0.53</td></tr><tr><td>肺</td><td>2.26</td><td>0.41</td><td>0.21</td></tr><tr><td>筋肉</td><td>2.66</td><td>0.41</td><td>0.23</td></tr><tr><td>腎脂肪</td><td>1.21</td><td>0.15</td><td>—</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |  |                | 4 時間           | 26 時間 | 50 時間 | 肝臓      | 2.72 | 0.49 | 0.28 | 腎臓  | 5.32 | 1.19 | 0.53 | 肺    | 2.26 | 0.41 | 0.21 | 筋肉   | 2.66 | 0.41 | 0.23 | 腎脂肪  | 1.21 | 0.15 | —    |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 時間 | 50 時間 |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 肝臓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.49  | 0.28  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 腎臓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.19  | 0.53  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 肺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.41  | 0.21  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 筋肉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.41  | 0.23  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 腎脂肪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.15  | —     |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 牛 (反すう開始前)、<br>2 mg/kg/日、筋肉内<br>投与 2 時間後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 肝臓 : 2.79 μg/g、腎臓 : 5.99 μg/g、肺 : 1.77 μg/g、筋肉 : 1.78 μg/g、最終<br>投与部位筋肉 : 93.99 μg/g、脂肪 : 1.59 μg/g、胆汁 : 2.52 μg/g、心臓 : 2.14<br>μg/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  | 牛 (泌乳牛)、2<br>mg/kg/日、皮下投与<br>(5 日間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td></td><td colspan="3">組織濃度 (μg 当量/g)</td></tr><tr><td>最終投与後日数</td><td>2 日</td><td>4 日</td><td>8 日</td></tr><tr><td>筋肉</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>—</td></tr><tr><td>腎脂肪</td><td>0.02</td><td>—</td><td>0.01</td></tr><tr><td>大網脂肪</td><td>0.03</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr><tr><td>肝臓</td><td>0.10</td><td>0.03</td><td>0.03</td></tr><tr><td>腎臓</td><td>0.04</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr><tr><td>肺</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr><tr><td>胆汁</td><td>0.04</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>血漿</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> |       |       |  |                | 組織濃度 (μg 当量/g) |       |       | 最終投与後日数 | 2 日  | 4 日  | 8 日  | 筋肉  | 0.01 | 0.01 | —    | 腎脂肪  | 0.02 | —    | 0.01 | 大網脂肪 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 肝臓   | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 腎臓 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 肺    | 0.03   | 0.01 | 0.01 | 胆汁   | 0.04 | —   | —    | 血漿   | —    | —    | —    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 組織濃度 (μg 当量/g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 最終投与後日数                          | 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 日   |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 筋肉                               | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —     |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 腎脂肪                              | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.01  |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 大網脂肪                             | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 肝臓                               | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.03  |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 腎臓                               | 0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 肺                                | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 胆汁                               | 0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —     |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 血漿                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —     |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 豚、2 mg/kg/日、<br>筋肉内投与 (5 日<br>間) | <table><tr><td></td><td colspan="4">組織濃度 (μg 当量/g)</td></tr><tr><td>最終投与後日数</td><td>4 時間</td><td>2 日</td><td>4 日</td><td>8 日</td></tr><tr><td>肝臓</td><td>1.27</td><td>0.09</td><td>0.05</td><td>0.03</td></tr><tr><td>腎臓</td><td>2.55</td><td>0.07</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr><tr><td>肺</td><td>1.20</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>&lt;LOD</td></tr><tr><td>筋肉</td><td>1.12</td><td>0.13</td><td>&lt;LOD</td><td>&lt;LOD</td></tr><tr><td>注射部位筋肉</td><td>1.04</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr><tr><td>腎脂肪</td><td>0.73</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>&lt;LOD</td></tr><tr><td>大網脂肪</td><td>0.48</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr><tr><td>皮膚</td><td>0.65</td><td>0.09</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr><tr><td>胆汁</td><td>4.77</td><td>0.10</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr><tr><td>全血</td><td>0.69</td><td>0.01</td><td>&lt;LOD</td><td>&lt;LOD</td></tr><tr><td>血漿</td><td>0.67</td><td>0.01</td><td>&lt;LOD</td><td>&lt;LOD</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |  | 組織濃度 (μg 当量/g) |                |       |       | 最終投与後日数 | 4 時間 | 2 日  | 4 日  | 8 日 | 肝臓   | 1.27 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 腎臓   | 2.55 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 肺    | 1.20 | 0.03 | 0.01 | <LOD | 筋肉 | 1.12 | 0.13 | <LOD | <LOD | 注射部位筋肉 | 1.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 腎脂肪 | 0.73 | 0.02 | 0.01 | <LOD | 大網脂肪 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 皮膚 | 0.65 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 胆汁 | 4.77 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 全血 | 0.69 | 0.01 | <LOD | <LOD | 血漿 | 0.67 | 0.01 | <LOD | <LOD |
|                                  | 組織濃度 (μg 当量/g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 最終投与後日数                          | 4 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 日   | 8 日   |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 肝臓                               | 1.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.05  | 0.03  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 腎臓                               | 2.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.02  | 0.01  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 肺                                | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  | <LOD  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 筋肉                               | 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <LOD  | <LOD  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 注射部位筋肉                           | 1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  | 0.01  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 腎脂肪                              | 0.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  | <LOD  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 大網脂肪                             | 0.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  | 0.01  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 皮膚                               | 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.01  | 0.01  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 胆汁                               | 4.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.02  | 0.01  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 全血                               | 0.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <LOD  | <LOD  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
| 血漿                               | 0.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <LOD  | <LOD  |  |                |                |       |       |         |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |

## (2) 代謝・排泄

フルオロキノロン系抗菌性物質を各種動物に投与した場合、薬剤や供試動物の種類、投与経路等によりその代謝物は異なるが、総じて、主に未変化体、その他グルクロン酸抱合体等が糞尿中に排出された（表 12）。（参照 8~14、229）

表 12 フルオロキノロン系抗菌性物質における代謝・排泄

| 薬剤   | 畜種、投与方法等                                                   | 代謝・排泄                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERFX | ラット、5 mg/kg、経口投与                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>血中濃度は投与後 1 時間以内に最高値 570 µg/mL に達し、生物学的利用率は 75.3%、半減期は 11.7 時間であった。</li> <li>投与 24 時間後までに胆汁中に 39.5% が排泄され、残りは尿中に排泄された。</li> <li>尿中からは未変化体及びそのグルクロン酸抱合体として約 60%、その他の代謝物として脱エチル体が 20~30% が回収された。</li> </ul>                                                                  |
| OBFX | 牛、詳細不明                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>尿中代謝物は OBFX のグルクロン酸抱合体及び 7 位ジメチルピペラジニル基の 4-ヒドロキシ体（N-ヒドロキシ体）が同定され、それぞれ約 1% 及び約 5% 認められた。</li> <li>筋肉内投与による尿中排泄率は投与 72 時間後で投与量の 37.3% で、糞中排泄率は 5.46% であった。</li> </ul>                                                                                                       |
|      | 豚、 <sup>[14C]</sup> -OBFX を使用                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>尿中代謝物は OBFX のグルクロン酸抱合体で、約 7% 認められた。</li> <li>筋肉内投与した時の尿中排泄率は投与 72 時間後では投与量の 71.1~82.5% で、糞中排泄率は 9.12~8.3% であった。</li> </ul>                                                                                                                                                |
| DFLX | イヌ、10 mg/kg、強制経口投与、 <sup>[14C]</sup> -DFLX を使用             | <ul style="list-style-type: none"> <li>糞尿における未変化体と各代謝物を調査した結果、糞尿の合計では、未変化体が 64.5% で最も多く、グルクロン酸抱合体 12.4%、N-デスメチルジフロキサシン 11.6% の順に多かった。</li> <li>※N-デスメチルジフロキサシン（サラフロキサシン）の抗菌活性は、ほとんどの菌種に対して、DFLX よりも低いとの報告がある。</li> </ul>                                                                                         |
|      | 豚、10 mg/kg、経口投与                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与後 120 時間までに糞中にその 61.3% が排泄された。尿中への排泄は少なく、投与後 120 時間で全体の 12.5% であった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| NFLX | ラット及びマウス、50mg/kg、経口投与                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与後 96 時間の尿中回収率は、マウス、ラットでそれぞれ 6.1%、8.4% で、糞中回収率はそれぞれ 91.4%、85.4% であった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|      | 豚、10 mg/kg、強制経口投与                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与 1、2、4 時間後の各組織における NFLX 未変化体及び代謝物の濃度を測定した結果、代謝物として、3-オキシ体、エチレンジアミン体、アセチルエチレンジアミン体、アセチル体、ホルミル体及びアミノ体が検出された。</li> <li>小腸内容物及び小腸については、投与 1 時間後の濃度がそれぞれ 202.69 µg/g、28.39 µg/g と、他の臓器と比較して高い値を示したが、投与 4 時間後の濃度はそれぞれ 11.7 µg/g、1.73 µg/g と急速に消失し、蓄積する傾向は認められなかった。</li> </ul> |
| MBFX | 搾乳牛、2 mg/kg、皮下投与（1 日 1 回、5 日間）、 <sup>[14C]</sup> -MBFX を使用 | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与量を 100 % とすると、代謝及び排泄は以下のように推定された。</li> <li>尿：41~47%（MBFX：40~46%、MBFX N-オキシド：≤0.5%、MBFX 抱合体：≤0.4%）</li> <li>糞：43~51%（MBFX：42~51%）</li> <li>乳汁：0.1%（MBFX：0.1%、MBFX N-オキシド：0.001%、デメチル MBFX：0.01%）</li> </ul>                                                              |
|      | 牛（反すう開始前）、皮下投与、 <sup>[14C]</sup> -MBFX を使用                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与量を 100% とすると、代謝及び排泄は以下のように推定された。</li> <li>尿：72~81%（MBFX：65~78%、MBFX N-オキシド：2.0%、MBFX 抱合体：2.0%）</li> <li>糞：5~13%（MBFX：4~12%、その他：≤0.3%、極性物質：≤0.5%）</li> </ul>                                                                                                             |

|  |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 豚、2 mg/kg/日 (5日間)、筋肉内投与、 <sup>[14C]</sup> -MBFX を使用。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・投与量を 100% とすると、代謝及び排泄は以下のように推定された。</li> <li>尿：51～60% (MBFX：42～53%、MBFX N-オキシド：1～3%、極性物質：3～6%)</li> <li>糞：27～29% (MBFX：25～28%、MBFX N-オキシド：≤1%)</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (3) 残留

フルオロキノロン系抗菌性物質を牛及び豚に投与した際の各組織の残留濃度は、薬剤や供試動物の種類、投与経路、投与量等により異なるが、おおむね 3～22 日で検出限界未満となった。泌乳牛の MBFX 投与では、投与後 4 日目までには合乳において定量限界未満となった。また、投与後 4 日目までには 1 例の腎を除き各臓器において定量限界未満であった (表 13、表 14)。(参照 8～10、13、15～19、103、170)

豚の MBFX 投与では、投与後 5 日には、筋肉、皮膚、小腸及び注射部位筋肉、投与後 7 日には肝臓において、LOQ 未満 (<0.005 µg/g) となる個体も認められ、投与後 12 日にはこれらの臓器について全ての個体で LOQ 未満となった。腎臓については、投与後 12 日では 4 例中 2 例が LOQ 未満となった。(表 14)。(参照 229)

表 13 フルオロキノロン系抗菌性物質の残留

| 薬剤   | 畜種、投与方法等                     | 残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERFX | 牛、5 及び 10 mg/kg、皮下投与 (5日間)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・5 mg/kg 投与群において、投与 7 日後には最終投与部位を除く分析対象で、14 日後には全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。10 mg/kg 投与群では、投与 7 日後には全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> <li>・小腸：投与 1 日後において、5 mg/kg 投与群の ERFX は&lt;0.01～0.21 µg/g、CPFX は&lt;0.01～0.18 µg/g であり、10 mg/kg 投与群の ERFX は 0.04～0.24 µg/g、CPFX は 0.05～0.30 µg/g であったが、いずれも投与 7 日後には検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul> |
| ERFX | 泌乳牛、5 及び 10 mg/kg、皮下投与 (5日間) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳汁中の ERFX は、5 mg/kg 投与群では投与 36 時間後に、10 mg/kg 投与群では投与 72 時間後には検出限界未満となった。</li> <li>・乳汁中の CPFX は、5 mg/kg 投与群では投与 72 時間後に、10 mg/kg 投与群では投与 108 時間後には検出限界未満となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| ERFX | 牛、7.5 及び 15 mg/kg、皮下投与 (単回)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・7.5 mg/kg 及び 15 mg/kg 投与群において、投与 7 日後には肝臓及び注射部位直下筋肉を除き検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。投与 10 日後以降は、全分析対象において検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> <li>・小腸：投与 1 日後において、7.5 mg/kg 投与群の ERFX は 0.19～0.58 µg/g、CPFX は 0.15～0.20 µg/g で、15 mg/kg 投与群の ERFX は 1.1～2.9 µg/g、CPFX は 0.46～0.75 µg/g であったが、いずれも投与 7 日後には検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul>                 |
| ERFX | 豚、5 及び 10 mg/kg、筋肉内投与 (5日間)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・5 及び 10 mg/kg 投与群において、投与 7 日後には肝臓を除く分析対象で、投与 14 日後には全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> <li>・小腸：投与 1 日後において、5 mg/kg 投与群の ERFX は 0.02～0.24 µg/g、CPFX は&lt;0.01～0.03 µg/g、10 mg/kg 投与群の ERFX は 0.07～0.31 µg/g、CPFX は 0.04～0.06 µg/g であったが、いずれも投与 7 日後には検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul>                                                             |
| ERFX | 牛、5 及び 10 mg/kg、経口投与 (5日間)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・5 mg/kg 投与群において、投与 7 日後には肝臓を除く分析対象で 0.04 µg/g 以下となった。5 及び 10 mg/kg 投与群において、投与 21 日後には全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>小腸：投与 6 時間後において、5 mg/kg 投与群の ERFX は 0.74～1.3 µg/g、CPFX は 0.39～0.59 µg/g で、10 mg/kg 投与群の ERFX は 3.03 µg/g、CPFX は 1.28 µg/g であった。投与 7 日後では、5 mg/kg 投与群の ERFX 及び CPFX は &lt;0.01～0.04 µg/g で、10 mg/kg 投与群の ERFX は 0.02 µg/g、CPFX は &lt;0.01～0.01 µg/g となった。5 及び 10 mg/kg 投与群ともに、ERFX は投与 21 日後に、CPFX は投与 14 日後には検出限界未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul> |
| ERFX | 豚、7.5 mg/kg、筋肉内投与 | <ul style="list-style-type: none"> <li>48 時間間隔で 2 回投与した。</li> <li>最終投与 7 日後には、腎臓と注射部位筋肉を除く分析対象組織（筋肉、肝臓、脂肪及び小腸）で定量限界値未満 (&lt;0.01 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

表 14 フルオロキノロン系抗菌性物質の残留

| 薬剤   | 畜種、投与方法等                         | 残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBFX | 牛、5 及び 10 mg/kg、筋肉内投与（5 日間）      | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 及び 10 mg/kg 投与群ともに、最終投与 14 日後には、全ての組織で検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> <li>小腸：投与 1 日後、5 mg/kg 投与群では 0.02～0.03 µg/g、10 mg/kg 投与群では 0.07～0.11 µg/g が検出された。5 mg/kg 投与群では、投与 3 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となり、10 mg/kg 投与群では、投与 7 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> </ul>                                         |
| OBFX | 搾乳牛、5 及び 10 mg/kg、筋肉内投与（5 日間）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>乳汁では、最終投与 54～57 時間後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBFX | 豚、5 及び 10 mg/kg、筋肉内投与（5 日間）      | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 mg/kg 投与群では最終投与 7 日後に、10 mg/kg 投与群では最終投与 10 日後には全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> <li>小腸：投与 1 日後、5 mg/kg 投与群では 0.04～0.21 µg/g、10 mg/kg 投与群では 0.05～0.24 µg/g が検出された。両群ともに、投与 3 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                    |
| OBFX | 豚、5 及び 10 mg/kg、飲水投与（3 日間）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 及び 10 mg/kg 投与群とも最終投与 6 日後に全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> <li>小腸：投与 1 日後、5 mg/kg 投与群では 0.06～0.30 µg/g、10 mg/kg 投与群では 0.17～0.18 µg/g が検出された。両群ともに、投与 6 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                         |
| DFLX | 豚、5 及び 10 mg/kg、飲水投与（3 日間）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>両群とも投与 5 日後に全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> <li>小腸：投与 1 日後、5 mg/kg 投与群では 0.02～0.32 µg/g、10 mg/kg 投与群では 0.03～0.75 µg/g が検出された。両群ともに、投与 5 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/g) となった。</li> <li>代謝物である N-デスメチルジフロキサシンは、投与 3 日後に全分析対象で検出限界未満 (&lt;0.02 µg/mL) となり、小腸においては、投与 1 日後には検出限界未満 (&lt;0.02 µg/mL) となった。</li> </ul> |
| DNFX | 牛、1.25 及び 3.75 mg/kg、筋肉内投与（3 日間） | <ul style="list-style-type: none"> <li>両群とも最終投与 48 時間後に検出限界未満 (&lt;0.05 µg/g) となった。</li> <li>小腸：投与 2 時間後、1.25 mg/kg 投与群では 0.94 µg/g、3.75 mg/kg 投与群では 2.5 µg/g が検出された。両群ともに、投与 48 時間後以降、検出限界未満 (&lt;0.05 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                                              |
| DNFX | 搾乳牛、5 mg/kg、筋肉内投与（3 日間）          | <ul style="list-style-type: none"> <li>乳汁では、最終投与 36 時間後には検出限界未満となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DNFX | 豚、1.25 及び 3.75 mg/kg、筋肉内投与       | <ul style="list-style-type: none"> <li>両群とも最終投与 22 日後までに検出限界未満 (&lt;0.05 µg/g) となった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 与（3日間）                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>小腸：投与2時間後、1.25 mg/kg 投与群では0.76～0.78 µg/g、3.75 mg/kg 投与群では1.9～2.2 µg/g が検出された。1.25 mg/kg 投与群では投与1日後までに、3.75 mg/kg 投与群では投与22日後までには検出限界未満（＜0.05 µg/g）となった。</li> </ul>                                        |
| NFLX | 豚、10 及び 20 mg/kg、混餌投与（5日間） | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 mg/kg 投与群では最終投与3日後までに、20 mg/kg 投与群は最終投与5日後までには検出限界未満（＜0.02 µg/mL、µg/g）となった。</li> </ul>                                                                                                                 |
| MBFX | 豚、2 mg/kg、筋肉内投与（5日間）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>最終投与3日後までには、全分析対象において定量限界未満（＜0.02 µg/g）となった。</li> <li>小腸：最終投与12時間後に0.39～0.44 µg/g、最終投与1日後に0.09～0.20 µg/g が検出され、最終投与3日後には定量限界未満（＜0.02 µg/g）となった。</li> </ul>                                                |
|      | 豚、8 mg/kg、筋肉内投与（単回）        | <ul style="list-style-type: none"> <li>筋肉、肝臓、腎臓、皮膚、小腸、注射部位筋肉のいずれにおいても投与後2日に最高濃度を示し、投与後5日には、筋肉、皮膚、小腸及び注射部位筋肉はLOQ 未満（＜0.005 µg/g）となる個体も認められ、投与後12日には全ての個体においてLOQ 未満となった。肝臓は投与後7日から定量限界未満の個体が認められ、最も長期残留を示した腎臓も投与後12日では4例中2例がLOQ 未満となった。</li> </ul> |
| MBFX | 牛、10 mg/kg、静脈内投与（単回）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与72時間後以降96時間後において、全試料（4頭、各4分房合乳）において定量限界未満（＜0.005 µg/g）となった。</li> </ul>                                                                                                                                  |
|      | 牛、10 mg/kg、静脈内投与（単回）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与96時間後には、全試料（20頭、各搾乳機からの合乳）において定量限界未満（＜0.002 µg/mL）となった。</li> </ul>                                                                                                                                      |
|      | 牛、10 mg/kg、静脈内投与（単回）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>投与4日後には、腎以外の各臓器において定量限界未満（＜0.005 µg/g）となり、投与5日後には1例の腎を除き、全ての試料において定量限界未満となった。</li> <li>小腸：投与1日後に0.037～0.071 µg/g が検出され、投与4日後には定量限界未満（＜0.005 µg/g）となった。</li> </ul>                                         |

## 2. フルオロキノロン系抗菌性物質における抗菌活性の作用機序

フルオロキノロン系抗菌性物質は、DNA の複製に関与する酵素である DNA ジャイレース及びトポイソメラーゼ IV の機能を阻害し、殺菌的に作用すると考えられている。

フルオロキノロン系を含むキノロン系抗菌性物質の標的酵素に対する阻害活性は、大腸菌においては、トポイソメラーゼ IV よりも DNA ジャイレースに対する方が強く、ブドウ球菌においては、DNA ジャイレースよりもトポイソメラーゼ IV に対する方が強く、グラム陰性菌とブドウ球菌におけるキノロン系抗菌性物質の第 1 標的酵素は異なると報告されている。(参照 20)

### (1) 標的酵素である DNA ジャイレースに対する作用機序

DNA ジャイレースは、*gyrA* 遺伝子にコードされているサブユニット A の 2 分子と *gyrB* 遺伝子にコードされているサブユニット B の 2 分子からなる酵素であり、DNA の高次（立体）構造を変化させ、DNA の複製、転写、組換え、修復等の重要な役割を担っている。抗菌活性の作用機序としては、キノロン系抗菌性物質が DNA ジャイレースによって切断された 2 本鎖 DNA の切断面にはまり込み、DNA 鎖の再結合を阻害することによって抗菌力を発揮するというモデルが提唱されている。(参照 20)

### (2) 標的酵素であるトポイソメラーゼIVに対する作用機序

トポイソメラーゼ IV は、ParC（又は GrlA）の 2 分子と ParE（又は GrlB）の 2 分子のサブユニットからなる酵素であり、複製後に絡み合った 2 本鎖 DNA の切断と再結合を行うことにより、分裂後の細胞に DNA を効率よく分配する役割を担っているが、キノロン系抗菌性物質によって阻害されることが明らかになっている。(参照 20)

## 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の抗菌スペクトル及び感受性分布

### (1) 抗菌スペクトル

フルオロキノロン系抗菌性物質は、グラム陽性球菌や陰性菌、さらには結核菌やマイコプラズマ、クラミジア等の病原微生物に対し殺菌的に作用し、その抗菌スペクトルは表 15-1 及び表 15-2 のとおりである。(参照 9~11、21、22、170、174-178)

表 15-1 フルオロキノロン系抗菌性物質の抗菌スペクトル (MIC)

| 種類   | 菌種                                | 菌株名         | MIC(μg/mL) |
|------|-----------------------------------|-------------|------------|
| ERFX | <i>Staphylococcus aureus</i>      | 209P JC-1   | 0.1        |
|      | <i>Staphylococcus epidermidis</i> | ATCC 122228 | 0.2        |
|      | <i>Enterococcus faecalis</i>      | ATCC 19433  | 1.6        |
|      | <i>Pasteurella multocida</i>      | B-48        | 0.8        |
|      | <i>Bacillus subtilis</i>          | ATCC 6633   | 0.8        |
|      | <i>Escherichia coli</i>           | NIHJ        | 0.1        |
|      | <i>Salmonella</i> Typhimurium     | LT-2        | 0.4        |
|      | <i>Klebsiella pneumoniae</i>      | 501         | 0.2        |
|      | <i>Shigella flexneri</i> 2a       | 5503        | 0.1        |

|               |                                                                     |                                         |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|               | <i>Proteus mirabilis</i>                                            | IFO 3849                                | 0.2          |
|               | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                       | 2063                                    | 3.13         |
| OBFX          | <i>S. aureus</i>                                                    | 209P JC-1                               | 0.39         |
|               | <i>S. epidermidis</i>                                               | 8                                       | 0.39         |
|               | <i>E. faecalis</i>                                                  | 2473                                    | 3.13         |
|               | <i>B. subtilis</i>                                                  | PCI 219                                 | 0.1          |
|               | <i>E. coli</i>                                                      | NIHJ JC-2                               | 0.05         |
|               | <i>S. Typhimurium</i>                                               | S-9                                     | 0.05         |
|               | <i>K. pneumoniae</i>                                                | 13                                      | 0.2          |
|               | <i>Proteus vulgaris</i>                                             | OX 19                                   | 0.05         |
|               | <i>P. aeruginosa</i>                                                | Tsuchijima                              | 1.56         |
| DFLX          | <i>S. aureus</i>                                                    | 209P JC-1                               | 0.39         |
|               | <i>S. epidermidis</i>                                               | Kawamura                                | 0.2          |
|               | <i>E. faecalis</i>                                                  | CN-478                                  | 3.13         |
|               | <i>B. subtilis</i>                                                  | ATCC 6633                               | 0.1          |
|               | <i>E. coli</i>                                                      | NIHJ JC-2                               | 0.39         |
|               | <i>S. Typhi</i>                                                     | T-58                                    | 0.39         |
|               | <i>K. pneumoniae</i>                                                | PCI-602                                 | 0.78         |
|               | <i>P. mirabilis</i>                                                 | TU-1698                                 | 0.78         |
|               | <i>P. aeruginosa</i>                                                | TU-408                                  | 0.78         |
| DNFX          | <i>S. aureus</i>                                                    | 209P                                    | 0.2          |
|               | <i>E. coli</i>                                                      | NIHJ JC-2                               | 0.05         |
|               | <i>Clostridium perfringens</i>                                      | NCTC 3181                               | 0.39         |
| DNFX<br>(牛由来) | <i>Haemophilus somnus</i><br>( <i>Histophilus somni</i> )           | #308                                    | 0.025        |
|               | <i>Pasteurella haemolytica</i><br>( <i>Mannheimia haemolytica</i> ) | 5903                                    | 0.1          |
|               | <i>Pasteurella multocida</i>                                        | 5901                                    | 0.05         |
|               | <i>Clostridium septicum</i>                                         | 5881                                    | 0.78         |
|               | <i>Mycoplasma bovis</i>                                             | Donetta                                 | 0.78         |
|               | <i>Mycoplasma bovigenitalium</i>                                    | PG11                                    | 0.78         |
|               | <i>Mycoplasma bovirhinis</i>                                        | PG43                                    | 1.56         |
| DNFX<br>(豚由来) | <i>E. coli</i>                                                      | B1163, B1300,<br>B1521                  | 0.05~0.1     |
|               | <i>Salmonella</i> spp.                                              | L-36, L-61,<br>L-71                     | 0.10~0.20    |
|               | <i>Haemophilus parasuis</i>                                         | 石川、岡山                                   | 0.1          |
|               | <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>                              | HPF10, HPF13,<br>HPF17, HPF25,<br>HPF28 | 0.1          |
|               | <i>P. multocida</i>                                                 | Kobe5, Kobe6                            | 0.0125~0.025 |
|               | <i>Bordetella bronchiseptica</i>                                    | I-52, I-53, O16                         | 1.56~3.13    |
|               | <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>                                     | J                                       | 0.05         |
|               | <i>Treponema hyodysenteriae</i>                                     | S73/2, DJ70                             | 6.25         |
|               |                                                                     |                                         |              |
| NFLX          | <i>S. aureus</i>                                                    | FDA209P JC-1                            | 0.39         |
|               | <i>E. coli</i>                                                      | NIHJ JC-2                               | 0.1          |
|               | <i>K. pneumoniae</i>                                                | PCI-602                                 | 0.025        |
|               | <i>B. subtilis</i>                                                  | ATCC 6633                               | 0.2          |
|               | <i>S. Typhimurium</i>                                               | IID 971                                 | 0.1          |
|               | <i>S. Typhi</i>                                                     | 901                                     | 0.05         |

|      |                                        |            |            |
|------|----------------------------------------|------------|------------|
| MBFX | <i>Salmonella</i> Enteritidis          | G14        | 0.05       |
|      | <i>P. mirabilis</i>                    | IFO 3849   | 0.2        |
|      | <i>P. aeruginosa</i>                   | PAO1       | 0.78       |
|      | <i>E. coli</i>                         | ATCC 25922 | 0.008      |
|      |                                        |            | 0.008-0.03 |
|      |                                        | JCM 5491   | 0.063      |
|      | <i>S. Typhmurium</i>                   | ATCC 14028 | 0.03       |
|      | <i>K. pneumoniae</i>                   | ATCC 43816 | 0.032      |
|      | <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> | ATCC 27090 | 0.015-0.06 |
|      | <i>S. aureus</i>                       | ATCC 29213 | 0.12-0.5   |
|      | <i>E. faecalis</i>                     | JCM 7783   | 2          |
|      | <i>Enterococcus faecium</i>            | JCM 5804   | 8          |
|      | <i>M. bovirhinis</i>                   | ATCC 27748 | 0.25-1.0   |

( )内は現在の分類名

表 15-2 フルオロキノロン系抗菌性物質の抗菌スペクトル (MIC<sub>50</sub> 及び MIC<sub>90</sub>)

| MBFX | 菌種                              | 菌株数 | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> |
|------|---------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|      | <i>E. coli</i>                  | 48  | 0.03              | 0.03              |
|      | <i>Klebsiella</i> spp.          | 65  | 0.03              | 0.1               |
|      | <i>S. Typhimurium</i>           | 14  | 0.06              | —                 |
|      | <i>Proteus</i> spp.             | 28  | 0.03~0.06         | —                 |
|      | <i>Pasteurella</i> spp.         | 22  | 0.08              | —                 |
|      | <i>Haemophilus</i> spp.         | 26  | 0.025             | 0.025             |
|      | <i>P. aeruginosa</i>            | 33  | 0.33~0.78         | 3.13              |
|      | <i>B. bronchiseptica</i>        | 10  | 0.8               | —                 |
|      | <i>Campylobacter jejuni</i>     | 17  | 0.2               | 0.78              |
|      | <i>Staphylococcus</i> spp.      | 47  | 0.39~0.77         | 0.39              |
|      | <i>Enterococcus</i> spp.        | 40  | 1.56~6.25         | 3.13~12.5         |
|      | <i>Clostridium</i> spp.         | 14  | 3.7               | —                 |
|      | <i>M. bovis</i>                 | 15  | 0.5               | —                 |
|      | <i>M. bovirhinis</i>            | 2   | 0.125             | —                 |
|      | <i>Mycoplasma gallisepticum</i> | 4   | 0.09              | —                 |
|      | <i>Mycoplasma synoviae</i>      | 1   | 1                 | —                 |

## (2) 家畜の病原菌におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布

家畜の病原菌に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC は、表 16 のとおりである。(参照 7、8、10、103) また、国内で牛の病性鑑定材料から分離された *P. multocida* に対する CPF<sub>X</sub> の MIC を表 17 に示した。(参照 106)

第3版改訂に当たって提出された、牛乳房炎由来 *Staphylococcus aureus* 等 (2012 及び 2015 年分離) に対する MBFX の MIC 範囲は、 $\leq 0.125 \sim 4$   $\mu\text{g/mL}$  であった (表 18)。(参照 170)

表 16 家畜の病原菌に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC

| 種類   | 由来 | 菌種                  | MIC <sub>50</sub> ( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC <sub>90</sub> ( $\mu\text{g/mL}$ ) |
|------|----|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ERFX | 牛  | <i>P. multocida</i> | 0.025                                  | 0.1                                    |
|      | 牛  | <i>E. coli</i>      | 0.05                                   | 0.05                                   |

|      |   |                                                    |              |              |
|------|---|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      | 牛 | <i>M. bovis</i>                                    | 0.2          | 0.39         |
|      | 牛 | <i>M. bovirhinis</i>                               | 0.1          | 0.39         |
|      | 牛 | <i>Ureaplasma diversum</i>                         | 0.39         | 0.78         |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i>                         | 0.05         | 0.1          |
|      |   |                                                    | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ |
|      | 豚 | <i>P. multocida</i>                                | 0.025        | 0.025        |
| OBFX | 豚 | <i>E. coli</i>                                     | 0.025        | 0.39         |
|      | 牛 | <i>P. multocida</i>                                | —            | 0.05         |
|      | 牛 | <i>P. haemolytica</i><br>( <i>M. haemolytica</i> ) | —            | 0.05         |
|      | 牛 | <i>E. coli</i>                                     | —            | 0.2          |
|      | 牛 | <i>M. bovirhinis</i>                               | —            | 0.1          |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i>                         | —            | 0.1          |
|      | 豚 | <i>P. multocida</i>                                | —            | 0.0125       |
|      | 豚 | <i>E. coli</i>                                     | —            | 0.2          |
| DFLX | 豚 | <i>M. hyopneumoniae</i>                            | —            | 0.1          |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i> (1 型)                   | —            | 0.05         |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i> (2 型)                   | —            | 0.05         |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i> (5 型)                   | —            | 0.025        |
| DNFX | 豚 | <i>P. multocida</i> (A 型)                          | —            | 0.05         |
|      | 牛 | <i>P. multocida</i>                                | 0.05         | 0.1          |
|      | 牛 | <i>M. haemolytica</i>                              | 0.2          | 0.2          |
|      | 牛 | <i>M. bovis</i>                                    | 0.78         | 0.78         |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i>                         | 0.1          | 0.2          |
|      | 豚 | <i>P. multocida</i>                                | 0.05         | 0.1          |
| NFLX | 豚 | <i>H. parasuis</i>                                 | 0.1          | 1.56         |
|      | 豚 | <i>E. coli</i>                                     | 0.2          | —            |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i>                         | 0.1          | —            |
| MBFX | 豚 | <i>P. multocida</i>                                | 0.39         | —            |
|      | 牛 | <i>P. multocida</i>                                | <0.06        | <0.06        |
|      | 牛 | <i>M. haemolytica</i>                              | <0.06        | <0.06        |
|      | 牛 | <i>M. bovis</i>                                    | 1            | 2            |
|      | 豚 | <i>A. pleuropneumoniae</i>                         | <0.06        | <0.06        |
|      | 豚 | <i>P. multocida</i>                                | <0.06        | <0.06        |
|      | 豚 | <i>M. hyopneumoniae</i>                            | 0.5          | 2            |

表 17 牛の病性鑑定材料由来 *P. multocida* に対する CPFX の MIC

| 分離年  | 菌株数 | MIC ( $\mu\text{g/mL}$ ) |                   |                   |
|------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|
|      |     | 範囲                       | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> |
| 2016 | 102 | $\leq 0.03 \sim 1$       | $\leq 0.03$       | 1                 |
| 2017 | 70  | $\leq 0.03 \sim 1$       | $\leq 0.03$       | 1                 |
| 2018 | 95  | $\leq 0.03 \sim 1$       | 0.12              | 1                 |

表 18 牛乳房炎由来菌に対する MBFX の MIC

| 菌種                      | 分離年  | 菌株数 | MIC (μg/mL) |                   |                   |
|-------------------------|------|-----|-------------|-------------------|-------------------|
|                         |      |     | 範囲          | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> |
| <i>S. aureus</i>        | 2012 | 10  | ≤0.125~2    | 0.25              | 2                 |
|                         | 2015 | 22  | ≤0.125~0.5  | 0.25              | 0.5               |
| <i>S. equorum</i>       | 2012 | 8   | 0.25~0.5    | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 8   | ≤0.125~0.5  | —                 | —                 |
| <i>S. hamolyticus</i>   | 2012 | 10  | 0.25~4      | 0.25              | 4                 |
|                         | 2015 | 6   | ≤0.125~0.5  | —                 | —                 |
| <i>S. hyicus</i>        | 2012 | 0   | —           | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 8   | 0.25~0.5    | —                 | —                 |
| <i>S. saprophyticus</i> | 2012 | 0   | —           | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 11  | 0.25~1      | 0.5               | 0.5               |
| <i>S. xylosus</i>       | 2012 | 4   | 0.5         | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 15  | ≤0.125~0.5  | 0.5               | 0.5               |
| <i>S. agalactiae</i>    | 2012 | 2   | 2           | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 5   | 1~2         | —                 | —                 |
| <i>S. bovis</i>         | 2012 | 10  | 1~4         | 4                 | 4                 |
|                         | 2015 | 12  | 1~4         | 2                 | 4                 |
| <i>S. dysgalactiae</i>  | 2012 | 9   | 1~4         | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 20  | 0.5~2       | 1                 | 1                 |
| <i>S. equinus</i>       | 2012 | 10  | 4           | 4                 | 4                 |
|                         | 2015 | 21  | 2~4         | 2                 | 4                 |
| <i>S. uberis</i>        | 2012 | 9   | 1~2         | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 20  | 0.25~1      | 1                 | 1                 |
| <i>E. coli</i>          | 2012 | 30  | ≤0.125      | ≤0.125            | ≤0.125            |
|                         | 2015 | 18  | ≤0.125~0.5  | ≤0.125            | 0.5               |
| <i>K. oxytoca</i>       | 2012 | 4   | ≤0.125      | —                 | —                 |
|                         | 2015 | 13  | ≤0.125~1    | ≤0.125            | ≤0.125            |
| <i>K. pneumoniae</i>    | 2012 | 12  | ≤0.125      | ≤0.125            | ≤0.125            |
|                         | 2015 | 13  | ≤0.125~1    | ≤0.125            | 0.5               |

### (3) 大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターにおけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布

大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターにおけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC は、表 19 及び表 20 のとおりである。(参照 3、7、23~26、106)

表 19 大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターに対するフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC (1999~2004 年)

| 種類   | 由来 | 菌種                        | MIC <sub>50</sub> (μg/mL) | MIC <sub>90</sub> (μg/mL) |
|------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ERFX | 家畜 | <i>E. coli</i>            | ≤0.125                    | 0.25                      |
|      | 家畜 | <i>Salmonella</i> spp.    | ≤0.125                    | ≤0.125                    |
|      | 家畜 | <i>Campylobacter</i> spp. | <0.125                    | 4                         |
| OBFX | 牛  | <i>E. coli</i>            | ≤0.06                     | 0.125                     |
|      | 豚  | <i>E. coli</i>            | ≤0.06                     | 1                         |

|      |   |                           |              |              |
|------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|      | 豚 | <i>S. Typhimurium</i>     | $\leq 0.06$  | 1            |
|      | 豚 | <i>Campylobacter</i> spp. | 4            | 32           |
| DFLX | — | <i>E. coli</i>            | 0.12         | 0.25         |
|      | — | <i>Salmonella</i> spp.    | 0.25         | 0.25         |
|      | — | <i>C. jejuni</i>          | 0.25         | 0.5          |
|      | — | <i>Campylobacter coli</i> | 0.125        | 0.25         |
| DNFX | 牛 | <i>E. coli</i>            | $\leq 0.063$ | 64           |
|      | 牛 | <i>Campylobacter</i> spp. | 4            | 16           |
|      | 豚 | <i>E. coli</i>            | $\leq 0.063$ | 64           |
|      | 豚 | <i>S. Typhimurium</i>     | —            | $\leq 0.063$ |
|      | 豚 | <i>Campylobacter</i> spp. | 2            | 16           |
| NFLX | 豚 | <i>E. coli</i>            | $< 0.06$     | 0.5          |
|      | 豚 | <i>Salmonella</i> spp.    | $< 0.06$     | 1            |
|      | 豚 | <i>Campylobacter</i> spp. | 8            | 32           |
| MBFX | 牛 | <i>E. coli</i>            | $< 0.06$     | $< 0.06$     |
|      | 牛 | <i>Campylobacter</i> spp. | $< 0.06$     | 8            |
|      | 豚 | <i>E. coli</i>            | $< 0.06$     | 0.25         |
|      | 豚 | <i>Salmonella</i> spp.    | $< 0.06$     | 0.5          |
|      | 豚 | <i>Campylobacter</i> spp. | 4            | 8            |

表 20 牛及び豚由来大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターに対する ERFX 又は CPFEX の MIC (2005～2019 年)

|       | <i>E. coli</i>                  |                                 | <i>Salmonella</i> spp.          |                                 | <i>Campylobacter</i> spp.       |                                 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | MIC 最小値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC 最高値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC 最小値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC 最高値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC 最小値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC 最高値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) |
| 2005  | $\leq 0.125$                    | $\geq 32$                       | $\leq 0.125$                    | 0.25                            | $\leq 0.125$                    | 16                              |
| 2006  | $\leq 0.125$                    | $\geq 32$                       | $\leq 0.125$                    | $\leq 0.125$                    | $\leq 0.125$                    | 8                               |
| 2007  | $\leq 0.125$                    | 8                               | $\leq 0.125$                    | $\leq 0.125$                    | $\leq 0.125$                    | 64                              |
| 2008  | $\leq 0.125$                    | 16                              | $\leq 0.031$                    | 1                               | 0.06                            | 16                              |
| 2009  | $\leq 0.125$                    | $> 32$                          | $\leq 0.125$                    | 1                               | $\leq 0.03$                     | 16                              |
| 2010* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 1                               | 0.06                            | 32                              |
| 2011* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 1                               | 0.06                            | 64                              |
| 2012* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 1                               | $\leq 0.03$                     | 64                              |
| 2013* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 0.5                             | 0.06                            | $> 64$                          |
| 2014* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 1                               | 0.06                            | 32                              |
| 2015* | $\leq 0.03$                     | $> 4$                           | $\leq 0.03$                     | 1                               | 0.06                            | $> 64$                          |
| 2016* | $\leq 0.03^{**}$                | $> 4^{**}$                      | $\leq 0.03$                     | 1                               | $\leq 0.03^{**}$                | $64^{**}$                       |
| 2017* | $\leq 0.03^{**}$                | $0.5^{**}$                      | $\leq 0.03$                     | 1                               | $0.06^{**}$                     | $64^{**}$                       |
| 2018* | $\leq 0.03^{**}$                | $> 4^{**}$                      | —                               | —                               | $0.06^{**}$                     | $> 64^{**}$                     |
| 2019* | $\leq 0.03^{**}$                | $> 4^{**}$                      | —                               | —                               | $\leq 0.03^{**}$                | $64^{**}$                       |

\* : 2010 年以降は ERFX に代わって CPFEX が用いられている。

\*\* : 2016 年以降は農場由来株ではなく、と畜場由来株が用いられている。

#### (4) 腸球菌におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC 分布

JVARM における腸球菌におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC は、表 21 及び表 22 のとおりである。(参照 106、170)

また、フルオロキノロン系抗菌性物質 (MBFX 又はその他) を使用した家畜又は農場における腸球菌の薬剤感受性は、牛由来腸球菌の MIC<sub>90</sub> は 2010 年から 2015 年にかけて 4 µg/mL から 16 µg/mL で推移していた。また、豚由来腸球菌の MIC<sub>90</sub> は 2010 年から 2015 年にかけて 4 µg/mL から 64 µg/mL で推移していた (表 23)。

表 21 牛由来腸球菌に対する ERFX の MIC (農場での調査)

| 菌種                          | 分離年  | 株数  | MIC 範囲<br>(µg/mL) | MIC <sub>50</sub><br>(µg/mL) | MIC <sub>90</sub><br>(µg/mL) |
|-----------------------------|------|-----|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>E. faecalis</i>          | 2008 | 10  | 0.5~4             | 1                            | 4                            |
|                             | 2009 | 8   | 1~2               | —                            | —                            |
|                             | 2010 | 6   | 1~4               | —                            | —                            |
|                             | 2011 | 8   | 1~2               | —                            | —                            |
|                             | 2012 | 14  | 0.5~1             | 1                            | 1                            |
|                             | 2013 | 3   | 0.25~1            | —                            | —                            |
|                             | 2014 | 6   | 0.5~2             | —                            | —                            |
|                             | 2015 | 5   | 0.5~1             | —                            | —                            |
| <i>E. faecium</i>           | 2008 | 53  | 0.5~16            | 1                            | 8                            |
|                             | 2009 | 24  | 1~8               | 2                            | 8                            |
|                             | 2010 | 16  | 1~16              | 2                            | 16                           |
|                             | 2011 | 38  | 0.25~8            | 2                            | 8                            |
|                             | 2012 | 44  | 0.5~16            | 1                            | 16                           |
|                             | 2013 | 10  | 0.5~8             | 1                            | 4                            |
|                             | 2014 | 27  | 0.5~16            | 2                            | 16                           |
|                             | 2015 | 25  | 0.5~16            | 2                            | 8                            |
| <i>Enterococcus</i><br>spp. | 2008 | 264 | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2009 | 251 | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2010 | 280 | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2011 | 247 | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2012 | 274 | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2013 | 241 | 0.25~8            | 1                            | 2                            |
|                             | 2014 | 290 | ≤0.125~16         | 1                            | 2                            |
|                             | 2015 | 220 | 0.25~16           | 1                            | 2                            |

表 22 牛由来腸球菌に対する ERFX 又は CPFEX の MIC (と畜場での調査)

| 菌種                          | 分離年  | 株数  | MIC 範囲<br>(µg/mL) | MIC <sub>50</sub><br>(µg/mL) | MIC <sub>90</sub><br>(µg/mL) |
|-----------------------------|------|-----|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Enterococcus</i><br>spp. | 2012 | 201 | 0.5~32            | 1                            | 2                            |
|                             | 2013 | —   | —                 | —                            | —                            |
|                             | 2014 | 260 | ≤0.125~8          | 0.5                          | 0.5                          |
|                             | 2015 | 269 | 0.25~8            | 0.5                          | 1                            |
|                             | 2016 | 239 | ≤0.12~8           | 0.5                          | 0.5                          |

|  |       |     |         |      |     |
|--|-------|-----|---------|------|-----|
|  | 2017  | 242 | ≤0.12~2 | 0.25 | 0.5 |
|  | 2018* | 170 | 0.12~4  | 0.5  | 1   |
|  | 2019* | 255 | 0.25~4  | 0.5  | 1   |

\*：2018 年以降は ERFX に代わって CPFEX が用いられている。

表 23 フルオロキノロン系抗菌性物質（MBFX 又はその他）を使用した家畜又は農場における腸球菌の薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2010~2011 年 | 2012~2013 年 | 2014~2015 年 |
|------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| MBFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 25          | 8           | 52          |
|      |    |      | 検体数               | 75          | 65          | 65          |
|      |    |      | 菌株数               | 39          | 35          | 21          |
|      |    |      | MIC 範囲            | 0.5~4       | 1~32        | 1~64        |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | 1           | 2           | 8           |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 4           | 4           | 16          |
| MBFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 32          | 31          | 123         |
|      |    |      | 検体数               | 148         | 93          | 73          |
|      |    |      | 菌株数               | 105         | 60          | 54          |
|      |    |      | MIC 範囲            | 0.5~64      | 1~64        | 1~64        |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | 2           | 2           | 4           |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 16          | 4           | 64          |

※MIC の単位：μg/mL

#### 4. フルオロキノロン系抗菌性物質における交差耐性の可能性及び医療分野における重要性

動物用医薬品として使用されているフルオロキノロン系抗菌性物質は前述のとおりであるが、その中で、動物用及び人用に共通しているフルオロキノロン系抗菌性物質は OFLX（鶏に使用する製剤が承認されている。）及び NFLX（豚及び鶏に使用する製剤が承認されている。）である。また、人用抗菌性物質として使用されているレボフロキサシン（LVFX）は OFLX の光学異性体、CPFEX は動物用として使用されている ERFX の代謝物であり、構造が非常に類似している（表 24、表 25）。

その他、人用医薬品として使用されているフルオロキノロン系抗菌性物質としては、2022 年の時点で塩酸モキシフロキサシン、ロメフロキサシン、トスフロキサシン、プルリフロキサシン等がある。

このように、全く同一成分、又は構造が非常に類似しているフルオロキノロン系抗菌性物質が動物用及び人用に使用されている場合がある。しかし、フルオロキノロン系抗菌性物質は、成分が異なったとしても構造や作用機序は基本的に類似していることから、成分によって交差耐性の程度が若干異なる可能性はあるものの、同系統内で相互に交差耐性を示すと考えられる。

また、フルオロキノロン系抗菌性物質は、「食品を介して人の健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて」（2006 年 4 月 13 日食品安全委員会決定(2022 年 3 月改正)。以下、「人用抗菌性物質の重要度ランク付け」という。）において、ある特定の人の疾病に対する唯一の治療薬である又は代替薬がほとんどないという理由から、「I：きわめて高度に重要」とランク付けされている。（参照 27）

表 24 人用フルオロキノロン系抗菌性物質 (OFLX 及び LVFX) の概要





| 一般名   | オフロキサシン (OFLX)                                                                    | レボフロキサシン (LVFX)                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構造式   |  |                                       |
| 分子式   | $C_{18}H_{20}FN_3O_4$                                                             | $C_{18}H_{20}FN_3O_4$                                                                                                   |
| 概要    | 動物用及び人用として使用                                                                      | オフロキサシンの光学異性体                                                                                                           |
| 適応症   | 感染性腸炎、腸チフス、パラチフス 等                                                                | 感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、炭疽、ブルセラ症、ペスト 等                                                                                     |
| 用法・用量 | 成人に対して、OFLX として 1 日 300～600 mg を 2～3 回に分割して経口投与する。なお、感染症の種類及び症状により適宜増減する。         | 成人に対して、LVFX として 1 回 100 mg を 1 日 2～3 回経口投与する。感染症の種類及び症状により適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には LVFX として 1 回 200 mg 1 日 3 回経口投与する。 |

表 25 人用フルオロキノロン系抗菌性物質 (NFLX 及び CPFX) の概要

| 一般名   | ノルフロキサシン (NFLX)                                                                    | シプロフロキサシン (CPFX)                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 構造式   |  |  |
| 分子式   | $C_{16}H_{18}FN_3O_3$                                                              | $C_{17}H_{18}FN_3O_3$                                                               |
| 概要    | 動物用及び人用として使用                                                                       | エンロフロキサシンの代謝物                                                                       |
| 適応症   | 感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、炭疽 等                                                          | 感染性腸炎 等                                                                             |
| 用法・用量 | NFLX として、通常、成人 1 回 100～200 mg を 1 日 3～4 回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。                    | CPFX として、通常、成人 1 回 100～200 mg を 1 日 2～3 回経口投与する。なお、感染症の種類及び症状に応じ適宜増減する。             |

## 5. フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌、薬剤耐性決定因子の耐性機序及び遺伝学的情報

フルオロキノロン系抗菌性物質の耐性機序については、大腸菌 K-12 株や緑膿菌 PAO 株等におけるフルオロキノロン耐性変異株の解析から、標的酵素の変異や膜透過性の変化（薬剤の取込み低下、薬剤の排出亢進）が明らかにされている。また、近年、プラスミド上に存在する伝達性のキノロン耐性遺伝子が報告されており、DNA ジャイレースへのキノロン系抗菌性物質の作用からの保護や薬剤の排出機能に関与していると考えられている。

## (1) 標的酵素 (DNA ジャイレース及びトポイソメラーゼⅣ) の変異によるキノロン耐性

### ① DNA ジャイレースの変異による耐性

大腸菌 K-12 株のキノロン耐性遺伝子 (*nfxA*, *norA*, *nalA*) は、DNA ジャイレースのサブユニット A をコードする *gyrA* 遺伝子上に変異が起きたもので、DNA 複製の阻害時に、サブユニット A、DNA、キノロン系抗菌性物質の 3 者が相互作用を示す部位であると考えられている。なお、キノロン耐性変異株の DNA ジャイレースは、キノロン系抗菌性物質の阻害を数十倍から数百倍受けにくくなっていたとの報告がある。

大腸菌以外のブドウ球菌、肺炎球菌、緑膿菌、結核菌、淋菌等でもキノロン耐性遺伝子の変異部位が明らかにされており、大腸菌のものと極めて類似していると報告されている。(参照 20)

### ② トポイソメラーゼⅣの変異による耐性

黄色ブドウ球菌のキノロン耐性は、大腸菌や緑膿菌の場合と異なり、最初にトポイソメラーゼⅣの ParC タンパク質をコードする *parC* (*griA*) 遺伝子に変異した後に、DNA ジャイレースの変異が高頻度にかかることが報告されている。

高度耐性化したブドウ球菌の遺伝子解析によると、第 1 段階で *parC* (*griA*) 遺伝子に変異が起こり、第 2 段階で *gyrA* 遺伝子、第 3 段階で再び *parC* (*griA*) 遺伝子、第 4 段階で *gyrA* 遺伝子に点変異が認められ、これら遺伝子の 2 サイクルに及ぶ標的酵素の変異が、キノロン耐性の高度化に関与していると報告されている。(参照 20)

フルオロキノロン耐性及び低感受性大腸菌について、キノロン耐性決定領域 (Quinolone Resistance Determining Regions : QRDR) と呼ばれる部位の変異の有無について検討した結果、フルオロキノロン耐性菌はいずれも *gyrA* 及び *parC* に変異が認められた。このため、高度耐性化するには *gyrA* 及び *parC* の部位の変異が必要であると確認された。(参照 134)

一方、カンピロバクターは、GyrA の QRDR における一か所の変異で、フルオロキノロン剤耐性を獲得する。これらは、カンピロバクターが、サルモネラや大腸菌に比べて、容易にフルオロキノロン耐性を獲得する要因と考えられている。(参照 135~137)

### ③ 標的酵素の変異によるキノロン耐性の遺伝学的情報

標的酵素の変異によるキノロン耐性は、大腸菌及びサルモネラでは、主に DNA ジャイレース及びトポイソメラーゼⅣの変異であり、トポイソメラーゼⅣが存在しないと考えられているカンピロバクターでは、DNA ジャイレースの変異であると考えられている。(参照 28、29)

## (2) 膜透過性の変化によるキノロン耐性

### ① 薬剤の取り込み低下による耐性

大腸菌 K-12 株における NFLX 及び CPFY 耐性変異株の解析から、菌体内に物質

を取込むための透過孔であるポーリンを形成する外膜タンパク質 OmpF の減少やリポ多糖体の変異が、これらの変異株におけるキノロン系抗菌性物質の外膜透過性を低下させ、キノロン耐性に関与することが報告されている。(参照 20)

また、*H. influenzae* のポーリンタンパク質 OmpP2 の変異や *A. pleuropneumoniae* のポーリンタンパク質 OmpP2B 及び LamB の発現抑制がキノロン耐性に関与することが報告されている。(参照 179、180)

## ② 薬剤の排出亢進による耐性

緑膿菌 PAO 株における NFLX 耐性変異株の解析から、これらの変異株におけるキノロン耐性は NFLX の外膜透過性の低下によるものではなく、NFLX の菌体外への排出機能の亢進によることが明らかにされている。(参照 20) フルオロキノロン耐性付与に関与する多剤排出ポンプとして、緑膿菌の MexAB/OprM 及び MexCD/OprJ、*S. aureus* の NorA、大腸菌やサルモネラの AcrAB/TolC、カンピロバクターの CmeABC 等が知られている。これらの多剤排出ポンプの通常発現レベルは低く、フルオロキノロンおよび他の抗菌性物質に対する耐性が付与されるには、発現レベルの上昇が必要となる。大腸菌では、AcrAB/TolC の発現は marRAB、soxR や acrR といった調節遺伝子によって支配されており、調節遺伝子の変異によって AcrAB/TolC の発現亢進及び多剤耐性がもたらされる場合がある。(参照 181、182)

また、*A. pleuropneumoniae* における AcrB 過剰発現のキノロン耐性への関与やカンピロバクター CmeABC の変異による耐性の亢進及び変異型 Re-CmeABC の自然形質転換による水平伝播が報告されている。(参照 181、183)

## (3) 伝達性キノロン耐性遺伝子

標的酵素の変異及び膜透過性の変化に関連するキノロン耐性遺伝子はいずれも染色体上に存在しており、薬剤耐性遺伝子が菌から菌へ伝播することはないと考えられてきた。しかし、最近、腸内細菌目細菌の接合伝達性プラスミド上に存在し、キノロン耐性に関与する伝達性のキノロン耐性遺伝子 (*qnr*、*aac(6')-Ib-cr*、*qepA*) が人臨床及び動物由来菌株において報告されている。さらに、*oqxAB*、*qacA*、*qacB*、*crpP* が伝達性のキノロン耐性遺伝子として機能することが報告されている。

キノロン系抗菌性物質による DNA ジャイレース阻害を抑制するタンパク質 QnrA (218 アミノ酸) をコードしている遺伝子 (*qnrA*) は伝達性のプラスミド上に存在しており、QnrA は、DNA ジャイレース、DNA 鎖、キノロン系抗生物質の 3 者の相互作用を何らかの形でブロックし、キノロン耐性を発現しているものと考えられている。(参照 20、30) QnrA は、既知の McbG 及び MfpA と約 20% の相同性を示し、CPFX による DNA ジャイレース阻害を抑制することが明らかにされている。現在までに、QnrA 以外に、QnrS、QnrB、QnrC、QnrD、QnrE、QnrVC などの類似タンパクが発見されている。腸内細菌目細菌は本来キノロン感受性が非常に高く、QnrA タンパクなどの産生のみでは臨床耐性とはならないが、標的酵素変異等と相加的に働いた場合、耐性株の出現を助長する可能性がある。(参照 49、184)

*aac(6')-Ib-cr* 遺伝子 (アミノグリコシド系抗菌性物質耐性に関与するアミノグリコシドアセチルトランスフェラーゼをコードする遺伝子 *aac(6')-Ib* の変異遺伝子) がコ

ードするアミノグリコシドアセチルトランスフェラーゼは、*qnr* 遺伝子と同じプラスミド上に存在し、フルオロキノロン系抗菌性物質の中でも特異的に CPFX 及び NFLX を N-アセチル化することにより、薬剤耐性を発現すると考えられている。(参照 31)

また、*qepA* 遺伝子がコードする QepA タンパク質はフルオロキノロン系抗菌性物質の排出機能に関与しているものと考えられており、国内の人臨床由来フルオロキノロン耐性大腸菌で報告されている。(参照 32)

*oqxAB* 遺伝子がコードする OqxAB タンパク質は、排出ポンプを構成し、豚の発育促進のために用いられたオラキンドックス耐性に関与する伝達性プラスミド上に最初に認められた。*oqxAB* 遺伝子は大腸菌や *K. pneumoniae* の臨床由来株のプラスミド上やサルモネラの染色体及びプラスミド上に IS 26 様エレメントに挟まれてみとめられる。中国のオラキンドックス使用農場で分離された大腸菌では、動物分離株の 39%、農場従事者分離株の 30% で伝達性プラスミド上に *oqxAB* 遺伝子が検出されている。OqxAB 排出ポンプの基質特異性は広く、クロラムフェニコール、トリメトプリムやキノロン耐性に関与する。(参照 185)

*S. aureus* のプラスミド上にコードされた排出ポンプ QacB の特定の遺伝子産物 QacBIII が CPFX 及び NRFX の排出に関与すること、また QacA にもキノロンの MIC をわずかに上昇させる効果のあることが報告されている。(参照 186)

緑膿菌の接合伝達性プラスミド上に同定された *crpP* 遺伝子には CPFX を不活化するリン酸化酵素 CrpP がコードされており、*crpP* 相同遺伝子が大腸菌や *K. pneumoniae* 等からも検出されている。(参照 184)

最近、*Salmonella* Goldcost の接合伝達性プラスミド上に同定された *ramA* 遺伝子 (*ramAp*) には、大腸菌やサルモネラにおいて多剤排出ポンプとして機能する AcrAB-ToC の転写制御因子である RamA がコードされており、キノロン耐性ととともに、マクロライド、テトラサイクリン耐性等の付与に関与することが報告されている。(参照 187)

## 6. ハザードの特定に係る検討

### (1) 感染症病原菌について

ハザードの特定に当たって考慮すべき感染症として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）に基づく一類から五類までの感染症及び国立感染症研究所により主要な腸管感染症（食中毒を含む。）として定義、公表されている感染症のうち、病原体が細菌であり、フルオロキノロン系抗菌性物質が第一選択薬又は推奨治療薬とされている感染症を抽出し、その概要や発生状況等を表 26 及び表 27 にまとめた。なお、カンピロバクター感染症及び腸管出血性大腸菌以外の病原性大腸菌による腸管感染症については、フルオロキノロン系抗菌性物質は治療薬として推奨されていないが、国内における食中毒の発生動向を踏まえてハザードの特定に係る検討対象とした。（参照 33、34、138）

これらの感染症のうち、その感染経路、発生状況等から国内の牛及び豚由来の畜産食品を介して発症する可能性を考慮すべき感染症は、腸管出血性大腸菌感染症、サルモネラ感染症（チフス菌（*S. Typhi*）及びパラチフス菌（*S. Paratyphi A*）によるものを除く。以下同じ。）及びカンピロバクター感染症であると考えられた。

また、「抗菌薬使用のガイドライン」（日本感染症学会、日本化学療法学会編集）によると、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ（チフス菌及びパラチフス菌を除くサルモネラ。以下同じ。）は、フルオロキノロン系抗菌性物質が人医療分野で対象としている腸管感染症の病原菌とされている。この他に、フルオロキノロン系抗菌性物質は、原因菌が特定されていない段階での腸管感染症の治療薬としても使用されており、カンピロバクター感染症に対しても投与されている場合があるものと考えられる。（参照 35）

なお、腸管出血性大腸菌以外の「その他の病原大腸菌」による食中毒については、2021 年に牛乳を原因とする食中毒事例の報告が 1 例あった。（参照 162、163）豚由来食品を原因とする事例はない。

表 26 ハザードの特定に係る検討表（感染症発生動向調査）

| 類別 | 疾患名 | 細菌名                    | 報告数* |   | 代替物質                                           | 感染症の概要及び背景                                                                      |
|----|-----|------------------------|------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一類 | ペスト | <i>Yersinia pestis</i> | 2002 | 0 | アミノ配糖体（ストレプトマイシン、ゲンタマイシン）、テトラサイクリン系、クロラムフェニコール | 本症の主な伝播ルートはノミやエアロゾル、感染した人又は感染動物（げっ歯類）との直接的な接触によるもので、家畜が媒介する例は開発途上国においても非常に稀である。 |
|    |     |                        | 2003 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2004 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2005 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2006 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2007 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2008 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2009 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2010 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2011 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2012 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2013 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2014 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2015 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2016 | 0 |                                                |                                                                                 |
|    |     |                        | 2017 | 0 |                                                |                                                                                 |

|    |       |                                                                                                 |      |       |              |                                                                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |       |                                                                                                 | 2018 | 0     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2019 | 0     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2020 | 0     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2021 | 0     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 合計   | 0     |              |                                                                    |
| 三類 | 細菌性赤痢 | <i>Shigella dysenteriae</i> ,<br><i>S. flexneri</i> ,<br><i>S. boydii</i> ,<br><i>S. sonnei</i> | 2002 | 699   | ホスホマイシン      | 本症の主な感染源は人で、患者や保菌者の糞便、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物を介して直接又は水系により間接的に感染する。 |
|    |       |                                                                                                 | 2003 | 473   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2004 | 604   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2005 | 553   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2006 | 490   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2007 | 452   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2008 | 320   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2009 | 181   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2010 | 235   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2011 | 300   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2012 | 214   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2013 | 143   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2014 | 158   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2015 | 156   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2016 | 121   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2017 | 141   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2018 | 268   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2019 | 140   |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2020 | 87    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2021 | 7     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 合計   | 5,742 |              |                                                                    |
| 三類 | 腸チフス  | <i>S. Typhi</i>                                                                                 | 2002 | 62    | 第三世代セファロスポリン | 本症の起因菌は宿主特異性があり、感染源は人に限られ、人の糞便で汚染された食物や水が本症を媒介する。                  |
|    |       |                                                                                                 | 2003 | 63    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2004 | 67    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2005 | 50    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2006 | 72    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2007 | 47    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2008 | 57    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2009 | 29    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2010 | 32    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2011 | 21    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2012 | 36    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2013 | 65    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2014 | 53    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2015 | 37    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2016 | 52    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2017 | 37    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2018 | 35    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2019 | 37    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2020 | 21    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2021 | 4     |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 合計   | 877   |              |                                                                    |
| 三類 | パラチフス | <i>S. Paratyphi A</i>                                                                           | 2002 | 35    | 第三世代セファロスポリン | 本症の起因菌は宿主特異性があり、感染源は人に限られ、人の糞便で汚染された食物や水が本症を媒介する。                  |
|    |       |                                                                                                 | 2003 | 44    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2004 | 91    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2005 | 20    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2006 | 26    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2007 | 22    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2008 | 27    |              |                                                                    |
|    |       |                                                                                                 | 2009 | 27    |              |                                                                    |

|    |                     |                                                          |      |        |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                          | 2010 | 21     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2011 | 23     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2012 | 24     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2013 | 50     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2014 | 16     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2015 | 32     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2016 | 20     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2017 | 14     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2018 | 23     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2019 | 21     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2020 | 7      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2021 | 0      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 合計   | 543    |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 三類 | コレラ                 | <i>Vibrio cholerae</i><br>O1 及び O139<br>のうちコレラ毒<br>素産生性菌 | 2002 | 51     | テトラサイク<br>リン系、エリ<br>スロマイシ<br>ン、スルファ<br>メトキサゾー<br>ル・トリメト<br>プリム配合剤 | 本症は代表的な経口感染<br>症の1つであるが、最近の<br>日本では輸入感染症とし<br>て発見されることが多い。<br>起因菌で汚染された水や<br>食物を摂取することによ<br>って感染するが、日本での<br>報告例は少なく、輸入魚介<br>類等の汚染が原因である<br>と考えられる。                |
|    |                     |                                                          | 2003 | 24     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2004 | 86     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2005 | 56     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2006 | 45     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2007 | 13     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2008 | 45     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2009 | 16     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2010 | 11     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2011 | 12     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2012 | 3      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2013 | 4      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2014 | 5      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2015 | 7      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2016 | 9      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2017 | 7      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2018 | 4      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2019 | 5      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2020 | 1      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2021 | 0      |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 合計   | 404    |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 三類 | 腸管出血性<br>大腸菌感染<br>症 | Enterohemorrhagic <i>E. coli</i>                         | 2002 | 3,183  | ホスホマイシ<br>ン                                                       | 本症はベロ毒素産生性の<br>腸管出血性大腸菌で汚染<br>された食物等の経口摂取、<br>すなわち汚染畜水産食品、<br>生肉又は加熱不十分な食<br>肉からの腸管感染が主体<br>である。本症は人から人へ<br>の二次感染も問題となり、<br>重症かつ公衆衛生上問題<br>となりうる感染症である<br>と考えられる。 |
|    |                     |                                                          | 2003 | 2,999  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2004 | 3,764  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2005 | 3,589  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2006 | 3,922  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2007 | 4,617  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2008 | 4,321  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2009 | 3,889  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2010 | 4,134  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2011 | 3,490  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2012 | 3,768  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2013 | 4,044  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2014 | 4,151  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2015 | 3,573  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2016 | 3,647  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2017 | 3,904  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2018 | 3,854  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2019 | 3,744  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2020 | 3,094  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 2021 | 3,243  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|    |                     |                                                          | 合計   | 70,783 |                                                                   |                                                                                                                                                                   |

|    |        |                                                                                                                                   |      |        |                                      |                                                                                                                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四類 | レジオネラ症 | <i>Legionella pneumophila</i>                                                                                                     | 2002 | 167    | エリスロマイシン、リファンピシン                     | 本症の起因菌は、土壌細菌として環境等に常在している。近年、冷却塔、給湯系、渦流浴等の水系の人工環境にアメーバを宿主として増殖し、エアロゾルの発生する可能性のある温水より空気感染する機会が増加した。               |
|    |        |                                                                                                                                   | 2003 | 146    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2004 | 161    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2005 | 281    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2006 | 519    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2007 | 668    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2008 | 893    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2009 | 717    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2010 | 751    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2011 | 818    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2012 | 899    |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2013 | 1,124  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2014 | 1,248  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2015 | 1,592  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2016 | 1,602  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2017 | 1,733  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2018 | 2,142  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2019 | 2,316  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2020 | 2,059  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2021 | 2,133  |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 合計   | 21,969 |                                      |                                                                                                                  |
| 四類 | ブルセラ症  | <i>Brucella abortus</i> ,<br><i>B. suis</i> ,<br><i>B. neotomae</i> ,<br><i>B. ovis</i> ,<br><i>B. canis</i> ,<br><i>B. maris</i> | 2002 | 1      | テトラサイクリン系、リファンピシン、アミノグリコシド系、トリモキサゾール | 本症は感染動物の乳や乳製品の摂取、感染動物(牛、羊、山羊、豚等)やその死体等との接触によって感染するため、食料のみならず、共同生活者として動物への依存度が強い国や地域において重要である。                    |
|    |        |                                                                                                                                   | 2003 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2004 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2005 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2006 | 5      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2007 | 1      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2008 | 4      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2009 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2010 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2011 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2012 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2013 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2014 | 10     |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2015 | 5      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2016 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2017 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2018 | 3      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2019 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2020 | 2      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2021 | 1      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 合計   | 48     |                                      |                                                                                                                  |
| 四類 | 炭疽     | <i>Bacillus anthracis</i>                                                                                                         | 2002 | 0      | ペニシリン G                              | 本症は世界の多くの地域で見られるが、開発途上国や獣医衛生が遅れている国に集中している。人及び動物における炭疽の自然感染は、偶発的に摂取(又は接触)した芽胞が原因であり、起因菌が個体から個体へ直接伝播されることはほとんどない。 |
|    |        |                                                                                                                                   | 2003 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2004 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2005 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2006 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2007 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2008 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2009 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2010 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2011 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2012 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2013 | 0      |                                      |                                                                                                                  |
|    |        |                                                                                                                                   | 2014 | 0      |                                      |                                                                                                                  |

|    |                |                                            |      |         |                                            |                                            |
|----|----------------|--------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                |                                            | 2015 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2016 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2017 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2018 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2019 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2020 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2021 | 0       |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 合計   | 0       |                                            |                                            |
| 五類 | 性器クラミジア感染症     | <i>Chlamydia trachomatis</i>               | 2002 | 43,766  | テトラサイクリン系、マクロライド系                          | 本症は日本で最も多い性感染症であるが、主に成人では性行為、新生児では産道感染による。 |
|    |                |                                            | 2003 | 41,945  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2004 | 38,155  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2005 | 35,057  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2006 | 32,112  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2007 | 29,939  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2008 | 28,398  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2009 | 26,045  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2010 | 26,315  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2011 | 25,682  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2012 | 24,530  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2013 | 25,606  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2014 | 24,960  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2015 | 24,450  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2016 | 24,397  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2017 | 24,835  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2018 | 25,467  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2019 | 27,221  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2020 | 28,381  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2021 | 30,003  |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 合計   | 587,264 |                                            |                                            |
| 五類 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | ペニシリン耐性<br><i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2002 | 6,132   | カルバペネム、ペニシリンの大量投与、重症例にはカルバペネム及びグリコペプチド等の併用 | 本症は呼吸器感染症の中でもペニシリンに耐性を獲得した肺炎球菌（常在細菌）による。   |
|    |                |                                            | 2003 | 6,447   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2004 | 6,692   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2005 | 6,233   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2006 | 5,294   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2007 | 4,840   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2008 | 5,257   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2009 | 4,773   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2010 | 5,659   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2011 | 4,648   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2012 | 3,564   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2013 | 3,161   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2014 | 2,292   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2015 | 2,057   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2016 | 2,017   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2017 | 2,001   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2018 | 1,895   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2019 | 1,754   |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2020 | 879     |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 2021 | 846     |                                            |                                            |
|    |                |                                            | 合計   | 76,441  |                                            |                                            |

※「感染症発生動向調査」における報告数

表 27 ハザードの特定に係る検討表（食中毒統計の患者報告数）

| 病因物質 | 報告数※ | 代替物質 | 感染症の概要及び背景 |
|------|------|------|------------|
|------|------|------|------------|

|                 |      |        |                |                                                                                                                           |
|-----------------|------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |        |                |                                                                                                                           |
| サルモネラ属菌         | 2002 | 5,833  | ホスホマイシン、アンピシリン | 本症はサルモネラによるもので、起因菌はフルオロキノロン系抗菌性物質の対象動物である家畜(特に鶏)の腸内常在菌である。                                                                |
|                 | 2003 | 6,517  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2004 | 3,788  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2005 | 3,700  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2006 | 2,053  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2007 | 3,603  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2008 | 2,551  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2009 | 1,518  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2010 | 2,476  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2011 | 3,068  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2012 | 670    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2013 | 861    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2014 | 440    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2015 | 1,918  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2016 | 704    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2017 | 1,183  |                |                                                                                                                           |
|                 | 2018 | 640    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2019 | 476    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2020 | 861    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2021 | 318    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2022 | 698    |                |                                                                                                                           |
|                 | 合計   | 43,876 |                |                                                                                                                           |
| ナグビブリオ          | 2002 | 30     | テトラサイクリン系      | 本症はコレラ（三類感染症）の起因菌である <i>V. cholerae</i> の毒素産生型以外によるもので、本菌で汚染された水や魚介類を摂取することによって感染する。                                      |
|                 | 2003 | 2      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2004 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2005 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2006 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2007 | 1      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2008 | 5      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2009 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2010 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2011 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2012 | 1      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2013 | 446    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2014 | 1      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2015 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2016 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2017 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2018 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2019 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2020 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2021 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 2022 | 0      |                |                                                                                                                           |
|                 | 合計   | 486    |                |                                                                                                                           |
| 腸管出血性大腸菌（VT 産生） | 2002 | 273    | ホスホマイシン        | 本症はベロ毒素産生性の腸管出血性大腸菌で汚染された食物等の経口摂取、すなわち汚染畜水産食品、生肉又は加熱不十分な食肉からの腸管感染が主体である。本症は人から人への二次感染も問題となり、重症かつ公衆衛生上問題となりうる感染症であると考えられる。 |
|                 | 2003 | 184    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2004 | 70     |                |                                                                                                                           |
|                 | 2005 | 105    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2006 | 179    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2007 | 928    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2008 | 115    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2009 | 181    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2010 | 358    |                |                                                                                                                           |
|                 | 2011 | 714    |                |                                                                                                                           |

|                |      |        |                                             |                                                                  |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                | 2012 | 392    |                                             |                                                                  |
|                | 2013 | 105    |                                             |                                                                  |
|                | 2014 | 766    |                                             |                                                                  |
|                | 2015 | 156    |                                             |                                                                  |
|                | 2016 | 263    |                                             |                                                                  |
|                | 2017 | 168    |                                             |                                                                  |
|                | 2018 | 456    |                                             |                                                                  |
|                | 2019 | 165    |                                             |                                                                  |
|                | 2020 | 30     |                                             |                                                                  |
|                | 2021 | 42     |                                             |                                                                  |
|                | 2022 | 78     |                                             |                                                                  |
|                | 合計   | 5,728  |                                             |                                                                  |
| その他の病原大腸菌      | 2002 | 1,368  | 対症療法のみ<br>※フルオロキノロン系抗菌<br>性物質は推奨<br>されていない。 | 腸管出血性大腸菌以外の下痢原性大腸菌（腸管病原性大腸菌、腸管侵入性大腸菌、毒素原性大腸菌、腸管凝集性大腸菌）によるもの。     |
|                | 2003 | 1,375  |                                             |                                                                  |
|                | 2004 | 869    |                                             |                                                                  |
|                | 2005 | 1,734  |                                             |                                                                  |
|                | 2006 | 902    |                                             |                                                                  |
|                | 2007 | 648    |                                             |                                                                  |
|                | 2008 | 501    |                                             |                                                                  |
|                | 2009 | 160    |                                             |                                                                  |
|                | 2010 | 1,048  |                                             |                                                                  |
|                | 2011 | 967    |                                             |                                                                  |
|                | 2012 | 219    |                                             |                                                                  |
|                | 2013 | 1,007  |                                             |                                                                  |
|                | 2014 | 81     |                                             |                                                                  |
|                | 2015 | 362    |                                             |                                                                  |
|                | 2016 | 569    |                                             |                                                                  |
|                | 2017 | 1,046  |                                             |                                                                  |
|                | 2018 | 404    |                                             |                                                                  |
|                | 2019 | 373    |                                             |                                                                  |
|                | 2020 | 6,284  |                                             |                                                                  |
|                | 2021 | 2,258  |                                             |                                                                  |
|                | 2022 | 200    |                                             |                                                                  |
|                | 合計   | 22,375 |                                             |                                                                  |
| エルシニア・エンテロコリチカ | 2002 | 8      | アミノグリコ<br>シド系、ドキシ<br>サイクリン                  | 本症の起因菌は腸内細菌目に属しており、主に野生動物の糞便とともに排出された菌を直接又は飲食物を介して経口摂取することで発症する。 |
|                | 2003 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2004 | 40     |                                             |                                                                  |
|                | 2005 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2006 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2007 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2008 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2009 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2010 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2011 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2012 | 135    |                                             |                                                                  |
|                | 2013 | 52     |                                             |                                                                  |
|                | 2014 | 16     |                                             |                                                                  |
|                | 2015 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2016 | 72     |                                             |                                                                  |
|                | 2017 | 7      |                                             |                                                                  |
|                | 2018 | 7      |                                             |                                                                  |
|                | 2019 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2020 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2021 | 0      |                                             |                                                                  |
|                | 2022 | 0      |                                             |                                                                  |

|                  |      |        |                                                                 |                                                                                                              |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 合計   | 337    |                                                                 |                                                                                                              |
| 腸炎ビブリオ           | 2002 | 2,714  | テトラサイクリン                                                        | 本症は感染性胃腸炎（五類感染症）の起因菌の1つである腸炎ビブリオによるもので、原因となる畜水産食品として判明しているもののほとんどが魚介類及びその加工品、さらに加熱加工したものの汚染した水や器具による二次汚染である。 |
|                  | 2003 | 1,342  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2004 | 2,773  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2005 | 2,301  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2006 | 1,236  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2007 | 1,278  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2008 | 168    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2009 | 280    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2010 | 579    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2011 | 87     |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2012 | 124    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2013 | 164    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2014 | 47     |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2015 | 224    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2016 | 240    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2017 | 97     |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2018 | 222    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2019 | 0      |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2020 | 3      |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2021 | 0      |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2022 | 0      |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 合計   | 13,879 |                                                                 |                                                                                                              |
| カンロバクター・ジェジュニ／コリ | 2002 | 2,152  | 第一選択薬：マクロライド系（アジスロマイシン、クラリスロマイシン等）<br>※フルオロキノロン系抗菌性物質は推奨されていない。 | 本症は日本の代表的な食中毒の原因となるカンピロバクターによるもので、本菌はフルオロキノロン系抗菌性物質の対象動物である家畜（特に牛及び鶏）の腸内常在菌である。                              |
|                  | 2003 | 2,642  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2004 | 2,485  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2005 | 3,439  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2006 | 2,297  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2007 | 2,396  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2008 | 3,071  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2009 | 2,206  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2010 | 2,092  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2011 | 2,341  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2012 | 1,834  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2013 | 1,551  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2014 | 1,893  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2015 | 2,089  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2016 | 3,272  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2017 | 2,315  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2018 | 1,995  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2019 | 1,937  |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2020 | 901    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2021 | 764    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 2022 | 822    |                                                                 |                                                                                                              |
|                  | 合計   | 42,407 |                                                                 |                                                                                                              |

※「食中毒統計（厚生労働省）」における病因物質別食中毒患者報告数

## （２）常在菌及びそのフルオロキノロン耐性菌による感染症の検討

牛及び豚の腸管に常在している大腸菌や腸球菌等の人の常在菌についても、牛及び豚にフルオロキノロン系抗菌性物質が投与された場合、フルオロキノロン耐性菌が選択される可能性が考えられる。

一般に、それらの菌は健康な人においては、牛及び豚由来の食品を介して感染症を

直接引き起こす可能性は低いと考えられる。

フルオロキノロン耐性を獲得した常在菌の悪影響としては、静脈留置針確保の患者や術後患者、免疫機能が低下した患者等の易感染者から易感染者への食品を介さない院内感染等が考えられる。

しかし、ある抗菌性物質に耐性を獲得した腸球菌による院内感染の事例や、家畜及び人から同一の薬剤耐性を獲得した腸内細菌目細菌が分離される等の報告もあることから、今後も大腸菌や腸球菌等の常在菌についても、薬剤耐性に係るモニタリング調査を継続し、フルオロキノロン耐性に関する知見を踏まえ、必要に応じてハザードとして特定する必要性について再検討する必要があると考えられる。

## 7. ハザードの特定

ハザードとして特定される感染症の原因菌は、牛及び豚に対する評価対象動物用医薬品の使用により薬剤耐性菌が選択され、人がその薬剤耐性菌に起因する感染症を発症した場合に、人用フルオロキノロン系抗菌性物質による治療効果が減弱又は喪失する可能性がある感染症の原因菌である。

牛及び豚の腸内細菌叢には、牛及び豚における下痢症の主な原因菌とはならないものの、人の健康を害する O157 等の腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターを保菌していることもある。したがって、牛及び豚の呼吸器感染症、消化管感染症（大腸菌症）及び乳房炎の治療のためにフルオロキノロン系抗菌性物質を投与した場合、フルオロキノロン系抗菌性物質の生体内薬物動態等を考慮すると、腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターにフルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌が選択される可能性があると考えられる。

したがって、国内の牛及び豚由来の畜産食品を介して伝播する可能性がある感染症であり、かつ人の医療分野において、フルオロキノロン系抗菌性物質による治療が推奨されている腸管感染症は、腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症であると考えられる。また、フルオロキノロン系抗菌性物質は、カンピロバクター感染症に対する推奨薬とはされていないが、感染性腸炎の初診時に、原因菌が特定されていない段階で投薬される場合があることから、カンピロバクターがフルオロキノロン耐性菌であった場合、人の治療に対して悪影響を及ぼすという可能性は否定できないと考えられた。

以上のことから、リスク評価すべきハザードとして、牛及び豚に対してフルオロキノロン系抗菌性物質を使用することにより薬剤耐性が選択された腸管出血性大腸菌<sup>3</sup>、サルモネラ及びカンピロバクターを特定した。

---

<sup>3</sup> 本評価書において「腸管出血性大腸菌」とは、「ベロ毒素（Verotoxin, VT）を産生する腸管出血性大腸菌」を指す。また、本評価書において、単に「大腸菌」とした場合、特段の記載がない限り、薬剤感受性の指標細菌（動物用抗菌性物質の評価において薬剤感受性の指標に広く用いられている細菌。動物の腸管に生息し、フードチェーンによって人に伝播される可能性はあるが、通常、人の食品由来感染症を起こさない細菌。（参照 1））としての大腸菌を指すものとする。

#### IV. 発生評価に関する知見

発生評価では、評価指針の第2章第2の1 発生評価に基づき、評価対象動物用医薬品が牛及び豚に使用された場合に、ハザードが選択される可能性及びその程度を評価する。また、発生評価の範囲は、評価対象動物用医薬品を牛及び豚に使用した時点から、当該家畜又は当該家畜から生産された畜産食品が農場を出るまでとする。

##### 1. 畜産現場におけるフルオロキノロン耐性の状況

###### (1) フルオロキノロン系抗菌性物質製剤の市販前後における耐性の状況（適用菌種）

フルオロキノロン系抗菌性物質製剤（ERFX、OBFX、DFLX、NFLX）の市販前後における健康畜及び病畜から分離された本剤の適用菌種に対する薬剤感受性が調査されている（表28～表31）。（参照36～39、103、170）

2008 及び 2009 年に国内で分離された豚胸膜肺炎由来野外分離 *A. pleuropneumoniae* 2 型（52 株）の MIC 範囲は  $\leq 0.13 \sim 0.5 \mu\text{g/mL}$  と報告されている。（参照103）また、第3版改訂に当たって、フルオロキノロン系抗菌性物質製剤（MBFX）の市販前後における本剤の適用菌種に対する薬剤感受性調査の結果が提出された。牛由来の *P. multocida* 及び *M. haemolytica* の MIC<sub>90</sub> は、市販前は  $<0.06 \mu\text{g/mL}$  であったが、市販1～6年後はそれぞれ  $1 \mu\text{g/mL}$  及び  $4 \mu\text{g/mL}$  であった。*M. bovis* の MIC<sub>90</sub> は、市販前は  $2 \mu\text{g/mL}$  であり、市販6年後は  $128 \mu\text{g/mL}$  と報告されている（表32）。

豚由来の *P. multocida* 及び *A. pleuropneumoniae* の MIC<sub>90</sub> は、市販前は  $<0.06 \mu\text{g/mL}$  で、市販6年後は、それぞれ  $0.12 \mu\text{g/mL}$  及び  $0.25 \mu\text{g/mL}$  と報告されている（表33）。（参照170）

表 28 ERFX 製剤の市販前後における牛由来菌株の薬剤感受性

| 菌種             | 調査時期<br>(菌株数) | MIC 範囲                  | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> | 耐性株数<br>(%) |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>E. coli</i> | 市販前 (208)     | 0.006～1.56              | 0.049             | 0.78              | 0 (0.0)     |
|                | 市販前 (61)      | 0.025～>1.56             | 0.05              | 0.8               | 2 (3.3)     |
|                | 市販前 (27)      | $\leq 0.04 \sim 1.56$   | 0.09              | 0.78              | 0 (0.0)     |
|                | 市販前 (81)      | 0.05～25                 | 0.1               | 0.78              | 6 (7.4)     |
|                | 市販前 (42)      | $\leq 0.025 \sim 1.56$  | $\leq 0.025$      | 0.39              | 0 (0.0)     |
|                | 市販前 (20)      | 0.05～0.2                | 0.05              | 0.2               | 0 (0.0)     |
|                | 市販前 (111)     | $\leq 0.025 \sim 3.13$  | $\leq 0.025$      | 0.39              | 0 (0.0)     |
|                | 市販前 (88)      | $\leq 0.1 \sim 3.13$    | 0.39              | 3.13              | 0 (0.0)     |
|                | 市販後 (20)      | $\leq 0.025 \sim 6.25$  | 0.025             | 3.13              | 1 (5.0)     |
|                | 市販後 (30)      | 0.025～12.5              | 0.05              | 0.78              | 1 (3.3)     |
|                | 市販後 (25)      | 0.025～>50               | 0.05              | 25                | 4 (16.0)    |
|                | 市販後 (25)      | $\leq 0.0125 \sim >50$  | 0.025             | 25                | 4 (16.0)    |
|                | 市販後 (20)      | $\leq 0.0125 \sim 3.13$ | 0.05              | 0.05              | 0 (0.0)     |
|                | 市販後 (24)      | $\leq 0.0125 \sim 12.5$ | 0.025             | 1.56              | 2 (8.3)     |
|                | 市販後 (61)      | $\leq 0.0125 \sim 50$   | 0.025             | 3.13              | 4 (6.6)     |
|                | 市販後 (47)      | $\leq 0.0125 \sim 25$   | 0.025             | 0.39              | 4 (8.5)     |

|                     |          |               |         |        |         |
|---------------------|----------|---------------|---------|--------|---------|
|                     | 市販後 (24) | 0.025～0.78    | 0.025   | 0.2    | 0 (0.0) |
| <i>P. multocida</i> | 市販前 (24) | ≤0.04～3.12    | 0.09    | 0.78   | 0 (0.0) |
|                     | 市販前 (17) | ≤0.0125～0.025 | ≤0.0125 | 0.025  | 0 (0.0) |
|                     | 市販前 (48) | ≤0.0125～0.05  | ≤0.025  | ≤0.025 | 0 (0.0) |
|                     | 市販前 (15) | 0.05～0.2      | 0.2     | 0.2    | 0 (0.0) |
|                     | 市販前 (20) | ≤0.0125       | ≤0.025  | ≤0.025 | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.1   | 0.025   | 0.05   | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.05  | 0.025   | 0.025  | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.2   | 0.025   | 0.1    | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.1   | 0.05    | 0.1    | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.1   | 0.025   | 0.1    | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (38) | ≤0.0125～0.05  | ≤0.0125 | 0.05   | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (10) | ≤0.0125～0.2   | 0.1     | 0.2    | 0 (0.0) |
|                     | 市販後 (20) | ≤0.0125～0.39  | 0.05    | 0.2    | 0 (0.0) |

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

※耐性株は 6.25  $\mu\text{g/mL}$  以上の MIC を示した場合とした。

※*E. coli* の菌株は、市販前については 1984～1990 年、市販後については 1992～1997 年に全国各地で分離した。

※*P. multocida* の菌株は、市販前については 1986～1990 年、市販後については 1992～1997 年に全国各地で分離した。

表 29 OBFX 製剤（牛及び豚の注射剤）の市販前後における豚由来菌株の薬剤感受性

| 菌種                         | 項目                | 調査時期<br>(菌株数) | OBFX         | ERFX          |
|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>A. pleuropneumoniae</i> | MIC 範囲            | 市販前 (42)      | ≤0.0125～0.05 | ≤0.0125～0.05  |
|                            |                   | 市販後 (58)      | ≤0.0125～0.2  | ≤0.0125～0.2   |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (42)      | 0.025        | 0.025         |
|                            |                   | 市販後 (58)      | ≤0.0125      | ≤0.0125       |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (42)      | 0.05         | 0.05          |
|                            |                   | 市販後 (58)      | 0.05         | 0.05          |
| <i>P. multocida</i>        | MIC 範囲            | 市販前 (30)      | ≤0.0125～0.05 | ≤0.0125～0.025 |
|                            |                   | 市販後 (52)      | ≤0.0125～0.2  | ≤0.0125～0.1   |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (30)      | 0.025        | 0.0125        |
|                            |                   | 市販後 (52)      | 0.025        | ≤0.0125       |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (30)      | 0.025        | 0.025         |
|                            |                   | 市販後 (52)      | 0.05         | 0.025         |
| <i>M. hyopneumoniae</i>    | MIC 範囲            | 市販前 (24)      | 0.1～0.2      | 0.05～0.2      |
|                            |                   | 市販後 (49)      | 0.025～0.39   | 0.0125～0.39   |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (24)      | 0.1          | 0.05          |
|                            |                   | 市販後 (49)      | 0.1          | 0.05          |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (24)      | 0.2          | 0.1           |
|                            |                   | 市販後 (49)      | 0.2          | 0.1           |
| <i>E. coli</i>             | MIC 範囲            | 市販前 (55)      | 0.05～1.56    | —             |
|                            |                   | 市販後 (230)     | 0.025～3.13   | —             |

|  |                   |           |      |   |
|--|-------------------|-----------|------|---|
|  | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (55)  | 0.1  | — |
|  |                   | 市販後 (230) | 0.1  | — |
|  | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (55)  | 1.56 | — |
|  |                   | 市販後 (230) | 0.2  | — |

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

※OBFX 製剤 (牛及び豚の注射剤) の市販前 (1970～1989 年分離 151 株) と市販後 (1994～1999 年分離 389 株) において出荷豚又は罹患豚から分離した。

表 30 DFLX 製剤の市販前後における豚由来菌株の薬剤感受性

| 菌種                         | 項目                | 調査時期 | DFLX                   | ERFX                    |
|----------------------------|-------------------|------|------------------------|-------------------------|
| <i>A. pleuropneumoniae</i> | MIC 範囲            | 市販前  | 0.025～0.39             | 0.025～0.2               |
|                            |                   | 市販後  | 0.025～1.56             | $\leq 0.006 \sim 0.78$  |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前  | 0.05                   | 0.025                   |
|                            |                   | 市販後  | 0.05                   | 0.025                   |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前  | 0.05                   | 0.05                    |
|                            |                   | 市販後  | 0.39                   | 0.2                     |
| <i>P. multocida</i>        | MIC 範囲            | 市販前  | 0.013～0.05             | $\leq 0.006 \sim 0.025$ |
|                            |                   | 市販後  | $\leq 0.006 \sim 0.78$ | $\leq 0.006 \sim 0.78$  |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前  | 0.025                  | 0.013                   |
|                            |                   | 市販後  | 0.013                  | 0.013                   |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前  | 0.05                   | 0.013                   |
|                            |                   | 市販後  | 0.05                   | 0.05                    |

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

※DFLX 製剤の市販前 (1992～1994 年分離 80 株) と市販後 (1996～2001 年分離 127 株) において罹患豚から分離した。

表 31 NFLX 製剤の市販前後における豚由来菌株の薬剤感受性

| 菌種                         | 項目                | 調査時期 (菌株数) | NFLX                |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <i>A. pleuropneumoniae</i> | MIC 範囲            | 市販前 (26)   | 0.05～0.39           |
|                            |                   | 市販後 (75)   | $< 0.06 \sim 2$     |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (26)   | 0.1                 |
|                            |                   | 市販後 (75)   | $< 0.06$            |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (26)   | 0.2                 |
|                            |                   | 市販後 (75)   | 0.12                |
| <i>P. multocida</i>        | MIC 範囲            | 市販前 (18)   | 0.2～0.78            |
|                            |                   | 市販後 (54)   | $< 0.06 \sim 4$     |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (18)   | 0.39                |
|                            |                   | 市販後 (54)   | $< 0.06$            |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (18)   | 0.78                |
|                            |                   | 市販後 (54)   | $< 0.06$            |
| <i>E. coli</i>             | MIC 範囲            | 市販前 (15)   | 0.05～0.39           |
|                            |                   | 市販後 (481)  | $< 0.06 \sim > 128$ |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (15)   | 0.2                 |
|                            |                   | 市販後 (481)  | $< 0.06$            |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (15)   | 0.2                 |

|  |  |           |       |
|--|--|-----------|-------|
|  |  | 市販後 (481) | <0.06 |
|--|--|-----------|-------|

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

※「市販前」は承認申請時の感受性調査によるデータ、「市販後」は再審査申請時の使用農場における感受性調査によるデータ

表 32 MBFX 製剤の市販前後における牛由来菌株の薬剤感受性

| 菌種                    | 項目                | 調査時期 (菌株数)       | MBFX               |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <i>P. multocida</i>   | MIC 範囲            | 市販前 (136)        | <0.06~0.5          |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (141) | $\leq 0.06 \sim 1$ |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (43)  | $\leq 0.06 \sim 1$ |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (114) | $\leq 0.06 \sim 1$ |
|                       | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (136)        | <0.06              |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (141) | $\leq 0.06$        |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (43)  | $\leq 0.06$        |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (114) | 1                  |
|                       | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (136)        | <0.06              |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (141) | 1                  |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (43)  | 1                  |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (114) | 1                  |
| <i>M. haemolytica</i> | MIC 範囲            | 市販前 (89)         | <0.06~0.5          |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (47)  | $\leq 0.06 \sim 8$ |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (44)  | $\leq 0.06 \sim 8$ |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (103) | $\leq 0.06 \sim 8$ |
|                       | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (89)         | <0.06              |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (47)  | 0.25               |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (44)  | 0.25               |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (103) | $\leq 0.06$        |
|                       | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (89)         | <0.06              |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (47)  | 4                  |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (44)  | 8                  |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (103) | 4                  |
| <i>M. bovis</i>       | MIC 範囲            | 市販前 (33)         | 0.5~8              |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (52)  | 0.5~128            |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (42)  | 0.5~64             |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (82)  | 0.5~>128           |
|                       | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (33)         | 1                  |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (52)  | 2                  |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (42)  | 2                  |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (82)  | 2                  |
|                       | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (33)         | 2                  |
|                       |                   | 市販後 1~2 年目 (52)  | 64                 |
|                       |                   | 市販後 3~4 年目 (42)  | 32                 |
|                       |                   | 市販後 5~6 年目 (82)  | 128                |

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

※「市販前」はマルボシル承認申請時の感受性調査によるデータ、「市販後」は使用農場における感受性調査によるデータ

表 33 MBFX 製剤の市販前後における豚由来菌株の薬剤感受性

| 菌種                         | 項目                | 調査時期 (菌株数)      | MBFX       |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <i>P. multocida</i>        | MIC 範囲            | 市販前 (54)        | <0.06~0.12 |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (23) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (34) | ≤0.06~0.25 |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (28) | ≤0.06~0.25 |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (54)        | <0.06      |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (23) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (34) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (28) | ≤0.06      |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (54)        | <0.06      |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (23) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (34) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (28) | 0.12       |
| <i>A. pleuropneumoniae</i> | MIC 範囲            | 市販前 (75)        | <0.06~1    |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (34) | ≤0.06~0.25 |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (52) | ≤0.06~0.25 |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (67) | ≤0.06~0.25 |
|                            | MIC <sub>50</sub> | 市販前 (75)        | <0.06      |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (34) | 0.12       |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (52) | ≤0.06      |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (67) | ≤0.06      |
|                            | MIC <sub>90</sub> | 市販前 (75)        | <0.06      |
|                            |                   | 市販後 1~2 年目 (34) | 0.12       |
|                            |                   | 市販後 3~4 年目 (52) | 0.25       |
|                            |                   | 市販後 5~6 年目 (67) | 0.25       |

※MIC の単位 : µg/mL

※「市販前」はマルボシル承認申請時の感受性調査によるデータ、「市販後」は使用農場における感受性調査によるデータ

**(2) 健康家畜由来細菌の抗菌性物質感受性調査 (JVARM)**

JVARM における健康家畜 (肥育牛、肥育豚、採卵鶏及び肉用鶏) 由来細菌の抗菌性物質感受性調査は、国内の都道府県を同じ細菌 (1 クールにつき、大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ又は腸球菌のうち 1 菌種を選定し実施) について、2007 年までは 4 ブロックにわけて 1 年に 1 ブロックずつ調査を行い、4 年で全国を調査するという体制 (1999 年 : 全国、2000~2003 年 : 第 1 クール、2004~2007 年 : 第 2 クール)、2008 年からは大腸菌及びカンピロバクター<sup>4</sup>について、2 ブロックに分けて 2 年で全国を調査する体制 (2008~2009 年 : 第 3 クール。2010~2011 年 : 第 4 クール。2012~2013 年 : 第 5 クール。2014~2015 年 : 第 6 クール。) となった。更に、2016 年からは、大腸菌及びカンピロバクターについて、農場ではなくと畜場又は食鳥処理

<sup>4</sup> 2008 年以降は、大腸菌、カンピロバクター及び腸球菌の 3 菌種について調査、腸球菌はハザードとして特定されていないため、記載をしていない。

場において採材し、分離した細菌の薬剤感受性を調査する体制に移行した。

なお、2010 年からは薬剤感受性試験法がそれまでの寒天平板希釈法から微量液体希釈法に、フルオロキノロン系の試験薬剤が ERFX から CPFEX に変更されている。

サルモネラについては、健康家畜の調査では分離できる菌株が極めて少数であることから、2008 年より国内の病性鑑定材料から当該年度に分離したサルモネラ菌株を積極的に収集し、耐性調査を全国的に実施している。

ERFX 又は CPFEX に対する各菌種の MIC 分布域及び耐性率等の結果は次のとおりである（表 34～表 37）。（参照 23、106）

## ① 大腸菌<sup>5</sup>

調査家畜全体（牛及び豚由来菌株）の MIC 分布域には大きな変動がみられず、1999～2020 年において感受性に大きな変化はないものと考えられた。また、耐性率は牛由来で 0.0～1.5%、豚由来で 0.0～4.4%の範囲で変動しており、大きな変動はないものと考えられた（表 34）。

なお、1999～2001 年に本調査で分離された腸管出血性大腸菌（牛由来 65 菌株、豚由来 25 菌株）における調査では、ERFX 又は OFLX に対する薬剤耐性（ブレイクポイント 3.13 µg/mL）は認められなかったと報告されている。（参照 40、106）また、2007～2008 年に健康家畜（肉用牛）から分離された腸管出血性大腸菌（O157 241 菌株、O26 11 菌株）における調査では、ERFX に対する薬剤耐性（ブレイクポイント 2 µg/mL）は認められなかったと報告されている。（参照 139）

---

<sup>5</sup> JVARМ では、薬剤耐性モニタリング調査の指標細菌としての大腸菌の薬剤耐性調査を実施している。

表 34 大腸菌における ERFX 又は CPFY 耐性の状況

|       | 牛及び豚由来合計  |          |         |                 |                 |                     | 牛由来       |         | 豚由来       |         |
|-------|-----------|----------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|
|       | 調査菌株数 (株) |          | 耐性率 (%) | MIC 最小値 (μg/mL) | MIC 最高値 (μg/mL) | ブレイクポイント (μg/mL)*** | 調査菌株数 (株) | 耐性率 (%) | 調査菌株数 (株) | 耐性率 (%) |
| 1999  | 714       | (全国)     | 1.4     | ≤0.05           | 25              | 3.13                | 356       | 0.3     | 358       | 0.0     |
| 2000  | 311       | (第1グループ) | 1       | ≤0.05           | 50              | 3.13                | 162       | 1.2     | 149       | 0.7     |
| 2001  | 324       |          | 0       | ≤0.125          | 0.5             | 2                   | 172       | 0.0     | 152       | 0.0     |
| 2002  | 315       |          | 1.3     | ≤0.125          | 32              | 2                   | 179       | 0.0     | 136       | 2.9     |
| 2003  | 254       |          | 2       | ≤0.125          | 32              | 2                   | 133       | 0.0     | 121       | 4.1     |
| 2004  | 260       |          | 1.5     | ≤0.125          | ≥32             | 2                   | 124       | 0.0     | 136       | 2.9     |
| 2005  | 290       | (第2グループ) | 1.4     | ≤0.125          | ≥32             | 2                   | 138       | 1.4     | 152       | 1.3     |
| 2006  | 275       |          | 0.4     | ≤0.125          | ≥32             | 2                   | 149       | 0.0     | 126       | 0.8     |
| 2007  | 236       |          | 0.8     | ≤0.125          | 8               | 2                   | 130       | 1.5     | 106       | 0.0     |
| 2008  | 433       |          | 0.7     | ≤0.125          | 16              | 2                   | 289       | 0.3     | 144       | 1.4     |
| 2009  | 403       | (第3グループ) | 0.7     | ≤0.125          | >32             | 2                   | 265       | 0.0     | 138       | 2.2     |
| 2010* | 433       | (第4グループ) | 0.5     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 293       | 0.0     | 140       | 1.4     |
| 2011* | 418       |          | 1.4     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 273       | 0.7     | 145       | 2.8     |
| 2012* | 442       | (第5グループ) | 0.9     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 299       | 1.0     | 143       | 0.7     |
| 2013* | 372       |          | 0.3     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 240       | 0.0     | 132       | 0.8     |
| 2014* | 418       | (第6グループ) | 0.5     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 284       | 0.0     | 134       | 1.5     |
| 2015* | 323       |          | 0.9     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 216       | 0.5     | 107       | 1.9     |
| 2016* | 348**     | —        | 1.4     | ≤0.03           | >4              | 4                   | 258**     | 0.4     | 90**      | 4.4     |
| 2017* | 335**     | —        | 0       | ≤0.03           | 0.5             | 4                   | 252**     | 0.0     | 83**      | 0.0     |
| 2018* | 272**     | —        | 0.7     | ≤0.03           | >4              | 4****               | 189**     | 0.5     | 83**      | 1.2     |
| 2019* | 368**     | —        | 0.8     | ≤0.03           | >4              | 4****               | 288**     | 0.3     | 80**      | 2.5     |
| 2020* | 346**     | —        | 0.6     | —               | —               | 4****               | 253**     | 0.4     | 93**      | 1.1     |

\* : 2010 年以降は ERFX に代わって CPFY が用いられている。

\*\* : 2016 年以降は、農場由来株ではなく、と畜場由来株の調査結果

\*\*\* : 1999～2000 年は Japanese Society of Chemotherapy (JSC)、2001 年以降は CLSI によるブレイクポイント

\*\*\*\* : CLSI による変更後のブレイクポイントは 1 μg/mL であるが、JVARM では変更前のブレイクポイントを採用。

## ② サルモネラ

1999 年から 2007 年にかけて実施された調査においては、家畜全体（牛及び豚由来菌株）の MIC 分布域には大きな変動がみられなかった。（表 35）。

表 35 サルモネラにおける ERFX 又は CPFY 耐性の状況

|      | 牛及び豚由来合計 |      |                |                |                           | ブレイクポイント (μg/mL)* | 耐性率(%) |
|------|----------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|
|      | 調査菌株数    |      | MIC 最小値(μg/mL) | MIC 最高値(μg/mL) | MIC <sub>90</sub> (μg/mL) |                   |        |
| 1999 | 11       | (全国) | ≤0.05          | 0.1            | 0.1                       | —                 | —      |
| 2000 | 48       |      | ≤0.125         | 0.5            | 0.25                      | 2                 | 0      |

|      |    |         |              |              |              |   |   |
|------|----|---------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 2001 | 8  | (第1クール) | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ |   |   |
| 2002 | 42 |         | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ |   |   |
| 2003 | 4  |         | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ |   |   |
| 2004 | 8  | (第2クール) | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | — | — |
| 2005 | 6  |         | $\leq 0.125$ | 0.25         | 0.25         | — | — |
| 2006 | 9  |         | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | — | — |
| 2007 | 7  |         | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | $\leq 0.125$ | — | — |

\* : CLSI によるブレイクポイント

### ③ カンピロバクター

牛からは主に *C. jejuni* が、豚からは主に *C. coli* がそれぞれ分離された（表 36、表 37）。

牛由来 *C. jejuni* の耐性率は、2000～2008 年では 2006 年の 0.0%を除き 8.8～30.3%の範囲で変動しており、大きな変動はないものと考えられた。2009～2013 年では、24.4～57.4%の範囲で変動していた。耐性率の全国データの比較では、第 1 版で評価した第 2 クール以降、第 3 及び第 4 クールでは第 2 クールと統計学的に有意な差は認められなかったが、第 5 クールにおいては、第 2 クールと統計学的な有意差が認められた。しかしながら、第 4 クールと第 5 クールの間には統計学的に有意な差は認められなかった。第 2 クールと第 5 クール間で有意な差が認められた理由は、2012 年の耐性率が他の年に比較して高かったためである。また、第 6 クールの耐性率は 40%であった。2016 年以降は、(2) 前文にあるとおり調査方法が変更になっているが、耐性率は、31.4%と低かった 2018 年を除き、44.4～62.7%の範囲で変動しており、耐性率の大きな上昇はないものと推察された。ただし、2019 年と 2020 年は 60%前後と比較的高めの耐性率となっている（表 36）。

豚由来 *C. coli* の耐性率は、1999～2008 年では 21.3～56.3%の範囲で変動しており、異なる調査地域におけるデータの比較ではあるが、調査を開始した 1999 年の 21.3%と 2007 年の 56.3%のデータ間にもみ統計学的に有意な差が認められた（表 37）。また、1999 年、第 1 クール（2000 年～2003 年）及び第 2 クール（2004 年～2007 年）の全国データの比較では、1999 年と第 2 クール間及び第 1 クールと第 2 クール間で統計学的に有意な差が認められた。第 2 クール以降では、2011 年における耐性率が例年に比べて上昇しているため、第 2 クールと第 4 クールの耐性率に統計学的な有意差が認められたが、第 2 クールと第 3 クール及び第 5 クール間で統計学的に有意な差は認められなかった。第 6 クールの耐性率は、52.6%であった。2016 年以降は、(2) 前文にあるとおり調査方法が変更になっており、耐性率はおおむね同程度（40.0～59.0%）の範囲で変動している。このことから、耐性率の大きな上昇はないものと推察された（表 37）。

表 36 牛由来 *C. jejuni* 及び *C. coli* における ERFX 又は CPFEX 耐性の状況

| 年     | <i>C. jejuni</i> |         |                      |           |       |         | <i>C. coli</i> |         |
|-------|------------------|---------|----------------------|-----------|-------|---------|----------------|---------|
|       | 調査菌株数 (株)        | 耐性率 (%) | ブレイクポイント (μg/mL)**** | 調査菌株数 (株) |       | 耐性率 (%) | 調査菌株数 (株)      | 耐性率 (%) |
| 1999  | 34               | 8.8     | 1.56                 | (全国)      | 34    | 8.8     | 0              | -       |
| 2000  | 43               | 16.3    | 1.56                 | (第 1 クール) | 131   | 18.3    | 3              | 33.3    |
| 2001  | 28               | 25      | 2                    |           |       |         | 5              | 80.0    |
| 2002  | 26               | 15.4    | 2                    |           |       |         | 2              | 0.0     |
| 2003  | 34               | 17.6    | 2                    |           |       |         | 2              | 50.0    |
| 2004  | 37               | 16.2    | 2                    | (第 2 クール) | 75    | 20.0    | 0              | -       |
| 2005  | 12               | 25.0    | 2                    |           |       |         | 0              | -       |
| 2006  | 4                | 0.0     | 2                    |           |       |         | 0              | -       |
| 2007  | 22               | 27.3    | 2                    |           |       |         | 5              | 60.0    |
| 2008  | 33               | 30.3    | 2                    | (第 3 クール) | 78    | 26.9    | 3              | 33.3    |
| 2009  | 45               | 24.4    | 2                    |           |       |         | 6              | 50.0    |
| 2010* | 51               | 37.3    | 4                    | (第 4 クール) | 102   | 33.3    | 3              | 33.3    |
| 2011* | 51               | 29.4    | 4                    |           |       |         | 9              | 55.6    |
| 2012* | 47               | 57.4    | 4                    | (第 5 クール) | 118   | 42.4*** | 5              | 40.0    |
| 2013* | 71               | 32.4    | 4                    |           |       |         | 4              | 100     |
| 2014* | 60               | 43.3    | 4                    | (第 6 クール) | 105   | 40.0    | 6              | 66.7    |
| 2015* | 45               | 35.6    | 4                    |           |       |         | 6              | 100     |
| 2016* | 81**             | 44.4    | 4                    | —         | 81**  | 44.4    | 88**           | 75.0    |
| 2017* | 97**             | 50.5    | 4                    | —         | 97**  | 50.5    | 59**           | 81.4    |
| 2018* | 35**             | 31.4    | 4                    | —         | 35**  | 31.4    | 39**           | 92.3    |
| 2019* | 117**            | 59.8    | 4                    | —         | 117** | 59.8    | 65**           | 90.8    |
| 2020* | 110**            | 62.7    | 4                    | —         | 110** | 62.7    | —              | —       |

\* : 2010 年以降は EFRX に代わって CPFEX が用いられている。

\*\* : 2016 年以降は、農場由来株ではなく、と畜場由来株の調査結果

\*\*\* : 第 2 クールの耐性率と比較して有意差あり ( $p<0.01$ )。

\*\*\*\* : 1999～2009 年は微生物学的ブレイクポイント、2010 年以降は CLSI によるブレイクポイント

表 37 豚由来 *C. jejuni* 及び *C. coli* における ERFX 又は CPFEX 耐性の状況

| 年    | <i>C. jejuni</i> |         |                      | <i>C. coli</i> |         |           |     |         |
|------|------------------|---------|----------------------|----------------|---------|-----------|-----|---------|
|      | 調査菌株数 (株)        | 耐性率 (%) | ブレイクポイント (μg/mL)**** | 調査菌株数 (株)      | 耐性率 (%) | 調査菌株数 (株) |     | 耐性率 (%) |
| 1999 | 3                | 33.3    | 1.56                 | 47             | 21.3    | (全国)      | 47  | 21.3    |
| 2000 | 1                | 0.0     | 1.56                 | 98             | 24.5    | (第 1 クール) | 289 | 27.7    |
| 2001 | 0                | -       | 2                    | 68             | 23.5    |           |     |         |
| 2002 | 2                | 100     | 2                    | 37             | 24.3    |           |     |         |
| 2003 | 0                | -       | 2                    | 86             | 34.9    |           |     |         |
| 2004 | 0                | -       | 2                    | 72             | 26.4    | (第 2 クール) | 213 | 37.6    |
| 2005 | 2                | 100     | 2                    | 49             | 30.6    |           |     |         |
| 2006 | 0                | -       | 2                    | 28             | 35.7    |           |     |         |
| 2007 | 0                | -       | 2                    | 64             | 56.3    |           |     |         |

|       |     |     |   |      |      |             |      |         |
|-------|-----|-----|---|------|------|-------------|------|---------|
| 2008  | 0   | -   | 2 | 42   | 40.5 | (第3<br>クール) | 104  | 45.2    |
| 2009  | 0   | -   | 2 | 62   | 48.4 |             |      |         |
| 2010* | 0   | -   | 4 | 62   | 43.5 | (第4<br>クール) | 107  | 55.1*** |
| 2011* | 1   | 100 | 4 | 45   | 71.1 |             |      |         |
| 2012* | 2   | 100 | 4 | 58   | 25.9 | (第5<br>クール) | 100  | 33.0    |
| 2013* | 2   | 0.0 | 4 | 42   | 42.9 |             |      |         |
| 2014* | 0   | -   | 4 | 59   | 49.2 | (第6<br>クール) | 97   | 52.6    |
| 2015* | 0   | -   | 4 | 38   | 57.9 |             |      |         |
| 2016* | 0** | -   | 4 | 39** | 59.0 | —           | 39** | 59.0    |
| 2017* | 0** | -   | 4 | 61** | 54.1 | —           | 61** | 54.1    |
| 2018* | 1** | -   | 4 | 29** | 58.6 | —           | 29** | 58.6    |
| 2019* | 0** | -   | 4 | 60** | 40.0 | —           | 60** | 40.0    |
| 2020* | -   | -   | 4 | 42** | 50.0 | —           | 42** | 50.0    |

\*：2010 年以降は EFRX に代わって CPFEX が用いられている。

\*\*：2016 年以降は、農場由来株ではなく、と畜場由来株の調査結果

\*\*\*：第 2 クールの耐性率と比較して有意差あり ( $p<0.01$ )。

\*\*\*\*：1999～2009 年は微生物学的ブレイクポイント、2010 年以降は CLSI によるブレイクポイント

### (3) 病畜由来細菌の抗菌性物質感受性調査 (JVARM)

1995 年度から製造物責任法対応として実施しているもので、各家畜保健衛生所で病性鑑定材料から分離した家畜の病原細菌を対象とした薬剤耐性調査である。

サルモネラについて、1999 年から 2007 年まで健康家畜を対象に調査していたが、分離できる菌株が極めて少数であることから、2008 年より国内の病性鑑定材料から当該年度に分離したサルモネラ菌株を積極的に収集し、耐性調査を全国的に実施している。

ERFX 又は CPFEX に対する各菌種の MIC 分布域及び耐性率等の結果は次のとおりである (表 38)。(参照 23、106)

#### ① サルモネラ

調査家畜全体 (牛及び豚由来菌株) の MIC 分布域には大きな変動がみられず (2010～2017 年で  $\leq 0.03 \sim 1.0 \mu\text{g/mL}$ )、また、2010 年以降の耐性率にも大きな変動はないものと推察された (0～3.3%)。フルオロキノロン系抗菌性物質に対して感受性を維持していると考えられた (表 38)。

表 38 サルモネラにおける ERFEX 又は CPFEX 耐性の状況

|       | 牛及び豚由来合計 |   |                                    |                                    |                                           |                                        |                 |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|       | 調査菌株数    |   | MIC<br>最小値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC<br>最高値<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC <sub>90</sub><br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | ブレイクポイント<br>( $\mu\text{g/mL}$ )<br>** | 耐性率(%)          |
| 2008  | 165      | — | $\leq 0.031$                       | 1                                  | 0.25                                      | 2                                      | 0.0             |
| 2009  | 106      | — | $\leq 0.125$                       | 1                                  | $\leq 0.125$                              | 2                                      | 0.0             |
| 2010* | 153      | — | $\leq 0.03$                        | 1                                  | 0.06                                      | 4                                      | 0.0(0.0)<br>*** |

|       |     |   |       |     |       |   |                 |
|-------|-----|---|-------|-----|-------|---|-----------------|
| 2011* | 113 | — | ≤0.03 | 1   | 0.125 | 4 | 0.0(1.8)<br>*** |
| 2012* | 167 | — | ≤0.03 | 1   | 0.25  | 4 | 0.0(3.0)<br>*** |
| 2013* | 116 | — | ≤0.03 | 0.5 | ≤0.03 | 4 | 0.0(0.0)<br>*** |
| 2014* | 121 | — | ≤0.03 | 1   | 0.06  | 4 | 0.0(0.8)<br>*** |
| 2015* | 125 | — | ≤0.03 | 1   | 0.25  | 4 | 0.0(0.8)<br>*** |
| 2016* | 126 | — | ≤0.03 | 1   | 0.06  | 1 | 1.6             |
| 2017* | 103 | — | ≤0.03 | 1   | 0.06  | 1 | 2.9             |
| 2018* | 121 | — | —     | —   | —     | 1 | 3.3             |
| 2019* | 126 | — | —     | —   | —     | 1 | 1.6             |
| 2020* | 104 | — | —     | —   | —     | 1 | 0.0             |
| 2021* | 80  | — | —     | —   | —     | 1 | 2.5             |

\*：2010 年以降は ERFX に代わって CPFEX が用いられている。

\*\*：CLSI によるブレイクポイント

\*\*\*：ブレイクポイントを 1 µg/mL とした場合の耐性率

## ② 大腸菌

国内の病性鑑定材料から 2001～2004 年に分離した *E. coli*（牛由来 57 菌株、豚由来 118 菌株）における調査では、ERFX に対する耐性率は、牛由来菌株で 10.3%、豚由来菌株で 11.9%であったと報告されている。（参照 42）2013～2021 年に病性鑑定材料から分離された *E. coli* の CPFEX に対する耐性率は、牛では 11.7～34.0%、豚では 15.7～36.1%と年次によって変動がみられるが、2001～2004 年の調査で報告された耐性率に比べて高く推移している（表 39）。（参照 106）

表 39 大腸菌における CPFEX 耐性の状況

|      | 牛及び豚由来合計 |                      |                |
|------|----------|----------------------|----------------|
|      | 調査菌株数    | ブレイクポイント*<br>(µg/mL) | 耐性率(%)         |
| 2013 | 215      | 4                    | 31.6           |
| 2014 | 160      | 4                    | 23.8           |
| 2015 | 155      | 4                    | 32.9           |
| 2016 | 179      | 4                    | 19.0           |
| 2017 | 213      | 4                    | 24.0           |
| 2018 | 208      | 4                    | 22.1           |
| 2019 | 196      | 1                    | 21.9 (18.8) ** |
| 2020 | 179      | 1                    | 24.6           |
| 2021 | 196      | 1                    | 23.5           |

\*：CLSI によるブレイクポイント

\*\*：ブレイクポイントを 4 µg/mL とした場合の耐性率

#### (4) 動物用医薬品としてフルオロキノロン系抗菌性物質製剤を使用した農場における薬剤耐性の状況（公衆衛生）

フルオロキノロン系抗菌性物質製剤を使用した施設において対象動物から分離した公衆衛生に係る菌に関する薬剤感受性調査の実施及びその結果についての報告が承認取得者に義務付けられている（表 40～表 48）。（参照 41、229）ERFX、DFLX、NFLX 又は OBFX を使用した施設における 2003、2005、2007 及び 2009 年の報告並びに MBFX を使用した施設における 2010～2011、2012～2013 及び 2014～2015 年に牛及び豚から分離した菌に関する薬剤感受性調査の報告が提出された。（参照 107～109、170、229）

##### ① 大腸菌

ERFX に対する薬剤耐性菌が牛及び豚ともに検出されており、2003 年及び 2005 年の耐性率は 0.0～6.4%の範囲で、JVARM の調査結果とほぼ同等であった。他のフルオロキノロン系抗菌性物質（OBFX、DFLX、DNFX、NFLX）に対しても、感受性が低下していると考えられる菌株が検出された。2007、2009 及び 2011 年に ERFX を使用した農場から牛及び豚由来 *E. coli* の耐性率は、0～24.4%の範囲だった（表 40、表 41）。

また、MBFX に対する薬剤耐性について、牛及び豚由来 *E. coli* の MIC<sub>90</sub> は、2010 年から 2015 年にかけて 8 µg/mL から 16 µg/mL の間で推移しており、上昇傾向は見られなかった。また、豚由来 *E. coli* の耐性率は、2010 年から 2015 年にかけて 12.7%～21.3%の間に推移しており、大きな上昇傾向は見られなかった（表 42）。このことから、感受性に大きな変化はないと推察された。（参照 170、229）

表 40 フルオロキノロン系抗菌性物質（ERFX、DFLX、NFLX）を使用した家畜又は農場における *E. coli* の薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2003 年    | 2005 年    | 2007 年             | 2009 年        | 2011 年       |
|------|----|------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--------------|
| ERFX | 牛  | 強制経口 | 農場数               | 23        | 51        | 89                 | 50            | 54           |
|      |    |      | 検体数               | 25        | 51        | 89                 | 50            | 54           |
|      |    |      | 菌株数               | 49        | 86        | 151                | 97            | 95           |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～1   | ≤0.06～1   | ≤0.06<br>～<br>>128 | ≤0.06<br>～0.5 | ≤0.06<br>～64 |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06     | ≤0.06     | ≤0.06              | ≤0.06         | ≤0.06        |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | ≤0.06     | 0.25      | 16                 | ≤0.06         | 2            |
|      |    |      | 耐性率(%)            | 0         | 1.2       | 10.6               | 0             | 12.6         |
| ERFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 56        | 64        | 131                | 89            | 56           |
|      |    |      | 検体数               | 56        | 64        | 131                | 89            | 56           |
|      |    |      | 菌株数               | 112       | 109       | 220                | 162           | 101          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～128 | ≤0.06～128 | ≤0.06<br>～128      | ≤0.06<br>～64  | ≤0.06<br>～64 |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06     | ≤0.06     | ≤0.06              | ≤0.06         | ≤0.06        |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | ≤0.06     | 0.5       | 16                 | ≤0.06         | 2            |

|      |   |    |                   |            |            |              |              |              |
|------|---|----|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |    | 耐性率(%)            | 3.6        | 6.4        | 12.7         | 1.9          | 11.9         |
| ERFX | 豚 | 注射 | 農場数               | 29         | 48         | 54           | 42           | 47           |
|      |   |    | 検体数               | 34         | 48         | 54           | 42           | 47           |
|      |   |    | 菌株数               | 67         | 83         | 92           | 77           | 78           |
|      |   |    | MIC 範囲            | ≤0.06      | ≤0.06~64   | ≤0.06<br>~64 | ≤0.06<br>~16 | ≤0.06<br>~32 |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06      | ≤0.06      | ≤0.06        | ≤0.06        | 0.5          |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | ≤0.06      | 0.25       | 0.5          | 0.5          | 16           |
|      |   |    | 耐性率(%)            | 0          | 2.4        | 4.3          | 3.9          | 24.4         |
| DFLX | 豚 | 飲水 | 農場数               | 2          | 2          |              |              |              |
|      |   |    | 検体数               | 60         | 65         |              |              |              |
|      |   |    | 菌株数               | 116        | 112        |              |              |              |
|      |   |    | MIC 範囲            | ≤0.06~>128 | 0.125~>128 |              |              |              |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | 4          | 4          |              |              |              |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | >128       | >128       |              |              |              |
| NFLX | 豚 | 混餌 | 農場数               | 128        | 10         |              |              |              |
|      |   |    | 検体数               | 674        | 152        |              |              |              |
|      |   |    | 菌株数               | 481        | 69         |              |              |              |
|      |   |    | MIC 範囲            | —          | <0.06~64   |              |              |              |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | <0.06      | <0.06      |              |              |              |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | —          | 16         |              |              |              |

※MIC の単位 : µg/mL

表 41 フルオロキノロン系抗菌性物質 (OBFX、DNFX) を使用した家畜又は農場における *E. coli* の薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2004 年      | 2006 年      |
|------|----|------|-------------------|-------------|-------------|
| OBFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 1           | 4           |
|      |    |      | 検体数               | 10          | 50          |
|      |    |      | 菌株数               | 20          | 84          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06~0.125 | ≤0.06~128   |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06       | ≤0.06       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 0.125       | 0.125       |
| OBFX | 豚  | 注射   | 農場数               | —           | 6           |
|      |    |      | 検体数               | —           | 60          |
|      |    |      | 菌株数               | —           | 53          |
|      |    |      | MIC 範囲            | —           | ≤0.06~128   |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | —           | 0.125       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | —           | 32          |
| DNFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 6           | 6           |
|      |    |      | 検体数               | 47          | 40          |
|      |    |      | 菌株数               | 94          | 78          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.063~>128 | ≤0.063~>128 |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.063      | ≤0.063      |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 64          | 32          |
| DNFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 6           | 9           |
|      |    |      | 検体数               | 47          | 36          |

|  |  |  |                   |            |           |
|--|--|--|-------------------|------------|-----------|
|  |  |  | 菌株数               | 84         | 66        |
|  |  |  | MIC 範囲            | ≤0.063～128 | ≤0.063～32 |
|  |  |  | MIC <sub>50</sub> | ≤0.063     | ≤0.063    |
|  |  |  | MIC <sub>90</sub> | 64         | 16        |

※MIC の単位：μg/mL

表 42 フルオロキノロン系抗菌性物質（MBFX）を使用した家畜又は農場における *E. coli* の薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2010～11 年 | 2012～2013 年 | 2014～2015 年 |
|------|----|------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| MBFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 25        | 8           | 52          |
|      |    |      | 検体数               | 75        | 65          | 65          |
|      |    |      | 菌株数               | 72        | 63          | 61          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～32  | ≤0.06～32    | ≤0.06～32    |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06     | ≤0.06       | ≤0.06       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 16        | 8           | 16          |
| MBFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 32        | 31          | 123         |
|      |    |      | 検体数               | 148       | 93          | 73          |
|      |    |      | 菌株数               | 134       | 89          | 71          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～64  | ≤0.06～32    | ≤0.06～16    |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06     | ≤0.06       | ≤0.06       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 8         | 16          | 8           |
|      |    |      | 耐性率 (%)           | 12.7      | 21.3        | 18.3        |

※MIC の単位：μg/mL

ブレイクポイント（微生物学的ブレイクポイント）は、2 μg/mL。

## ② サルモネラ

2004 年から 2006 年にかけて実施された DNFX 及び NFLX に対する薬剤感受性調査のための分離菌株数（豚由来のみ）は非常に少なかったが、分離された 8 菌株については、MIC 分布域から、フルオロキノロン系抗菌性物質（DNFX、NFLX）に対する感受性は維持されていると考えられた（表 43、表 44）。

また、第 3 版改訂に当たって提出された、2010 年から 2015 年にかけて実施された対象を豚とする MBFX に対する薬剤感受性調査においては、MIC<sub>90</sub> は、2010 年から 2011 年の調査では 0.5 μg/mL だったと報告されているのに対し、2014 年から 2015 年の報告では ≤0.06 μg/mL であった。また、第 5 版改訂に当たって提出された、豚由来サルモネラの耐性率は、2010 年から 2015 年にかけて 0%～24.0% の間で推移しており、上昇傾向は見られなかった。このことから感受性は維持されていると推察された（表 45）。

表 43 フルオロキノロン系抗菌性物質（DNFX）を使用した家畜又は農場におけるサルモネラの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目  | 2004 年 | 2006 年 |
|------|----|------|-----|--------|--------|
| DNFX | 豚  | 注射   | 農場数 | 6      | 9      |
|      |    |      | 検体数 | 47     | 36     |

|  |  |  |                   |        |   |
|--|--|--|-------------------|--------|---|
|  |  |  | 菌株数               | 2      | — |
|  |  |  | MIC 範囲            | ≤0.063 | — |
|  |  |  | MIC <sub>50</sub> | —      | — |
|  |  |  | MIC <sub>90</sub> | ≤0.063 | — |

※MIC の単位 : µg/mL

表 44 フルオロキノロン系抗菌性物質 (NFLX) を使用した家畜又は農場におけるサルモネラの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2003 年  | 2005 年 |
|------|----|------|-------------------|---------|--------|
| NFLX | 豚  | 混餌   | 農場数               | 128     | 10     |
|      |    |      | 検体数               | 674     | 152    |
|      |    |      | 菌株数               | 6       | —      |
|      |    |      | MIC 範囲            | <0.06~1 | —      |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | <0.06   | —      |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 1       | —      |

※MIC の単位 : µg/mL

表 45 フルオロキノロン系抗菌性物質 (MBFX) を使用した家畜又は農場におけるサルモネラの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2010~2011 年 | 2012~2013 年 | 2014~2015 年 |
|------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| MBFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 8           | 31          | 123         |
|      |    |      | 検体数               | 196         | 120         | 110         |
|      |    |      | 菌株数               | 25          | 15          | 20          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06~0.5   | ≤0.06~0.5   | ≤0.06       |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06       | ≤0.06       | ≤0.06       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 0.5         | 0.5         | ≤0.06       |
|      |    |      | 耐性率 (%)           | 24.0        | 13.3        | 0.0         |

※MIC の単位 : µg/mL

ブレイクポイント (微生物学的ブレイクポイント) は、0.25 µg/mL。

### ③ カンピロバクター

薬剤感受性調査のための分離菌株数が少ない場合が多かったが、ERFX に対する薬剤耐性菌が牛及び豚ともに発生しており、耐性率はおおむね数十%であった。他のフルオロキノロン系抗菌性物質 (OBFX、DNFX、NFLX) に対しても、感受性が低下していると考えられる菌株が検出された (表 46、表 47)。

2007、2009 及び 2011 年に ERFX を使用した農場から牛及び豚由来カンピロバクターについては、分離菌株数が少ない場合が多かったが、ERFX に対する耐性菌が牛及び豚に認められ、耐性率は約数十%だった。

第 3 版改訂に当たって提出された、2010 年から 2015 年にかけて実施されたカンピロバクターの MBFX に対する薬剤感受性調査においては、2014 年から 2015 年にかけて牛から分離された菌株において耐性率は 73.7%であった。2010 年から 2013 年にかけて分離された株については、微生物学的ブレイクポイントが設定できな

ったため耐性率は算出していないが、2010 年以降の MIC<sub>90</sub> は、牛において 16 µg/mL から変わっておらず感受性に大きな変化はないと推察された。なお、2010～2013 年にかけて分離された株について 2014～2015 年に設定された微生物学的ブレイクポイントを適用した場合の耐性率は、牛において 2012～2013 年に分離された株は 2 株と少なく、耐性率の単純な比較は難しいが、63.6%（2010～2011 年）及び 100%（2012～2013 年）となった。また、2010 年から 2015 年にかけて豚から分離された菌株において、MIC<sub>90</sub> は 16 µg/mL から変わっていなかった。また、第 5 版改訂に当たって提出された、豚から分離された菌株の耐性率については、2010 年から 2015 年にかけて 63.3%～83.3%の間で推移していた。これらのことから、感受性に大きな変化はないと推察された（表 48）。

表 46 フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場におけるカンピロバクターの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2003 年   | 2005 年  | 2007 年       | 2009 年                     | 2011 年                     |
|------|----|------|-------------------|----------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| ERFX | 牛  | 強制経口 | 農場数               | 23       | 51      | 89           | 50                         | 54                         |
|      |    |      | 検体数               | 25       | 51      | 89           | 50                         | 54                         |
|      |    |      | 菌株数               | 10       | 4       | 9            | 16                         | 5                          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～2  | ≤0.06～8 | ≤0.06<br>～32 | ≤0.06<br>～16               | ≤0.06<br>～16               |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | 0.5      | ≤0.06   | ≤0.5         | ≤0.06<br>～8 <sup>1)</sup>  | ≤0.06 <sup>3)</sup>        |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 2        | 8       | 32           | ≤0.06<br>～16 <sup>1)</sup> | 16 <sup>3)</sup>           |
|      |    |      | 耐性率 (%)           | 20       | 50      | 7.4          | 0～75 <sup>1)</sup>         | 0～25 <sup>3)</sup>         |
| ERFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 56       | 64      | 131          | 89                         | 56                         |
|      |    |      | 検体数               | 56       | 64      | 131          | 89                         | 56                         |
|      |    |      | 菌株数               | 24       | 10      | 18           | 16                         | 8                          |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06～16 | ≤0.06～8 | ≤0.06<br>～32 | ≤0.06<br>～16               | ≤0.06<br>～128              |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06    | ≤0.06   | ≤0.06        | ≤0.06<br>～8 <sup>1)</sup>  | ≤0.06 <sup>3)</sup>        |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 16       | 4       | 32           | ≤0.06<br>～16 <sup>1)</sup> | 16 <sup>3)</sup>           |
|      |    |      | 耐性率 (%)           | 25       | 30      | 27.8         | 0～80 <sup>1)</sup>         | 16.7～<br>100 <sup>2)</sup> |
| ERFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 29       | 48      | 54           | 42                         | 47                         |
|      |    |      | 検体数               | 34       | 48      | 54           | 42                         | 47                         |
|      |    |      | 菌株数               | 26       | 7       | 25           | 8                          | 20                         |
|      |    |      | MIC 範囲            | ≤0.06    | ≤0.06～2 | ≤0.06<br>～64 | ≤0.06<br>～32               | ≤0.06<br>～64               |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | ≤0.06    | ≤0.06   | ≤0.06        | ≤0.06<br>～8 <sup>1)</sup>  | ≤0.06<br>～32 <sup>1)</sup> |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | ≤0.06    | 2       | 32           | ≤0.06<br>～32 <sup>1)</sup> | ≤0.5～<br>64 <sup>1)</sup>  |

|      |   |    |                   |           |         |    |                          |                     |
|------|---|----|-------------------|-----------|---------|----|--------------------------|---------------------|
|      |   |    | 耐性率 (%)           | —         | —       | 24 | 0～<br>66.7 <sup>1)</sup> | 0～100 <sup>1)</sup> |
| NFLX | 豚 | 混餌 | 農場数               | 128       | 10      |    |                          |                     |
|      |   |    | 検体数               | 674       | 152     |    |                          |                     |
|      |   |    | 菌株数               | 452       | 67      |    |                          |                     |
|      |   |    | MIC 範囲            | <0.06～128 | 0.12～64 |    |                          |                     |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | 8         | 4       |    |                          |                     |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | 32        | 16      |    |                          |                     |

※MIC の単位 : µg/mL

- 1) : *Campylobacter coli*, *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter*sp. の各々に対する数値があるため、それらの最小値と最大値の範囲で示した。
- 2) : *C. jejuni*, *Campylobacter*sp. の各々に対する数値があるため、それらの最小値と最大値の範囲で示した。
- 3) : *C. jejuni*, *Campylobacter*sp. の各々に対する数値があるが、*Campylobacter*sp. は株数が 2 以下のため、*C. jejuni* の数値を示した。

表 47 フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場におけるカンピロバクターの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目                | 2004 年 | 2006 年   |
|------|----|------|-------------------|--------|----------|
| OBFX | 豚  | 注射   | 農場数               | —      | 6        |
|      |    |      | 検体数               | —      | 60       |
|      |    |      | 菌株数               | —      | 57       |
|      |    |      | MIC 範囲            | —      | ≤0.06～32 |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | —      | 0.25     |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | —      | 16       |
| DNFX | 牛  | 注射   | 農場数               | 6      | 6        |
|      |    |      | 検体数               | 47     | 40       |
|      |    |      | 菌株数               | 8      | 2        |
|      |    |      | MIC 範囲            | 0.5～16 | 32       |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | 4      | —        |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 16     | 32       |
| DNFX | 豚  | 注射   | 農場数               | 6      | 9        |
|      |    |      | 検体数               | 47     | 36       |
|      |    |      | 菌株数               | 8      | 10       |
|      |    |      | MIC 範囲            | 2～16   | 1～128    |
|      |    |      | MIC <sub>50</sub> | 2      | 64       |
|      |    |      | MIC <sub>90</sub> | 16     | 128      |

※MIC の単位 : µg/mL

表 48 フルオロキノロン系抗菌性物質 (MBFX) を使用した家畜又は農場におけるカンピロバクターの薬剤感受性

| 成分名  | 畜種 | 投与経路 | 項目  | 2010～2011 年 | 2012～2013 年 | 2014～2015 年 |
|------|----|------|-----|-------------|-------------|-------------|
| MBFX | 牛  | 注射   | 農場数 | 25          | 8           | 52          |
|      |    |      | 検体数 | 75          | 65          | 65          |
|      |    |      | 菌株数 | 11          | 2           | 19          |

|      |   |    |                   |          |          |          |
|------|---|----|-------------------|----------|----------|----------|
|      |   |    | MIC 範囲            | ≤0.06～32 | 8～16     | ≤0.06～16 |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | 8        | 8        | 8        |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | 16       | 16       | 16       |
|      |   |    | 耐性率 (%)           | (63.6)   | (100)    | 73.7     |
| MBFX | 豚 | 注射 | 農場数               | 32       | 31       | 123      |
|      |   |    | 検体数               | 148      | 93       | 73       |
|      |   |    | 菌株数               | 79       | 42       | 23       |
|      |   |    | MIC 範囲            | ≤0.06～32 | ≤0.06～32 | ≤0.06～32 |
|      |   |    | MIC <sub>50</sub> | 8        | 8        | 8        |
|      |   |    | MIC <sub>90</sub> | 16       | 16       | 16       |
|      |   |    | 耐性率 (%)           | 63.3     | 83.3     | 69.6     |

※MIC の単位：μg/mL

ブレイクポイント（微生物学的ブレイクポイント）は、牛が 2 mg/L（2014～2015 年に分離された株により設定）であり、2010 年～2013 年までに分離された株については、当該ブレイクポイントを遡って適用した場合の耐性率を示している。豚については、2010～2011 年は>1 μg/mL、2012～2013 年は>0.5 μg/mL、2014～2015 年は 1 μg/mL。

#### （５）家畜分野におけるフルオロキノロン耐性に関するその他の知見

2006～2009 年に山口県で子牛の口腔内スワブから分離された志賀毒素産生大腸菌（STEC）（186 頭中 24 頭から分離（12.9%））27 株中 5 株（18.5%）が CRFX 耐性であったと報告されている。（参照 188）また、2011～2013 年に国内の大型酪農場で子牛 83 頭の直腸便から分離した大腸菌 174 株中 95 株（54.6%）がディスク拡散法により OFLX 耐性を示した。耐性株に対する ERFX の MIC の範囲は 4～>128 μg/mL であり、MIC >128 μg/mL の株が 78.6%を占めたと報告されている。（参照 189）

2002～2005 年に国内で分離された *S. Typhimurium* の牛臨床由来 104 菌株及び豚臨床由来 48 菌株の調査において、高度な ERFX 耐性（MIC 16 μg/mL）が牛由来の 1 株で報告されている。また、国内で分離された多剤耐性サルモネラ系統の調査においても、牛由来 1 株（2001 年）がフルオロキノロン耐性（CPFX の MIC 24 μg/mL、NFLX の MIC 32 μg/mL）を示したと報告されている。（参照 43、44）さらに、[IV 1（3）]に示したように国内の牛の病性鑑定材料から分離された *Salmonella* spp.においても少数ではあるが、フルオロキノロン耐性株（CPFX の MIC 1 μg/mL）が検出されている。（参照 106）

OBFX 製剤については、投与前後における *E. coli* の薬剤感受性の変化が調査されている（表 49～表 51）。（参照 37）

牛乳房炎治療のための MBFX 製剤の投与前後における乳房炎由来大腸菌の薬剤感受性の変化については、投与前の MBFX の MIC 範囲は≤0.063～32 μg/mL だったが、投与 16 日後は≤0.063～0.25 μg/mL だった（表 52）。（参照 170）

第 5 版改訂に当たって、豚細菌性下痢症治療のための MBFX 製剤の投与前後における細菌性下痢症由来大腸菌の薬剤感受性の変化が調査されている。投与前の MBFX の MIC 範囲は≤0.063～8 μg/mL だったが、投与 3 日後は≤0.063～32 μg/mL だった（表 53）。（参照 229）

表 49 OBFX 製剤の投与前後における豚糞便由来菌株の薬剤感受性 (MIC) ①

| 菌種             | 調査時期      | OBFX      | ERFX        |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>E. coli</i> | 投与前       | 0.05～0.78 | 0.0125～0.2  |
|                | 最終投与 6 日後 | 0.05～3.13 | 0.0125～0.78 |

※単位：μg/mL

※投与方法：5 mg/kg 体重を 3 日間飲水投与

※調査菌株数は各区 15 菌株

表 50 OBFX 製剤の投与前後における豚糞便由来菌株の薬剤感受性 (MIC) ②

| 菌種             | 調査時期       | MIC 範囲     | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> |
|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| <i>E. coli</i> | 投与前        | 0.025～0.2  | 0.1               | 0.2               |
|                | 投与期間中      | 0.05～6.25  | 0.2               | 3.13              |
|                | 最終投与 1 日後  | 0.025～>100 | 0.78              | 50                |
|                | 最終投与 7 日後  | 0.025～0.39 | 0.1               | 0.39              |
|                | 最終投与 14 日後 | 0.1～1.56   | 0.1               | 0.78              |

※単位：μg/mL

※投与方法：5 mg/kg 体重を 3 日間飲水投与

※調査菌株数は各区 32 菌株

表 51 OBFX 製剤の投与前後における豚房床面由来菌株の薬剤感受性 (MIC)

| 菌種             | 投与量         | 調査時期       | OBFX       | ERFX        |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| <i>E. coli</i> | —           | 投与前        | 0.025～0.39 | 0.0125～0.39 |
|                | 5 mg/kg 体重  | 最終投与 5 日後  | 0.05～0.1   | 0.025～0.1   |
|                |             | 最終投与 1 か月後 | 0.025～0.1  | 0.0125～0.05 |
|                | 10 mg/kg 体重 | 最終投与 5 日後  | 0.025～0.2  | 0.025～0.2   |
|                |             | 最終投与 1 か月後 | 0.025～0.1  | 0.0125～0.05 |

※MIC の単位：μg/mL

※投与方法：3 日間飲水投与

※*E. coli* の調査菌株数は、投与前：15 菌株、最終投与 5 日後：4～5 菌株、最終投与 1 か月後：6 菌株

表 52 MBFX 製剤の投与前後における牛乳房炎由来菌株の薬剤感受性 (MIC)

| 菌種             | 投与群                               | 調査時期       | 菌株数 | MBFX        | ERFX        |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----|-------------|-------------|
| <i>E. coli</i> | MBFX<br>静脈内<br>10 mg/kg<br>体重 1 回 | 投与前        | 16  | ≤0.063～32   | ≤0.063～>128 |
|                |                                   | 投与 9 日後    | 5   | ≤0.063      | ≤0.063      |
|                |                                   | 投与 16 日後   | 2   | ≤0.063～0.25 | ≤0.063      |
|                | CEZ<br>静脈内<br>5 mg/kg<br>体重 1 回/  | 投与前        | 5   | ≤0.063～0.5  | ≤0.063～0.5  |
|                |                                   | 最終投与 9 日後  | 2   | ≤0.063～8    | ≤0.063～16   |
|                |                                   | 最終投与 16 日後 | 1   | ≤0.063      | ≤0.063      |

|  |            |    |  |  |  |
|--|------------|----|--|--|--|
|  | 日 3 日<br>間 | 日後 |  |  |  |
|--|------------|----|--|--|--|

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

表 53 MBFX 製剤の投与前後における豚細菌性下痢症由来菌株の薬剤感受性 (MIC)

| 菌種             | 投与群                              | 調査時期    | 菌株数 | MBFX                 | MIC <sub>50</sub> | MIC <sub>90</sub> |
|----------------|----------------------------------|---------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>E. coli</i> | MBFX<br>筋肉内<br>8 mg/kg<br>体重 1 回 | 投与前     | 69  | $\leq 0.063 \sim 8$  | $\leq 0.063$      | 0.5               |
|                |                                  | 投与 3 日後 | 40  | $\leq 0.063 \sim 32$ | 0.5               | 8                 |

※MIC の単位 :  $\mu\text{g/mL}$

また、2012 年度から 2015 年度に農林水産省で実施したと畜場における健康家畜由来細菌の薬剤耐性菌モニタリングにおける、牛及び豚由来大腸菌及びカンピロバクターの CPFY に対する耐性率は表 54 に示すとおりである。(参照 140)

表 54 と畜場における牛及び豚由来大腸菌及びカンピロバクターの CPFY 耐性の状況 (2012～2015 年)

| 菌種               | 動物種 | 調査年  | 調査株数 | MIC 範囲<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC <sub>50</sub><br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | MIC <sub>90</sub><br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | 耐性<br>株数 | 耐性率  |
|------------------|-----|------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|
| <i>E. coli</i>   | 牛   | 2012 | 248  | $\leq 0.03 \sim 0.5$           | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 0        | 0.0  |
|                  |     | 2013 | 341  | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 2        | 0.6  |
|                  |     | 2014 | 263  | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 2        | 0.8  |
|                  |     | 2015 | 274  | $\leq 0.03 \sim 1$             | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 0        | 0.0  |
|                  | 豚   | 2012 | 195  | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 3        | 1.5  |
|                  |     | 2013 | 127  | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | 0.06                                      | 1        | 0.8  |
|                  |     | 2014 | 93   | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | 0.25                                      | 2        | 2.2  |
|                  |     | 2015 | 96   | $\leq 0.03 \sim > 4$           | $\leq 0.03$                               | $\leq 0.03$                               | 9        | 4.9  |
| <i>C. jejuni</i> | 牛   | 2012 | 82   | 0.06～64                        | 0.25                                      | 16                                        | 28       | 34.1 |
|                  |     | 2013 | 143  | $\leq 0.03 \sim > 64$          | 0.25                                      | 16                                        | 42       | 29.4 |
|                  |     | 2014 | 132  | 0.06～>64                       | 0.5                                       | 32                                        | 65       | 49.2 |
|                  |     | 2015 | 157  | $\leq 0.03 \sim 64$            | 0.25                                      | 16                                        | 64       | 40.8 |
|                  | 豚   | 2014 | 0    | —                              | —                                         | —                                         | —        | —    |
|                  |     | 2015 | 0    | —                              | —                                         | —                                         | —        | —    |
| <i>C. coli</i>   | 牛   | 2014 | 47   | 0.12～64                        | 16                                        | 32                                        | 37       | 78.7 |
|                  |     | 2015 | 81   | 0.25～64                        | 16                                        | 32                                        | 59       | 72.8 |
|                  | 豚   | 2013 | 106  | 0.06～>64                       | 1                                         | 32                                        | 49       | 46.2 |
|                  |     | 2014 | 93   | 0.12～64                        | 8                                         | 32                                        | 47       | 50.5 |
|                  |     | 2015 | 65   | 0.12～64                        | 0.5                                       | 32                                        | 31       | 47.7 |

※ ブレイクポイントは 4  $\mu\text{g/mL}$

フランスでは、2004年に豚へのERFXの経口投与<sup>6</sup>により、投与終了7日後からフルオロキノロン耐性*C. coli*が選択されるとの報告があった。(参照 164) また、国内では、2014年に承認されている用法・用量でのERFX（筋肉内注射<sup>7</sup>）及びNFLX（経口<sup>8</sup>）の投与により、投与開始3又は4日後から豚の生体内でERFX耐性カンピロバクター<sup>9</sup>が選択されたという報告があった。(参照 141)

スイスでは、2006年に、豚由来*C. coli*野外分離株の分子疫学的な解析において、特定の遺伝子型の耐性菌が広まっているのではなく、それぞれの農場で選択圧により耐性を獲得している可能性が示唆されたとの報告があった。(参照 165)

インドでは、山羊へのMBFX筋肉内投与（5日間）により、投与開始4日および6日後に一過性に糞便中の大腸菌数の減少とMBFX耐性菌の優勢化がみられ、耐性株には*gyrA*遺伝子のQRDR内の変異及びプラスミド媒介性キノロン耐性（plasmid-mediated quinolone resistance：PMQR）遺伝子の保有が認められることが報告されている。(参照 190)

米国では、子牛へのDNFX皮下投与により、腸管内に定着していたフルオロキノロン耐性*C. jejuni*の選択が起きることが報告されている。(参照 191)

米国での2009～2018年の調査において、食料生産動物用のフルオロキノロンの販売量の増加に伴って、市販の肉類におけるキノロン耐性非チフス性サルモネラの検出率が増加し、販売量の増加がみられた2013～2018年における牛肉及び豚肉からのキノロン耐性非チフス性サルモネラの検出率とフルオロキノロン販売量の間の相関係数は、牛肉で0.67（ $n=6$ ,  $p=0.14$ ）、豚肉で0.80（ $n=6$ ,  $p=0.05$ ）であった。(参照 192)

## 2. フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性菌及び薬剤耐性決定因子の出現並びに選択の可能性

### （1）フルオロキノロン耐性の獲得の可能性

MICの4倍濃度におけるOFLX及びCPFXに対する*E. coli*の耐性菌出現頻度は $<1.0 \times 10^{-9}$ ～ $2.7 \times 10^{-8}$ であった。*in vitro*における*E. coli*の耐性獲得（増量継代法）が、OFLX、CPFX及びNFLXについて試験されており、7代の継代培養後、MICが2～8倍に上昇したと報告されている。(参照 45)

また、MICの4倍濃度におけるOFLX及びCPFXに対する*E. coli*の耐性菌出現頻度は $<2.2 \times 10^{-9}$ ～ $5.2 \times 10^{-9}$ と低く、その濃度で選択された耐性菌のMICも、選択濃度の2～4倍であったという報告もある。(参照 21)

*in vitro*におけるOBFXに対する自然耐性菌の出現頻度が、黄色ブドウ球菌（*S. aureus*）や*E. coli*等6菌種において調査されており、ほとんどの菌種で $10^{-9}$ 以下と低頻度であった。また、健康豚由来の*E. coli*、*E. faecalis*等を用いた*in vitro*耐性獲得試験を実施したところ、各菌株を20代継代した株において、MICの上昇は2倍以下であった。(参照 37)

MBFXに対する*E. coli*の牛及び豚由来各3株の*in vitro*（MICの4倍及び8倍濃

<sup>6</sup> 5週齢、15 mg/頭/日、5日間

<sup>7</sup> 18日齢、5 mg/kg 体重/日、5日間

<sup>8</sup> 18日齢、5 mg/kg 体重/日、5日間

<sup>9</sup> 菌種不明

度)における耐性出現頻度は以下のとおりであった。

*E. coli* 牛由来株 : MIC の 4 倍及び 8 倍濃度において  $<5.3 \times 10^{-8} \sim <7.8 \times 10^{-8}$

*E. coli* 豚由来株 : MIC の 4 倍濃度において 2 株では  $<3.5 \times 10^{-8} \sim <5.0 \times 10^{-8}$ 、1 株において  $7.9 \times 10^{-8}$  で耐性株 (MIC 1.0  $\mu\text{g/mL}$ ) が出現し、MIC の 8 倍濃度において  $<3.5 \times 10^{-8} \sim <7.9 \times 10^{-8}$  (参照 170)

*C. jejuni* の *in vitro* における CPFEX に対する耐性株出現頻度は、CPFEX 濃度が MIC の 5 倍濃度 (0.625  $\mu\text{g/mL}$ ) のとき  $1.17 \times 10^{-6}$  であった。(参照 142) また、別の報告では、CPFEX 濃度が 1  $\mu\text{g/mL}$  の時の *C. jejuni* の基準株、鶏由来株及び牛由来株における耐性菌出現頻度は  $4.2 \times 10^{-9} \sim 2.9 \times 10^{-6}$ 、同じ濃度での *C. coli* の鶏由来株及び豚由来株における耐性菌出現頻度は  $1.3 \times 10^{-8} \sim 7.0 \times 10^{-3}$  であり、(参照 143) 大腸菌やサルモネラと比較して高い頻度を示す株が認められた。カンピロバクターの耐性獲得頻度を決定づける要素として、薬物排泄ポンプの関与が示されている。排泄ポンプが機能しない株を使用して、*in vitro* での耐性獲得状況を比較したところ、排泄ポンプが機能しない株は、フルオロキノロン耐性の出現頻度が 1,000 分の 1 に低下していた。また、野外株ではフルオロキノロンのばく露の濃度による変異頻度の変動が小さかったが、ポンプが機能しない株では、ばく露の濃度が高くなると変異頻度が 1,000 分の 1 から 10,000 分の 1 に低下していた。(参照 142)

## (2) キノロン耐性遺伝子がフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC に与える影響

キノロン耐性遺伝子は互いに相加・相乗効果を持ち、DNA ジャイレースやトポイソメラーゼ IV の変異の程度に応じて耐性度が上昇したり、他の耐性遺伝子を獲得したりすることにより、さらに耐性度が上昇することが知られている。

また、プラスミド上に存在する *qnr* 遺伝子、*aac(6')-Ib-cr* 遺伝子及び *qepA* 遺伝子は、MIC の上昇に対する作用は低いものの、フルオロキノロン系抗菌性物質の存在下において、*gyrA* 遺伝子や *parC* 遺伝子の変異によるフルオロキノロン耐性を獲得した突然変異体の選択を促進する効果があると報告されている。(参照 30、46)

### ① 大腸菌における *gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子が MIC に与える影響

*gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子の変異程度により、フルオロキノロン系抗菌性物質 (NFLX、CPFEX 等 6 種類) の MIC がどのように上昇するかが調査されている。*gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子を持たない株の MIC (0.01~0.06  $\mu\text{g/mL}$ ) と比較すると、*gyrA* 遺伝子 (一か所の変異) により約 10 倍、*gyrA* 遺伝子 (一か所の変異) に *parC* 遺伝子 (一~二か所の変異) が加わると約 10~100 倍、*gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子 (それぞれ二か所変異) により約 1,000~10,000 倍に、MIC が上昇すると報告されている。(参照 47)

### ② 大腸菌におけるプラスミド上の *qnr* 遺伝子及び *aac(6')-Ib-cr* 遺伝子が MIC に与える影響

*qnr* 遺伝子を持たない株のフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC<sub>90</sub> (CPFEX : 0.008  $\mu\text{g/mL}$ 、LVFX : 0.015  $\mu\text{g/mL}$ ) は、*qnr* 遺伝子を持つことにより、CPFEX 及び LVFX ではともに約 30 倍 (調査したフルオロキノロン系抗菌性物質全体では約 16~125

倍)に上昇すると報告されている。(参照 30)

同様に、*aac(6')-Ib-cr* 遺伝子を持たない株が、この遺伝子を持つことにより、CPFX 及び NFLX の MIC が約 3~4 倍に上昇することが報告されている。(参照 30)

これらの耐性遺伝子は相加的な効果があり、耐性遺伝子を持たない株 (CPFX の MIC : 0.008 µg/mL) が *qnr* 遺伝子を持つことにより、CPFX の MIC は 0.125~0.25µg/mL に上昇し、さらに *qnr* 遺伝子及び *aac(6')-Ib-cr* 遺伝子の両方を持つと、CPFX の MIC は 1.0~2.0 µg/mL に上昇することが報告されている。(参照 31)

### ③ 大腸菌におけるプラスミド上の *qepA* 遺伝子が MIC に与える影響

*qepA* 遺伝子を持たない株のフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC (ERFX 及び NFLX : 0.03 µg/mL) は、*qepA* 遺伝子を持つことにより、約 1~32 倍に上昇すると報告されている。(参照 48)

### ④ 大腸菌におけるプラスミド上の *oqxAB* 遺伝子が MIC に与える影響

*oqxAB* 遺伝子を持たない株のフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC (CPFX : 0.0078µg/mL、NFLX : 0.0313 µg/mL) は、*oqxAB* 遺伝子を持つことにより、約 32~64 倍に上昇し、同時に複数の抗菌性物質 (オラキンドックス、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、トリメトプリム等) の MIC の上昇 (約 64~128 倍) がみられると報告されている。(参照 193)

### ⑤ 大腸菌におけるプラスミド上の *crpP* 遺伝子が MIC に与える影響

*crpP* 又は *crpP* 相同遺伝子を持たない株のフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC (CPFX : 0.004 µg/mL) は、当該遺伝子を持つことにより、約 15~30 倍に上昇すると報告されている。(参照 194)

### ⑥ 大腸菌におけるプラスミド上の *ramAp* 遺伝子が MIC に与える影響

*ramAp* 遺伝子を持たない株のフルオロキノロン系抗菌性物質の MIC (CPFX : ≤ 0.015 µg/mL) は、当該遺伝子を持つことにより、約 4 倍に上昇すると報告されている。(参照 189)

以上のように、フルオロキノロン系抗菌性物質の継続した使用により、ある耐性遺伝子を保有した細菌が、さらに他の耐性遺伝子を保有することで、その MIC がさらに上昇し、結果として、ハザードが選択される可能性が高くなると考えられる。

## (3) フルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性決定因子の細菌間での伝達の可能性

*gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子がプラスミドにより伝達される可能性は低いと考えられているが、最近、染色体上で変異した *gyrA* 遺伝子及び *parC* 遺伝子が高頻度伝達性プラスミドの共存下で伝達されるという、大腸菌を用いた実験が報告されている。(参照 226)

また、フルオロキノロン耐性決定因子である *qnr* 遺伝子、*aac(6')-Ib-cr* 遺伝子、*qepA*

遺伝子及び *oqxAB* 遺伝子等はプラスミド上にあることから、細菌間で伝達される。  
(参照 31、32、49、184、185)

人臨床分野における *qnr* 遺伝子については、国内の腸内細菌目細菌 441 株の調査 (2002 年) では、*Enterobacterspp.*及び *Citrobacterspp.*から各 1 株が検出されている他、中国で分離されたキノロン高度耐性大腸菌のうち約 8%から検出されている。  
*qepA* 遺伝子については、国内の臨床分野から分離された大腸菌 751 株 (2002～2006 年) の調査では、*qepA* 遺伝子を保有している大腸菌は 0.3% (2 株) であったと報告されている。また、これらの伝達性キノロン耐性遺伝子は、海外における動物由来 *E. coli* で報告されている他、国内においても、*qnr* 遺伝子が牛由来 *S. Typhimurium* で報告されている (参照 49～53)。

国内の動物由来及び人臨床由来大腸菌及びサルモネラのプラスミド性フルオロキノロン耐性遺伝子の検出状況を検索し、その結果を表 55 に示した。(参照 195)

表 55 国内の動物由来及び人臨床由来等大腸菌及びサルモネラのプラスミド性フルオロキノロン耐性遺伝子の検出状況

| 調査年           | 対象菌種                                                   | 由来           | 耐性遺伝子                                                             | 検出頻度：<br>陽性株数/供試株数<br>(陽性率)                              | 参照<br>文献 |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 2004-<br>2007 | <i>E. coli</i>                                         | 鶏<br>(大腸菌症)  | <i>aac(6')-Ib-cr</i>                                              | 1/117 (0.9%)                                             | 参照 196   |
| 2008-<br>2009 | <i>E. coli</i>                                         | 鶏<br>(大腸菌症等) | <i>aac(6')-Ib-cr</i><br><i>oqxAB</i>                              | 3/92 (3.3%)<br>2/92 (2.2%)                               | 参照 197   |
| 2003-<br>2007 | <i>S. Typhimurium</i>                                  | 牛<br>豚<br>鶏  | <i>qnrS1</i>                                                      | 2/156 (1.3%)<br>0/62<br>0/7                              | 参照 198   |
| 2013          | <i>S. Typhimurium</i><br>単相変異株                         | 牛            | <i>qnrS1</i>                                                      | 1 株 (WGS)                                                | 参照 199   |
| 2013<br>2016  | <i>S. Typhimurium</i><br>単相変異株                         | 牛            | <i>aac(6')-Ib-cr</i>                                              | 2 株 (WGS)                                                | 参照 200   |
| 2005-<br>2006 | <i>E. coli</i> (ESBL 産生)                               | 人<br>(臨床)    | <i>qnrA1</i><br><i>aac(6')-Ib-cr</i>                              | 3/46 (6.5%)<br>6/46 (13.0%)                              | 参照 201   |
| 2009          | <i>E. coli</i><br>(ExPEC)                              | 人<br>(臨床)    | <i>aac(6')-Ib-cr</i>                                              | 2/140 (1.4%)                                             | 参照 202   |
| 2008-<br>2011 | <i>E. coli</i> (ESBL 産生)                               | 人<br>(臨床)    | <i>qnrB</i><br><i>qnrS</i><br><i>aac(6')-Ib-cr</i><br><i>qepA</i> | 1/71 (1.4%)<br>1/71 (1.4%)<br>6/71 (8.4%)<br>2/71 (2.8%) | 参照 203   |
| 2008-<br>2011 | <i>E. coli</i><br>(ExPEC)                              | 人<br>(臨床)    | <i>qnrA1</i><br><i>aac(6')-Ib-cr</i><br><i>qepA</i>               | 1/126 (0.8%)<br>11/126 (8.7%)<br>2/126 (1.6%)            | 参照 204   |
| 2015-<br>2016 | <i>E. coli</i><br>(CRE( <i>bla</i> <sub>IMP-6</sub> )) | 人<br>(臨床)    | <i>qnrB</i><br><i>qnrS</i><br><i>aac(6')-Ib-cr</i>                | 1/2 (50%)<br>1/2 (50%)<br>2/2 (100%)                     | 参照 205   |
| 2008          | <i>E. coli</i>                                         | 人<br>(臨床)    | <i>qnrS1</i><br><i>oqxAB</i>                                      | 1 株 (WGS)                                                | 参照 206   |

|      |                       |            |              |     |        |
|------|-----------------------|------------|--------------|-----|--------|
| 2017 | <i>S. Senftenberg</i> | 人（食品生産従事者） | <i>qnrS1</i> | 1 株 | 参照 207 |
|------|-----------------------|------------|--------------|-----|--------|

以上のように、キノロン耐性遺伝子は細菌間で伝達される可能性があり、フルオロキノロン系抗菌性物質の使用により、ある耐性遺伝子を保有した細菌が他の細菌に対して耐性遺伝子を伝達することにより、MIC が上昇し、結果として、ハザードが選択される可能性が高くなると考えられる。

なお、国内の人臨床由来 *bla*<sub>IMP-6</sub> 陽性大腸菌の接合伝達試験において、大腸菌ドナー株の *aac(6')-Ib-cr* 又は *aac(6')-Ib-cr* 及び *qnrB* 遺伝子は *bla*<sub>IMP-6</sub>/*bla*<sub>CTX-M-2</sub> 遺伝子とともに大腸菌レシピエント株へ共伝達されたと報告されている。（参照 205）また、国内の血便を呈した牛及び健康牛から分離された *S. Typhimurium* 単相変異株（*Salmonella* 4,[5],12:i:- ST34）2 株で検出された *aac(6')-Ib-cr* 遺伝子保有多剤耐性プラスミドには他の薬剤耐性遺伝子（*arr-3*、*bla*<sub>OXA-1</sub>、*catB3*、*sul1* 及び *aac(3)-IV*、*aph(3)-Ia*、*aph(4)-Ia*、*arr-3*、*bla*<sub>OXA-1</sub>、*catB3*、*dfrA12*、*sul1*、*sul2*、*sul3*）の共存が認められている。（参照 200）

### 3. フルオロキノロン系抗菌性物質の使用状況

2012 年のフルオロキノロン系抗菌性物質の推定原体販売量は、牛用が年間 777 kg、豚用が 1,399 kg、鶏用が 2,410 kg であり、牛用が 17%、豚用が 30%を占めている。2021 年では、牛用が年間 1,593 kg、豚用が 1,916 kg、鶏用が 4,033 kg であり、牛用が 21.1%、豚用が 25.4%を占めている。（参照 104）

JVARM で、農場での動物用抗菌性物質の使用状況の調査が行われているが、フルオロキノロン系抗菌性物質が使用されている農場の割合は、肥育牛 1.48%、肥育豚 2.04%、肉用鶏 3.08%であった（2004 年～2007 年）。（参照 144）

## V. ばく露評価に関する知見

ばく露評価では、評価指針の第 2 章第 2 の 2 ばく露評価に基づき、人がハザードにばく露されうる経路を明らかにするとともに、各経路でのハザードの増加又は減弱を推定し、畜産食品を介してハザードのばく露を受ける可能性及びその程度を評価する。ばく露評価の範囲は、家畜及び畜産食品が農場から出荷され、輸送、とさつ及び加工等され、人がこれらの畜産食品を入手し、摂取するまでとする。

### 1. 牛及び豚由来食品の消費量

牛及び豚由来食品の「年間 1 人当たり消費量 (kg)」は表 56 のとおりである。牛肉及び牛乳・乳製品は、2000 年をピークにやや減少傾向にあるが、2009 年以降は微増傾向である。豚肉は 2000 年以降微増傾向である。（参照 54、145）

表 56 牛及び豚由来食品の年間 1 人当たり消費量（純食料ベース）

|   | 牛肉      |        | 牛乳・乳製品  |        | 豚肉      |        |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 年 | 消費量(kg) | 自給率(%) | 消費量(kg) | 自給率(%) | 消費量(kg) | 自給率(%) |

|      |     |    |      |    |      |    |
|------|-----|----|------|----|------|----|
| 1985 | 3.9 | 72 | 70.6 | 85 | 9.3  | 86 |
| 2000 | 7.6 | 34 | 94.2 | 68 | 10.6 | 57 |
| 2004 | 5.6 | 44 | 93.9 | 67 | 12   | 51 |
| 2005 | 5.6 | 43 | 91.8 | 68 | 12.1 | 50 |
| 2006 | 5.5 | 43 | 92.1 | 67 | 11.5 | 52 |
| 2007 | 5.7 | 43 | 93.1 | 66 | 11.5 | 52 |
| 2008 | 5.7 | 44 | 86   | 70 | 11.7 | 52 |
| 2009 | 5.8 | 43 | 84.5 | 71 | 11.5 | 55 |
| 2010 | 5.9 | 42 | 86.4 | 67 | 11.7 | 53 |
| 2011 | 6   | 40 | 88.6 | 65 | 11.9 | 52 |
| 2012 | 5.9 | 42 | 89.5 | 65 | 11.8 | 53 |
| 2013 | 6   | 41 | 88.9 | 64 | 11.8 | 54 |
| 2014 | 5.9 | 42 | 89.5 | 63 | 11.8 | 51 |
| 2015 | 5.8 | 40 | 91.1 | 62 | 12.2 | 51 |
| 2016 | 6   | 38 | 91.3 | 62 | 12.4 | 50 |
| 2017 | 6.3 | 36 | 93.4 | 60 | 12.8 | 49 |
| 2018 | 6.5 | 36 | 95.2 | 59 | 12.8 | 48 |
| 2019 | 6.5 | 35 | 95.5 | 59 | 12.8 | 49 |
| 2020 | 6.5 | 36 | 94.3 | 61 | 12.9 | 50 |
| 2021 | 6.2 | 38 | 94.4 | 63 | 13.2 | 49 |

## 2. ハザードとなりうる当該細菌の生物学的特性

ハザードとして特定したフルオロキノロン耐性菌については、当該細菌の非薬剤耐性菌と生物学的特性が異なることにより病原性が高まること等を示すデータは報告されておらず、腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターの一般的な生物学的特性の概要についてまとめた。

### (1) 腸管出血性大腸菌

#### ① 抵抗性、生残性及び増殖性

熱に対する抵抗性では、リン酸緩衝液中における D 値<sup>10</sup>は 62.8℃で 24 秒、牛ひき肉中（脂肪 20%）における D 値は、50℃で 92.67 分、55℃で 19.26 分であった。

（参照 55）

酸に対する抵抗性では、本菌は各種の食品中で pH4.0 までは発育可能で、pH2.0～4.0 の酸性条件においても急激な菌数の減少はみられない。（参照 55、56）

凍結における生残性については、本菌を接種した食品を冷凍保存（-20℃で 9 か

<sup>10</sup> 最初に生存していた菌数を 1/10 に減少させる（つまり 90%を死滅させる）のに要する加熱時間（D-value : Decimal reduction time）。

月間)した試験において、食肉の菌数は大きく増減しなかったものの、牛乳の菌数は徐々に減少したと報告されている。また、本菌を添加した食肉(ミノ、大腸、レバー)を冷凍保存(−30℃)した試験では、食肉の種類に関係なく、3か月後には1/10~1/100の菌数となった。(参照 57、58)

乾燥に対する抵抗性では、水分活性 0.34~0.68、塩分濃度 0.5~3.0%の条件下で、5℃に保存した牛肉粉中の本菌は8週間後まで生存が確認されている。(参照 55)

牛糞便中においても、本菌は22℃で49~56日間、5℃で63~72日間生存した。(参照 55)

増殖性については、発育温度領域は8~46℃、発育塩分濃度領域は0~6.5%、発育 pH 領域は4.4~9.0、発育水分活性域は0.95以上とされており、特に、培養温度25~43.5℃、塩分濃度0.5~6.0%、pH5.5~7.0で活発に増殖すると報告されている。(参照 56、59)

## ② 生存能力及び分布状況等

本菌は通常 of 自然環境下において長く生存し、低温、低栄養、紫外線等の過酷な自然環境下においても、「生存しているが培養不可能」な状態(VBNC: Viable but Non-Culturable)で長く存在できる。(参照 56)

本菌については、牛、豚、めん羊等のほ乳動物や鳥類の腸管内に存在している。国内の牛における保菌状況は、O157については培養法で0.6~3.6%、VT産生大腸菌についてはPCR法で約30~80%と報告されている。また、国内の豚におけるO157の保菌状況は培養法で0.0%及び14.0%と報告されている。(参照 56、60)

## (2) サルモネラ

### ① 抵抗性、生残性及び増殖性

熱に対する抵抗性では、リン酸緩衝液中におけるD値は62.8℃で36~42秒であった。(参照 55)

酸に対する抵抗性では、本菌はpH4.5~9.0の範囲で発育が可能であるとされている。(参照 61)

凍結における生残性に関しては、鶏のと体を−37℃で急速冷凍した後に−21℃で保存した場合でも、本菌が13か月間生存していたという報告がある。(参照 61)

乾燥に対する抵抗性では、本菌は、肉粉、骨粉、乾燥卵白等の水分が10~12%以下の場合でも無期限に生存していたとの報告がある。(参照 61)

増殖性については、食肉中(牛肉及び鶏肉)では、好気(又は微好気)条件下の20℃及び32℃で顕著な菌数の増加が見られたが、4℃では増加が認められなかった。(参照 62)

本菌の発育が可能な条件は8~45℃、水分活性0.94以上、pH4.5~9.0とされており、増殖に至適な温度は35~37℃、pH領域は6.5~7.5である。また、低温条件では長期間生存できるが、高温には弱く、70℃以上の温度で死滅する。(参照 61)

### ② 生存能力及び分布状況等

本菌は種々の環境条件に対して抵抗性があり、自然環境下ではあらゆる場所に生

息し、大腸菌等の腸内細菌目細菌が死滅する乾燥条件下でも長期間生存できる。(参照 61)

本菌については、牛、豚、鶏等の家畜の腸管内に常在菌として存在している他、ペットや鳥類、ミドリガメ等の爬虫類、両生類も保菌していることが知られている。(参照 34)

### (3) カンピロバクター

#### ① 抵抗性、生残性及び増殖性

*C. jejuni* は 31～46℃で増殖し、至適増殖温度は、42～43℃であり、30℃以下では増殖しない。*C. jejuni* の培養液中での増殖至適 pH は 6.5～7.5 であり、最小発育 pH は pH4.9、最大発育 pH はおよそ pH9.0 である。増殖至適水分活性 ( $a_w$ ) は 0.997 である。30℃以下、47℃以上、pH 4.7 以下又は 2%食塩存在下では増殖することができないとする報告もある。2%超の食塩濃度には感受性があり、5～10 時間で死滅する。*C. coli* は、30.5℃では増殖することができる。(参照 225)

また、環境中では生きているが人工培地で培養できない、いわゆる VBNC (Viable But Non Culturable) と呼ばれる状態となる。(参照 63)

凍結における生残性では、本菌は食肉を凍結及び解凍を繰り返すことで顕著な減少が認められ、保存期間の長短より凍結及び解凍回数による影響が大きいと考えられる。(参照 62、65)

本菌は、微好気性環境下(酸素濃度 5～15%)で発育し、大気中の通常酸素濃度(約 23%)では発育しない他、乾燥条件下では死滅が早い、塩分濃度 0.5%前後を至適とした好塩性を有する等の特性から、通常の食品中では増殖が困難であると考えられる。(参照 34、64、66)

本菌がと体の加工及び肉の流通の過程で遭遇する環境条件の下では生存できないとの報告が多く存在する。それらの報告では、カンピロバクターが酸素に対して感受性があることも示している。カンピロバクターは牛肉の加工中に遭遇する処理、例えば、強制空気による乾燥、冷却及び凍結に対しても感受性があり、(参照 63、66) (参照 146、147～150) 牛肉の一般的な流通形態での長期保存においては、温度等の条件や菌株によって菌数が減少すると報告されている。(参照 151～153) 一方、菌数の減少は認められないという報告もあった。(参照 154)

#### ② 生存能力及び分布状況等

カンピロバクターは一般的に空気、乾燥、熱に弱く、速やかに死滅する。本菌は大気や乾燥には極めて弱い、湿潤な環境では長期間生存すると考えられる。(参照 66) カンピロバクターは、水の中で数週間生存できる。冷水(4℃)で数週間生存するが、温水(25℃)では数日しか生存できないとされている。(参照 225)

また、*C. jejuni* は牛、めん羊、鶏等の腸管内に広く常在菌として保菌されており、*C. coli* は豚での保菌率が高いとされている。(参照 34)

### 3. 家畜及び畜産食品が農場から出荷され人に摂取されるまでの経路

牛、豚及び生乳が農場から出荷され、消費者に摂取されるまでの経路の一例は表 57 及

び表 59 のとおりで、とさつ・加工から調理等までの詳細な過程の一例は表 58 のとおりである。

農場では、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）に基づく飼養衛生管理基準により、家畜の伝染性疾病の予防が図られるとともに、家畜生産段階における HACCP の考え方が取り入れられ、家畜の生産段階における衛生管理ガイドラインにより、病原大腸菌 O157 やサルモネラの汚染防止対策が講じられている。（参照 67）

また、と畜場では、平成 8 年に改正されたと畜場法施行規則（昭和 28 年 9 月 28 日厚生省令第 44 号）において、HACCP の考え方を導入したと畜場における食肉の取扱いの規定が盛り込まれ、平成 9 年に改正された同法施行令（昭和 28 年 8 月 25 日政令第 216 号）において、と畜場の衛生管理基準及び構造設備基準が追加され、食肉処理段階における微生物汚染防止が図られている。2014 年 4 月に改正されたと畜場法施行規則において、と畜業者等の講ずべき衛生措置の基準が改正され、従来の基準に加え、新たに HACCP を用いて衛生管理を行う場合の基準が規定された（参照 208）。さらに、2018 年 6 月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布、2020 年 6 月に施行され、原則としてと畜業者を含む食品等事業者全てに対して、HACCP に沿った衛生管理を実施することが規定された。

生食用牛肉については、2011 年 10 月に、食品衛生法に基づく規格基準が策定され、肉塊の表面から深さ 1 cm 以上の部分までを 60℃で 2 分間以上加熱する方法、又はこれと同等以上の効果を有する方法で加熱殺菌を行うことや腸内細菌目菌群が陰性でなければならないこと等が規定された。さらに 2012 年 7 月には、牛肝臓の生食用としての販売・提供は禁止された。（参照 155、156）

また、厚生労働省から評価要請を受けた豚の食肉の生食に係る食品健康影響評価については、2015 年 2 月に食品安全委員会から豚の食肉を生で喫食しないこと、現実的なより高い温度で加熱することが重要であること等を答申した。（参照 169）これを受けて、厚生労働省は、2015 年 6 月に、規格基準の改正により、豚の食肉（内臓を含む）の食肉販売店、飲食店等における生食用としての提供を禁止した。（参照 209）

牛乳については、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生省令第 52 号。以下「乳等省令」という。）に基づく牛乳の殺菌条件（63℃で 30 分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌（国内では 120～150℃で 2～3 秒での加熱処理が主流。)) することが規定されている<sup>11</sup>。さらに、乳製品についても牛乳と同等の加熱殺菌をしたものが製造・加工に用いられている。（参照 210）

---

<sup>11</sup> 食品衛生法に基づく特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設では、さく取した生乳を未殺菌又は低温殺菌で処理し、乳等省令で定める成分規格（細菌数 30,000 以下、大腸菌群陰性等）を有する特別牛乳を製造することが可能。2016 年度の許可施設数は全国 5 施設（うち 1 施設が未殺菌乳を製造。）。

表 57 牛及び豚が農場から出荷され消費者に至るまでの経路（一例）





表 58 牛及び豚における主な処理過程（一例）

| 処理過程          | 牛                                                                                                                    | 豚                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| と畜段階          | 生体受付<br>↓<br>係留・生体検査<br>↓<br>とさつ<br>↓<br>剥皮<br>↓<br>内臓摘出<br>↓<br>背割<br>↓<br>枝肉検査・洗浄<br>↓<br>冷却保管<br>↓<br>出荷（枝肉）<br>↓ | 生体受付<br>↓<br>係留・生体検査<br>↓<br>とさつ<br>↓<br>内臓摘出<br>↓<br>剥皮<br>↓<br>背割<br>↓<br>枝肉検査・洗浄<br>↓<br>冷却保管<br>↓<br>出荷（枝肉）<br>↓ |
| 部分肉加工段階       | 仕入<br>↓<br>大分割・整形・袋詰・真空包装<br>↓<br>保管<br>↓<br>出荷（部分肉）<br>↓                                                            |                                                                                                                      |
| 卸売・精肉処理及び小売段階 | 仕入<br>↓<br>精肉処理・パック包装・対面販売<br>↓<br>消費者                                                                               |                                                                                                                      |

表 59 生乳が農場から出荷され消費者に至るまでの経路（一例）



#### 4. ハザードとなりうる当該細菌による牛及び豚由来食品の汚染

##### （1）牛及び豚由来食品がハザードとなりうる当該細菌に汚染される可能性

食肉の汚染の可能性としては、食肉処理段階におけるハザードに汚染された腸管内容物由来のばく露が考えられる。ハザードに汚染された食肉は、輸送又は保存中の冷蔵及び冷凍保存下でも増殖はしないが生残するため、飲食店の調理施設や家庭等に持ち込まれる可能性が生じる。

また、生乳の汚染の可能性としては、ハザードに汚染された腸管内容物である糞便による汚染が考えられるが、いずれの菌も、牛乳の殺菌条件である 63℃で 30 分間、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法での加熱処理（国内では 120～150℃で 1～3 秒が主流）により排除されるものと考えられる。また、乳製品についても牛乳と同等の加熱殺菌されたものを製造・加工に用いており、ハザードは排除されるものと考えられる。

##### （2）ハザードとなりうる当該細菌による市販の牛及び豚由来食品の汚染状況

市販の牛及び豚由来食品の細菌による汚染状況が調査されている（表 60-1～表 60-

2)。内臓肉以外の食肉については、腸管出血性大腸菌 O157 の陽性率はおおむね 1 % 以下、O157 以外の腸管出血性大腸菌<sup>12</sup>の陽性率も数%と少なかったが、牛の内臓肉の陽性率は、内臓肉以外よりも高い調査結果がみられた。また、サルモネラの陽性率は、豚ひき肉では 5.6%以下を維持しているが、牛ひき肉は 2015 年まで 2.9%以下を維持していた。2016、2017、2018 年は検体数が 10 検体程度と少ない。したがって、2015 年までとの陽性率との単純比較は難しいが、これら 3 年間では、それぞれ 0、1、1 検体が陽性となっており、検体数のわりには高い陽性検体数となっている。

カンピロバクターの陽性率は、一部牛の内臓肉の陽性率が高い調査結果が報告されているものの、牛の内臓肉以外については 0%だった（表 60-3）。したがって、当該細菌による牛及び豚由来食品の汚染はおおむね小さいものと考えられた。（参照 68、110、111）

表 60-1 市販されている牛肉及び豚肉における腸管出血性大腸菌（O157）検出状況（厚生労働省とりまとめ）

| 由来   | 陽性率  | 検体数 | 調査年次 | 備考                               |
|------|------|-----|------|----------------------------------|
| 牛ひき肉 | 0.0% | 244 | 2000 | <i>E. coli</i> 陽性率 53.7%         |
|      | 0.0% | 305 | 2001 | <i>E. coli</i> 陽性率 57.4%         |
|      | 0.0% | 201 | 2002 | <i>E. coli</i> 陽性率 55.2%         |
|      | 0.0% | 172 | 2003 | <i>E. coli</i> 陽性率 56.4%         |
|      | 0.0% | 188 | 2004 | <i>E. coli</i> 陽性率 58.5%         |
|      | 0.0% | 165 | 2005 | <i>E. coli</i> 陽性率 53.9%         |
|      | 0.0% | 127 | 2006 | <i>E. coli</i> 陽性率 58.3%         |
|      | 0.0% | 146 | 2007 | <i>E. coli</i> 陽性率 64.4%         |
|      | 0.0% | 137 | 2008 | <i>E. coli</i> 陽性率 64.2%         |
|      | 0.0% | 114 | 2009 | <i>E. coli</i> 陽性率 61.4%         |
|      | 0.9% | 115 | 2010 | <i>E. coli</i> 陽性率 60.9%         |
|      | 0.0% | 102 | 2011 | <i>E. coli</i> 陽性率 65.7%         |
|      | 0.0% | 99  | 2012 | <i>E. coli</i> 陽性率 58.6%         |
|      | 0.0% | 55  | 2013 | <i>E. coli</i> 陽性率 70.0%（検体数 10） |
|      | 0.0% | 41  | 2014 | <i>E. coli</i> 陽性率 0.0%（検体数 4）   |
|      | 0.0% | 32  | 2015 | <i>E. coli</i> 陽性率 0.0%（検体数 2）   |
|      | 0.0% | 62  | 2016 |                                  |
|      | 0.0% | 42  | 2017 |                                  |
|      | 0.0% | 35  | 2018 |                                  |
| 豚ひき肉 | 0.0% | 149 | 2000 | <i>E. coli</i> 陽性率 69.1%         |

<sup>12</sup> 「食中毒菌汚染実態調査」では、腸管出血性大腸菌のうち、O157、O26 及び O111 について検査を実施。平成 27 年以降はこれらに加えて、O103、O121 及び O145 についても検査。

|  |      |     |      |                                   |
|--|------|-----|------|-----------------------------------|
|  | 0.0% | 138 | 2001 | <i>E. coli</i> 陽性率 58.7%          |
|  | 0.0% | 130 | 2002 | <i>E. coli</i> 陽性率 69.2%          |
|  | 0.0% | 170 | 2003 | <i>E. coli</i> 陽性率 66.5%          |
|  | 0.0% | 148 | 2004 | <i>E. coli</i> 陽性率 77.0%          |
|  | 0.5% | 194 | 2005 | <i>E. coli</i> 陽性率 71.6%          |
|  | 0.0% | 167 | 2006 | <i>E. coli</i> 陽性率 73.7%          |
|  | 0.0% | 190 | 2007 | <i>E. coli</i> 陽性率 63.2%          |
|  | 0.0% | 177 | 2008 | <i>E. coli</i> 陽性率 78.5%          |
|  | 0.0% | 165 | 2009 | <i>E. coli</i> 陽性率 70.3%          |
|  | 0.0% | 174 | 2010 | <i>E. coli</i> 陽性率 71.3%          |
|  | 0.0% | 144 | 2011 | <i>E. coli</i> 陽性率 68.7%          |
|  | 0.0% | 136 | 2012 | <i>E. coli</i> 陽性率 69.1%          |
|  | 0.0% | 119 | 2013 | <i>E. coli</i> 陽性率 66.7% (検体数 15) |
|  | 1.0% | 102 | 2014 | <i>E. coli</i> 陽性率 25.0% (検体数 4)  |
|  | 0.0% | 94  | 2015 | <i>E. coli</i> 陽性率 71.4% (検体数 7)  |
|  | 0.0% | 6   | 2016 |                                   |
|  | 0.0% | 11  | 2017 |                                   |
|  | 0.0% | 14  | 2018 |                                   |

表 60-2 市販されている牛肉及び豚肉におけるサルモネラ検出状況（厚生労働省とりまとめ）

| 調査年次 | 牛ひき肉 |     | 豚ひき肉 |     |
|------|------|-----|------|-----|
|      | 陽性率  | 検体数 | 陽性率  | 検体数 |
| 2000 | 2.5% | 244 | 2.0% | 149 |
| 2001 | 2.0% | 305 | 5.1% | 138 |
| 2002 | 0.5% | 201 | 4.6% | 130 |
| 2003 | 0.0% | 172 | 0.6% | 170 |
| 2004 | 1.1% | 188 | 3.4% | 148 |
| 2005 | 1.8% | 165 | 4.6% | 194 |
| 2006 | 1.6% | 127 | 2.4% | 167 |
| 2007 | 1.4% | 146 | 4.7% | 190 |
| 2008 | 2.2% | 137 | 3.9% | 177 |
| 2009 | 0.9% | 114 | 3.0% | 165 |
| 2010 | 0.0% | 115 | 1.7% | 174 |
| 2011 | 2.9% | 102 | 1.4% | 144 |
| 2012 | 1.0% | 99  | 2.9% | 136 |

|      |       |    |      |     |
|------|-------|----|------|-----|
| 2013 | 1.8%  | 55 | 4.2% | 119 |
| 2014 | 2.4%  | 41 | 4.9% | 102 |
| 2015 | 0.0%  | 32 | 4.3% | 94  |
| 2016 | 0.0%  | 11 | 0.0% | 1   |
| 2017 | 10.0% | 10 | 5.6% | 54  |
| 2018 | 12.5% | 8  | 2.1% | 47  |

表 61-1 市販されている牛肉及び豚肉における腸管出血性大腸菌（O157）検出状況（その他の文献）

| 由来     | 陽性率   | 検体数   | 調査年次      | 備考              | 参考文献   |
|--------|-------|-------|-----------|-----------------|--------|
| 牛枝肉    | 0.06% | 4,810 | 1994      | O157 以外陽性率 0.1% | 参照 55  |
| 牛枝肉    | 0.3%  | 2,534 | 1996      | O157 以外陽性率 0.0% | 参照 55  |
| 牛枝肉    | 0.0%  | 140   | 2008～2009 |                 | 参照 112 |
| 牛肉（国産） | 0.0%  | 196   | 1996      | O157 以外陽性率 2.0% | 参照 55  |
| 牛肉     | 0.0%  | 42    | 1997      | O157 以外陽性率 2.4% | 参照 55  |
| 牛肉     | 0.7%  | 134   | 1998～2005 | 大腸菌陽性率 47.0%    | 参照 69  |
| 牛肉     | 0.0%  | 171   | 2005～2008 |                 | 参照 113 |
| 牛肉     | 2.2%  | 46    | 2006～2007 |                 | 参照 112 |
| 牛肉     | 0.0%  | 4     | 2011      |                 | 参照 114 |
| 牛ひき肉   | 0.0%  | 575   | 2005～2008 |                 | 参照 113 |
| 牛ひき肉   | 0.0%  | 7     | 2006～2007 |                 | 参照 112 |
| 牛肉・豚肉  | 7.5%  | 201   | 2000～2004 | *               | 参照 70  |
| 牛肉・豚肉  | 4.9%  | 41    | 1997      | O157 以外陽性率 4.9% | 参照 55  |
| 牛肉・豚肉  | 16.3% | 104   | 2010～2013 | O157 以外陽性率 7.7% | 参照 211 |
| 豚肉（国産） | 0.0%  | 30    | 1996      | O157 以外陽性率 0.0% | 参照 55  |
| 豚肉     | 0.0%  | 183   | 1998～2005 | 大腸菌陽性率 56.3%    | 参照 69  |
| 豚肉・牛肉  | 0.0%  | 12    | 1997      | O157 以外陽性率 8.3% | 参照 55  |
| 牛肉・豚肉  | 0.0%  | 40    | 1998～2005 | 大腸菌陽性率 50.0%    | 参照 69  |
| 牛肉・豚肉  | 0.0%  | 95    | 1997～2000 |                 | 参照 59  |
| 牛肉・豚肉  | 16.7% | 6     | 2006～2007 |                 | 参照 112 |

\*：陽性 15 検体中 10 検体が 2002 年調査で陽性。陽性 15 検体中 10 検体が 2 つの精肉店由来。

表 61-2 市販されている牛肉及び豚肉におけるサルモネラ検出状況（その他の文献）

| 由来     | 陽性率  | 検体数 | 調査年次      | 参考文献  |
|--------|------|-----|-----------|-------|
| 牛肉（国産） | 0.0% | 22  | 1999～2001 | 参照 71 |

|        |       |     |           |        |
|--------|-------|-----|-----------|--------|
| 牛肉     | 0.0%  | 134 | 1998～2005 | 参照 69  |
| 牛肉     | 0.0%  | 171 | 2005～2008 | 参照 113 |
| 牛肉     | 0.0%  | 26  | 2006*     | 参照 115 |
| 牛肉     | 0.0%  | 14  | 2006      | 参照 116 |
| 牛肉     | 0.0%  | 14  | 2007      | 参照 117 |
| 牛肉     | 0.0%  | 15  | 2008      | 参照 118 |
| 牛肉     | 0.0%  | 13  | 2009      | 参照 119 |
| 牛肉     | 0.0%  | 15  | 2010～2011 | 参照 120 |
| 牛肉     | 0.0%  | 15  | 2011      | 参照 121 |
| 牛肉ドリップ | 0.0%  | 21  | 2008～2009 | 参照 122 |
| 牛ひき肉   | 0.0%  | 50  | 2001      | 参照 72  |
| 牛ひき肉   | 1.8%  | 575 | 2005～2008 | 参照 123 |
| 牛肉臓肉   | 0.0%  | 3   | 2006*     | 参照 115 |
| 牛肉臓肉   | 3.8%  | 104 | 2010～2013 | 参照 211 |
| 牛肉臓肉   | 2.0%  | 198 | 2009～2017 | 参照 212 |
| 豚枝肉    | 0.0%  | 120 | 2008～2009 | 参照 123 |
| 豚肉（国産） | 0.0%  | 15  | 1999～2001 | 参照 71  |
| 豚肉     | 2.2%  | 183 | 1998～2005 | 参照 69  |
| 豚肉     | 0.0%  | 25  | 2006*     | 参照 115 |
| 豚肉     | 0.0%  | 15  | 2006      | 参照 116 |
| 豚肉     | 0.0%  | 16  | 2007      | 参照 117 |
| 豚肉     | 0.0%  | 15  | 2008      | 参照 118 |
| 豚肉     | 0.0%  | 15  | 2009      | 参照 119 |
| 豚肉     | 0.0%  | 20  | 2010～2011 | 参照 120 |
| 豚肉     | 5.0%  | 20  | 2011      | 参照 121 |
| 豚肉     | 1.4%  | 657 | 2009～2017 | 参照 215 |
| 豚肉ドリップ | 0.0%  | 21  | 2008～2009 | 参照 122 |
| 豚ひき肉   | 0.0%  | 50  | 2001      | 参照 72  |
| 豚肉臓肉   | 0.0%  | 16  | 2006*     | 参照 115 |
| 豚肉臓肉   | 30.3% | 142 | 2009～2017 | 参照 212 |
| 牛肉・豚肉  | 0.0%  | 40  | 1998～2005 | 参照 69  |
| 豚肉     | 2.7%  | 75  | 2017      | 参照 213 |

\*：調査結果の公表年次

表 61-3 市販されている牛肉及び豚肉におけるカンピロバクター検出状況  
(その他の文献)

| 由来      | 陽性率                                            | 検体数 | 調査年次      | 参考文献   |
|---------|------------------------------------------------|-----|-----------|--------|
| 牛肉      | 0.0%                                           | 25  | 2006*     | 参照 115 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 14  | 2006      | 参照 116 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 50  | 2007～2008 | 参照 113 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 14  | 2007      | 参照 117 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 15  | 2008      | 参照 118 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 13  | 2009      | 参照 119 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 15  | 2010～2011 | 参照 120 |
| 牛肉      | 0.0%                                           | 15  | 2011      | 参照 121 |
| 牛肉ドリップ  | 0.0%                                           | 21  | 2008～2009 | 参照 119 |
| 牛内臓肉    | 0.0%                                           | 3   | 2006*     | 参照 115 |
| 牛内臓肉    | <i>C. jejuni</i> 40.4%<br><i>C. coli</i> 15.4% | 104 | 2010～2013 | 参照 211 |
| 牛肝臓（胆汁） | 35.7%                                          | 154 | 2017～2019 | 参照 214 |
| 牛ひき肉    | 0.0%                                           | 50  | 2001      | 参照 72  |
| 牛ひき肉    | 0.3%                                           | 283 | 2007～2008 | 参照 113 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 24  | 2006*     | 参照 115 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 15  | 2006      | 参照 116 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 16  | 2007      | 参照 117 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 28  | 2008      | 参照 113 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 15  | 2008      | 参照 118 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 15  | 2009      | 参照 119 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 20  | 2010～2011 | 参照 120 |
| 豚肉      | 0.0%                                           | 20  | 2011      | 参照 121 |
| 豚肉ドリップ  | 0.0%                                           | 21  | 2008～2009 | 参照 122 |
| 豚内臓肉    | 0.0%                                           | 16  | 2006*     | 参照 115 |
| 豚ひき肉    | 0.0%                                           | 50  | 2001      | 参照 72  |
| 豚ひき肉    | 0.3%                                           | 367 | 2005～2008 | 参照 113 |
| 牛乳      | 0.0%                                           | 14  | 1995～1999 | 参照 73  |

\*1：調査結果の公表年次

### （３）市販の国産牛肉及び豚肉から分離した大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターのフルオロキノロン耐性の状況

食品安全確保総合調査「畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査」において、2006～2008 年は市販の国産牛肉及び豚肉から検出された大腸菌について、2013 年は

と畜場で採取された牛及び豚の肝臓から検出された *C. jejuni* 及び *C. coli* について、ERFX 又は CPFEX に対する薬剤耐性が調査されている。(参照 74～76、157)

市販の国産牛肉及び豚肉において、分離された大腸菌における ERFX 耐性菌（ブレイクポイント 2 µg/mL）は、牛肉由来 101 株及び豚肉由来 103 株ではおおむね認められなかった（表 62）。一方で、国内のと畜場で採取された牛及び豚の肝臓から分離された *C. jejuni* 及び *C. coli* においては、CPFEX に対する薬剤耐性菌が認められ、調査株数が多い牛由来 *C. jejuni* 及び豚由来 *C. coli* では 32.3 及び 48.6%、調査株数の少ない牛由来 *C. coli* 及び豚由来 *C. jejuni* では 80.0 及び 66.7%であった（表 63）。

2014 年は市販の国産牛ひき肉及び豚ひき肉から検出された大腸菌及びサルモネラ属菌について CPFEX に対する薬剤耐性が調査されている。(参照 215)

大腸菌では CPFEX 耐性菌が認められたが、耐性率は牛ひき肉由来株で 3.8%、豚ひき肉由来株で 1.4%と低く、ESBL 産生大腸菌では、調査菌株数が少ないものの、牛ひき肉由来株で 40.0%、豚ひき肉由来株で 26.7%と高い耐性率が認められた（表 64）。（参照 216）

その他の調査結果として、東京都内で流通する牛内臓肉から分離された *C. jejuni* 50 株中 27 株（54.0%）、*C. coli* 16 株中 2 株（12.5%）が CPFEX 耐性と報告されている。

（参照 211）さらに、と畜場においてと畜検査に合格し、内臓検査によって食用適とされた牛肝臓の胆嚢内胆汁から分離された *C. jejuni*（27 株）、*C. fetus*（24 株）及び *C. coli*（5 株）の CPFEX 耐性率は 44.4%、66.7%及び 60.0%と報告されている。（参照 214）東京都内で流通する牛肉から分離された大腸菌の CPFEX 耐性率は、2015 年 0%（供試菌株 43 株）、2016 年 2.8%（同 70 株）、2017 年 0%（同 39 株）と報告されている。（参照 217）

表 62 市販の国産牛肉及び豚肉から分離された大腸菌の ERFX 耐性の状況

| 対象         | 調査<br>菌株数 | MIC 範囲<br>(µg/mL) | MIC <sub>50</sub><br>(µg/mL) | MIC <sub>90</sub><br>(µg/mL) | 耐性率 (%) |
|------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 牛肉（2006 年） | 6         | <0.125            | <0.125                       | <0.125                       | 0.0     |
| 牛肉（2007 年） | 59        | <0.125-1          | <0.125                       | <0.125                       | 0.0     |
| 牛肉（2008 年） | 36        | <0.125            | <0.125                       | <0.125                       | 0.0     |
| 豚肉（2006 年） | 13        | <0.125-0.5        | <0.125                       | <0.125                       | 0.0     |
| 豚肉（2007 年） | 19        | <0.125            | <0.125                       | <0.125                       | 0.0     |
| 豚肉（2008 年） | 71        | <0.125-2          | <0.125                       | <0.125                       | 2.8     |

ERFX のブレイクポイント：2 µg/mL（微生物学的ブレイクポイント）

表 63 と畜場で採取された牛及び豚の肝臓から分離されたカンピロバクターの CPFEX 耐性の状況（2013 年）

| 対象 | 菌種 | 調査<br>菌株数 | MIC 範囲<br>(µg/mL) | MIC <sub>50</sub><br>(µg/mL) | MIC <sub>90</sub><br>(µg/mL) | 耐性株<br>数 | 耐性率<br>(%) |
|----|----|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|
|----|----|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|

|                   |                  |    |           |        |        |    |      |
|-------------------|------------------|----|-----------|--------|--------|----|------|
| 牛肝臓 <sup>*1</sup> | <i>C. jejuni</i> | 99 | ≤0.03～16  | 0.125  | 8      | 32 | 32.3 |
|                   | <i>C. coli</i>   | 10 | 0.125～16  | 16     | 16     | 8  | 80.0 |
| 豚肝臓 <sup>*2</sup> | <i>C. jejuni</i> | 3  | 0.125～32  | <0.125 | <0.125 | 2  | 66.7 |
|                   | <i>C. coli</i>   | 72 | 0.0625～32 | 2      | 16     | 35 | 48.6 |

CPFX のブレイクポイント：4 µg/mL (CLSI)

\*1：牛肝臓 505 検体中、109 検体がカンピロバクター陽性。

\*2：豚肝臓 500 検体中、74 検体がカンピロバクター陽性（うち 1 検体からは *C. jejuni* と *C. coli* が分離された）。

表 64 市販の国産牛ひき肉及び豚ひき肉から分離された大腸菌及びサルモネラ属菌の CPFX 耐性の状況（2014 年）

| 対象   | 菌種             | 調査<br>菌株数 | MIC 範囲<br>(µg/mL) | MIC <sub>50</sub><br>(µg/mL) | MIC <sub>90</sub><br>(µg/mL) | 耐性<br>株数 | 耐性率<br>(%) |
|------|----------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| 牛ひき肉 | 大腸菌            | 52        | ≤0.03～4           | ≤0.03                        | ≤0.03                        | 2        | 3.8        |
|      | ESBL 産生<br>大腸菌 | 5         | ≤0.03～4           | 0.5                          | 4                            | 2        | 40.0       |
|      | サルモネラ<br>属菌    | 50        | ≤0.03～0.06        | ≤0.03                        | ≤0.03                        | 0        | 0.0        |
| 豚ひき肉 | 大腸菌            | 73        | ≤0.03～>4          | ≤0.03                        | ≤0.03                        | 1        | 1.4        |
|      | ESBL 産生<br>大腸菌 | 15        | ≤0.03～>4          | 0.12                         | 4                            | 4        | 26.7       |
|      | サルモネラ<br>属菌    | 65        | ≤0.03             | ≤0.03                        | ≤0.03                        | 0        | 0.0        |

CPFX のブレイクポイント：4 µg/mL (CLSI)

## VI. 影響評価に関する知見

影響評価では、評価指針の第 2 章第 2 の 3 影響評価に基づき、本評価書で検討しているハザードにばく露されることにより起こり得る人の健康上の影響及びフルオロキノロン系抗菌性物質の人医療における重要性を考慮して、人における治療効果が減弱又は喪失する可能性及びその程度を評価する。

### 1. ハザードとなりうる細菌のばく露に起因して生じる可能性のある人の疾病

ハザードとなりうる細菌である腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターによるばく露の結果、生じる可能性のある人の疾病は、いずれも腸管感染症の一種である腸管出血性大腸菌感染症、サルモネラ感染症及びカンピロバクター感染症であると考えられ、日本における代表的な食中毒の原因菌でもある。

#### （1）腸管出血性大腸菌感染症

##### ① 発生原因及び発生状況

人や動物から検出される腸管出血性大腸菌の血清型は 100 以上あり、国内の感染

例では O157 が多く、O26、O111、O145 等による感染事例も報告されている。(参照 55)

腸管出血性大腸菌は感染力が強く、食品安全委員会の「生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌」に係る食品健康影響評価では、腸管出血性大腸菌による食中毒事例において摂取菌数が判明している事例中、最も低い菌数は 2 CFU/人であったとされている。(参照 166、167)

本症の発生原因は、腸管出血性大腸菌で汚染された食品（生肉又は加熱の不十分な食肉等）の経口摂取であり、牛肉、牛ステーキ、牛レバ刺し、牛タタキ、ハンバーグ、野菜サラダ、井戸水等の様々な食品、食材等が特定又は推定されている。(参照 77)

本菌は一般の大腸菌と同様に熱に弱く、一般的な消毒剤でも容易に死滅するため、調理前の手洗いや食材を十分に加熱する等、通常の食中毒対策により感染の予防が可能であると考えられる。(参照 34、78)

また、[V. 3.]で述べたとおり生食用牛肉については、規格基準が策定され、また、牛肝臓については生食用としての販売・提供は禁止された。(参照 155、156)

食中毒統計における腸管出血性大腸菌（VT 産生）による食中毒は、2004～2013 年の 10 年間で患者数は約 3,100 名、死者数は 7 名、2014～2022 年の 9 年間で患者数は約 2,000 名、死者数は 12 名と報告されている。また、同期間に、人口動態統計において、死因が腸管出血性大腸菌による腸管感染症となっている死亡者数<sup>13</sup>は 2004～2013 年の 10 年間で 52 名、2014～2021 年の 8 年間で 58 名と報告されている。(参照 138、168)

1990 年代初期は集団発生が認められたが、1997 年以降は減少し、散発事例はほぼ横ばい状態にあるが、同じ遺伝学的特徴を有する菌株が広域に感染者を発生させる広域散発事例は現在でも腸管出血性大腸菌感染症対策においても大きな問題であるとされており、厚生労働省は広域的に発生する食中毒事案の早期探知及び有効的な調査等を目的として、2018 年に広域的な感染症及び食中毒に関する調査情報の共有手順等について定めている。(参照 227、228) また、二次感染の多いことが特徴で、発生時期は夏季に多いが、冬季にも発生は認められる。(参照 33、34、138)

## ② 重篤度

臨床症状としては、全く症状がないものから、軽い腹痛や下痢のみで終わるもの、さらには頻回の水様便、激しい腹痛、著しい血便を伴う出血性大腸炎から溶血性尿毒症症候群（Hemolytic uremic syndrome : HUS）や脳症等の重篤な合併症を併発するものまで様々である。O157 感染による有症者の約 6～7%では、下痢等の初発症状がみられた数日後から 2 週間以内（多くは 5～7 日後）に、HUS または脳症等の重症合併症が発症し、死に至る場合もある。特に、若齢者や高齢者等については、重症合併症を併発しやすいことから、注意が必要である。(参照 34、78)

---

<sup>13</sup> 厚生労働省人口動態統計において、基本死因分類が「A04.3 腸管出血性大腸菌感染症」となっているもの。

## (2) サルモネラ感染症

### ① 発生原因及び発生状況

本症の発生は、かつて、牛や豚等の家畜の腸内に生息する *S. Typhimurium* の食品汚染によるものとされていたが、1980 年代後半からは、*S. Enteritidis* による鶏卵及び鶏卵関連食品の汚染が原因で急増した。

本症の発生には、一般に 10 万～数 100 万個が必要と考えられてきたが、サルモネラ食中毒事例において摂取菌数が判明している事例中、最も低い菌数はチョコレートの原因とした事例の 4.3 MPN<sup>14</sup>/100g であるなど、*S. Enteritidis* を含む数種における感染菌数は極めて少ないことが分かってきており、感染菌数について腸管出血性大腸菌との大きな違いはないとされている。(参照 166)

原因食品が特定された事例（1987～1999 年）では、鶏卵の使用頻度が全体の 75.2%と高く、卵納豆、自家製マヨネーズ、ミルクセーキ等の鶏卵を使用した「非加熱調理食品」であった。(参照 79、80)

本菌は熱に弱く、また 8℃以下の冷蔵保存により効果的に増殖を抑制できるため、調理前の手洗いや食材を十分に加熱する等の一般的な食中毒対策により、感染の予防が可能であると考えられる(参照 81、82)。また、生食用食肉（牛肉）については、[V. 3.]で述べたとおり規格基準が策定された。(参照 155)

食中毒統計におけるサルモネラ属菌による食中毒は、2004～2013 年の 10 年間で患者数は約 24,000 名、死者数は 7 名、2014～2022 年の 9 年間で患者数は約 7,238 名、死者数は 1 名と報告されている。発生件数、患者数ともに 2000 年以降減少傾向にあり、2013 年にはそれぞれ 2000 年の約 19%、約 2.7%という状況にある。(参照 138)

また、人口動態統計において死因がサルモネラによる腸管感染症となっている死亡者数<sup>15</sup>は 2004～2013 年の 10 年間で 67 名、2014～2021 年の 8 年間で 34 名と報告されている。(参照 168)

### ② 重篤度

本症は、汚染された食品を摂取してから 12～48 時間の潜伏期間を経て発症する。臨床症状は主として急性胃腸炎であり、下痢、腹痛、嘔吐及び発熱等を主徴とする。下痢は軟便、水様便が多いが、重症例では粘血便が見られることもある。また、健康な成人では胃腸炎にとどまることが多いが、小児では意識障害、痙攣及び菌血症、高齢者では急性脱水症状及び菌血症を起こす等重症化し、死に至る場合もある。(参照 34、83)

<sup>14</sup> 一般的に菌数が少ないと思われる検体中の菌数を確率論的に推計する方法で、最確数 (Most Probable Number の略) という。検体の階段希釈液を 3 本または 5 本ずつの培地に接種して「陽性」の出現率から菌数を推計する。

<sup>15</sup> 厚生労働省人口動態統計において、基本死因分類が「A02 その他のサルモネラ感染症」となっているもの。当該分類には、細分類として「A02.0 サルモネラ腸炎」、「A02.1 サルモネラ敗血症」、「A02.2 局所的サルモネラ感染症」、「A02.8 その他明示されたサルモネラ感染症」及び「A02.9 サルモネラ感染症、詳細不明」が含まれる。

### (3) カンピロバクター感染症

#### ① 発生原因及び発生状況

本症は、少ない菌量で感染が成立することや、潜伏期間が2～5日と長いこと、大気条件下では菌が急速に死滅すること等により、発生原因の特定が困難である。

本症の原因菌の95～99%は *C. jejuni* であり、*C. coli* は数%のみである。

*C. jejuni* は感染力が強く、 $8 \times 10^2$  CFU で感染が認められたとの報告がある。また、人体投与実験では、*C. jejuni* を  $5 \times 10^2$  個牛乳に加えて飲んだところ下痢と腹痛を発症したとの一報告もあることから、 $10^2$  オーダー以下の低い菌量でも発症が認められるものと考えられる。(参照 158～160)

原因食品として、生肉料理（牛レバー、鶏肉の刺身やたたき等）や鶏肉調理食品等が推定されているが、食品以外でも井戸水等の水系感染事例も報告されている。

(参照 34)

本菌は空気、乾燥、熱に弱く、速やかに死滅するため、調理前の手洗いや食材は十分に加熱する等の一般的な食中毒対策に加え、調理器具・器材の洗浄・消毒・乾燥・二次汚染を防ぐ保管、生肉の喫食は避けること等により、感染の予防が可能であると考えられる。(参照 34) また、牛肝臓については、[V. 3.] で述べたとおり、生食用としての販売・提供は禁止された。(参照 156)

本症は、国内において代表的な食中毒であり、食中毒統計における *C. jejuni* / *C. coli* による食中毒は、2004～2013 年の 10 年間で事件数は約 4,000 件、患者数は 24,000 名、死者数は 0 名、2014～2022 年の 9 年間で患者数は約 16,000 名、死数 0 名と報告され、2003 年以降 2020 年現在、細菌性食中毒の病因物質別事件数で第一位となっている。(参照 138)

また、同期間に、人口動態統計において死因がカンピロバクター腸炎による腸管感染症となっている死亡者数<sup>16</sup>は 2004～2013 年の 10 年間で 2 名、2014～2021 年の 8 年間で 14 名と報告されている。(参照 168)

近年、学校等の大規模事例が減少し、飲食店等の小規模事例が増加してきたため、患者数は大幅に増減せず推移している。発生時期は 5～6 月に多く、7～8 月はやや減少、9～10 月に上昇する傾向となっている。(参照 33、34、138)

#### ② 重篤度

本症は、汚染された食品の摂取後 1～7 日で、下痢、腹痛、発熱、嘔吐、頭痛、全身倦怠感、血便等の症状が認められる。下痢は 1 日 4～12 回にもおよび、便性は水様性、泥状で膿、粘液、血液が混じることもしばしばある。本症の患者の多くは自然治癒し、一部の免疫不全患者を除いて死亡例もなく、予後も良好である場合が多いが、合併症として敗血症、肝炎、胆管炎、髄膜炎、関節炎、ギラン・バレー症候群等を起こすことがある。ギラン・バレー症候群は、急激に筋力低下が発症、進行する運動神経障害優位の末梢性多発神経炎である。疫学的データからカンピロバクター感染がギラン・バレー症候群の先行感染症の一つとして考えられているが、その発症機序については未解明の部分がある。疫学的データによれば、*C. jejuni* 感染症からギラン・

<sup>16</sup> 厚生労働省人口動態統計において、基本死因分類「A04.5 カンピロバクター腸炎」となっているもの。

バレー症候群に進展する確率は 1/1,000～1/3,000 と考えられている。(参照 158、161)

## 2. ハザードのばく露による人の疾病に対するフルオロキノロン系抗菌性物質による治療

### (1) 腸管出血性大腸菌感染症

#### ① 治療方針及び第一選択薬

「一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌（O157 等）感染症治療の手引き（改訂版）」（平成 9 年厚生省腸管出血性大腸菌感染症の診断治療に関する研究班）では、下痢症に対する対症療法に加え、適切な抗菌薬を使用することとされている。その場合、できるだけ速やかに抗菌薬を投与すること、抗菌薬の使用期間は 3 日間として長期投与は避けること、薬剤耐性菌と判明した場合は直ちに使用を中止し、必要に応じて他剤に変更すること等の注意が示されている。

本症に対する第一選択薬としては、フルオロキノロン系抗菌性物質、ホスホマイシン及びカナマイシンが推奨され、日本では、ホスホマイシンが多く使用されていると考えられる。(参照 34、35、78)

他方、腸管出血性大腸菌感染症については抗菌薬治療の必要の有無について意見が分かれるところであり、推奨は統一されていないが、投与する場合は、成人では第一選択としてキノロン、第二選択としてホスホマイシンが挙げられている。小児ではホスホマイシンを発症 3 日以内に投与することとされている。(参照 218)

#### ② 当該疾病の治療におけるハザードの影響

ハザードによって本症が発症し、その治療薬としてフルオロキノロン系抗菌性物質が投与された場合、治療期間が長引いたり、重症化したりする等の悪影響を及ぼす可能性は否定できない。しかし、実際の治療薬としては、フルオロキノロン系抗菌性物質よりもホスホマイシンが多く使用されていることや、第一選択薬 3 剤の系統が異なるため、お互いが代替治療薬として補完しあうと考えられること等から、本症の起因菌がハザードであったとしても、治療は可能であると考えられる。

### (2) サルモネラ感染症

#### ① 治療方針及び第一選択薬

下痢症に対する対症療法を行い、抗菌薬は軽症例では使用しないのが原則であるが、重症例や基礎疾患等の易感染性要因のある中等症例、保菌により就業上の制限を受ける場合、二次感染を起こす危険のある集団生活者等に対しては、感受性等に注意して薬剤を選択し、抗菌薬を 3～7 日間使用することとされている。海外では、抗菌薬の投与によって腸内細菌叢が攪乱され、除菌が遅れる上に、薬剤耐性菌の誘発、サルモネラに対する易感染性を高める等の理由で、単純な胃腸炎には投与すべきではないという意見が一般的であるが、国内では、フルオロキノロン系抗菌性物質の 7 日間投与は腸内細菌叢に対する影響もなく、除菌率も高いという成績に基づき使用されている。

本症に対する第一選択薬としては、フルオロキノロン系抗菌性物質、ホスホマイシン及びアンピシリンが推奨されている。(参照 34、35、83)

## ② 当該疾病の治療におけるハザードの影響

ハザードによって本症が発症し、その治療薬としてフルオロキノロン系抗菌性物質が投与された場合、治療期間が長引いたり、重症化したりする等の悪影響を及ぼす可能性は否定できない。しかし、本症のような感染性胃腸炎に対しては対症療法が優先されていることや、第一選択薬 3 剤の系統が異なるため、お互いが代替治療薬として補完しあうと考えられること等から、本症の起因菌がハザードであったとしても、治療は可能であると考えられる。

ただし、*S. Typhimurium* において、アンピシリン耐性を示す株が少なくない他、フルオロキノロン系抗菌性物質や第三世代セファロスポリンに高度耐性を示す株等が分離されていることが危惧される。

## (3) カンピロバクター感染症

### ① 治療方針及び第一選択薬

本症の患者の多くは自然治癒し、予後も良好であることが多いが、原因不明の初期治療では、重症例や基礎疾患等の易感染性要因のある中等症例、保菌により就業上の制限を受ける場合、二次感染を起こす危険のある集団生活者等に対し、対症療法とともに、抗菌薬を 3～5 日間使用することとされている。

本症の患者の多くは自然治癒し、また、予後も良好である場合が多く、特別治療を必要としないが、重篤な症状や敗血症などを呈した患者では、対症療法と共に適切な化学療法が必要である。

本症に対する第一選択薬としては、マクロライド系抗生物質（アジスロマイシン、クラリスロマイシン等）及びホスホマイシンが推奨されている。カンピロバクターのフルオロキノロン耐性は 1 段階の突然変異で獲得されるため、フルオロキノロン系抗菌性物質は治療薬としては推奨されていない。しかし、フルオロキノロン系抗菌性物質は、原因菌がまだ特定されていない腸管感染症に対する初診時の治療薬として使用されており、カンピロバクター感染症に対しても投与されている可能性がある。（参照 34、35、84、218）

### ② 当該疾病の治療におけるハザードの影響

本症の治療薬として、フルオロキノロン系抗菌性物質は推奨されておらず、マクロライド系抗生物質（アジスロマイシン、クラリスロマイシン等）及びホスホマイシンが推奨されていることから、本症の起因菌がハザードであったとしても、治療は可能であると考えられる。しかし、原因菌がまだ特定されていない時点における腸管感染症の治療薬としてフルオロキノロン系抗菌性物質が使用される可能性があり、本症の起因菌がハザードであった場合には、治療期間が長引く等の悪影響を及ぼす可能性は否定できない。

## 3. 人臨床分野におけるフルオロキノロン耐性菌の状況等

### (1) 人臨床分野におけるフルオロキノロン耐性菌等の検出状況

フルオロキノロン系抗菌性物質が牛及び豚に使用された場合に選択される薬剤耐性菌（ハザード）が、人臨床分野における耐性菌の発現に対して、どの程度、影響を及

ばしているのかは不明であるが、人臨床分野におけるフルオロキノロン耐性菌の検出状況が調査されている。

### ① 腸管出血性大腸菌等

国内の人臨床由来大腸菌におけるフルオロキノロン耐性率の調査では、腸管出血性大腸菌が 0.0%、病原性大腸菌が約 3.0%、*E. coli* (病原性不明) が 10%前後であったという報告がある (表 65、表 66)。国内での最近の調査結果によると、腸管出血性大腸菌のフルオロキノロン耐性株は検出されていないが、尿路感染症又は呼吸器感染症由来大腸菌のフルオロキノロン耐性率は 1994 年の 2.1%から 2016 年の 37.2%と明らかな上昇がみられている。(参照 219、220)

また、国内の人臨床由来菌株では、テトラサイクリン、アミノベンジルペニシリン、ストレプトマイシン、ホスホマイシン、カナマイシン、NA 等に対する薬剤耐性菌が報告されている。(参照 78)

### ② サルモネラ

国内の人臨床由来株におけるフルオロキノロン耐性率の調査では、フルオロキノロン耐性は認められていないという報告もあるが (表 63、64)、人臨床由来のサルモネラにおいてフルオロキノロン耐性菌が分離されたとの報告もある。(参照 44、85、86) 国内の最近の調査結果では、1%以下から数%と耐性率は低いものの、耐性株が検出されている。(参照 220、221)

また、国内のサルモネラにおけるその他の薬剤耐性率は、アンピシリンで 20~30%、ホスホマイシンで 10%未満であり、ストレプトマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、スルフィソキサゾール等に対する薬剤耐性菌も報告されている。(参照 34、87)

### ③ カンピロバクター

国内の人臨床由来 *C. jejuni* における調査では、フルオロキノロン耐性率は 10~40%程度であったという報告が多い (表 65、表 66)。

また、エリスロマイシンの耐性率は低いが、1990 年代後半以降、ホスホマイシンやフルオロキノロン系抗菌性物質 (OFLX) の耐性率は約 30%以上になっているという報告もある。(参照 84、88) 2010 年代の調査結果では、*C. jejuni* での CPF 耐性率は 40~50%に達しており、耐性率の上昇傾向がみられる。(参照 221-223)

表 65 人臨床由来株におけるフルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性の状況 (国内)

| 菌種                           | 薬剤名  | 耐性率  | 調査株数 | 調査年次      | 参考文献  |
|------------------------------|------|------|------|-----------|-------|
| 腸管出血性大腸菌 (O157)              | ERFX | 0.0% | 52   | 1986~1995 | 参照 89 |
|                              | OFLX | 0.0% | 52   |           |       |
|                              | NFLX | 0.0% | 52   |           |       |
| 病原性大腸菌 (ETEC、EIEC、EHEC、EPEC) | OFLX | 2.9% | 70   | 1996~2000 | 参照 90 |

|                        |              |              |       |           |        |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------|
| 腸管出血性大腸菌 (O157)        | NFLX 等       | 0.0%         | 1,675 | 2000~2006 | 参照 86  |
| 腸管出血性大腸菌               | CPFX<br>NFLX | 0.0%         | 101   | 2006      | 参照 86  |
| 志賀毒素産生大腸菌 (STEC)       | CPFX         | 0.0%         | 138   | 2003~2007 | 参照 224 |
| 腸管出血性大腸菌               | NFLX         | 0.0%         | 805   | 2006~2016 | 参照 219 |
| <i>E. coli</i> (参考)    | OFLX         | 9.3%         | 504   | 2000      | 参照 91  |
|                        | CPFX         | 9.1%         | 504   |           |        |
| <i>E. coli</i> (参考)    | OFLX         | 12.5%        | 696   | 2002      | 参照 92  |
|                        | CPFX         | 12.5%        | 696   |           |        |
| <i>E. coli</i> (参考)    | CPFX         | 12.5%        | 112   | 2005      | 参照 124 |
| <i>E. coli</i> (参考)    | CPFX         | 2.1%         | 387   | 1994      | 参照 220 |
|                        |              | 2.5%         | 357   | 1996      |        |
|                        |              | 3.3%         | 363   | 1998      |        |
|                        |              | 8.7%         | 504   | 2000      |        |
|                        |              | 12.1%        | 696   | 2002      |        |
|                        |              | 18.8%        | 1105  | 2004      |        |
|                        |              | 25.8%        | 743   | 2007      |        |
|                        |              | 29.6%        | 741   | 2010      |        |
|                        |              | 34.7%        | 712   | 2013      |        |
|                        |              | 37.2%        | 669   | 2016      |        |
| <i>Salmonella</i> spp. | OFLX         | 0.0%         | 93    | 1996~2000 | 参照 90  |
| <i>Salmonella</i> spp. | OFLX         | 0.0%         | 165   | 2000      | 参照 91  |
|                        | CPFX         | 0.0%         | 165   |           |        |
| <i>Salmonella</i> spp. | OFLX         | 0.0%         | 186   | 2002      | 参照 92  |
|                        | CPFX         | 0.0%         | 186   |           |        |
| <i>Salmonella</i> spp. | CPFX<br>NFLX | 4.5%         | 176*1 | 2006      | 参照 86  |
| <i>Salmonella</i> spp. | CPFX         | 0.0%         | 107   | 1994      | 参照 220 |
|                        |              | 0.0%         | 154   | 1996      |        |
|                        |              | 0.0%         | 99    | 1998      |        |
|                        |              | 0.0%         | 165   | 2000      |        |
|                        |              | 0.0%         | 186   | 2002      |        |
|                        |              | 0.9%         | 320   | 2004      |        |
|                        |              | 1.4%         | 210   | 2007      |        |
|                        |              | 0.0%         | 194   | 2010      |        |
|                        |              | 1.6%         | 123   | 2013      |        |
|                        |              | 4.7%         | 106   | 2016      |        |
|                        |              |              |       |           |        |
| <i>Salmonella</i> spp. | CPFX         | 0.3%         | 387   | 2015      | 参照 221 |
|                        |              | 0.8%         | 360   | 2016      |        |
|                        |              | 1.7%         | 409   | 2017      |        |
|                        |              | 0.3%         | 315   | 2018      |        |
|                        |              | 0.4%         | 265   | 2019      |        |
|                        |              | 0.0%         | 211   | 2020      |        |
|                        |              | 1.4%         | 146   | 2021      |        |
|                        |              |              |       |           |        |
| <i>C. jejuni</i>       | OFLX         | 22.0%        | 41    | 1996~2000 | 参照 90  |
| <i>C. jejuni</i>       | CPFX         | 22.0%        | 127   | 2001~2003 | 参照 88  |
| <i>C. coli</i>         | CPFX         | 62.5%        | 8     |           |        |
| <i>C. jejuni</i>       | CPFX         | 2003 : 17.4% | 132   | 2003~2006 | 参照 125 |
|                        |              | 2004 : 21.4% | 196   |           |        |
|                        |              | 2005 : 21.0% | 195   |           |        |
| <i>C. jejuni</i>       | CPFX         | 32.1%        | 53    | 2002~2006 | 参照 126 |
| <i>C. jejuni</i>       | NFLX         | 32.1%        | 53    | 2002~2006 | 参照 126 |
| <i>C. jejuni</i>       | NFLX 等       | 12.0%        | 75    | 1999      | 参照 93  |
| <i>C. jejuni</i>       | NFLX 等       | 17.3%        | 98    | 2000      | 参照 93  |

|                  |        |                                                                                                               |         |           |        |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| <i>C. jejuni</i> | NFLX 等 | 43.9%                                                                                                         | 98      | 2001      |        |
| <i>C. jejuni</i> | NFLX 等 | 35.2%                                                                                                         | 145     | 2002      |        |
| <i>C. jejuni</i> | NFLX 等 | 40.7%                                                                                                         | 81      | 2006      | 参照 95  |
| <i>C. jejuni</i> | NFLX 等 | 2000 : 26.0%<br>2001 : 38.2%<br>2002 : 28.4%<br>2003 : 26.8%<br>2004 : 38.6%<br>2005 : 27.4%<br>2006 : 35.2%  | 1,320*2 | 2000~2006 | 参照 86  |
|                  |        | 2007 : 26.4%                                                                                                  |         | 2007      |        |
| <i>C. jejuni</i> | CPFX 等 | 42.0%                                                                                                         | 50      | 2011~2013 | 参照 222 |
| <i>C. jejuni</i> | CPFX   | 53.7%                                                                                                         | 108     | 2011      | 参照 221 |
|                  |        | 62.7%                                                                                                         | 83      | 2012      |        |
|                  |        | 50.6%                                                                                                         | 85      | 2013      |        |
|                  |        | 50.4%                                                                                                         | 125     | 2014      |        |
|                  |        | 37.1%                                                                                                         | 116     | 2015      |        |
|                  |        | 52.2%                                                                                                         | 113     | 2016      |        |
|                  |        | 43.5%                                                                                                         | 115     | 2017      |        |
|                  |        | 51.8%                                                                                                         | 110     | 2018      |        |
|                  |        | 54.5%                                                                                                         | 132     | 2019      |        |
|                  |        | 31.4%                                                                                                         | 86      | 2020      |        |
| <i>C. jejuni</i> | CPFX   | 34.9%                                                                                                         | 215     | 2000~2008 | 参照 223 |
|                  |        | 41.9%                                                                                                         | 215     | 2009~2017 |        |
| <i>C. coli</i>   | NFLX 等 | 2000 : 23.1%<br>2001 : 100.0%<br>2002 : 37.5%<br>2003 : 90.0%<br>2004 : 33.3%<br>2005 : 42.9%<br>2006 : 75.0% | 60*2    | 2000~2006 | 参照 86  |
| <i>C. coli</i>   | CPFX 等 | 64.3%                                                                                                         | 14      | 2011~2013 | 参照 222 |
| <i>C. coli</i>   | CPFX   | 87.5%                                                                                                         | 8       | 2011      | 参照 221 |
|                  |        | 66.7%                                                                                                         | 9       | 2012      |        |
|                  |        | 75.0%                                                                                                         | 12      | 2013      |        |
|                  |        | 57.1%                                                                                                         | 7       | 2014      |        |
|                  |        | 50.0%                                                                                                         | 8       | 2015      |        |
|                  |        | 35.7%                                                                                                         | 14      | 2016      |        |
|                  |        | 62.5%                                                                                                         | 8       | 2017      |        |
|                  |        | 37.5%                                                                                                         | 8       | 2018      |        |
|                  |        | 68.8%                                                                                                         | 16      | 2019      |        |
|                  |        | 57.1%                                                                                                         | 7       | 2020      |        |

\*1 : 散発下痢症患者由来 149 株 (うち海外渡航歴のある患者由来 11 株)、健康者由来 27 株

\*2 : 2000~2006 年の合計調査株数

表 66 (参考) 人臨床由来株におけるフルオロキノロン系抗菌性物質に対する薬剤耐性の状況 (外国)

| 菌種 (由来)                                  | 薬剤名  | 耐性率   | 調査株数   | 調査年次      | 参考文献   |
|------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|--------|
| Non-Typhi <i>S. enterica</i>             | CPFX | 0.1%  | 12,252 | 1996～2003 | 参照 96  |
| Nontyphoidal <i>Salmonella</i>           | CPFX | 0.8%  | 25,319 | 2000      | 参照 97  |
|                                          | CPFX | 0.4 % | 29,196 | 2001      |        |
|                                          | CPFX | 0.9%  | 27,589 | 2002      |        |
|                                          | CPFX | 0.9%  | 28,311 | 2003      |        |
|                                          | CPFX | 0.8%  | 25,176 | 2004      |        |
| Nontyphoid <i>Salmonella</i>             | CPFX | 2.7%  | 671    | 2001      | 参照 98  |
| <i>S. Typhimurium</i>                    | CPFX | 70.5% | 44     | 2002～2005 | 参照 99  |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)   | CPFX | 2.2%  | 90     | 2007      | 参照 100 |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴のあった患者由来)    | CPFX | 18.2% | 44     |           |        |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴が不明であった患者由来) | CPFX | 3.4%  | 206    |           |        |
| <i>S. Typhimurium</i>                    | CPFX | 70.0% | 44     | 2002～2005 | 参照 99  |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)   | CPFX | 2.0%  | 203    | 2011      | 参照 127 |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴のあった患者由来)    | CPFX | 16.0% | 74     |           |        |
| <i>S. Typhimurium</i> (外国旅行歴が不明であった患者由来) | CPFX | 6.0%  | 85     |           |        |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)   | CPFX | 9.0%  | 67     | 2007      | 参照 100 |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴のあった患者由来)    | CPFX | 30.7% | 88     |           |        |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴が不明であった患者由来) | CPFX | 12.0% | 183    |           |        |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)   | CPFX | 18.0% | 66     | 2011      | 参照 127 |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴のあった患者由来)    | CPFX | 24.0% | 167    |           |        |
| <i>S. Enteritidis</i> (外国旅行歴が不明であった患者由来) | CPFX | 27.0% | 55     |           |        |
| <i>C. jejuni</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)        | CPFX | 38.6% | 70     | 2007      | 参照 100 |
| <i>C. jejuni</i> (外国旅行歴のあった患者由来)         | CPFX | 70.5% | 61     |           |        |
| <i>C. jejuni</i> (外国旅行歴のなかった患者由来)        | CPFX | 33.0% | 104    | 2011      | 参照 127 |
| <i>C. jejuni</i> (外国旅行歴のあった患者由来)         | CPFX | 84.0% | 79     |           |        |

## (2) フルオロキノロン耐性菌が人の健康に与える悪影響

家畜、食品及び人の臨床に由来するフルオロキノロン耐性菌の類似性や、由来は特定されていないが、フルオロキノロン耐性菌による人の健康に対する悪影響を示唆する知見が報告されている。

日本及び台湾において、人及び動物由来のフルオロキノロン耐性サルモネラについて、両者の遺伝子的な類似性を示唆した文献が報告されている。(参照 44、83)

デンマークにおいては、豚、豚肉及び人臨床のそれぞれに由来するフルオロキノロン耐性の *S. Typhimurium* が遺伝子的に類似している他、人に対するフルオロキノロン系抗菌性物質治療の臨床効果が減弱する可能性を示唆した文献が報告されている。(参照 101)

また、フランスにおいて、最初に投与された CPFX により症状が改善せず入院した患者から、CPFX 耐性の *S. Typhimurium* (由来不明) が CPFX 投与後に分離されたというフルオロキノロン系抗菌性物質の治療効果の減弱事例が報告されている。(参照 102)

一方、以下の報告によると、フルオロキノロン耐性カンピロバクターに感染したとしても、臨床的には必ずしも疾病が重篤化したり治療が長引いたり等の悪影響が生じないであろうことが示唆されている。

2 か所 (米国及び英国) で実施された *C. jejuni* に感染した症例の重篤度及び症状の持続期間又は入院期間等に対する大規模な疫学調査 (約 11,000 症例) を統計学的に再解析した結果、臨床的には、フルオロキノロン耐性カンピロバクターによる感染がフルオロキノロン感受性カンピロバクターによる感染よりも人の健康に深刻な影響を与えとはいえないと結論されている。(参照 128)

英国で実施された短期及び中期的な疫学調査 (556 症例の 3 か月間及び 6 か月間の追跡調査) においては、フルオロキノロン耐性カンピロバクター感染による臨床的及び公衆衛生学的な疾病の重症化や持続期間の延長を示す証拠を見出すことはできなかった。(参照 129)

## VII. 食品健康影響評価

### 1. 発生、ばく露及び影響評価並びにリスクの推定の考え方

評価指針に基づき、特定したハザードである腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターについて、発生、ばく露及び影響評価を行い、その結果を総合的に判断してリスクの推定を行った。（参照 1）

### 2. 発生評価について

#### （1）ハザードの出現（薬剤耐性機序、遺伝学的情報等）

腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターにおけるフルオロキノロン耐性に大きく影響するのは染色体上の遺伝子であると考えられてきたが、プラスミド上に存在するキノロン耐性遺伝子も複数報告されており、それらが細菌間で伝達されることも報告されている。実際に、牛由来サルモネラにおいても伝達性フルオロキノロン耐性遺伝子保有株が検出されている。（腸管出血性大腸菌及びサルモネラについて懸念は中程度）

カンピロバクターについては、サルモネラ及び大腸菌と比較して耐性株出現頻度が高い株が存在し、GyrA の QRDR の一か所の変異でフルオロキノロン耐性を獲得することが知られている。また、国内で承認されている用法・用量で豚にフルオロキノロンを投与した場合に、速やかに耐性菌が選択されたことが報告されている。また、スイスにおいて、豚由来 *C. coli* の野外分離株の分子疫学的な解析において、それぞれの農場で選択圧により耐性を獲得している可能性が示唆されたとの報告があった。（カンピロバクターについて懸念は大きい）

#### （2）ハザードの感受性分布

健康な牛及び豚由来の大腸菌では、フルオロキノロン耐性菌が認められるものの、耐性率や MIC 分布域に大きな変動は認められておらず、感受性は維持されているものと考えられた（腸管出血性大腸菌について懸念は小さい）。

健康な牛及び豚由来のサルモネラは、ほとんど検出されない。病畜由来のサルモネラでは、フルオロキノロン耐性菌が認められるものの、全体的には MIC 分布域に大きな変動はみられず、感受性を維持していると考えられた。耐性株は検出されるが少数である。（サルモネラについて懸念は小さい）

健康な牛及び豚由来カンピロバクターでは、大腸菌及びサルモネラよりも高いレベルで耐性率が変動している。農場において採材した健康な牛由来 *C. jejuni* においては、1999 年と第 2 クールの間で耐性率に大きな変動はなかった。しかしながら、第 2 クール以降、第 2 及び第 5 クール間で耐性率に統計学的に有意な差が認められた。第 6 クールの耐性率は 40%と同程度であった。また、2016 年以降のと畜場において採材した調査では、耐性率は、31.4%と低かった 2018 年を除き、44.4～62.7%の範囲で変動しており、耐性率の大きな上昇はなかった。ただし、2019 及び 2020 年は 60%前後と比較的高めの耐性率が報告されており、今後上昇傾向となるか動向を把握する必要がある。

また、農場において採材した健康な豚由来 *C. coli* においては、1999 年と第 2 クールのうちの 1 年である 2007 年の耐性率のデータ間のみ統計学的に有意な差が認め

られた。また、第2及び第4クールの間で耐性率に統計学的に有意な差が認められたが、第2クール及び第3クール又は第5クール間で統計学的に有意な差は認められなかった。第6クルールの耐性率は52.6%であった。また、2016年以降のと畜場において採材した調査では、耐性率はおおむね同程度（40.0～59.0%）で推移しており、耐性率の大きな上昇はないものと推察された。（カンピロバクターについて懸念は中程度）

ただし、耐性率の変動については引き続き注意深く監視する必要がある。

### （3）発生評価に係るその他要因（薬物動態、使用方法、使用量等）

牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤については、承認事項における使用期間や使用方法の限定、法令による獣医師の関与の義務付け等の適正使用の確保のための措置、市販後における耐性菌の状況に関する調査・報告等の義務付け、全国規模の薬剤耐性菌のモニタリング調査等が措置されている。また、第1版の結果を受けて、第一次選択薬が無効な症例にのみ第二次選択薬として使用することを徹底する等の措置を講じ、現在も維持している。カンピロバクターについては、豚においては、ヒトのカンピロバクター感染症の主要な原因菌である *C. jejuni* はほとんど分離されない。

フルオロキノロン系抗菌性物質は、動物用医薬品として1991年以降販売されており、原体の流通量は、牛は2019年まで微増していたが2020年及び2021年はほぼ同量であり、また、豚は大きな変動はなく、双方大きな上昇はみられない。

フルオロキノロン系抗菌性物質が適切に使用される限りにおいて、腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターのハザードの発生について、大きな懸念を生じさせるようなその他の要因はないものと考えられた。（懸念は小さい）

### （4）発生評価

発生評価の結果を表67に示した。

腸管出血性大腸菌及びサルモネラについては、ハザードが選択される可能性があるが、フルオロキノロン系抗菌性物質が適切に使用される限りにおいて、その程度は小さいと考えられる。（低度）

サルモネラについては、少数であるが耐性株が検出されていること、また伝達性フルオロキノロン耐性遺伝子保有株が検出されていることから、耐性状況について今後とも注視が必要である。

カンピロバクターについては、速やかな耐性菌の選択が懸念される。2009～2013年のデータでは、農場にて採材した健康牛及び豚由来株の耐性率の経年的なデータ間に統計学的な有意差が認められたが、全体としては耐性率に変動があるとは言えないとしていた。2016年以降、と畜場より採材した健康牛及び豚由来株の耐性率に大きな上昇は見られないものの、その耐性率はそれぞれ牛で31.4～62.7%、豚で40.0～59.0%と、腸管出血性大腸菌及びサルモネラと比較して高く推移している。（中等度）

表 67 発生評価の内容

| 区分   | 評価項目   |                | 腸管出血性大腸菌 | サルモネラ | カンピロバクター |
|------|--------|----------------|----------|-------|----------|
| 発生評価 | 評価結果   |                | 低度       | 低度    | 中等度      |
|      | 各項目の評価 | ①ハザードの出現に係る懸念  | 中程度      | 中程度   | 大きい      |
|      |        | ②ハザードの感受性に係る懸念 | 小さい      | 小さい   | 中程度      |
|      |        | ③その他要因に係る懸念    | 小さい      | 小さい   | 小さい      |

### 3. ばく露評価について

#### (1) ハザードを含む当該細菌の生物学的特性

腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターは牛及び豚の腸内に存在し、かつ食肉で生存が可能であることから、ハザードが食品を介して人へばく露する可能性があると考えられた。抵抗性、生残性、増殖性等の生物学的特性については、一般的な細菌の範囲であると考えられた（懸念は中程度）。

#### (2) ハザードを含む当該細菌による食品の汚染状況

牛肉及び豚肉が適切に管理される限りにおいては、腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターによる牛肉及び豚肉の汚染は少なく、それらのハザードによる汚染はさらに少ないと考えられた。一方で、牛内臓肉からの腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの陽性率は牛肉よりも高かった。牛内臓肉及び牛の胆嚢内胆汁から分離されたカンピロバクターのフルオロキノロン耐性率は高いとの報告もあったが、国産の牛豚ひき肉及び牛肉より分離された大腸菌のフルオロキノロン耐性率は低かった（懸念は小さい）。

#### (3) ばく露評価に係るその他要因（食肉処理工程、流通経路等）

牛肉及び豚肉が適切に管理及び消費される限りにおいては、腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターについて、大きな懸念を生じさせるようなその他の要因はないと考えられた。また、ハザードを含む当該細菌が原因となる食中毒については、調理前の手洗い、他の食材、特に調理済み食品との交差汚染を防ぎ、食材を十分に加熱する等の一般的な食中毒対策により感染が予防できるものと考えられた。また、2011年には生食用牛肉の規格基準の設定、2012年には牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止により、リスクはさらに低くなった。また、2015年には豚の食肉（内臓を含む）の生食用として提供の禁止及び2020年にはHACCPに沿った衛生管理の原則実施している（懸念は小さい）。

#### (4) ばく露評価

ばく露評価の結果を 表 68 に示した。腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピ

ロバクターについては、ハザードによるばく露を受ける可能性があるが、一般的な食中毒対策等により、牛及び豚由来食品が適切に管理及び消費されている限りにおいては、ばく露の程度は低いと考えられる。また、生食用牛肉の規格基準の設定、牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止、豚肉（内臓含む）の生食用としての提供禁止により、リスクはさらに低くなった。また、HACCPに沿った衛生管理を原則実施している（低度）。

ただし、牛内臓肉及び牛の胆嚢内胆汁から分離されたカンピロバクターのフルオロキノロン耐性率は高いとの報告もあり、内臓から肉部分への交差汚染によりばく露のリスクが高まる可能性も否定できないことに留意が必要である。

表 68 ばく露評価の内容

| 区分    | 評価項目   |               | 腸管出血性大腸菌 | サルモネラ | カンピロバクター |
|-------|--------|---------------|----------|-------|----------|
| ばく露評価 | 評価結果   |               | 低度       | 低度    | 低度       |
|       | 各項目の評価 | ①生物学的特性に係る懸念  | 中程度      | 中程度   | 中程度      |
|       |        | ②食品の汚染状況に係る懸念 | 小さい      | 小さい   | 小さい      |
|       |        | ③その他要因に係る懸念   | 小さい      | 小さい   | 小さい      |

#### 4. 影響評価について

##### （１）当該疾病治療におけるフルオロキノロン系抗菌性物質の重要度

食品安全委員会が決定した「人用抗菌性物質の重要度ランク付け」において、フルオロキノロン系抗菌性物質は「ランクⅠ（きわめて高度に重要）」とランク付けされている。また、フルオロキノロン系抗菌性物質は、腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症に対しては推奨薬とされている（ランクⅠかつ推奨薬、どちらも該当）。カンピロバクター感染症に対しては推奨薬とはされていない（ランクⅠだが推奨薬ではない、一方のみ該当）。

##### （２）当該疾病の重篤性

腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症については、食品を介した感染症の発生数が多い。特に腸管出血性大腸菌においては、同じ遺伝学的特徴を有する菌株が広域に感染者を発生させる広域散发事例が現在でも腸管出血性大腸菌感染症対策においても大きな問題となっている。また、腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症は、症状が重篤化する可能性が否定できないと考えられた（懸念は大きい）。

カンピロバクター感染症については、食品を介した感染症の発生件数が多く、ギラン・バレー症候群との関連性も指摘されているが、患者の多くは自然治癒し、予後も良好である場合が多いことから、症状が重篤化する可能性が大きいとは言い切れないと考えられた（懸念は中程度）。

### （３）影響評価に係るその他要因（代替薬の状況、医療分野における薬剤耐性の状況等）

腸管出血性大腸菌感染症及びサルモネラ感染症については、フルオロキノロン系抗菌性物質とは系統の異なる代替薬が存在している他、医療分野におけるフルオロキノロン系抗菌性物質に対する耐性率も低く維持されていると考えられることから、大きな懸念を生じさせる要因はないと考えられた（懸念は小さい）。

カンピロバクター感染症については、フルオロキノロン系抗菌性物質とは系統の異なる抗菌性物質が推奨薬とされているが、原因菌がまだ特定されていない時点における腸管感染症の治療薬としてフルオロキノロン系抗菌性物質が使用される場合があることや、医療分野におけるフルオロキノロン系抗菌性物質に対する耐性率が腸管出血性大腸菌及びサルモネラよりも高めであることから、ハザードが本症の治療に対して悪影響を及ぼす可能性は否定できないと考えられた（懸念は中程度）。

### （４）影響評価

影響評価の結果を表 69 に示した。医療分野における現状を総合的に考慮すると、腸管出血性大腸菌、サルモネラ及びカンピロバクターは、ハザードに起因する感染症に対するフルオロキノロン系抗菌性物質の治療効果が減弱又は喪失する可能性があり、その程度は腸管出血性大腸菌及びサルモネラについては高度、カンピロバクターについては中程度であると考えられた。

表 69 影響評価の内容

| 区分   | 評価項目   |                | 腸管出血性大腸菌 | サルモネラ  | カンピロバクター |
|------|--------|----------------|----------|--------|----------|
| 影響評価 | 評価結果   |                | 高度       | 高度     | 中程度      |
|      | 各項目の評価 | ①重要度ランクⅠかつ推奨薬  | どちらも該当   | どちらも該当 | 一方のみ該当   |
|      |        | ②当該疾病の重篤性に係る懸念 | 大きい      | 大きい    | 中程度      |
|      |        | ③その他要因に係る懸念    | 小さい      | 小さい    | 中程度      |

## 5. リスクの推定について

### （１）腸管出血性大腸菌

フルオロキノロン系抗菌性物質が牛及び豚に使用されることによりハザードが選択される可能性があり、牛及び豚由来大腸菌ではフルオロキノロン耐性菌が認められるものの、耐性率や MIC 分布に大きな変動は認められておらず、フルオロキノロン系抗菌性物質が適正に使用される限りにおいて、発生評価としては「低度」と判断された。

また、ばく露評価においては、ハザードが食品を介して人へばく露する可能性があると考えられたが、当該細菌の牛及び豚肉における汚染が内臓肉を除き少ないこと、一般的な食中毒対策により感染が予防できること、生食用牛肉の規格基準の設定及び牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止等から、「低度」と判断された。

影響評価としては、フルオロキノロン系抗菌性物質が「人用抗菌性物質の重要度ランク付け」において「ランクⅠ（きわめて高度に重要）」とランク付けされていること、

また、系統の異なる代替薬は存在するものの腸管出血性大腸菌感染症に対する推奨薬とされていること、さらに、当該感染症の重篤性から、影響評価は「高度」と判断された。

以上の各評価項目の結果を踏まえ、総合的にリスクを推定した結果、腸管出血性大腸菌のハザードによるリスクは中等度と判断された（表 70）。

## （２）サルモネラ

フルオロキノロン系抗菌性物質が牛及び豚に使用されることによりハザードが選択される可能性がある。少数ながらフルオロキノロン耐性株が検出されており、伝達性フルオロキノロン耐性遺伝子保有株も検出されるようになっているが、全体的には MIC 分布に大きな変動は認められておらずフルオロキノロン系抗菌性物質が適正に使用される限りにおいて、発生評価としては「低度」と判断された。

また、ばく露評価においては、ハザードが食品を介して人へばく露する可能性があると考えられたが、当該細菌の牛及び豚肉における汚染が少ないこと、一般的な食中毒対策により感染が予防できること、生食用牛肉の規格基準の設定及び牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止等から、「低度」と判断された。

影響評価としては、フルオロキノロン系抗菌性物質が「人用抗菌性物質の重要度ランク付け」において「ランクⅠ（きわめて高度に重要）」とランク付けされていること、また、系統の異なる代替薬は存在するもののサルモネラ感染症に対する推奨薬とされていること、さらに、当該感染症の重篤性から、影響評価は「高度」と判断された。

以上の各評価項目の結果を踏まえ、総合的にリスクを推定した結果、サルモネラのハザードによるリスクは中等度と判断された（表 70）。

## （３）カンピロバクター

フルオロキノロン系抗菌性物質が牛及び豚に使用されることにより速やかにハザードが選択される可能性があり、JVARM によるモニタリング調査において調査年ではばらつきはあるものの、調査年又はクール間の耐性率に統計学的に有意な差が認められている。2016 年以降、健康牛及び豚由来カンピロバクターの耐性率は上昇傾向にはないものの、比較的高く推移していることから、発生評価は「中等度」と判断された。

ばく露評価においては、ハザードが食品を介して人へばく露する可能性があると考えられたが、当該細菌の牛及び豚肉における汚染が少ないこと、一般的な食中毒対策により感染が予防できること、生食用牛肉の規格基準の設定及び牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止等から、「低度」と判断された。

影響評価としては、フルオロキノロン系抗菌性物質が「人用抗菌性物質の重要度ランク付け」において「ランクⅠ（きわめて高度に重要）」とランク付けされているが、カンピロバクター感染症に対する推奨薬とはされていないこと等から、影響評価は「中等度」と判断された。

以上の各評価項目の結果を踏まえ、総合的にリスクを推定した結果、カンピロバクターのハザードによるリスクは中等度と判断された（表 70）。

表 70 リスクの推定の内容

| 区分         | 評価項目       |             | 腸管出血性<br>大腸菌 | サルモネラ | カンピロバ<br>クター |
|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| リスクの<br>推定 | 評価結果       |             | 中等度          | 中等度   | 中等度          |
|            | 各項目の<br>評価 | ①発生評価（スコア）  | 低度(1)        | 低度(1) | 中等度(2)       |
|            |            | ②ばく露評価（スコア） | 低度(1)        | 低度(1) | 低度(1)        |
|            |            | ③影響評価（スコア）  | 高度(3)        | 高度(3) | 中等度(2)       |
|            |            | （スコア合計）     | （5）          | （5）   | （5）          |

## 6. 食品健康影響評価について

以上のことから、これまでに得られている科学的知見に基づく現時点での牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤の承認に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価は、以下のとおりと考えられた。

- （1）評価対象動物用医薬品であるフルオロキノロン系抗菌性物質が、牛及び豚に使用された結果としてハザードが選択され、牛及び豚由来食品を介して人がハザードにばく露され、人用抗菌性物質による治療効果が減弱又は喪失する可能性は否定できず、リスクの程度は中等度であると考えた。
- （2）なお、薬剤耐性菌については、現時点では詳細な科学的知見や情報が必ずしも十分とは言えず、また、リスク評価の手法についても国際的にも十分確立されていないと考えられるため、国際機関における検討状況等を含め新たな科学的知見・情報の収集が必要である。

## Ⅷ. その他の考察

### 1. リスク管理措置の徹底について

牛及び豚に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤については、〈別紙参考 1〉に示すフルオロキノロン系抗菌性物質製剤の適正使用の確保のための措置及び薬剤耐性菌に関する情報収集等のリスク管理措置等の徹底が図られている。さらに、第 1 版の評価を踏まえた〈別紙参考 2〉に示すリスク管理措置が 2012 年 6 月に示されたところである。(参照 130)

第 1 版の評価の結果(2010 年 3 月通知)を受け、第一次選択薬が無効な症例にのみ第二次選択薬としてフルオロキノロン系抗菌性物質を使用することを徹底する等の措置を農林水産省は講じた。しかし、2010 年以降、フルオロキノロン系抗菌性物質の原体の流通量は減少に転じていない。

また、2016 年以降、健康な牛及び豚から分離されるカンピロバクターのフルオロキノロン耐性率が牛で 31.4～62.7%、豚で 40～59%で推移しており低減傾向はみられない。特に、牛由来 *C. jejuni* の耐性率は、2019 年及び 2020 年は 60%前後と比較的高めの耐性率となっており、今後増加傾向に転ずることも否定できない。

このため、今後も薬剤耐性菌に関する科学的知見・情報を収集した上で随時検証を行い、必要なリスク管理措置が講じられることが不可欠である。

### 2. 薬剤耐性菌に係るモニタリングについて

薬剤耐性菌のモニタリングについては、家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の評価の実施に当たり、家畜－食品－人という一連の過程の中で薬剤耐性菌の動態をモニタリングすることが有効であり、また、試料の採取方法や薬剤感受性試験法等の調査手法が標準化されたデータにより検討することが望ましい。

JVARM における健康家畜由来細菌のモニタリングは、2015 年までは、全国を 4 ブロックに分けた農場における調査を、2016 年からと畜場等における調査を実施しているところである(詳細は、IV. 1. (2) 参照)。今後も、薬剤耐性菌の調査を継続的に行い、フルオロキノロン系抗菌性物質製剤の使用と薬剤耐性率の上昇に係る因果関係等を解明することができるシステムを構築していくことが望まれる。なお、今回、発生評価において「懸念が大きい」とされた項目があることを踏まえ、引き続き、モニタリングの充実が望まれる。

同様に、家畜－食品－人における全国的モニタリングの体制の構築により、家畜等における耐性菌の出現と人から分離される耐性菌の比較解析を行い因果関係の解明を行うことも重要である。

このようなことから、今後、関係リスク管理機関が連携の上、疫学的評価・検証に耐え得る包括的な薬剤耐性菌モニタリング体制を構築し、薬剤耐性獲得状況について継続的に調査・監視することが必要である。

さらに、薬剤耐性菌のモニタリングは、薬剤耐性菌の発生状況を的確にモニタリングし、得られたモニタリング結果は適時に科学的に検証されるべきものであることから、常に最新の科学的知見・情報を踏まえた上で、モニタリングの対象とする菌種(食品媒介性病原菌、指標細菌、その他今後ハザードとして特定する必要があると判断される細菌)、サンプリング方法、抗菌剤、薬剤耐性遺伝子等の調査の範囲・内容等について、適

切に設定することが必要である。

### 3. フルオロキノロン系抗菌性物質耐性カンピロバクターの発生動向

ばく露評価において、フルオロキノロン系抗菌性物質耐性カンピロバクターが食品を介して人へばく露する可能性があると考えられたが、当該細菌の牛及び豚肉における汚染が少ないこと、一般的な食中毒対策により感染が予防できること、生食用牛肉の規格基準の設定及び牛肝臓の生食用としての販売・提供の禁止等から、「低度」と判断された。

しかし、牛内臓肉及び牛の胆嚢内胆汁から分離されたカンピロバクターのフルオロキノロン耐性率は高いとの報告もあり、内臓から肉部分への交差汚染によりばく露のリスクが高まる可能性も否定できない。したがって、引き続き、内臓肉、肉ともに、薬剤耐性菌の発生動向を注意深く監視する必要があると考える。

### 4. 食品健康影響評価の見直しについて

評価対象動物用医薬品の承認に係る案件については、承認後、特に市販後の耐性状況のデータ等を踏まえたリスク評価が必要とされることから、承認後のリスク管理状況やモニタリング調査結果、新たな科学的知見・情報等の収集、検証を行った上で、国際機関等における検討状況等も踏まえ、医薬品医療機器等法に基づく再審査時のみならず必要に応じ、それらの情報に基づき改めて評価を実施することが必要であると考ええる。

## ＜別紙参考 1＞フルオロキノロン系抗菌性物質製剤における現状のリスク管理措置

現在、リスク管理機関においては、以下に示すような、フルオロキノロン系抗菌性物質製剤の適正使用確保のための措置及び薬剤耐性菌に関する情報の収集等の措置が講じられている。

### （１）承認等の取扱い

フルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする動物用医薬品の承認申請については、同一の成分を有効成分とする人用医薬品が既に承認されている場合は、当該医薬品の再審査が終了した後に受け付ける（対象製剤としては、フルオロキノロン系・第三世代セファロスポリン系・15員環マクロライド系抗菌剤）。

フルオロキノロン系抗菌性物質を有効成分とする動物用医薬品については、

- ① 承認事項及び使用上の注意として、
    - ア．対象菌種に起因する適応症の治療のみに限り使用すること
    - イ．用法・用量の厳守、定められた期間以上の連続投与の制限
    - ウ．第一選択薬が無効の症例のみに限り使用すること
    - エ．感受性試験により感受性を確認した上で投与することを規定
  - ② 要指示医薬品制度（医薬品医療機器等法）、要診察医薬品制度（獣医師法）による使用に当たっての専門家としての獣医師の関与の義務付け
  - ③ 医薬品医療機器等法に基づく使用基準（罰則あり）により、用法・用量、対象動物等を限定
  - ④ 使用者に対して以下の事項を帳簿に記載する努力義務を規定
    - ア．使用した年月日
    - イ．使用した場所
    - ウ．使用対象動物の種類、頭羽数及び特徴
    - エ．使用した医薬品の名称
    - オ．用法及び用量
    - カ．使用対象動物及びその生産する乳等を食用に供するためにと殺又は出荷することが出来る年月日
- 等の適正使用のための措置を実施。

### （２）承認後（市販後）及び再審査後における取扱い

- ① 承認取得後
  - ア．販売数量、当該医薬品を使用した施設における耐性菌発現状況調査結果（対象動物から分離された有効菌種及び公衆衛生に係る菌種（サルモネラ、カンピロバクター、大腸菌及び腸球菌））等の定期報告及び使用者への適正使用の確保のための情報提供を義務付け
  - イ．再審査時（通常、新規承認から6年後）に耐性菌の調査データを提出
- ② 再審査終了後  
承認取得後から継続して再審査終了後についても販売数量、当該医薬品が使用さ

れた施設における耐性菌発現状況調査結果（対象動物から分離された有効菌種及び公衆衛生に係る菌種（サルモネラ、カンピロバクター、大腸菌及び腸球菌））等の定期報告及び使用者への適正使用の確保のための情報提供の義務付け

③ JVARМによる薬剤耐性菌調査の実施

フルオロキノロン系抗菌性物質を含む動物用抗菌性物質に対する食品媒介性病原細菌（サルモネラ、カンピロバクター）及び指標細菌（腸球菌、大腸菌）における全国規模の薬剤耐性菌のモニタリング調査

## ＜別紙参考 2＞牛及び豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置について（平成 24 年 6 月 25 日）

### 1 背景

#### （1）食品安全委員会の評価

牛及び豚用フルオロキノロン剤に係る薬剤耐性菌の食品健康影響については、食品安全委員会がリスクの推定区分は中等度と評価した。（平成 22 年 3 月 25 日）

また、リスク評価の中で、①現在のリスク管理措置の徹底、科学的知見・情報を収集した上での随時検証、②薬剤耐性菌に係るモニタリング体制を充実し、継続的な調査・監視、についても付言した。

#### （2）評価を踏まえた農林水産省の対応

既に行われてきた措置を以下のように強化するとともに、リスク管理措置の効果の検証のため、科学的知見・情報を収集することとした。

- ①承認された適応症の治療に限定した使用や第一次選択薬が無効な症例に限定した使用が行われるように添付文書（使用上の注意）の表記を統一した。
- ②従来の JVARМ による農場における調査に加えて、と畜場及び食鳥処理場におけるモニタリングを開始した。
- ③我が国の実態に即したモニタリングの充実に向けた研究を開始した。

### 2 現行のリスク管理措置の効果

これまでに得られている農林水産省の調査結果や論文は適応菌でのフルオロキノロン剤に対する感受性は維持されていると報告。したがって、現行のリスク管理措置は一定の目的を果たしていると判断した。

### 3 今後の対応

モニタリング計画を見直して、薬剤耐性菌の動向をよりの確に把握し、リスク管理措置の検証を行う。

また、現行の措置の継続とともに、生産現場における動物用抗菌性物質製剤の使用実態等を踏まえてさらに以下の措置を講ずる。

- ①第一次選択薬が無効な症例にのみ第二次選択薬として使用することを徹底する。
- ②投与後一定期間内（3 日程度）に効果判定を実施し、効果がみられない場合には獣医師の判断によって薬剤を変更する。
- ③農林水産省が実施する農場及びと畜場等におけるモニタリング（調査規模、調査頻度等）を充実する。
- ④製造販売業者が実施するフルオロキノロン剤の適応菌及び公衆衛生上重要な菌種のモニタリングを充実する。

<別紙 1 検査値等略称>

| 略称                | 名称                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C <sub>max</sub>  | 最高濃度                                                                                             |
| CFU               | Colony Forming Unit                                                                              |
| CLSI              | 臨床検査標準協会                                                                                         |
| CPFX              | シプロフロキサシン                                                                                        |
| DANMAP            | Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program                       |
| DFLX              | ジフロキサシン                                                                                          |
| DNFX              | ダノフロキサシン                                                                                         |
| EHEC              | 腸管出血性大腸菌                                                                                         |
| EIEC              | 腸管侵入性大腸菌                                                                                         |
| EMA               | 欧州医薬品庁                                                                                           |
| EPEC              | 腸管病原性大腸菌                                                                                         |
| ERFX              | エンロフロキサシン                                                                                        |
| ETEC              | 腸管毒素原性大腸菌                                                                                        |
| FDA               | 米国食品医薬品庁                                                                                         |
| HACCP             | 危害分析重要管理点                                                                                        |
| HUS               | 溶血性尿毒症症候群                                                                                        |
| JVARM             | 我が国の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリングシステム<br>(Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System) |
| LOD               | 検出限界                                                                                             |
| LOQ               | 定量下限                                                                                             |
| LVFX              | レボフロキサシン                                                                                         |
| MBFX              | マルボフロキサシン                                                                                        |
| MIC               | 最小発育阻止濃度                                                                                         |
| MIC <sub>50</sub> | 50%最小発育阻止濃度                                                                                      |
| MIC <sub>90</sub> | 90%最小発育阻止濃度                                                                                      |
| MPN               | 最確数 (Most Probable Number)                                                                       |
| NA                | ナリジクス酸                                                                                           |
| NFLX              | ノルフロキサシン                                                                                         |
| OBFX              | オルビフロキサシン                                                                                        |
| OFLX              | オフロキサシン                                                                                          |
| OIE               | 国際獣疫事務局                                                                                          |
| T <sub>max</sub>  | 最高濃度到達時間                                                                                         |
| T <sub>1/2</sub>  | 血 (清) 中消失半減期                                                                                     |
| VT                | ベロ毒素                                                                                             |
| WHO               | 世界保健機関                                                                                           |

## ＜参照＞

1. 食品安全委員会. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針. 2004 年 9 月 (2022 年 3 月改正) .
2. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 抄録 ハザードの特定. (未公表)
3. 食品安全委員会. (別添) 塩酸ジフロキサシンの食品健康影響評価について.
4. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 抄録 リスク評価、2 発生評価. (未公表)
5. FDA. Withdrawal of approval of the new animal drug application for enrofloxacin in poultry: Docket No. 2000 N-1571. (未公表)
6. EMEA. Public statement on the use of (fluoro)quinolones in food-producing animals in the European Union: Development of resistance and impact on human and animal health. 2007.
7. 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—マルボフロキサシンを有効成分とする牛及び豚の注射剤. (未公表)
8. 動物用抗菌剤研究会. 最新データ 動物用抗菌剤マニュアル 2004; p146-153.
9. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 3. (未公表)
10. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 11. (未公表)
11. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 14. (未公表)
12. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 4. (未公表)
13. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 13. (未公表)
14. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 19. (未公表)
15. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 2. (未公表)
16. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 7. (未公表)

17. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 8. (未公表)
18. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 12. (未公表)
19. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 16. (未公表)
20. 平井敬二. キノロン系薬の作用機序と耐性機構研究の歴史. 日本化学療法学会雑誌 2005; 53: 349-56.
21. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 22. (未公表)
22. 内田幸治. メシル酸ダノフロキサシンについて. 動物抗菌会報. 1994; 8-48. (未公表)
23. 農林水産省 動物医薬品検査所. 平成 11 年度～16 年度 家畜由来細菌の抗菌剤感受性調査成績の概要について. 1999～2004 年.
24. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 23. (未公表)
25. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 25. (未公表)
26. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオリキノロン—: 資料 26. (未公表)
27. 食品安全委員会. 食品を介して人の健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて (第 3 版) . 2006 年 4 月. (2022 年 3 月改定)
28. Hopkins KL, Davies RH, Threlfall EJ. Mechanisms of quinolone resistance in *Escherichia coli* and *Salmonella*: Recent developments. International Journal of Antimicrobial Agents. 2005; 25: 358-373.
29. Piddock LJ, Ricchi V, Pumbwe L, Everett MJ, Griggs DJ. Fluoroquinolone resistance in *Campylobacter* species from man and animals: detection of mutations in topoisomerase genes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2003; 51: 19-26.
30. Robicsek A, Jacoby GA, Hooper DC. The worldwide emergence of plasmid-mediated quinolone resistance. Lancet Infectious Disease. 2006; 6: 629-40.
31. Robicsek A, Strahilevitz J, Jacoby GA, Macielag M, Abbanat D, Park CH, et al. Fluoroquinolone-modifying enzyme: a new adaptation of a common aminoglycoside acetyltransferase. Nature Medicine. 2006; 12: 83-8.
32. Yamane K, Wachino J, Suzuki S, Kimura K, Shibata N, Kato H, et al. New plasmid-mediated fluoroquinolone efflux pump, QepA, found in an *Escherichia coli* clinical isolate.

- Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2007; 51: 3354-3360.
33. 厚生労働省. 感染症に関する情報. 感染症報告者数 1999～2006);2007.
  34. 国立感染症研究所感染症疫学センター. IDWR (感染症発生動向調査) 感染症の話.
  35. 抗菌薬使用のガイドライン. 日本感染症学会／日本化学療法学会編. 2005.
  36. バイトリル再審査申請書添付資料. (未公表)
  37. ビクタス製造承認申請書添付資料. (未公表)
  38. ベテキノン再審査申請書添付資料. (未公表)
  39. インフェック再審査申請書添付資料. (未公表)
  40. Kijima-Tanaka M, Ishihara K, Kojima A, Morioka A, Nagata R, Kawanishi M, et al. A National surveillance of shiga toxin-producing *Escherichia coli* in food-producing animals in Japan. Journal of Veterinary Medicine. B, Infectious Diseases and Veterinary Public Health. 2005; 52: 230-237.
  41. 農林水産省. フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場における薬剤感受性. (平成 15～18 年度) .
  42. Harada K, Asai T, Kojima A, Oda C, Ishihara K, Takahashi T. Antimicrobial susceptibility of pathogenic *Escherichia coli* isolated from sick cattle and pigs in Japan. The Journal of Veterinary Medical Science. 2005; 67: 999-1003.
  43. Kawagoe K, Mine H, Asai T, Kojima A, Ishihara K, Harada K, et al. Changes of multi-drug resistance pattern in *Salmonella enterica* subspecies *enterica* serovar Typhimurium isolates from food-producing animals in Japan. The Journal of Veterinary Medical Science. 2007; 69: 1211-1213.
  44. Izumiya H, Mori K, Kurazono T, Yamaguchi M, Higashide H, Konishi N, et al. Characterization of isolates of *Salmonella enterica* serovar Typhimurium displaying high-level fluoroquinolone resistance in Japan. Journal of Clinical Microbiology. 2005; 43: 5074-5079.
  45. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオロキノロン—: 資料 33. (未公表)
  46. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオロキノロン—: 資料 34. (未公表)
  47. Morgan-Linnell SK, Zechiedrich L. Contributions of the combined effects of topoisomerase mutations toward fluoroquinolone resistance in *Escherichia coli*. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2007; 51: 4205-4208.
  48. Liu JH, Deng YT, Zeng ZL, Gao JH, Chen L, Arakawa Y, et al. Coprevalence of plasmid-mediated quinolone resistance determinants QepA, Qnr, and AAC(6)-Ib-cr among 16S rRNA methylase RmtB-producing *Escherichia coli* isolates from pigs. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2008; 52: 2992-2993.
  49. 田中眞由美. シンポジウム 2 耐性菌の進化—その耐性機構—キノロン薬剤耐性【プラスミド性耐性遺伝子を中心に】. 日本化学療法学会雑誌. 2006; 54S-A: 49.
  50. Wang M, Tran JH, Jacoby GA, Zhang Y, Wang F, Hooper DC. Plasmid-mediated quinolone

- resistance in clinical isolates of *Escherichia coli* from Shanghai, China. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 2003; 47: 2242-2248.
51. Yamane K, Wachino J, Suzuki S, Arakawa Y. Plasmid-mediated *qepA* gene among *Escherichia coli* clinical isolates from Japan. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 2008;p1564-1566.
  52. Ma J, Zeng Z, Chen Z, Xu X, Wang X, Deng Y, et al. High prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance determinants *qur*; *aac(6')-Ib-cr* and *qepA* among ceftiofur-resistant *Enterobacteriaceae* isolates from companion and food-producing animals. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 2009; 54: 519-524.
  53. Ahmed AM, Ishida Y, Shimamoto T. Molecular characterization of antimicrobial resistance in *Salmonella* isolated from animals in Japan. *Journal of Applied Microbiology*. 2009; 106: 402-409.
  54. (独) 農畜産業振興機構. 牛及び豚由来食品の1人1年供給純食料.
  55. 大日本住友製薬株式会社, バイエルメディカル株式会社, ファイザー株式会社, 明治製菓株式会社. 家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響評価—フルオロキノロン—: 資料 46. (未公表)
  56. 小川博美. 腸管出血性大腸菌の生態とその制御—動物における分布と食品・各種環境下での消長. 広島県保健環境センター研究報告. 2001; 11: 1-20.
  57. 金井美恵子, 大城椎子, 宮澤文雄, 竹田多恵. 種々の食品を-20℃に冷凍保存した際の腸管出血性大腸菌 O157:H7 の挙動. 日本食品保蔵科学会誌. 2000; 26: 131-137.
  58. 和田洋之, 田邊英子, 平山祐子, 中嶋洋, 畑ますみ, 前野幸子, 他. 焼肉用生肉等の汚染実態調査結果について. 食品衛生研究. 2002; 52: 73-80.
  59. 増田高志, 川村朝子, 三輪憲永, 秋山眞人, 宮本秀樹, 寺井克哉. 腸管出血性大腸菌 O157 に関する疫学調査. 静岡県環境衛生科学研究所報告. 1999; 42: 41-48.
  60. 食品安全委員会 微生物・ウイルス専門調査会. 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル—牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌— (改訂版). 2010 年 4 月.
  61. 鶏卵・鶏肉のサルモネラ全書 —安全な鶏卵・鶏肉の生産・流通のためのサルモネラ対策—鶏病研究会編: (株) 日本畜産振興会; p.18-22.
  62. 品川邦汎, 重茂克彦, 斎藤志保子. 凍結・解凍回数及び保存温度による食肉中のカンピロバクターとサルモネラの菌数の変動. 平成15年度病原微生物データ分析実験作業成果報告書. 2004 年.
  63. 三澤尚明. カンピロバクター感染症. モダンメディア. 2005; 51: 45-52.
  64. 食品安全委員会 微生物・ウイルス専門調査会. 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル—鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリ—. 2006 年 10 月.
  65. 小野一晃, 安藤陽子, 川森文彦, 尾関由姫恵, 柳川敬子. 冷凍保存鶏肉における *Campylobacter jejuni* の生存性とパルスフィールド・ゲル電気泳動法による分離菌株の遺伝子解析. 日本食品微生物学会雑誌. 2005; 22: 59-65.
  66. 伊藤武. カンピロバクター食中毒—現状と対策—. 月刊フードケミカル. 2000; 6: 27-32.
  67. 農林水産省. 衛生管理ガイドライン.
  68. 厚生労働省. 食品の食中毒菌汚染実態調査 (2000~2007 年).
  69. 池田徹也, 森本洋, 玉手直人, 清水俊一, 熊田洋行, 駒込理佳, 他: 食品の食中毒菌汚染実態

- 調査. 道衛研所報. 2007; 57: 73-75.
70. 北瀬照代, 石井宮次. 市販の牛内臓肉の腸管出血性大腸菌 O157 汚染状況について. 大阪市立環科研報告. 2005; 15-19.
  71. 土井りえ, 小野晃, 斎藤章暢, 大塚佳代子, 柴田穰, 正木宏幸. 市販食肉におけるサルモネラとリステリアの汚染状況. 日本獣医公衆衛生学会誌. 2003; 56: 167-170.
  72. 森田幸雄, 壁谷英則, 石岡大成, 阪脇廣美, 長井章, 鈴木宣夫, 他. 家畜および市販挽き肉における *Acrobacter*, *Campylobacter*, *Salmonella* の分布状況. 日本獣医公衆衛生学会誌. 2004; 57: 393-397.
  73. 藤代敏行, 中村恵子, 池田嘉子, 石北隆一, 馬場純一. 福岡市における食中毒事例及び収去検査からの *Campylobacter* 検出状況. 福岡市保環研報. 2000; 25: 105-106.
  74. 食品安全委員会. 平成 18 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査. 2007 年.
  75. 食品安全委員会. 平成 19 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査. 2008 年.
  76. 食品安全委員会. 平成 20 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査. 2009 年.
  77. 厚生労働省. 腸管出血性大腸菌 Q&A: 食中毒関連情報.
  78. 厚生労働省. 一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157 等)感染症治療の手引き (改訂版). 腸管出血性大腸菌に関する情報.
  79. 小沼博隆. 食品環境の微生物. 食品と技術. 2004; 3: 1-13.
  80. 阿部和男. 食材及び調理方法から解析したサルモネラ食中毒の発生要因の研究. 宮城県保健環境センター年報. 2005; 23: 35-39.
  81. 金井美恵子. 鶏卵中での *Salmonella* Enteritidis の増殖性. 相模女子大学紀要. 2002; 65B: 1-6.
  82. 相川勝弘, 村上裕之, 猪俣恭子, 丸山務, 藤澤倫彦, 高橋孝則, 他. 卵の保存及び調理と関連する条件が *Salmonella* Enteritidis の増殖、侵入及び生残に与える影響. 食品衛生学雑誌. 2002; 43: 178-184.
  83. 食品安全委員会 微生物・ウイルス専門調査会. 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル～鶏肉中のサルモネラ属菌～ (改訂版). 2012 年 1 月.
  84. 相楽裕子. 2 カンピロバクター感染症. 化学療法の領域. 2006; 22: 25-32.
  85. Nakaya H, Yasuhara A, Yoshimura K, Ohihoi Y, Izumiya H, Watanabe H. Life-threatening infantile diarrhea from fluoroquinolone-resistant *Salmonella enterica* Typhimurium with mutations in both *gyrA* and *parC*. Emerging Infectious Diseases. 2003; 9: 255-257.
  86. 厚生労働科学研究費補助金. 食品の安心・安全確保推進研究事業. 薬剤耐性食中毒菌サーベイランスに関する研究 (平成 18 年度総括・分担研究報告書).
  87. 石畝史, 京田芳人, 望月典郎, 布施田哲也, 重屋志啓盛, 泉谷秀昌, 他. 多剤耐性 *Salmonella enterica* serovar Newport における患者由来株と下水由来株との比較検討. 感染症学雑誌. 2005; 79: 270-275.
  88. 高山貞男, 佐竹幸子, 石原加奈子. ヒトの下痢便から分離された *Campylobacter jejuni* と *Campylobacter coli* の抗菌薬感受性. 感染症学雑誌. 2005; 79: 169-1655.
  89. 福山正文, 大仲賢二, 古畑勝則, 原元宣, 中澤宗生. ヒト下痢症および健康牛から分離した Vero 毒素産生性大腸菌 O157:H7 (VTEC O157:H7)における薬剤感受性. 感染症学雑誌. 2005; 79:

- 451-457.
90. 小花光夫, 相楽裕子, 青木知信, 金龍起, 滝沢慶彦, 角田隆文, 他. 感染性腸炎の細菌の動向. 感染症学雑誌. 2002; 76: 355-368.
  91. 山口恵三, 大野章, 槻谷総子, 岩田守弘, 神田誠, 辻尾芳子, 他: 2000 年に全国 37 施設から分離された臨床分離株 8,474 株の各種抗菌薬に対する感受性サーベイランス. The Japanese Journal of Antibiotics. 2003; 56: 341-364.
  92. 山口恵三, 大野章, 槻谷総子, 岩田守弘, 神田誠, 辻尾芳子, 他: 2002 年に全国 52 施設から分離された臨床分離株 11,475 株の各種抗菌薬に対する感受性サーベイランス. The Japanese Journal of Antibiotics. 2005; 58: 17-44.
  93. 石村勝之, 毛利好江, 橋渡佳子, 山本美和子, 佐々木敏之, 古田喜美, 他. 広島市の散発性カンピロバクター食中毒における分離菌株の疫学的解析手法と解析結果の検討. 平成 13 年度 広島市衛生研究所年報. 2001; 21.
  94. 石村勝之, 毛利好江, 橋渡佳子, 山本美和子, 古田喜美, 佐々木敏之, 他. 過去 3 年間の散発事例由来 *Campylobacter jejuni* の血清型および薬剤耐性. 平成 14 年度 広島市衛生研究所年報. 2002; 22.
  95. 谷口正昭, 国寄勝也, 末永朱美, 蔵田和正, 吉野谷進, 石村勝之, 他. 散発事例および食肉由来 *Campylobacter jejuni* の血清型および薬剤耐性 (2006 年). 平成 19 年度 広島市衛生研究所年報. 2007; 26: 88-90.
  96. Stevenson JE, Gay K, Barrett TJ, Medalla F, Chiller TM, Angulo FJ. Increase in nalidixic acid resistance among non-typhi *Salmonella enterica* isolates in the United States from 1996 to 2003. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2007; 51: 195-197.
  97. Meakins S, Fisher IS, Berghold C, Gerner-Smidt P, Tschäpe H, Cormican M, et al. Antimicrobial drug resistance in human nontyphoidal *Salmonella* isolates in Europe 2000-2004: A report from the Enter-net International Surveillance Network. Microbial Drug Resistance. 2008; 14:31-35.
  98. Hsueh PR, Teng LJ, Tseng SP, Chang CF, Wan JH, Yan JJ, et al. Ciprofloxacin-resistant *Salmonella enterica* Typhimurium and Choleraesuis from pigs to humans, Taiwan. Emerging Infectious Diseases. 2004; 10: 60-68.
  99. Cui S, Li J, Sun Z, Hu Z, Jin S, Guo Y, et al. Ciprofloxacin-resistant *Salmonella enterica* serotype Typhimurium, China. Emerging Infectious Diseases. 2008; 14:493-495.
  100. DANMAP 2007 – Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, foods and humans in Denmark.
  101. Mølbak K, Baggesen DL, Aarestrup FM, Ebbesen JM, Engberg J, Frydendahl K, et al. An outbreak of multidrug-resistant, quinolone-resistant *Salmonella enterica* serotype Typhimurium DT104. The New England Journal of Medicine. 1999; 341: 1420-1425.
  102. Casin I, Breuil J, Darchis JP, Guelpa C, Collatz E. Fluoroquinolone resistance linked to GyrA, GyrB, and ParC mutations in *Salmonella enterica* Typhimurium isolates in humans. Emerging Infectious Diseases. 2003; 9: 1455-1457.
  103. バイエル薬品株式会社. 動物用医薬品製造販売承認申請. バイトリルワンジェクト注射液の概要書. (未公表)
  104. 農林水産省動物医薬品検査所. 平成 16 年～令和 3 年動物用医薬品, 医薬部外品及び医療機器

- 販売高年報. (別冊) 各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量.
105. バイエル薬品株式会社. 平成 16~24 年度動物用医薬品等の取扱数量に関する資料. (未公表)
106. 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課, 動物医薬品検査所, 独立行政法人農林水産消費安全技術センター. 平成 16~令和 3 年度 家畜由来細菌の抗菌剤感受性調査  
農林水産省動物医薬品検査所. 平成 20~令和 3 年度 動物用医薬品の事故防止・被害対応業務による野外流行株の検査結果について.
107. 農林水産省. フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場における薬剤感受性 (平成 20 年度)
108. 農林水産省: フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場における薬剤感受性 (平成 22 年度)
109. 農林水産省: フルオロキノロン系抗菌性物質を使用した家畜又は農場における薬剤感受性 (平成 24 年度)
110. 厚生労働省. 食品の食中毒菌汚染実態調査の結果. (平成 20~24 年度).
111. 厚生労働省. 食品の食中毒菌汚染実態調査の結果. (平成 25 年度).
112. 吉田紀美, 青木紀子, 田中博, 大瀬戸光明, 井上博雄. 家畜および食肉等における腸管出血性大腸菌の血清型別分布状況に関する調査研究. 平成 18 年度愛媛衛環研年報. 2006; 9: 6-9.
113. 鈴木穂高, 山本茂貴. 日本とヨーロッパ各国の食品の食中毒菌汚染実態の比較. —「食品の食中毒菌汚染実態調査」の結果の有効活用—. 国立医薬品食品衛生研究所報告. 2011; 129: 118-128.
114. 村上光一, 前田詠里子, 市原祥子, 大石明, 江藤良樹, 濱崎光宏, 他. 平成 23 年度食品の食中毒菌汚染実態調査. 福岡県保健環境研究所年報. 2012; 39: 84-86.
115. 齊藤志保子, 八柳潤, 今野貴之. 秋田県における食中毒起因菌の侵淫実態と分離株の性状に関する調査研究. 秋田県健康環境センター年報. 2006; 2: 49-56.
116. 濱崎光宏, 村上光一, 野田多美枝, 堀川和美, 竹中重幸, 石黒靖尚. 平成 18 年度収去食品中の食中毒細菌検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2007; 34: 96-98.
117. 中村祥子, 江藤良樹, 濱崎光宏, 村上光一, 竹中重幸, 堀川和美. 平成 19 年度収去食品中の食中毒細菌及び貝毒検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2008; 35: 105-107.
118. 市原祥子, 江藤良樹, 濱崎光宏, 村上光一, 竹中重幸, 堀川和美. 平成 20 年度収去食品中の食中毒細菌及び貝毒検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2009; 36: 110-112.
119. 江藤良樹, 市原祥子, 濱崎光宏, 村上光一, 竹中重幸, 堀川和美. 平成 21 年度収去食品中の食中毒細菌及び貝毒検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2010 ;37: 86-88.
120. 江藤良樹, 市原祥子, 濱崎光宏, 村上光一, 竹中重幸, 堀川和美. 平成 22 年度収去食品中の食中毒細菌及び貝毒検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2011; 38: 81-84.
121. 市原祥子, 江藤良樹, 濱崎光宏, 村上光一, 竹中重幸, 堀川和美. 平成 23 年度収去食品中の食中毒細菌及び貝毒検査. 福岡県保健環境研究所年報. 2012; 39: 93-96.
122. 熱田純子, 黒崎守人, 高橋起男, 川瀬遵. 島根県における食肉のカンピロバクターとサルモネラの汚染状況及びヒト由来株との関連性について. 島根県保健環境科学研究所報. 2009; 51: 52-56.
123. 森田幸雄, 古茂田恵美子, 塩飽二郎, 細見隆夫, 板垣基樹, 中田恵三, 他. と畜場における牛および豚枝肉の衛生状況. 日本食品微生物学会雑誌. 2010; 27: 90-95.
124. 田中知暁, 満山順一, 山岡一清, 浅野裕子, 澤村治樹, 末松寛之, 他. 岐阜県下で分離されたグラム陰性菌に対するフルオロキノロン系薬の抗菌力 (2005 年). The Japanese Journal of

- Antibiotics. 2007; 60: 141-152.
125. Bakeli G, Sato K, Kumita W, Saito R, Ono E, Chida T, et al. Antimicrobial susceptibility and mechanism of quinolone resistance in *Campylobacter jejuni* strains isolated from diarrheal patients in a hospital in Tokyo. Journal of Infection and Chemotherapy. 2008; 14: 342-348.
126. 柿本将平, 福山正文, 古畑勝則, 大仲賢二, 吉浪誠, 谷川力, 他. ヒト下痢便および鶏肉, 鶏糞便から分離した *Campylobacter jejuni* 株の薬剤感受性試験およびキノロン耐性株に対する遺伝子変異に関する検討. 感染症学雑誌. 2007; 81: 363-369.
127. Statens Serum Institut, National Veterinary Institute, National Food Institute. DANMAP 2011. DANMAP 2011 – Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, foods and humans in Denmark. 2012.
128. Wassenaar TM, Kist M, de Jong A. Re-analysis of the risk attributed to ciprofloxacin-resistant *Campylobacter jejuni* infections. International Journal of Antimicrobial Agents. 2007; 30: 195-201.
129. Evans MR, Northey G, Sarvotham TS, Rigby CJ, Hopkins AL, Thoma DRH. Short-term and medium-term clinical outcomes of quinolone-resistant *Campylobacter* infections. Clinical Infectious Disease. 2009; 48: 1500-1506.
130. 農林水産省. 牛及び豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置について (2012 年 6 月 25 日付) .
131. 農林水産省. フルオロキノロン系等製剤に係る表示等の記載について (平成 26 年 11 月 21 日付) .
132. 農林水産省. フルオロキノロン系等製剤に係る調査等について (平成 26 年 11 月 21 日付) .
133. 農林水産省. 畜産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方 (平成 25 年 12 月 24 日付) .
134. Webber M, Piddock LJV. Quinolone resistance in *Escherichia coli*. Veterinary Research. 2001; 32: 275-284.
135. Luo N, Pereira S, Sahin O, Lin, J, Huang S, Michel L, et al. Enhanced *in vivo* fitness of fluoroquinolone-resistant *Campylobacter jejuni* in the absence of antibiotic selection pressure. Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2005; 102: 541-546.
136. Zhang Q, Sahin O, McDermott PF, Payot S. Fitness of antimicrobial-resistant *Campylobacter* and *Salmonella*. Microbes and Infection. 2006; 8: 1972-1978.
137. Han J, Wang Y, Sahin O, Shen Z, Guo B, Shen J, et al. A fluoroquinolone resistance associated mutation in *gyrA* affects DNA supercoiling in *Campylobacter jejuni*. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2012; 2: -1-10.
138. 厚生労働省. 感染症情報. 感染症報告数. 2005~2021 年.  
食中毒統計. 年次別病因物質別食中毒発生状況. 2005~2022 年.
139. Sasaki Y, Usui M, Murakami M, Haruna M, Kojima A, Asai T, et al. Antimicrobial resistance in Shiga toxin-producing *Escherichia coli* O157 and O26 isolates from beef cattle. Japanese Journal of Infectious Disease. 2012; 65: 117-121.
140. 農林水産省 消費・安全局畜産安全管理課, 動物医薬品検査所. 平成 24 年度のと畜場及び食鳥処理場における家畜由来細菌の薬剤耐性モニタリング結果. 2014 年 6 月.

141. Usui M, Sakemi Y, Uchida I, Tamura T. Effects of fluoroquinolone treatment and group housing of pigs on the selection and spread of fluoroquinolone-resistant *Campylobacter*. *Veterinary Microbiology*. 2014; 170: 438-441.
142. Yan M, Sahin O, Lin J, Zhang Q. Role of the CmeABC efflux pump in the emergence of fluoroquinolone-resistant *Campylobacter* under selection pressure. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 2006; 58: 1154-1159.
143. Hänninen ML, Hannula M. Spontaneous mutation frequency and emergence of ciprofloxacin resistance in *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter coli*. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 2007; 60:1251-1257.
144. 小池良治, 浅井鉄夫, 小澤真名緒, 石川整. 食用動物における動物用抗菌薬の使用状況の調査結果について. *動物医薬品検査所年報*. 2008; 45: 30-33.
145. 農林水産省. 食料需給表 平成 24 年度 (品目別累年表(3-7 牛肉、牛乳・乳製品、豚肉)、関連指標(5-1 品目別自給率の推移)). 2014 年 7 月.
146. Altekruuse SF, Stern NJ, Fields PI, Sverdlow DL. *Campylobacter jejuni* - An emerging foodborne pathogen. *Emerging Infectious Diseases*. 1999; 5: 28-35.
147. Snelling WJ, Matsuda M, Moore JE, Dooley JSG. Under the microscope. *Campylobacter jejuni*. *Letters in Applied Microbiology*. 2005; 41: 297-302.
148. Food Safety Authority of Ireland. Control of *Campylobacter* species in the food chain. 2002.
149. Stern NJ, Kazmi SU. Chapter 3 *Campylobacter jejuni*. In Doyle MP (ed.), *Foodborne Bacterial Pathogens*. New York. Marcel Dekker Inc. 1989; p.71-110.
150. FDA. Center for Food Safety & Applied Nutrition. *Campylobacter jejuni*. In *Bad Bug Book*. Foodborne pathogenic microorganisms and natural toxins handbook. 1992.
151. Balamurugan S, Nattress FM, Baker LP, Dilts BD. Survival of *Campylobacter jejuni* on beef and pork under vacuum packaged and retail storage conditions: Examination of the role of natural meat microflora on *C. jejuni* survival. *Food Microbiology*. 2011; 28: 1003-1010.
152. Gill CO, Harris LM. Survival and growth of *Campylobacter fetus* subsp. *jejuni* on meat and in cooked foods. *Applied and Environmental Microbiology*. 1982; 44: 259-263.
153. Hänninen ML, Korkeala H, Pakkala P. Effect of various gas atmospheres on the growth and survival of *Campylobacter jejuni* on beef. *Journal of Applied Bacteriology*. 1984; 57: 89-94.
154. Dykes GA, Moorhead SM. Survival of *Campylobacter jejuni* on vacuum or carbon dioxide packaged primal beef cuts stored at -1.5 °C. *Food Control*. 2001; 12: 553-557.
155. 厚生労働省. 生食用食肉 (牛肉) の規格基準設定に関する Q&A について (平成 23 年 9 月 28 日付) .
156. 厚生労働省. 牛の肝臓の基準に関する Q&A について (平成 24 年 6 月 27 日付) .
157. 食品安全委員会 平成 25 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査報告書. 2014 年.
158. 食品安全委員会. 微生物・ウイルス評価書 鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリ. 2009 年 6 月.
159. Black RE, Levine MM, Clements ML, Hughes TP, Blaser MJ. Experimental *Campylobacter jejuni* infection in humans. *The Journal of Infectious Diseases*. 1988; 157: 472-479.
160. Robinson DA. Infective dose of *Campylobacter jejuni* in milk. *British Medical Journal*. 1981;

282: 1584.

161. 国立感染症研究所感染症疫学センター. 感染症の話. [http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k05/k05\\_19/k05\\_19.html](http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k05/k05_19/k05_19.html).
162. 厚生労働省. 食中毒統計. 原因食品別食中毒発生状況. 2005～2013 年.
163. 国立感染症研究所感染症疫学センター. 下痢原性大腸菌. 感染症の話.
164. Delsol AA, Sunderland J, Woodward MJ, Pumbwe L, Piddock LJV, Roe JM. Emergence of fluoroquinolone resistance in the native *Campylobacter coli* population of pigs exposed to enrofloxacin. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 2004; 53: 872-874.
165. Keller J, Perreten V. Genetic diversity in fluoroquinolone and microlide-resistant *Campylobacter coli* from pigs. *Veterinary Microbiology*. 2006; 113:103-108.
166. 食品安全委員会. 微生物・ウイルス評価書. 生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌. 2011 年 8 月.
167. 平成 18 年度厚生労働科学研究費補助金. 食品の安全・安心確保推進研究事業『細菌性食中毒の予防に関する研究』（主任研究者 高鳥皓介）：分担研究「生食用の食肉及び野菜・香辛料における腸管出血性大腸菌およびサルモネラ食中毒の予防に関する研究」分担研究者 高鳥皓介. 2006 年.
168. 厚生労働省. 人口動態統計. 下巻 1-2: 死亡数, 性・死因（死因基本分類）別. 平成 16～令和 2 年.
169. 食品安全委員会. 微生物・ウイルス・寄生虫評価書 豚の食肉に係る食品健康影響評価. 2015 年 2 月.
170. Meiji Seika ファルマ株式会社 動物用医薬品製造販売承認申請書 フォーシル 概要書. (非公表)
171. WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR). Critically important antimicrobials for human medicine 6th revision 2018. 2019. <http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/>.
172. FDA/CVM. U.S. Guidance for Industry #152. Evaluating the safety of antimicrobial new animal drugs with regard to their microbiological effects on bacteria of human health concern. 2003.
173. EMA. Categorisation of antibiotics in the European Union. Answer to the request from the European Commission for updating the scientific advice on the impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals. 2019. (EMA/CVMP/CHMP/682198/2017)
174. Ferran A, Dupouy V, Toutain P L, and Bousquet-Mélou A. Influence of inoculum size on the selection of resistant mutants of *Escherichia coli* in relation to mutant prevention concentrations of marbofloxacin. *Antimicrob Agents Chemother* 2007. 51: 4163-6.
175. Kroemer S, Galland D, Guérin-Faubleé V, Giboin H, and Woehrlé-Fontaine F. Survey of marbofloxacin susceptibility of bacteria isolated from cattle with respiratory disease and mastitis in Europe. *Vet Rec* 2012. 170: 53.
176. Lee S J, Park N H, Mechesso A F, Lee K J, and Park S C. The phenotypic and molecular resistance induced by a single-exposure to sub-mutant prevention concentration of marbofloxacin in *Salmonella Typhimurium* isolates from swine. *Vet Microbiol* 2017. 207: 29-35.
177. Kesteman A S, Ferran A A, Perrin-Guyomard A, Laurentie M, Sanders P, Toutain P L

- et al. Influence of inoculum size and marbofloxacin plasma exposure on the amplification of resistant subpopulations of *Klebsiella pneumoniae* in a rat lung infection model. *Antimicrob Agents Chemother* 2009. 53: 4740-8.
178. El Garch F, Kroemer S, Galland D, Morrissey I, and Woehrle F. Survey of susceptibility to marbofloxacin in bacteria isolated from diseased pigs in Europe. *Vet Rec* 2017. 180: 591.
  179. Honda H, Sato T, Shinagawa M, Fukushima Y, Nakajima C, Suzuki Y et al. In Vitro Derivation of Fluoroquinolone-Resistant Mutants from Multiple Lineages of *Haemophilus influenzae* and Identification of Mutations Associated with Fluoroquinolone Resistance. *Antimicrob Agents Chemother* 2020. 64.
  180. Ma X, Zheng B, Wang J, Li G, Cao S, Wen Y et al. Quinolone Resistance of *Actinobacillus pleuropneumoniae* Revealed through Genome and Transcriptome Analyses. *Int J Mol Sci* 2021. 22.
  181. van Duijkeren E, Schink A K, Roberts M C, Wang Y, and Schwarz S. Mechanisms of Bacterial Resistance to Antimicrobial Agents. *Microbiol Spectr* 2018. 6.
  182. Shen Z, Wang Y, Zhang Q, and Shen J. Antimicrobial Resistance in *Campylobacter* spp. *Microbiol Spectr* 2018. 6.
  183. Yao H, Shen Z, Wang Y, Deng F, Liu D, Naren G et al. Emergence of a Potent Multidrug Efflux Pump Variant That Enhances *Campylobacter* Resistance to Multiple Antibiotics. *mBio* 2016. 7.
  184. Ruiz J. Transferable Mechanisms of Quinolone Resistance from 1998 Onward. *Clin Microbiol Rev* 2019. 32.
  185. Hooper D C and Jacoby G A. Mechanisms of drug resistance: quinolone resistance. *Ann N Y Acad Sci* 2015. 1354: 12-31.
  186. Ruiz J, Pons M J, and Gomes C. Transferable mechanisms of quinolone resistance. *Int J Antimicrob Agents* 2012. 40: 196-203.
  187. Hong Y P, Wang Y W, Chen B H, Song H Y, Chiou C S, and Chen Y T. RamAp Is an Efflux Pump Regulator Carried by an IncHI2 Plasmid. *Antimicrob Agents Chemother* 2022. 66: e0115221.
  188. 亀山光博, 矢端順子, 野村恭晴, 富永潔, 富田正章. 山口県内で飼養される子牛の口腔内における志賀毒素産生性大腸菌 の保有状況. *日本獣医師会雑誌* 2014. 67: 73-78.
  189. 村田亮. 仔ウシ由来大腸菌のフルオロキノロン剤耐性獲得状況. *家畜感染症学会誌 = The journal of farm animal in infectious disease* 2015. 4: 161-67.
  190. Bhardwaj P, Kaur G, and Rampal S. Impact of marbofloxacin administration on the emergence of marbofloxacin-resistant *E. coli* in faecal flora of goats and elucidation of molecular basis of resistance. *J Glob Antimicrob Resist* 2020. 21: 116-23.
  191. Goulart D B, Beyi A F, Wu Z, Adiguzel M C, Schroeder A, Singh K et al. Effect of Danofloxacin Treatment on the Development of Fluoroquinolone Resistance in *Campylobacter jejuni* in Calves. *Antibiotics (Basel)* 2022. 11.
  192. Yin X, Dudley E G, Pinto C N, and M'Ikanatha N M. Fluoroquinolone sales in food animals and quinolone resistance in non-typhoidal *Salmonella* from retail meats: United States, 2009-2018. *J Glob Antimicrob Resist* 2022. 29: 163-67.

193. Hansen L H, Jensen L B, Sørensen H I, and Sørensen S J. Substrate specificity of the OqxAB multidrug resistance pump in *Escherichia coli* and selected enteric bacteria. *J Antimicrob Chemother* 2007. 60: 145-7.
194. Chávez-Jacobo VM, Hernández-Ramírez K C, Silva-Sánchez J, Garza-Ramos U, Barrios-Camacho H, Ortiz-Alvarado R et al. Prevalence of the *crpP* gene conferring decreased ciprofloxacin susceptibility in enterobacterial clinical isolates from Mexican hospitals. *J Antimicrob Chemother* 2019. 74: 1253-59.
195. Rodríguez-Martínez J M, Machuca J, Cano M E, Calvo J, Martínez-Martínez L, and Pascual A. Plasmid-mediated quinolone resistance: Two decades on. *Drug Resist Updat* 2016. 29: 13-29.
196. Kawanishi M, Ozawa M, Hiki M, Abo H, Kojima A, and Asai T. Detection of *aac(6)-Ib-cr* in avian pathogenic *Escherichia coli* isolates in Japan. *J Vet Med Sci* 2013. 75: 1539-42.
197. Ozaki H, Matsuoka Y, Nakagawa E, and Murase T. Characteristics of *Escherichia coli* isolated from broiler chickens with colibacillosis in commercial farms from a common hatchery. *Poult Sci* 2017. 96: 3717-24.
198. Asai T, Sato C, Masani K, Usui M, Ozawa M, Ogino T et al. Epidemiology of plasmid-mediated quinolone resistance in *Salmonella enterica* serovar typhimurium isolates from food-producing animals in Japan. *Gut Pathog* 2010. 2: 17.
199. Arai N, Sekizuka T, Tamamura Y, Tanaka K, Barco L, Izumiya H et al. Phylogenetic Characterization of *Salmonella enterica* Serovar Typhimurium and Its Monophasic Variant Isolated from Food Animals in Japan Revealed Replacement of Major Epidemic Clones in the Last 4 Decades. *J Clin Microbiol* 2018. 56.
200. Arai N, Sekizuka T, Tamamura-Andoh Y, Barco L, Hinenoya A, Yamasaki S et al. Identification of a Recently Dominant Sublineage in *Salmonella* 4,[5],12:i:- Sequence Type 34 Isolated From Food Animals in Japan. *Front Microbiol* 2021. 12: 690947.
201. Ode T, Saito R, Kumita W, Sato K, Okugawa S, Moriya K et al. Analysis of plasmid-mediated multidrug resistance in *Escherichia coli* and *Klebsiella oxytoca* isolates from clinical specimens in Japan. *Int J Antimicrob Agents* 2009. 34: 347-50.
202. Aoike N, Saga T, Sakata R, Yoshizumi A, Kimura S, Iwata M et al. Molecular characterization of extraintestinal *Escherichia coli* isolates in Japan: relationship between sequence types and mutation patterns of quinolone resistance-determining regions analyzed by pyrosequencing. *J Clin Microbiol* 2013. 51: 1692-8.
203. Yano H, Uemura M, Endo S, Kanamori H, Inomata S, Kakuta R et al. Molecular characteristics of extended-spectrum  $\beta$ -lactamases in clinical isolates from *Escherichia coli* at a Japanese tertiary hospital. *PLoS One* 2013. 8: e64359.
204. Okade H, Nakagawa S, Sakagami T, Hisada H, Nomura N, Mitsuyama J et al. Characterization of plasmid-mediated quinolone resistance determinants in *Klebsiella pneumoniae* and *Escherichia coli* from Tokai, Japan. *J Infect Chemother* 2014. 20: 778-83.
205. Ogawa Y, Nakano R, Kasahara K, Mizuno T, Hirai N, Nakano A et al. Comparison of the inoculum size effects of antibiotics on IMP-6  $\beta$ -lactamase-producing Enterobacteriaceae co-harboring plasmid-mediated quinolone resistance genes. *PLoS One*

2019. 14: e0225210.
206. Munby M, Fujiki J, Aoki K, Kawaguchi C, Nakamura K, Nakamura T et al. Whole-Genome Sequence of Fluoroquinolone-Resistant *Escherichia coli* HUE1, Isolated in Hokkaido, Japan. *Microbiol Resour Announc* 2020. 9.
207. Shigemura H, Sakatsume E, Sekizuka T, Yokoyama H, Hamada K, Etoh Y et al. Food Workers as a Reservoir of Extended-Spectrum-Cephalosporin-Resistant *Salmonella* Strains in Japan. *Appl Environ Microbiol* 2020. 86.
208. 厚生労働省. と畜場法施行規則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について（食安発 0512 第 3 号平成 26 年 5 月 12 日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）.
209. 厚生労働省. 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について（食安発 0602 第 1 号平成 27 年 6 月 2 日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）.
210. 厚生労働省. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年 12 月 28 日付け厚生省告示第 370 号）.
211. 下島優香子, 井田美樹, 西野由香里, 石塚理恵, 黒田寿美代, 仲真晶子ら. 東京都内に流通する牛内臓肉からの糞便系大腸菌群, ベロ毒素産生性大腸菌, *Campylobacter jejuni/coli*, *Salmonella* および *Listeria monocytogenes* 検出状況. *日本食品微生物学会雑誌* 2015. 32: 209-14.
212. 下島優香子, 西野由香里, 福井理恵, 黒田寿美代, 鈴木淳, 貞升健志. 東京都内に流通する食肉から分離されたサルモネラの血清型および薬剤耐性. *食品衛生学雑誌* 2020. 61: 211-17.
213. 福井理恵. 東京都内の畜水産食品における食中毒菌検出状況（2017 年度）. *東京都微生物検査情報*. 2019. 40(1):1-6.
214. 佐々木貴正, 岩田剛敏, 上間匡, 朝倉宏. 牛胆嚢内胆汁のカンピロバクター汚染状況と分離株の性状. *食品衛生学雑誌* 2020. 61: 126-31.
215. 一般財団法人 東京顕微鏡院. 食品安全委員会 平成 26 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査報告書. 2015.
216. 一般財団法人 東京顕微鏡院. 食品安全委員会 平成 25 年度食品安全確保総合調査. 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査報告書. 2014.
217. 西野由香里, 下島優香子, 森田加奈, 井田美樹, 福井理恵, 黒田寿美代. 東京都で流通する食肉から分離された大腸菌の薬剤耐性. *食品衛生学雑誌* 2019. 60: 45-51.
218. 日本感染症学会/日本化学療法学会編. JAID/ISC 感染症治療ガイド 2019. ライフサイエンス出版, 東京, 2019.
219. 岩佐奈津美, 本田己喜子, 中牟田啓子. 福岡市においてヒトから分離された腸管出血性大腸菌の薬剤耐性状況（2006～2016 年）. *日本食品微生物学会雑誌* 2018. 35: 154-58.
220. Tateda K, Ohno A, Ishii Y, Murakami H, and Yamaguchi K. Investigation of the susceptibility trends in Japan to fluoroquinolones and other antimicrobial agents in a nationwide collection of clinical isolates: A longitudinal analysis from 1994 to 2016. *J Infect Chemother* 2019. 25: 594-604.
221. 薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会. 薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書 2020. 2022.
222. 大石明子, 村上光一, 江藤良樹, 世良暢之, 堀川和美. 食肉およびヒトの便から分離した *Campylobacter jejuni/coli* の 薬剤感受性試験並びに耐性遺伝子変異の検討. *感染症学雑誌* 2015. 89: 244-53.

223. Yamada K, Saito R, Muto S, Sasaki M, Murakami H, Aoki K et al. Long-term observation of antimicrobial susceptibility and molecular characterisation of *Campylobacter jejuni* isolated in a Japanese general hospital 2000-2017. *J Glob Antimicrob Resist* 2019. 18: 59-63.
224. Hiroi M, Takahashi N, Harada T, Kawamori F, Iida N, Kanda T et al. Serotype, Shiga Toxin (Stx) Type, and Antimicrobial Resistance of Stx-Producing *Escherichia coli* Isolated from Humans in Shizuoka Prefecture, Japan (2003-2007). *Japanese Journal of Infectious Diseases* 2012. 65: 198-202.
225. 食品安全委員会. 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル、鶏肉等における *Campylobacter jejuni/coli*. 2022.
226. 岡本了一. 耐性変異した *gyrA/parC* の伝達によるキノロン耐性化 ―大腸菌による実験的検証―. *日本化学療法学会雑誌*. 2006;54 supplement – A:50
227. 泉谷秀昌. 広域散発事例探知に向けた取り組み. *日本食品微生物学会雑誌*. 2019;36(1) 10-12.
228. 厚生労働省. 腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について（平成 30 年 6 月 29 日付け事務連絡）.
229. Meiji Seika ファルマ株式会社 動物用医薬品製造販売承認申請書 フォーシル S 概要書.（非公表）