

(案)

農薬評価書

カルボスルファン

2019年12月

食品安全委員会農薬専門調査会

目 次

	頁
○ 審議の経緯	4
○ 食品安全委員会委員名簿	4
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿	5
○ 要 約	10
I . 評価対象農薬の概要	11
1. 用途	11
2. 有効成分の一般名	11
3. 化学名	11
4. 分子式	11
5. 分子量	11
6. 構造式	11
7. 開発の経緯	11
II . 安全性に係る試験の概要	13
1. 動物体内運命試験	13
(1) ラット①	13
(2) ラット②	17
(3) ヤギ	20
(4) ニワトリ	22
2. 植物体内外運命試験	25
(1) 水稻①	25
(2) 水稻②	26
(3) 水稻③<参考資料>	27
(4) とうもろこし	28
(5) だいす	30
(6) てんさい	31
(7) ネーブルオレンジ	33
3. 土壤中運命試験	35
(1) 好気的土壤中及び嫌気的湛水土壤中運命試験	35
(2) 水/底質系における好気的湛水土壤中運命試験	36
(3) 土壤表面光分解試験	36
(4) 土壤中光分解試験	37
(5) 土壤吸脱着試験	37
(6) 土壤吸脱着試験（代謝物 P）	37
4. 水中運命試験	37

(1) 加水分解試験（緩衝液及び蒸留水）	37
(2) 水中光分解試験①（緩衝液及び蒸留水）	38
(3) 水中光分解試験②（滅菌自然水）	39
5. 土壤残留試験	39
6. 作物等残留試験	40
(1) 作物残留試験	40
(2) 畜産物残留試験	40
(3) 魚介類における最大推定残留値	42
7. 一般薬理試験	42
8. 急性毒性試験	45
(1) 急性毒性試験	45
(2) 急性神経毒性試験（ラット）	49
(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）	49
9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	50
10. 亜急性毒性試験	50
(1) 90日間亜急性毒性試験（ラット）①	50
(2) 90日間亜急性毒性試験（ラット）②	51
(3) 90日間亜急性毒性試験（マウス）	51
(4) 6か月間亜急性毒性試験（イヌ）	52
(5) 14週間亜急性毒性試験（イヌ）<参考資料>	53
(6) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）	54
(7) 3週間亜急性吸入毒性試験（ラット）	55
(8) 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）①	56
(9) 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）②	56
11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	57
(1) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	57
(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）	58
12. 生殖発生毒性試験	59
(1) 3世代繁殖試験（ラット）	59
(2) 発生毒性試験（ラット）	60
(3) 発生毒性試験（ウサギ）	61
13. 遺伝毒性試験	61
III. 食品健康影響評価	64
・別紙1：代謝物/分解物略称	73
・別紙2：検査値等略称	74
・別紙3：作物残留試験成績	75

・別紙4：畜産物残留試験成績（ウシ）	97
・参照	101

<審議の経緯>

1983年 3月 29日 初回農薬登録
2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照1）
2010年 10月 27日 農林水産省から厚生労働省へ魚介類への基準値設定依頼
2011年 2月 8日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安0208第6号）
2011年 2月 10日 関係書類の接受（参照2～6）
2011年 2月 17日 第367回食品安全委員会（要請事項説明）
2011年 11月 2日 第12回農薬専門調査会評価第一部会
2019年 7月 2日 追加資料受理（参照7～14）
2019年 7月 26日 第83回農薬専門調査会評価第一部会
2019年 8月 19日 追加資料受理（参照20）
2019年 9月 13日 第84回農薬専門調査会評価第一部会
2019年 10月 11日 第85回農薬専門調査会評価第一部会
2019年 11月 13日 第86回農薬専門調査会評価第一部会
2019年 12月 13日 第178回農薬専門調査会幹事会
2019年 12月 24日 第768回食品安全委員会（報告）

<食品安全委員会委員名簿>

(2012年6月30日まで)	(2015年6月30日まで)	(2017年1月6日まで)
小泉直子（委員長）	熊谷 進（委員長）	佐藤 洋（委員長）
熊谷 進（委員長代理*）	佐藤 洋（委員長代理）	山添 康（委員長代理）
長尾 拓	山添 康（委員長代理）	熊谷 進
野村一正	三森国敏（委員長代理）	吉田 緑
畠江敬子	石井克枝	石井克枝
廣瀬雅雄	上安平冽子	堀口逸子
村田容常	村田容常	村田容常

* : 2011年1月13日から

(2018年6月30日まで)	(2018年7月1日から)
佐藤 洋（委員長）	佐藤 洋（委員長）
山添 康（委員長代理）	山本茂貴（委員長代理）
吉田 緑	川西 徹
山本茂貴	吉田 緑
石井克枝	香西みどり
堀口逸子	堀口逸子
村田容常	吉田 充

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2012年3月31日まで)

・幹事会

納屋聖人（座長）	小澤正吾	松本清司
林 真（座長代理）	三枝順三	與語靖洋****
赤池昭紀	西川秋佳	吉田 緑
上路雅子	布柴達男***	

・評価第一部会

上路雅子（座長）	田村廣人	山崎浩史
林 真（座長代理）	平塚 明	義澤克彦
相磯成敏	福井義浩	若栗 忍
赤池昭紀	堀本政夫	

・評価第二部会

小澤正吾（座長）	小林裕子	細川正清
吉田 緑（座長代理）	長尾哲二	本間正充
浅野 哲**	長野嘉介*	松本清司
泉 啓介	根岸友惠	
棄形麻樹子*****	藤本成明	

・評価第三部会

三枝順三（座長）	川合是彰	永田 清
納屋聖人（座長代理）	佐々木有	八田稔久
石井康雄	高木篤也	増村健一**
臼井健二	津田洋幸	

・評価第四部会

西川秋佳（座長）	川口博明	根本信雄
布柴達男（座長代理***）	代田眞理子	柳井徳磨
與語靖洋（座長代理****）	玉井郁巳	山手丈至
太田敏博	津田修治	

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月21日まで

**** : 2011年6月22日から

***** : 2011年6月23日から

(2014年3月31日まで)

・幹事会

納屋聖人 (座長)	上路雅子	松本清司
西川秋佳* (座長代理)	永田 清	山手丈至**
三枝順三 (座長代理**)	長野嘉介	吉田 緑
赤池昭紀	本間正充	
・評価第一部会		
上路雅子 (座長)	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀 (座長代理)	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍
・評価第二部会		
吉田 緑 (座長)	菜形麻樹子	藤本成明
松本清司 (座長代理)	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充
・評価第三部会		
三枝順三 (座長)	小野 敦	永田 清
納屋聖人 (座長代理)	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一
・評価第四部会		
西川秋佳* (座長)	川口博明	根本信雄
長野嘉介 (座長代理*; 座長**)	代田眞理子	森田 健
山手丈至 (座長代理**)	玉井郁巳	與語靖洋
井上 薫**		

* : 2013年9月30日まで

** : 2013年10月1日から

(2016年3月31日まで)

・幹事会		
西川秋佳 (座長)	小澤正吾	林 真
納屋聖人 (座長代理)	三枝順三	本間正充
赤池昭紀	代田眞理子	松本清司
浅野 哲	永田 清	與語靖洋
上路雅子	長野嘉介	吉田 緑*
・評価第一部会		
上路雅子 (座長)	清家伸康	藤本成明
赤池昭紀 (座長代理)	林 真	堀本政夫
相磯成敏	平塚 明	山崎浩史
浅野 哲	福井義浩	若栗 忍
篠原厚子		
・評価第二部会		

吉田 緑 (座長) *	腰岡政二	本間正充
松本清司 (座長代理)	佐藤 洋	根岸友惠
小澤正吾	杉原数美	山本雅子
川口博明	細川正清	吉田 充
葉形麻樹子		
・評価第三部会		
三枝順三 (座長)	高木篤也	中山真義
納屋聖人 (座長代理)	田村廣人	八田稔久
太田敏博	中島美紀	増村健一
小野 敦	永田 清	義澤克彦
・評価第四部会		
西川秋佳 (座長)	佐々木有	本多一郎
長野嘉介 (座長代理)	代田眞理子	森田 健
井上 薫**	玉井郁巳	山手丈至
加藤美紀	中塚敏夫	與語靖洋

* : 2015 年 6 月 30 日まで

** : 2015 年 9 月 30 日まで

(2018 年 3 月 31 日まで)

・幹事会		
西川秋佳 (座長)	三枝順三	長野嘉介
納屋聖人 (座長代理)	代田眞理子	林 真
浅野 哲	清家伸康	本間正充*
小野 敦	中島美紀	與語靖洋
・評価第一部会		
浅野 哲 (座長)	葉形麻樹子	平林容子
平塚 明 (座長代理)	佐藤 洋	本多一郎
堀本政夫 (座長代理)	清家伸康	森田 健
相磯成敏	豊田武士	山本雅子
小澤正吾	林 真	若栗 忍
・評価第二部会		
三枝順三 (座長)	高木篤也	八田稔久
小野 敦 (座長代理)	中島美紀	福井義浩
納屋聖人 (座長代理)	中島裕司	本間正充*
腰岡政二	中山真義	美谷島克宏
杉原数美	根岸友惠	義澤克彦
・評価第三部会		
西川秋佳 (座長)	加藤美紀	高橋祐次

長野嘉介 (座長代理)
與語靖洋 (座長代理)
石井雄二
太田敏博

川口博明
久野壽也
篠原厚子
代田眞理子

塚原伸治
中塚敏夫
増村健一
吉田 充

* : 2017年9月30日まで

(2018年4月1日から)

・幹事会

西川秋佳 (座長)

代田眞理子

本間正充

納屋聖人 (座長代理)

清家伸康

松本清司

赤池昭紀

中島美紀

森田 健

浅野 哲

永田 清

與語靖洋

小野 敦

長野嘉介

・評価第一部会

浅野 哲 (座長)

篠原厚子

福井義浩

平塚 明 (座長代理)

清家伸康

藤本成明

堀本政夫 (座長代理)

豊田武士

森田 健

赤池昭紀

中塚敏夫

吉田 充*

石井雄二

・評価第二部会

松本清司 (座長)

棄形麻樹子

山手丈至

平林容子 (座長代理)

中島美紀

山本雅子

義澤克彦 (座長代理)

本多一郎

若栗 忍

小澤正吾

増村健一

渡邊栄喜

久野壽也

・評価第三部会

小野 敦 (座長)

佐藤 洋

中山真義

納屋聖人 (座長代理)

杉原数美

八田稔久

美谷島克宏 (座長代理)

高木篤也

藤井咲子

太田敏博

永田 清

安井 学

腰岡政二

・評価第四部会

本間正充 (座長)

加藤美紀

玉井郁巳

長野嘉介 (座長代理)

川口博明

中島裕司

與語靖洋 (座長代理)

代田眞理子

西川秋佳

乾 秀之

高橋祐次

根岸友惠

* : 2018年6月30日まで

<第 86 回農薬専門調査会評価第一部会専門参考人名簿>

久米利明

<第 178 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

三枝順三 林 真

要 約

カーバメート系殺虫剤であるカルボスルファン（CAS No. 55285-14-8）について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内運命（水稻、とうもろこし等）、急性神経毒性（ラット）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性/発がん性併合（ラット及びマウス）、3世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、カルボスルファン投与による影響は、主に赤血球及び脳ChE活性阻害、体重（増加抑制）並びに眼（虹彩萎縮、網膜変性等：ラット）に認められた。発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

ラットを用いた3世代繁殖試験において、産児数減少及び児動物の生後4日生存率低下が認められた。

各種試験結果から、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をカルボスルファン並びに代謝物B（カルボフラン）及びC（いずれも抱合体を含む）、魚介類中の暴露評価対象物質をカルボスルファン及び代謝物B（カルボフラン）と設定した。

各試験で得られた無毒性量又は最小毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の無毒性量0.5 mg/kg体重であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.005 mg/kg体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、カルボスルファンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量又は最小毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験の無毒性量0.5 mg/kg体重であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.005 mg/kg体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

カルボスルファンより最小の毒性量が低い代謝物B（カルボフラン）については、ラットを用いたChE活性阻害試験の総合評価における最小毒性量0.03 mg/kg体重を根拠として、安全係数200（種差：10、個体差：10、最小毒性量を用いたことによる追加係数：2）で除した0.00015 mg/kg体重/日及び0.00015 mg/kg体重をADI及びARfDと設定している（参照21）。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺虫剤

2. 有効成分の一般名

和名：カルボスルファン

英名：carbosulfan (ISO 名)

3. 化学名

IUPAC

和名：2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル(ジブチルアミノチオ)メチルカルバマート

英名：2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate

CAS (No. 55285-14-8)

和名：2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾフランニル *N*[(ジブチルアミノ)チオ]-*N*メチルカルバマート

英名：2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl *N*[(dibutylamino)thio]-*N*methylcarbamate


4. 分子式

C₂₀H₃₂N₂O₃S

5. 分子量

380.5

6. 構造式



7. 開発の経緯

カルボスルファンは、1974年に米国FMC社によってカルボフラン誘導体として開発されたカーバメート系殺虫剤であり、AChE活性を阻害することにより殺虫活性を示すと考えられている。

国内では1983年に初回農薬登録された。海外では、南米、アジア諸国等で登録されている。ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準値が設定されている。

今回、魚介類への基準値設定の要請がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要¹

各種運命試験 [II. 1～4]は、表1に示す各標識体を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からカルボスルファンの濃度（mg/kg 又はμg/g）に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は、別紙1及び2に示されている。

表1 標識体の略称及び標識位置

略称	標識位置
[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン	カルボスルファンのフェニル基の炭素を ¹⁴ Cで均一に標識したもの
[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン	カルボスルファンのブチル基の炭素を ¹⁴ Cで標識したもの
[car- ¹⁴ C]カルボスルファン	カルボスルファンのカルボニル基の炭素を ¹⁴ Cで標識したもの
¹⁴ C-代謝物B	代謝物B（カルボフラン）のフェニル基の炭素を ¹⁴ Cで均一に標識したもの

1. 動物体体内運命試験

(1) ラット①

SDラット（一群雌雄各5匹）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファン若しくは[dib-¹⁴C]カルボスルファンを4 mg/kg 体重（以下【1.(1)】において「低用量」という。）若しくは30 mg/kg 体重（以下【1.】において「高用量」という。）で単回経口投与、又は非標識カルボフランを低用量で14日間反復経口投与し、[phe-¹⁴C]カルボスルファン若しくは[dib-¹⁴C]カルボスルファンを低用量で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

① 吸収

尿及び糞中排泄試験【1.(1)④】における尿、呼気、臓器及び組織並びにカーカス²中放射能の合計から、投与後168時間の吸収率は少なくとも74.0%と算出された。

② 分布

単回経口投与群では投与168時間後、反復経口投与群では最終投与168時間後によく殺して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織中の残留放射能濃度は表2に示されている。

残留放射能は、[phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群では、ほとんどの試料で検出限界（0.001 μg/g）未満であり、心臓、腎臓、筋肉、肺及び脾臓で僅かに認められた。

[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では、採取された全ての臓器及び組織中に残留

¹ カルボスルファン農薬抄録（参照2、8）等に記載されている代謝物B（カルボフラン）を用いた各試験成績については、カルボフラン評価書（参照21）に記載した。

² 純粋・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

放射能が認められ、残留放射能濃度は肝臓、脂肪及び皮膚で比較的高かった。（参考照 2、4、8、16）

表2 主要臓器及び組織中の残留放射能濃度 ($\mu\text{g/g}$)

投与群	性別	[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン	[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン
4 mg/kg 体重 単回投与	雄	カーカス(0.008)、腎臓(0.008)、肺(0.006)、心臓(0.001)、血液(ND)	肝臓(0.095)、脂肪(0.076)、皮膚(0.044)、カーカス(0.038)、腎臓(0.034)、肺(0.024)、骨(0.021)、脳(0.021)、心臓(0.016)、脾臓(0.016)、血液(0.016)
	雌	カーカス(0.036)、心臓(0.026)、筋肉(0.002)、血液(ND)	肝臓(0.069)、脂肪(0.059)、カーカス(0.040)、皮膚(0.040)、腎臓(0.032)、卵巣(0.026)、子宮(0.026)、肺(0.022)、脳(0.018)、脾臓(0.015)、骨(0.014)、心臓(0.013)、血液(0.013)
4 mg/kg 体重 反復投与	雄	心臓(0.002)、血液(ND)	肝臓(0.132)、脂肪(0.066)、皮膚(0.050)、カーカス(0.039)、腎臓(0.037)、肺(0.030)、骨(0.028)、脳(0.025)、脾臓(0.022)、心臓(0.017)、精巣(0.017)、血液(0.015)
	雌	カーカス(0.011)、筋肉(0.002)、血液(ND)	肝臓(0.1)、脂肪(0.049)、皮膚(0.046)、カーカス(0.04)、腎臓(0.038)、子宮(0.03)、肺(0.029)、卵巣(0.027)、脳(0.024)、脾臓(0.023)、骨(0.02)、心臓(0.015)、血液(0.014)
30 mg/kg 体重 単回投与	雄	カーカス(0.131)、血液(ND)	肝臓(0.861)、脂肪(0.742)、皮膚(0.572)、カーカス(0.401)、腎臓(0.335)、肺(0.246)、骨(0.242)、脳(0.224)、脾臓(0.186)、心臓(0.185)、筋肉(0.159)、精巣(0.154)、血液(0.142)
	雌	カーカス(0.541)、心臓(0.018)、肺(0.01)、脾臓(0.01)、血液(ND)	カーカス(0.480)、肝臓(0.440)、脂肪(0.342)、皮膚(0.251)、腎臓(0.237)、肺(0.172)、卵巣(0.167)、子宮(0.150)、心臓(0.145)、骨(0.139)、脳(0.137)、脾臓(0.137)、筋肉(0.091)、血液(0.083)

ND : 検出限界 (0.001 $\mu\text{g/g}$) 未満

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [1. (1)④] で得られた尿及び糞を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿及び糞中代謝物は表 3 に示されている。

代謝プロファイルに、標識体、投与量及び性別による顕著な差は認められなかつた。尿中に未変化のカルボスルファンはほとんど認められず、主要代謝物として、[phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群では C、E、F、G 等が主にグルクロン酸又は硫酸抱合体として認められ、[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では P 及び W が認められた。糞中の主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、[phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群では代謝物 B、C 等、[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では代謝物 P が認められた。（参照 2、4、8、16）

表3 尿及び糞中代謝物 (%TAR)

投与群	試料	性別	[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン		[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン	
			カルボスルファン	代謝物	カルボスルファン	代謝物
4 mg/kg 体重 単回投与	尿	雄	ND	E(23.5)、G(20.3)、F(14.2)、C(11.0)、V(1.9)、B(0.1)、D(0.0)	ND	P(33.9)、W(23.8)
		雌	ND	G(26.3)、E(22.8)、F(12.7)、C(10.0)、V(1.8)、D(0.0)	ND	P(36.2)、W(22.5)
	糞	雄	2.5	C(6.4)、B(2.7)、F(1.2)、E(0.4)、G(0.4)、N(0.3)、V(0.3)、M(0.2)、O(0.2)、D(0.0)	6.3	P(4.5)
		雌	3.4	C(3.8)、B(2.6)、F(0.7)、E(0.3)、G(0.3)、M(0.2)、N(0.2)、V(0.2)、O(0.1)、D(0.0)	8.3	P(6.6)
4 mg/kg 体重 反復投与	尿	雄	ND	F(25.3)、C(17.6)、G(14.4)、E(8.8)、V(2.9)、B(0.1)、D(0.0)	ND	P(37.5)、W(25.8)
		雌	ND	F(25.6)、G(20.7)、C(20.1)、E(11.6)、V(2.2)、D(0.0)	ND	P(42.2)、W(24.7)
	糞	雄	0.9	C(4.5)、B(2.2)、F(0.9)、G(0.2)、N(0.2)、V(0.2)、D(0.1)、E(0.1)、M(0.1)、O(0.1)	3.5	P(3.4)
		雌	0.4	C(1.0)、B(0.9)、F(0.3)、G(0.1)、M(0.1)、N(0.1)、O(0.1)、V(0.1)、D(0.0)、E(0.0)	4.2	P(2.5)
30 mg/kg 体重 単回投与	尿	雄 ^a	ND	G(25.7)、F(17.9)、C(16.0)、E(7.3)、V(3.0)、D(0.0)	ND	P(36.3)、W(23.5)
		雌	0.3	G(23.9)、F(17.9)、C(11.5)、E(4.8)、V(2.2)、B(0.3)、D(0.0)、N(0.0)	ND	P(46.5)、W(17.1)
	糞	雄 ^a	1.7	B(1.8)、C(1.3)、F(0.6)、M(0.6)、N(0.3)、G(0.2)、O(0.2)、D(0.1)、E(0.1)、V(0.1)	4.1	P(2.7)
		雌	4.4	B(3.1)、C(1.9)、M(0.9)、N(0.7)、F(0.5)、G(0.4)、E(0.3)、O(0.2)、V(0.2)、D(0.1)	6.9	P(4.3)

注) • 試料採取時期は投与後 36 時間（ただし、[phe-¹⁴C]カルボスルファン低用量単回投与群の尿：投与後 48 時間及び[phe-¹⁴C]カルボスルファン高用量単回投与群の尿：投与後 72 時間を除く。）。

• [phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群の尿については、グルクロン酸又は硫酸抱合体を含む値。

ND : 検出されず。

^a : [phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群で認められた未同定代謝物（尿：8.7%TAR、糞：0.5%TAR）について、1 mol/L 塩酸で加水分解した結果、代謝物 C (0.4%TAR) 及び F (3.0%TAR) が認められた。

④ 排泄

投与後 168 時間（反復投与群では最終投与後 168 時間）の試料を採取して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

各投与群における尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

投与後 168 時間で 65.4%TAR 以上が尿中に排泄され、糞中排泄率は 21.8%TAR 以下、呼気中排泄率は 16.7%TAR 以下、体内残留放射能は 2%TAR 未満であった。

（参照 2、4、8、16）

表 4 尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与群	試料採取時期	試料	[phe- ¹⁴ C] カルボスルファン		[dib- ¹⁴ C] カルボスルファン	
			雄	雌	雄	雌
4 mg/kg 体重 単回投与	投与後 168 時間	尿 ^a	75.7	81.5	66.4	65.4
		糞	21.8	15.6	13.2	16.9
		呼 気 ¹⁴ CO ₂			10.7	8.72
		揮発性有機物			0.83	1.27
		臓器及び組織	<0.01	<0.01	0.20	0.13
4 mg/kg 体重 反復投与	最終 投与後 168 時間	尿 ^a	79.1	88.3	71.4	70.7
		糞	14.5	5.25	7.84	7.52
		呼 気 ¹⁴ CO ₂			12.1	12.5
		揮発性有機物			1.04	1.95
		臓器及び組織	<0.01	<0.01	0.02	0.13
30 mg/kg 体重 単回投与	投与後 168 時間	尿 ^a	82.7	72.1	65.9	66.3
		糞	10.2	16.9	7.78	12.3
		呼 気 ¹⁴ CO ₂			14.6	8.95
		揮発性有機物			2.05	0.96
		臓器及び組織	ND	<0.01	0.23	0.09
		カーカス	0.52	1.92	1.42	1.58

ND : 検出されず、／ : 測定されず

^a : ケージ洗浄液を含む。

(2) ラット②

SD ラット（雌雄、匹数不明）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファン、[dib-¹⁴C]カルボスルファン又は[car-¹⁴C]カルボスルファンを、3 mg/kg 体重又は高用量で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

① 吸収

尿及び糞中排泄試験 [1. (2)④] における尿、呼気、ケージ洗浄液及び組織中放射能の合計から、投与後 96 時間の吸収率は少なくとも 64.4% と算出された。

② 分布

[phe-¹⁴C]カルボスルファン及び[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では投与 96 時間後に、[car-¹⁴C]カルボスルファン投与群では投与 48 時間後にと殺して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織中の残留放射能濃度は表 5 に示されている。

残留放射能濃度は、血液、肝臓、腎臓、肺、心臓及び脾臓で比較的高かった。いずれの投与群においても、顕著な性差は認められなかった。(参照 2、8)

表 5 主要臓器及び組織中の残留放射能濃度 ($\mu\text{g/g}$)

投与群	性別	[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン	[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン	[car- ¹⁴ C]カルボスルファン
		投与 96 時間後	投与 96 時間後	投与 48 時間後
3 mg/kg 体重	雄	血液(0.08)	肝臓(0.09)、腎臓(0.07)、肺(0.04)、脾臓(0.04)、皮膚(0.04)、脂肪(0.04)、血液(0.03)	肝臓(0.78)、血液(0.68)
	雌 ^a	肝臓(0.11)、腎臓(0.05)、肺(0.05)、心臓(0.05)、脾臓(0.05)、脳(0.02)、皮膚(0.02)、筋肉(0.02)、骨(0.02)	肝臓(0.05)、腎臓(0.04)、脂肪(0.03)、血液(0.03)	肝臓(0.99)、腎臓(0.45)、心臓(0.45)、皮膚(0.23)、筋肉(0.18)
30 mg/kg 体重	雄	血液(1.73)	血液(2.10)	肝臓(8.00)、血液(6.86)
	雌	肺(1.53)、心臓(1.47)、血液(1.08)	肝臓(0.99)、腎臓(0.57)、脾臓(0.50)、肺(0.48)、皮膚(0.41)、骨(0.30)、心臓(0.28)、脂肪(0.24)、血液(0.24)	肝臓(9.59)、血液(9.40)

^a: [phe-¹⁴C]カルボスルファン及び[car-¹⁴C]カルボスルファン投与群では、血液中濃度は測定されなかった。

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [1. (2)④] で得られた投与後 24 時間の尿及び糞を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿及び糞中代謝物は表 6 に示されている。

いずれの投与群においても、尿及び糞中に未変化のカルボスルファンは認められなかったことから、ラット体内でカルボスルファンは速やかに代謝されると考えられた。主要代謝物として、尿中では C、E 及び G (いずれも抱合体を含む)、P 等、糞中では K、R 等が認められた。(参照 2、8)

表6 尿及び糞中代謝物 (%TAR)

投与群	試料	性別	[phe- ¹⁴ C] カルボスルファン ^a	[dib- ¹⁴ C] カルボスルファン	[car- ¹⁴ C] カルボスルファン ^a
3 mg/kg 体重	尿	雄	G(13.8)、E(6.8)、F(4.6)、C(4.3)、D(3.1)、B(1.2)、H(0.8)、J(0.8)、I(0.4)	P(41.9)	C(6.0)、H(1.2)、I/J(0.3)、D(0.1)
		雌	G(31.3)、E(14.8)、C(6.2)、B(0.7)、F(0.7)、J(0.7)、K(0.6)、M(0.5)、D(0.3)、I(0.2)、H(<0.1)	P(38.0)	C(4.8)、I/J(1.2)、H(0.7)、Q(0.3)、B(0.1)、D(0.1)、K(0.1)
	糞	雄	K(9.3)、E(3.2)、C(1.7)、Q(1.3)、M(0.8)	K(11.6)、R(1.8)、P(1.4)	K(2.2)、Q(0.7)、B(0.5)、C(0.5)、M(0.1)
		雌	K(2.0)、B(1.3)、Q(0.8)、G(0.2)、C(0.1)、I(0.1)、J(0.1)	R(22.1)、K(4.0)、P(2.4)	K(4.2)、B(1.7)、C(0.9)、Q(0.4)
30 mg/kg 体重	尿	雄	G(19.9)、C(9.5)、E(5.5)、F(2.7)、H(2.6)、I/J(2.2)、B(0.6)、D(0.4)	P(26.9)	C(10.5)、H(2.8)、I/J(2.2)、B(0.6)、D(0.2)
		雌	G(28.9)、C(12.6)、F(3.1)、E(2.0)、H(0.7)、I/J(0.7)、D(0.6)、K(0.2)	P(29.7)	C(13.7)、I/J(2.1)、H(0.4)、K(0.4)、B(0.2)、Q(0.2)、M(<0.1)
	糞	雄	K(5.2)、C(2.6)、B(2.5)、I/J(0.8)	R(17.8)、K(3.8)、P(0.1)	C(3.0)、B(2.6)、K(2.5)、Q(1.5)、M(1.3)、D(0.2)
		雌	K(2.1)、B(1.3)、C(0.2)、I/J(0.2)	R(16.8)、K(1.9)、P(<0.1)	K(4.9)、B(1.2)、C(1.0)、Q(0.4)

^a : [phe-¹⁴C]カルボスルファン及び[car-¹⁴C]カルボスルファン投与群における尿中代謝物は、グルクロニダーゼ処理及び酸加水分解画分で認められた抱合体を含む値。

[1.(1)及び(2)]から、ラットにおけるカルボスルファンの主要代謝経路は、①硫黄の酸化（代謝物Kの生成）、②N-S結合の開裂によるジブチルアミン側鎖の脱離（代謝物B及びPの生成）、③カルボスルファン又は代謝物Bのベンゾフラン環3位の炭素の酸化（代謝物M又はC及びDの生成）、④カルボスルファン又は代謝物Bの加水分解（代謝物Eの生成）、⑤代謝物C及びDの加水分解又はN-メチル基の酸化（代謝物F及びG又は代謝物H、I及びJの生成）、⑥ジスルフィド体（代謝物Qの生成）、⑦代謝物Pの酸化（代謝物Wの生成）であると考えられた。代謝物C、E、F、G等は、更にグルクロン酸又は硫酸抱合体化されると考えられた。また、カーバメート部位のカルボニル炭素及び代謝物Pは、CO₂に無機化される経路も考えられた。

④ 排泄

[phe-¹⁴C]カルボスルファン及び[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では投与後96時間、[car-¹⁴C]カルボスルファン投与群では投与後48時間の試料を採取して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

各投与群における尿、糞及び呼気中排泄率は表 7 に示されている。

いずれの投与群においても排泄は比較的速やかであり、投与後 48 時間で 80.2%TAR 以上が尿、糞及び呼気中に排泄された。[phe-¹⁴C] 及び [dib-¹⁴C] カルボスルファン投与群では主に尿中、[car-¹⁴C] カルボスルファン投与群では主に尿及び呼気 (¹⁴CO₂) 中に、それぞれ排泄された。(参照 2、8)

表 7 尿、糞及び呼気中排泄率 (%TAR)

投与群	試料	[phe- ¹⁴ C] カルボスルファン	[dib- ¹⁴ C] カルボスルファン	[car- ¹⁴ C] カルボスルファン			
		投与後 96 時間	投与後 96 時間	投与後 48 時間			
		雄	雌	雄	雌	雄	雌
3 mg/kg 体重	尿	61.9	87.3	72.3	63.7	27.1	30.3
	糞	35.7	10.5	23.6	29.2	18.0	13.4
	呼気(¹⁴ CO ₂)	ND	ND	1.4	3.3	42.8	40.9
	ケージ洗浄液	1.5	1.9	2.5	3.4	0.9	1.1
	組織	1.0	0.3	0.6	0.8	2.9	3.9
30 mg/kg 体重	尿	72.9	78.7	53.2	61.2	41.1	33.4
	糞	20.3	19.0	34.4	26.0	16.1	13.7
	呼気(¹⁴ CO ₂)	ND	ND	7.4	7.2	29.5	33.1
	ケージ洗浄液	6.0	0.9	3.9	5.2	0.8	1.6
	組織	0.8	1.4	1.2	0.7	5.0	4.1

ND : 検出されず

(3) ヤギ

泌乳ヤギ(ヌビアン種、一群雌 2 頭)に、[phe-¹⁴C] カルボスルファン又は [dib-¹⁴C] カルボスルファンを 25 mg/kg 飼料相当の用量で 7 日間カプセル経口投与して、動物体内運命試験が実施された。乳汁は 1 日 2 回、尿及び糞は 1 日 1 回、臓器及び組織は最終投与約 22 時間後に採取された。

投与放射能は、[phe-¹⁴C] カルボスルファン及び [dib-¹⁴C] カルボスルファン投与群において、尿中に 82.6 %TAR 及び 68.1 %TAR、糞中に 7%TAR 及び 3%TAR 排出され、主に尿中に排泄された。乳汁中の残留放射能濃度は投与後 2 日で定常状態となり、乳汁への移行は [phe-¹⁴C] カルボスルファン投与群では 0.165%TAR、[dib-¹⁴C] カルボスルファン投与群では 2.32%TAR であった。

乳汁及び組織中の残留放射能は表 8、各試料中の代謝物は表 9 及び 10 に示されている。

[phe-¹⁴C] カルボスルファン投与群において、未変化のカルボスルファン及び代謝物 B は、乳汁中では認められず、肝臓及び腎臓中ではいずれも 0.8%TRR 以下であった。主要代謝物として C、F 及び G (いずれも抱合体を含む) が 10%TRR を超えて認められた。[dib-¹⁴C] カルボスルファン投与群において、いずれの試料にも未変化のカルボスルファンは認められず、主要代謝物として乳汁中で Z2 及び Z3、肝臓で X が、それぞれ 10%TRR を超えて認められた。(参照 4、5、8、9、16)

表8 乳汁及び組織中の残留放射能 ($\mu\text{g/g}$)

試料	試料採取時期	[phe- ^{14}C]カルボスルファン	[dib- ^{14}C]カルボスルファン
乳汁	投与 1 日	午後	0.061
		午前	0.030
	投与 2 日	午後	0.058
		午前	0.026
	投与 4 日	午後	0.060
		午前	0.031
	投与 7 日	午後	0.075
		午前	0.039
肝臓	最終投与 約 22 時間後	0.058	1.12
腎臓		0.183	0.753
腰部筋肉		0.006	0.192
後肢筋肉		0.006	0.170
大網脂肪		0.009	1.19
腎周囲脂肪		0.011	0.744
全血	投与 1 日	0.000	0.000
	投与 3 日	0.019	0.106
	投与 7 日	0.030	0.209
	最終投与 約 22 時間後	0.029	0.254

表9 各試料中の代謝物 ([phe- ^{14}C]カルボスルファン投与群、%TRR)

試料	乳汁 ^a	肝臓	腎臓
有機溶媒可溶性画分	カルボスルファン	ND	0.1
	B	ND	0.2
	C	34.2	9.5
	D	1.2	1.5
	E	9.2	4.6
	F	21.1	15.6
	G	29.9	3.0
	H	ND	0.5
	K/N/O	ND	1.0
	V	ND	1.1
	極性抱合体	1.0	11.0
	未同定代謝物	0.2	6.1
有機溶媒不溶性画分	1.8	33.2	20.9
抽出残渣	1.4	12.7	2.1

注) 代謝物同定は、乳汁：有機溶媒抽出画分（ β -グルクロニダーゼ及びスルファターゼ処理）、肝臓：有機溶媒抽出画分、水性画分（ β -グルクロニダーゼ及びスルファターゼ処理）及び抽出残渣（ペプシン及びプロナーゼ処理）、腎臓：有機溶媒抽出画分及び有機溶媒不溶性画分（ペプシン及びプロナーゼ処理）を用いて行われた。

ND : 検出されず

^a : 投与 7 日午後の試料

表 10 各試料中の代謝物 ($[dib-^{14}C]$ カルボスルファン投与群、%TRR)

試料		乳汁 ^b	大網脂肪	肝臓	腎臓	腰部筋肉	
カルボスルファン		ND	ND	ND	ND	ND	
ジブチルアミン類	P	4.2	ND	ND	2.0	ND	
	W	1.4		2.0	ND		
	X	ND		10.4			
	Z1	1.1		1.0			
アミノブタノール類	Z2	15.6	0.8	5.3	5.0	ND	
	Z3	14.1		2.8	6.8		
極性アミン類 (W/Z1/Z2/Z3) ^a	ND	ND	ND	8.5	9.6		
非抱合アミン類	11.8	0.6	6.3	24.3	5.9		
抱合又はタンパク結合アミン類	10.5	ND	18.0	12.2	14.7		
天然成分	脂肪酸	13.4	82.0	ND	ND	ND	
	アミノ酸	5.5	ND	29.1	13.8	32.0	
	炭水化物	10.3		ND	ND	ND	
	トリグリセリド	1.1	5.3		ND	ND	
脂溶性画分	0.6	0.5	1.3	4.5	1.2		
極性水溶性画分	7.6	0.2	16.6	18.5	26.5		
抽出残渣	2.9	10.5	7.2	4.2	10.0		

ND : 検出されず

^a : ジブチルアミン類及びアミノブタノール類を含む非分離性画分。^b : 投与 5 日午後の試料

(4) ニワトリ

産卵鶏（白色レグホン種、一群雌 11 又は 16 羽³⁾ に、 $[phe-^{14}C]$ カルボスルファン又は $[dib-^{14}C]$ カルボスルファンを 0.5、1.5 及び 5.0 mg/kg 飼料相当の用量で、1 日 1 回、14 日間カプセル経口投与して、動物体内運命試験が実施された。卵及び排泄物は毎日、臓器及び組織は最終投与 6 時間以内にそれぞれ採取された。また、一群 3 羽について、投与期間終了後に最長 14 日間の休薬期間が設けられた。

卵中の残留放射能濃度は表 11、臓器及び組織中の残留放射能濃度は表 12、各試料中の代謝物は表 13 に、それぞれ示されている。

卵白及び卵黄中の残留放射能濃度は、いずれの投与群においても投与後 7 日で定常状態となり投与終了後は速やかに減少したが、 $[dib-^{14}C]$ カルボスルファン投与群では、5.0 mg/kg 飼料相当投与群で休薬 14 日の卵黄中に 0.0551 μg/g 認められた。卵白及び卵黄中残留放射能濃度は、 $[phe-^{14}C]$ カルボスルファン投与群に比べて $[dib-^{14}C]$ カルボスルファン投与群で高く、いずれの標識体投与群においても卵白に比べて卵黄で高かった。

臓器及び組織中の残留放射能濃度は、投与終了時ではいずれの投与群においても

³ 5.0 mg/kg 飼料相当投与群においては、投与終了時に採取された試料の処理操作を誤ったことから、5 羽を用いて追加試験が行われた。

肝臓で比較的高く認められた。休薬期間では、[phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群においては、5.0 mg/kg 飼料相当投与群の肝臓 (0.002 µg/g、休薬 7 日) を除いていずれも検出限界未満であった。[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群においては、休薬 7 日ではいずれの投与群においても脂肪で比較的高く認められ、休薬 14 日でも脂肪及び皮膚中残留放射能の顕著な減少は認められなかった。

[phe-¹⁴C]カルボスルファン投与群では、各試料中に未変化のカルボスルファンは認められず、主要代謝物として大腿筋で C、肝臓で F が、それぞれ 10%TRR を超えて認められた。このほかに、代謝物 D (抱合体を含む)、E、G 及び I が認められた。[dib-¹⁴C]カルボスルファン投与群では、脂肪中に未変化のカルボスルファンが認められたほか、主要代謝物として大腿筋及び肝臓で P が 10%TRR を超えて認められた。(参照 5、8、10、11、15、17)

表 11 卵中の残留放射能 (µg/g)

標識体		[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン			[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン		
投与量(mg/kg 飼料相当)		0.5	1.5	5.0 ^a	0.5	1.5	5.0 ^a
投与後日数(日)	3	卵白	<0.0020	<0.0020	0.0058	0.0023	0.0150
		卵黄	<0.0020	0.0021	0.0115	0.0379	0.0921
	7	卵白	<0.0020	<0.0020	0.0055	0.0098	0.0189
		卵黄	<0.0020	0.0053	0.0195	0.148	0.474
	13	卵白	<0.0020	<0.0020	0.0090	0.0112	0.0354
		卵黄	0.0025	0.0049	0.0260	0.165	0.582
	14 (休薬 1 日)	卵白	<0.0020	<0.0020	0.0053	0.0102	0.0199
		卵黄	0.0023	0.0068	0.0204	0.176	0.559
	21 (休薬 8 日)	卵白	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
		卵黄	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0281	0.149
	27 (休薬 14 日)	卵白	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
		卵黄	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0051	0.0221

^a : 追加試験の結果は含まない。

表 12 臓器及び組織中の残留放射能 ($\mu\text{g/g}$)

標識体		[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン			[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン		
投与量(mg/kg 飼料相当)		0.5	1.5	5.0	0.5	1.5	5.0
13 (休薬 0日)	胸筋	0.002	0.003	0.110	0.017	0.032	0.127
	血液	0.007	0.011	0.191	0.019	0.047	0.158
	脂肪	0.003	0.003	0.081	0.015	0.097	0.304
	砂囊	0.006	0.011	0.171	0.027	0.061	0.305
	心臓	0.003	0.006	0.159	0.025	0.059	0.239
	肝臓	0.011	0.015	0.282	0.154	0.297	1.352
	皮膚	0.004	0.006	0.145	0.014	0.042	0.122
	大腿筋	0.002	0.003	0.115	0.015	0.042	0.162
20 (休薬 7日)	胸筋	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.010	0.045
	血液	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.009	0.036
	脂肪	<0.002	<0.002	<0.002	0.024	0.106	0.410
	砂囊	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	0.026	0.076
	心臓	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.025	0.097
	肝臓	<0.002	<0.002	0.002	0.007	0.018	0.078
	皮膚	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.033	0.161
	大腿筋	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.018	0.068
27 (休薬 14日)	胸筋	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.010	0.036
	血液	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.008	0.028
	脂肪	<0.002	<0.002	<0.002	0.028	0.130	0.372
	砂囊	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	0.007	0.045
	心臓	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	0.020	0.038
	肝臓	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.022	0.019
	皮膚	<0.002	<0.002	<0.002	0.013	0.048	0.143
	大腿筋	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.015	0.045

表 13 各試料中の代謝物 (%TRR)

標識体	試料	試料採取日	カルボスルファン	代謝物
[phe- ¹⁴ C] カルボスルファン	大腿筋	最終投与 6時間以内	ND	C(36.9)、I(9.3)、F(7.1)、G(6.4)、D(1.7) ^a 、 その他(2.1)、未同定代謝物(6.6)
	肝臓		ND	F(16.0)、E(3.3)、G(2.5)、I(2.1)、D(1.7)、 C(1.1)、その他(0.5)、未同定代謝物(10.7)
[dib- ¹⁴ C] カルボスルファン	大腿筋	休薬 14 日	ND	P(22.5)、未同定代謝物(36.6)
	肝臓		ND	P(36.9)、未同定代謝物(25.6)
	脂肪		0.2	P(3.1)、未同定代謝物(86.7)
	脂肪		ND	未同定代謝物(100) ^b
	卵黄		ND	P(4.3)

ND : 検出されず

^a : 抱合体を含む。^b : 95%TRR 以上は脂肪酸として認められ、誘導体化によりオレイン酸 (37.0%TRR) 、パルミチン酸 (33.3%TRR) 、ステアリン酸 (7.7%TRR) 及びリノレン酸 (6.2%TRR) が認められた。

カルボスルファンのヤギ及びニワトリにおける主要代謝経路は、①N-S 結合の開

裂によるジブチルアミン側鎖の脱離（代謝物 B 及び P の生成）、②代謝物 B のベンゾフラン環 3 位の炭素の酸化（代謝物 C 及び D の生成）、③カルボスルファン並びに代謝物 B 又は C 及び D の加水分解（代謝物 E 又は F 及び G の生成）、④代謝物 P の酸化及び加水分解（ジブチルアミン類及びアミノブタノール類の生成）であると考えられた。ラットで認められたカーバメートメチルの酸化反応について、ヤギでは認められなかった。

2. 植物体体内運命試験

(1) 水稻①

[phe-¹⁴C]カルボスルファンのエタノール溶液を 1,100 g ai/ha の用量で、又は ¹⁴C-代謝物 B のエタノール溶液を 1,000 g ai/ha の用量で、それぞれ栽培ポットの土壤表面に散布し、2 週齢の水稻（品種：Calrose）の苗を移植後、湛水状態で栽培して、植物体内運命試験が実施された。試料として、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では処理 11 日及び 30 日後に茎葉、148 日後（成熟期）に穀粒、¹⁴C-代謝物 B 処理区では処理 15 日後に茎葉が、それぞれ採取された。また、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区において、移植 148 日後の水稻の穂實に [phe-¹⁴C]カルボスルファンを 32 μg/穂の用量で処理し、処理 45 日後に穀粒を採取して、植物体内運命試験が実施された。

[phe-¹⁴C]カルボスルファン及び ¹⁴C-代謝物 B 処理区における水稻試料中の放射能分布及び代謝物は表 14 に示されている。

土壤処理区において、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、未変化のカルボスルファンはほとんど認められず、茎葉における主要代謝物として B、C 及び E（いずれも抱合体を含む）が 10%TRR を超えて認められた。このほかに、代謝物 D、F 及び G（いずれも抱合体を含む）並びに I 抱合体、L 抱合体及び S 抱合体が認められた。¹⁴C-代謝物 B 処理区では、茎葉における主要成分として、未変化の B のほか、代謝物 C（抱合体を含む）が 10%TRR を超えて認められた。このほかに、代謝物 D 及び G が認められた。

土壤及び穂實処理後の穀粒における主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、代謝物 B（抱合体を含む）が 10%TRR を超えて認められた。このほかに、代謝物 C、D 及び G（いずれも抱合体を含む）等が認められた。

未成熟水稻において、[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は ¹⁴C-代謝物 B 処理による植物体内における主要代謝経路及び代謝物濃度に顕著な差は認められなかった。（参考 2、8）

表 14 [phe-¹⁴C]カルボスルファン及び¹⁴C-代謝物B処理区における
水稻試料中の放射能分布及び代謝物 (%TRR)

標識体	[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン			¹⁴ C-代謝物B	
処理方法	土壤処理		土壤及び 穂実処理	土壤処理	
試料採取時期	処理 11 日後	処理 30 日後	処理 148 日後	最終処理 45 日後	処理 15 日後
試料 ^a	茎葉	茎葉	穀粒	穀粒	茎葉
カルボスルファン	ND	0.2		5.7	—
B	45.3 (1.4)	12.0 (5.1)		29.1 (14.8)	40.9
C	20.2 (2.6)	9.4 (5.3)		7.7 (2.7)	25.8 (2.4)
D	2.1 (0.2)	0.9 (0.3)		2.3 (1.4)	3.8
E	1.2 (1.2)	13.6 (13.3)		2.2 (1.9)	ND
F	1.6 (1.4)	1.7 (1.6)		1.8 (1.4)	ND
G	3.3 (1.2)	7.6 (4.7)		4.3 (2.5)	0.5
I	0.1 (0.1)	0.6 (0.6)		0.4 (0.1)	ND
J	ND	ND		1.9 (1.0)	ND
K	ND	ND		1.7	ND
L	1.1 (1.1)	2.6 (2.6)		2.2 (2.2)	ND
M	ND	ND		0.6	ND
N	ND	ND		1.0	ND
O	ND	ND		1.9	ND
S	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)		1.4 (0.4)	ND
未同定代謝物	6.7	17.2		11.0	7.0
水溶性画分	1.7	15.4	45.8	7.0	4.4
抽出残渣	16.5	18.4	48.8	17.8	17.6

注) ・カルボスルファン、代謝物B及びその他各代謝物の数値は、遊離体及び抱合体の合計。

・()内は抱合体の値。

ND: 検出されず、—: 該当なし

^a: 代謝物分析は、有機溶媒抽出画分並びに水溶性画分及び抽出残渣の塩酸処理画分を用いて行われた。

^b: 有機可溶画分中放射能が少ないとから分析されなかった。

(2) 水稻②

[dib-¹⁴C]カルボスルファンのエタノール溶液を1,100 g ai/haの用量で栽培ポットの土壤表面に散布し、2週齢の水稻（品種不明）の苗を移植後、湛水状態で栽培し、処理11日及び30日後に茎葉、148日後（成熟期）に穀粒を採取して、植物体内運

命試験が実施された。また、土壤処理区における処理 148 日後の水稻の穂実に [dib-¹⁴C]カルボスルファンを 38 μg/穂の用量で処理し、処理 30 日後に穀粒を採取して、植物体内運命試験が実施された。

[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区における水稻試料中の放射能分布及び代謝物は表 15 に示されている。

土壤処理区では、いずれの試料においても残留放射能の大部分は抽出残渣中に認められ、主要成分として未変化のカルボスルファンのほか、茎葉では代謝物 P が認められたが 10%TRR 未満であった。

土壤及び穂実処理後の穀粒における主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、代謝物 P が 10%TRR を超えて認められた。このほかに、代謝物 K、M 及び N が認められた。(参照 2、8)

表 15 [dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区における水稻試料中の
放射能分布及び代謝物 (%TRR)

処理方法	土壤処理			土壤及び 穂実処理
試料採取時期	処理 11 日後	処理 30 日後 ^a	処理 148 日後	最終処理 30 日後
試料	茎葉	茎葉	穀粒	穀粒
有機溶媒画分	16.5	11.5	4.9	53.8
カルボスルファン	0.7			15.6
K	ND	NA	NA	0.4
M	ND			0.4
N	ND			0.2
P	2.5	3.3		29.6
未同定代謝物	13.0	5.6		7.6
水溶性画分	7.5	34.4	3.1	6.7
抽出残渣	76.3	45.2	92.0	39.5

ND : 検出されず、NA : 有機溶媒画分について分析されず

^a : 代謝物 P は、0.25 mol/L 塩酸による加水分解処理後の抽出残渣中に認められた。

(3) 水稻③<参考資料⁴>

[phe-¹⁴C]カルボスルファン、[dib-¹⁴C]カルボスルファン又は ¹⁴C-代謝物 B のエタノール溶液を 1,000 g ai/ha の用量で栽培ポット中の土壤表面に散布し、2 週齢の水稻（品種：Calrose）の苗を移植後、湛水状態で栽培し、処理 15 日及び 30 日後に茎葉を採取して、投与放射能の吸収及び移行性について確認された。

投与放射能の吸収率は、[phe-¹⁴C]カルボスルファン、[dib-¹⁴C]カルボスルファン及び ¹⁴C-代謝物 B 処理区で、それぞれ 6.3%、1.6% 及び 14.0% と算出された。

オートラジオグラフィーにおいて、[phe-¹⁴C]カルボスルファン及び ¹⁴C-代謝物 B 処理区では、葉先端及び根部に高濃度の放射能が認められた。一方、[dib-¹⁴C]カル

⁴ 投与放射能の吸収及び移行性のみ確認されていることから、参考資料とした。

ボスルファン処理区では、放射能は葉部に一様に分布し、根部における放射能濃度は低かった。（参照 2、8）

(4) とうもろこし

とうもろこし（品種：Agway 595-5）の播種時に、乳剤に調整した[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファンを3,400 g ai/haの用量で畝間に土壤処理して、植物体内運命試験が実施された。試料は、処理31日及び60日後に未成熟植物体、110日後にサイレージ、136日後に成熟試料（茎葉、苞皮及び穀粒）が、それぞれ採取された。

各標識体処理区におけるとうもろこし試料中の放射能分布及び代謝物は、表16及び17に示されている。

試料中の総残留放射能は、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区に比べて[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区で高く認められた。

いずれの標識体処理区においても、未変化のカルボスルファンは処理31日後に採取された未成熟植物体でのみ認められ、主要代謝物として[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区ではB、C及びG（いずれも抱合体を含む）、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区ではPが、それぞれ10%TRRを超えて認められた。このほかに、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区ではD、E及びF（いずれも抱合体を含む）並びにI、K、M、N及びO、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区ではK及びOが認められた。（参照2、8）

表 16 [phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区におけるとうもろこし試料中の放射能分布及び代謝物

試料採取時期	処理 31 日後		処理 60 日後		処理 110 日後		処理 136 日後(成熟期)						
	試料	未成熟植物体		未成熟植物体		サイレージ		茎葉		苞皮		穀粒	
		%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能		100	20.3	100	6.37	100	4.35	100	25.1	100	1.75	100	1.12
カルボスルファン		0.2	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
B		23.8 (0.8)	4.82	16.0 (4.1)	1.02	2.8 (2.6)	0.12	1.7 (0.3)	0.43	1.5	0.02		
C		24.9 (6.3)	5.05	22.3 (3.6)	1.42	13.6 (10.4)	0.59	12.2 (6.4)	3.06	10.3 (6.4)	0.18		
D		3.2 (0.4)	0.65	3.1 (0.6)	0.20	1.2 (0.6)	0.05	2.1 (0.8)	0.53	2.9 (1.9)	0.05		
E		0.5 (0.4)	0.10	3.2 (3.2)	0.20	3.7 (2.8)	0.16	2.1 (0.6)	0.53	3.1 (2.1)	0.05		
F		2.2 (2.1)	0.45	2.1 (1.6)	0.13	6.7 (5.8)	0.29	4.7 (3.2)	1.18	9.8 (6.7)	0.17		
G		4.0 (2.0)	0.81	15.1 (12.1)	0.96	11.0 (5.1)	0.48	9.7 (1.3)	2.44	6.7 (1.8)	0.12		
I		0.3	0.06	0.6	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
K		0.1	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
M		0.2	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
N		0.1	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
O		0.2	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
未同定代謝物		18.5 (15.0)	3.76	18.5 (18.1)	1.12	16.5 (13.6)	0.72	16.9 (9.2)	4.24	8.6 (5.7)	0.15		
有機可溶性画分		78.2	15.9	80.9	5.15	55.5	2.41	49.4	12.4	42.9	0.75	6.4	0.07
極性水性画分		10.5	2.13	6.5	0.41	27.3	1.19	32.8	8.24	36.6	0.64	67.7	0.76
抽出残渣		11.3	2.29	12.6	0.80	17.2	0.75	17.8	4.47	20.5	0.36	25.9	0.29

注) 数値は非抱合体と抱合体の合計、()内は抱合体の値。

ND : 検出されず、／: 有機可溶性画分における放射能が僅かであったことから、分析されず

表 17 [dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区におけるとうもろこし試料中の放射能分布及び代謝物

試料採取時期	処理 31 日後		処理 60 日後		処理 110 日後		処理 136 日後(成熟期)					
試料	未成熟植物体		未成熟植物体		サイレージ		茎葉		苞皮		穀粒	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能	100	3.64	100	1.33	100	1.22	100	2.39	100	1.22	100	1.18
カルボスルファン	0.3	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K	0.4	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
O	2.0	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
P	30.6	1.11	8.9	0.12	9.3	0.11	7.6	0.18	ND	ND	ND	ND
未同定代謝物	15.7	0.57	22.4	0.30	7.6	0.09	11.3	0.27	ND	ND	ND	ND
非抱合性カルボスルファン画分 ^a	13.2	0.48	13.9	0.18	7.0	0.09	10.4	0.25	8.9	0.11	0.7	0.01
非抱合性ジブチルアミン画分 ^b	35.8	1.30	17.4	0.23	9.9	0.12	8.5	0.20	ND	ND	ND	ND
抱合性有機可溶性画分	3.1	0.11	10.9	0.14	ND	ND	10.3	0.25	ND	ND	2.0	0.02
極性水性画分	26.8	0.98	23.3	0.31	34.6	0.42	38.9	0.93	42.0	0.51	71.2	0.84
抽出残渣	21.1	0.77	34.5	0.46	48.5	0.59	31.9	0.76	49.1	0.60	26.1	0.31

ND : 検出されず

^a : カルボスルファン骨格を有すると考えられる代謝物を含む。

^b : ジブチルアミン誘導体を含む。

(5) だいす

だいす（品種：Corsoy）の播種時に、乳剤に調整した[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファンを 2,200 g ai/ha の用量で土壤に処理し、処理 30 日及び 60 日後に茎葉、123 日後に子実を採取して、植物体内運命試験が実施された。

各標識体処理区におけるだいす試料中の放射能分布及び代謝物は、表 18 及び表 19 に示されている。

試料中の総残留放射能は、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区に比べて[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区で高く認められた。

[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、いずれの試料においても未変化のカルボスルファンは認められず、主要代謝物として茎葉で B、C 及び G（いずれも抱合体を含む）が 10%TRR を超えて認められた。子実では代謝物 C、E、F 及び G（いずれも抱合体を含む）が認められたが、いずれも 10%TRR 未満であった。

[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、茎葉に未変化のカルボスルファン及び代謝物 O が認められたが、いずれも 10%TRR 未満であった。（参照 2、8）

表 18 [phe-¹⁴C] カルボスルファン処理区におけるだいず試料中の放射能分布及び代謝物

試料採取時期	処理 30 日後		処理 60 日後		処理 123 日後	
試料	茎葉		茎葉		子実	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能	100	480	100	151	100	3.3
カルボスルファン	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	27.7 (0.5)	133	9.7 (1.5)	14.7	ND	ND
C	20.1 (8.8)	96.4	8.6 (3.4)	13.0	0.5 (0.2)	0.02
D	2.1 (0.4)	10.1	1.1 (0.5)	1.66	ND	ND
E	3.7 (3.2)	17.7	7.3 (6.5)	11.0	0.5 (0.2)	0.02
F	5.9 (5.6)	28.3	2.2 (1.3)	3.32	2.1 (0.7)	0.07
G	13.8 (11.8)	66.2	24.2 (20.3)	36.6	4.3 (0.3)	0.14
I	0.6	2.88	0.3	0.45	ND	ND
未同定代謝物	7.4	35.5	15.4	23.3	8.8	0.29
水溶性画分	15.7	75.3	5.4	8.2	41.5	1.36
抽出残渣	15.7	75.3	25.8	39.0	28.5	0.94

注) 代謝物の数値は非抱合体と抱合体の合計、()内は抱合体の値。

ND : 検出されず

表 19 [dib-¹⁴C] カルボスルファン処理区におけるだいず試料中の放射能分布及び代謝物

試料採取時期	処理 30 日後		処理 60 日後		処理 123 日後	
試料	茎葉		茎葉		子実	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能	100	7.5	100	2.4	100	1.98
カルボスルファン	0.2	0.015	0.02	0.0005	ND	ND
O	4.0	0.30	ND	ND	ND	ND
未同定代謝物	9.1	0.68	7.68	0.18	ND	ND
極性物質	47.1	3.5	59.5	1.4	44.1	0.87
抽出残渣	34.0	2.6	27.9	0.7	34.1	0.68

ND : 検出されず

(6) てんさい

播種 51 日後のてんさい (品種 : Mono-Hy-D₂) に、[phe-¹⁴C] カルボスルファン若しくは[dib-¹⁴C] カルボスルファンのエタノール溶液を 1,000~1,100 g ai/ha の用量で葉面散布、又は[phe-¹⁴C] カルボスルファン若しくは[dib-¹⁴C] カルボスルファンを同用量で土壌処理後に播種 51 日後のてんさいを定植し、処理 30 日、60 日及び 130 日後に植物体をそれぞれ採取して、植物体内運命試験が実施された。

各処理区のてんさい試料における総残留放射能濃度は表 20、[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファン葉面処理区におけるてんさい試料中の放射能分布及び代謝物は表 21 及び 22 に、それぞれ示されている。

いずれの処理区においても、葉及び根における残留放射能濃度は経時的に減少し、処理 130 日後に葉では 0.01~0.07 mg/kg、根では 0.02~0.17 mg/kg 認められた。

葉面処理区において、葉における主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、代謝物 C、F 及び G (いずれも抱合体を含む) 並びに P 及び T が 10%TRR を超えて認められた。根では、未変化のカルボスルファンは認められず、主要代謝物として T が 10%TRR を超えて認められたほか、代謝物 P が認められた。

土壤処理区において、処理 30 日後の葉における主要代謝物として C、F、G 等、処理 60 日後の根における主要代謝物として B、C、D 等が、いずれも抱合体として認められたが 10%TRR 未満であった。(参照 2、5、8)

表 20 てんさい試料における総残留放射能濃度 (mg/kg)

標識体		[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン		[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン	
試料		葉	根	葉	根
葉面 処理	30 日後	37.2	1.25	21.5	0.38
	60 日後	11.9	1.29	4.19	0.16
	130 日後	0.06	0.17	0.01	0.02
土壤 処理	30 日後	1.53	0.39	0.25	0.20
	60 日後	0.48	0.37	0.23	0.22
	130 日後	0.07	0.08	0.02	0.02

表 21 [phe-¹⁴C] カルボスルファン葉面処理区におけるてんさい葉試料中の放射能分布及び代謝物

試料採取時期	処理 30 日後		処理 60 日後		mg/kg
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	
総残留放射能	100	—	37.2	100	—
カルボスルファン	0.3	(0.1)	0.11	0.4	—
B	2.1	(1.6)	0.78	1.2	(0.9)
C	16.8	(14.2)	6.24	15.0	(14.6)
D	0.9	(0.5)	0.33	0.5	(0.3)
E	2.7	(2.6)	1.00	2.4	(2.3)
F	13.5	(13.1)	5.01	10.5	(10.3)
G	22.5	(22.1)	8.35	15.9	(15.7)
I	0.7	(0.6)	0.26	1.5	(1.4)
K	0.6	(0.3)	0.22	0.2	—
L	4.5	(4.5)	1.67	3.1	(3.1)
M	0.3	(0.1)	0.11	0.2	—
N	0.4	(0.2)	0.15	0.2	—
O	0.5	(0.3)	0.19	0.3	—
未同定代謝物	11.1	—	4.13	10.9	—
水溶性画分	5.4	—	2.00	12.7	—
抽出残渣	17.8	—	6.61	25.2	—
					3.00

注) ・代謝物の数値は非抱合体と抱合体の合計、()内は抱合体の値。

・根における代謝物同定は行われていない。

— : 該当なし

表 22 [dib-¹⁴C] カルボスルファン葉面処理区におけるてんさい試料中の放射能分布及び代謝物

試料	葉			根		
	処理 30 日後		処理 60 日後		処理 30 日後	
	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg
総残留放射能	100	21.5	100	4.19	100	0.38
カルボスルファン	1.0	0.22	ND	ND	ND	ND
P	46.9	10.1	19.9	0.83	3.9	0.01
T	13.9	2.99	30.8	1.29	12.1	0.05
U	2.2	0.47	1.4	0.06	ND	ND
未同定代謝物	25.4	5.46	28.9	1.21	7.0	0.03
水溶性画分	2.8	0.60	6.4	0.27	31.1	0.12
抽出残渣	5.0	1.08	9.4	0.39	35.4	0.13

ND : 検出されず

(7) ネーブルオレンジ

ネーブルオレンジ（品種不明、樹齢 21 年）の果実及び葉面に、乳剤に調製した [phe-¹⁴C] カルボスルファン又は[dib-¹⁴C] カルボスルファンを 61.5 g ai/ha の用量で散布して、植物体内運命試験が実施された。被験物質を散布後、樹木はビニールシートにより降雨から保護され、試料として処理当日並びに 7 日、15 日及び 30 日後

に果実、処理当日及び 30 日後に葉が、それぞれ採取された。

処理当日及び 30 日後の葉における残留放射能濃度は、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では 16 及び 12.8 mg/kg、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では 9.3 及び 4.6 mg/kg であった。

各標識体処理区における果実試料中の放射能分布は表 23、果皮及び果皮洗浄液中の代謝物は表 24 に示されている。

いずれの標識体処理区においても、投与放射能の大部分は果皮及び果皮洗浄液中に認められ、果肉及び果汁中残留放射能はいずれも 0.3%TRR 以下であった。

果皮及び果皮洗浄液中の主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では代謝物 B、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では代謝物 P が、それぞれ 10%TRR を超えて認められた。（参照 16）

表 23 果実試料中の放射能分布 (%TRR)

標識体	処理後日数 (日)	総残留 放射能 ^a (mg/kg)	果皮 洗浄液	果皮	果肉	果汁	非極性 画分	極性 画分	抽出 残渣
[phe- ¹⁴ C] カルボス ルファン	0(処理当日)	0.81	95.8	4.1	0.1	0.0	3.6	0.2	0.3
	7	0.85	86.6	13.2	0.1	0.0	—	—	—
	15	0.81	75.6	23.9	0.2	0.2	19.0	3.0	2.0
	30	0.78	53.7	45.9	0.1	0.3	35.4	6.7	3.7
[dib- ¹⁴ C] カルボス ルファン	0(処理当日)	0.72	93.9	5.7	0.3	0.2	3.7	1.9	1.1
	7	0.68	86.8	13	0.1	0.0	—	—	—
	15	0.56	75.1	24.5	0.2	0.2	9.6	13.9	1.1
	30	0.59	58.0	41.5	0.2	0.3	14.5	25.2	2.0

— : 参照した資料に記載がなかった。

^a : 果実全体における値。

表 24 果皮及び果皮洗浄液中の代謝物

標識体	代謝物	%TRR	mg/kg
[phe- ¹⁴ C] カルボスルファン	カルボスルファン	40.1	0.311
	B	33.9	0.263
	C	2.0	0.016
	D	2.0	0.016
	E	0.4	0.003
	H	1.2	0.01
	K	3.1	0.025
	Q	1.0	0.007
[dib- ¹⁴ C] カルボスルファン	カルボスルファン	31.2	0.183
	P	58.2	0.342

注) 各代謝物の値は、果皮抽出液及び果皮洗浄液中代謝物の合計。

カルボスルファンの植物における主要代謝経路は、①ジブチルアミン側鎖の脱離（代謝物 B 及び P の生成）、②代謝物 B の加水分解又はベンゾフラン環 3 位の炭

素の酸化（代謝物 E 又は C 及び D の生成）、③代謝物 C 及び D の加水分解（代謝物 F 及び G の生成）であると考えられた。また、ベンゾフラン環を有する各代謝物は、更に抱合化されると考えられた。

3. 土壤中運命試験

(1) 好気的土壤中及び嫌気的湛水土壤中運命試験

砂壤土（米国、pH 5.8）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファン、[car-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファンを 30 mg/kg 乾土の用量で添加し、好気的条件区では土壤水分量を容水量の 60%に調整し、嫌気的湛水条件区では脱酸素水で湛水し、24±2°C、暗条件下で最大 60 日間インキュベートして、好気的土壤中及び嫌気的湛水土壤中運命試験が実施された。また、[phe-¹⁴C]カルボスルファンを用いて、好気的条件下で 60 日間インキュベートする滅菌土壤区が設けられた。

好気的土壤及び嫌気的湛水土壤における放射能分布及び分解物は、表 25 及び表 26 にそれぞれ示されている。

いずれの処理区においても、カルボスルファンは速やかに分解され、主要分解物として[phe-¹⁴C]カルボスルファン及び[car-¹⁴C]カルボスルファン処理区では B、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では P が認められた。¹⁴CO₂は、非滅菌土壤ではいずれの標識体処理区においても経時的に増加し、生成量は嫌気的条件区に比べて好気的条件区で多かった。滅菌土壤区における ¹⁴CO₂の生成量は 0.1%TAR 未満であった。

好気的土壤における[car-¹⁴C]カルボスルファンの推定半減期は約 3 日、嫌気的湛水土壤における[phe-¹⁴C]カルボスルファンの推定半減期は約 2 日と、それぞれ算出された。（参照 2、8）

表 25 好気的土壤における放射能分布及び分解物 (%TAR)

標識体	[phe- ¹⁴ C]カルボスルファン					[car- ¹⁴ C]カルボスルファン		[dib- ¹⁴ C]カルボスルファン	
	非滅菌土壤			滅菌土壤		0 日	30 日	0 日	30 日
処理後日数	0 日	30 日	60 日	30 日	60 日				
カルボスルファン	78.2	5.1	1.9	7.6	2.4	79.9	3.4	69.8	9.8
B	19.9	53.9	37.7	69.7	72.8	1.0	47.9	—	—
D	ND	1.0	ND	ND	ND	ND	1.9	—	—
E	ND	0.2	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—
G	ND	0.4	ND	ND	ND	—	—	—	—
L	ND	0.3	0.6	ND	ND	ND	0.4	—	—
P	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.1
その他	3.2	8.6	8.4	20.8	20.6	0.2	0.7	3.1	1.7
¹⁴ CO ₂		8.8	13.1	<0.1	<0.1		26.8		51.3
抽出残渣	1.0	19.3	25.8	4.2	5.1	24.5	14.6	23.1	29.9

ND : 検出されず、— : 標識部位を含まないことから検出されず、／ : 試料なし

表 26 嫌気的湛水土壌における放射能分布及び分解物 (%TAR)

標識体	[phe- ¹⁴ C]		[car- ¹⁴ C]		[dib- ¹⁴ C]	
	カルボスルファン		カルボスルファン		カルボスルファン	
処理後日数	0 日	30 日	0 日	30 日	2 日	30 日
カルボスルファン	82.7	2.9	86.6	1.4	43.1	1.4
B	14.8	84.9	2.8	87.9	—	—
E	0.5	9.3	—	—	—	—
L	0.1	0.1	ND	ND	—	—
P	—	—	—	—	24.8	34.2
その他	1.1	2.1	0.5	1.4	29.4	49.5
¹⁴ CO ₂	／＼	0.9	／＼	2.4	0.4	3.8
抽出残渣	0.6	3.3	18.3	9.6	2.9	7.7

ND : 検出されず、— : 標識部位を含まないことから検出されず、／ : 試料なし

(2) 水/底質系における好気的湛水土壌中運命試験

水/底質系（英國、池水：pH 7.32～7.77、底質：土性不明、pH 7.1～7.2）に、カルボスルファンを 0.2 又は 0.4 mg/系全体の用量で添加し、10 又は 20°C、暗条件下で 102 日間インキュベートして、水/底質系における好気的湛水土壌中運命試験が実施された。

主要分解物として、B が水層で最大 34.7%TAR (10°C) 及び 33.2%TAR (20°C)、底質で最大 20.1%TAR (20°C)、E が水層で最大 23.2%TAR (20°C)、底質で最大 6.22%TAR (20°C) 認められた。試験終了時に揮発性化合物（主に ¹⁴CO₂）が 20%TAR～30.4%TAR 認められた。

好気的湛水土壌におけるカルボスルファンの推定半減期は、系全体で、20°Cでは 4.2 日～5.4 日、10°Cでは 10 日と、それぞれ算出された。（参照 5）

(3) 土壌表面光分解試験

薄層にしたシルト質壤土（米国、pH 4.9）の水分含量をほ場容水量の 22.2%に調整し、[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファン 25 μg を処理し、8 日間人工太陽光（光強度：25 W/m²、波長：290nm 以下をカット）を照射して、土壌表面光分解試験が実施された。また、両標識体を用いた暗対照区が設定された。

いずれの処理区においても、カルボスルファンは速やかに分解された。光照射区において、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、照射 10 分後に、未変化のカルボスルファンは 1.2%TAR となり、主要分解物として B が 86.4%TAR 認められた。分解物 B は照射 8 日後に 56.5%TAR となり、ほかに分解物 C、D、E、F、G、K、M、N 及び O が認められたが、いずれも 4.5%TAR 以下であった。[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、照射 10 分後に、未変化のカルボスルファンは 11.4%TAR となり、主要分解物として P が 38.6%TAR 認められた。分解物 P は照射 8 日後に 1.8%TAR となり、ほかに分解物 T 及び U が最大 9.0%TAR 及び 2.5%TAR 認められた。

光照射区及び暗対照区において、カルボスルファンの分解速度に顕著な差は認められなかった。（参照 2、8、16）

(4) 土壤中光分解試験

シルト質壤土（米国、pH 4.9）に[dib-¹⁴C]カルボスルファンを 25 mg/kg 乾土の用量で混合し、水分含量をほ場容水量の 70%に調整し、48 時間人工太陽光（光強度：25 W/m²、波長：290nm 以下をカット）を照射して、土壤中光分解試験が実施された。また、暗対象区が設定された。

光照射区において、未変化のカルボスルファンは照射 3 時間後に 85.9%TAR、照射 48 時間後に 76.2%TAR となり、主要分解物として P が照射 3 時間後に 6.5%TAR、照射 48 時間後に 6.7%TAR 認められた。また、照射 24 時間後に分解物 T 及び U が最大 1.4%TAR 及び 0.8%TAR 認められた。

光照射区及び暗対照区において、カルボスルファンの分解速度に顕著な差は認められなかった。（参照 2、8）

(5) 土壤吸脱着試験

4 種類の米国土壤（細砂、砂壤土、シルト質壤土及び砂質埴壤土）を用いた、カルボスルファンの土壤吸脱着試験が実施された。

カルボスルファンの Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 40.7～75.3、有機炭素含有率で補正した吸着係数 $K_{ads_{oc}}$ は 1,640～2,650、脱着係数 K_{des} は 63.5～111、有機炭素含有率で補正した脱着係数 $K_{des_{oc}}$ は 2,070～4,680 であった。（参照 2、8）

(6) 土壤吸脱着試験（代謝物 P）

4 種類の米国土壤（細砂、砂壤土、シルト質壤土及び砂質埴壤土）を用いた分解物 P の土壤吸脱着試験が実施された。

代謝物 P の Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 2.24～8.85、有機炭素含有率で補正した吸着係数 $K_{ads_{oc}}$ は 104～237、脱着係数 K_{des} は 3.77～12.9、有機炭素含有率で補正した脱着係数 $K_{des_{oc}}$ は 176～464 であった。（参照 2、8）

4. 水中運命試験

(1) 加水分解試験（緩衝液及び蒸留水）

pH 5.0（クエン酸緩衝液）、pH 7.0（リン酸緩衝液）及び pH 9.0（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液並びに蒸留水（pH 7.3）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファン（リン酸緩衝液のみ）を 0.25 mg/L の用量で添加し、25°C、暗条件下で最長 240 時間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

pH 5.0において、未変化のカルボスルファンは処理 5 分後の 60.3%TAR から処理 1 時間後に 5.2%TAR となり、主要分解物として B が処理 1 時間後に最大 93.7%TAR 認められた。このほかに、分解物 O が最大 0.6%TAR 認められた。

pH 7.0において、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、未変化のカルボスルファンは処理直後の94.7%TARから処理48時間後に6.5%TARとなり、主要分解物としてBが処理48時間後に最大89.6%TAR認められた。ほかに、分解物C、G、E、K、M、N及びOが認められたが、いずれも2.0%TAR以下であった。[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では、未変化のカルボスルファンは処理直後の96.4%TARから処理24時間後に58.6%TARとなり、主要分解物としてPが尿素誘導体として処理24時間後に最大35.3%TAR認められた。このほかに、分解物Nが最大0.7%TAR認められた。

pH 7.3において、未変化のカルボスルファンは処理直後の90.3%TARから処理48時間後に14.5%TARとなり、主要分解物としてBが処理48時間後に最大85.5%TAR認められた。このほかに、分解物E、M、N及びOが認められたが、いずれも1.3%TAR以下であった。

pH 9.0において、未変化のカルボスルファンは処理直後の92.8%TARから処理240時間後に35.3%TARとなり、主要分解物としてBが最大9.0%TAR、Eが最大33.6%TAR（いずれも処理72時間後）認められた。このほかに、分解物G、K、M、N及びOが認められたが、いずれも2.8%TAR以下であった。

[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区の結果から、カルボスルファンの推定半減期は、pH 5.0で0.2時間、pH7.0で11.4時間、pH7.3で18.2時間、pH9.0で173時間と、それぞれ算出された（参照2、5、8）

（2）水中光分解試験①（緩衝液及び蒸留水）

リン酸緩衝液（pH 7）及び蒸留水（pH不明）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファン又は[dib-¹⁴C]カルボスルファンを5 mg/Lの用量で添加し、人工太陽光（光強度：15 W/m²、波長：290nm以下をカット）を8日間照射して、水中光分解試験が実施された。また、両標識体を用いて暗対象区が設定された。

光照射区におけるリン酸緩衝液では、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区で照射8日後に、未変化のカルボスルファンは1.8%TARとなり、主要分解物としてBが最大59.7%TAR認められた。このほかに、分解物C、D、E、F、G、K、M、N及びOが認められたが、いずれも5.7%TAR以下であった。[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区で未変化のカルボスルファンは照射8日後に2.1%TARとなり、主要分解物としてPが照射4日後に最大54.7%TAR認められた。このほかに、分解物Tが最大3.4%TAR認められた。

蒸留水では、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区で照射8日後に、未変化のカルボスルファンは22.4%TARとなり、主要分解物としてBが最大38.8%TAR認められた。このほかに、分解物C、D、E、F、G、K、M、N及びOが認められたが、いずれも4.8%TAR以下であった。[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区で照射8日後に、未変化のカルボスルファンは47.3%TARとなり、主要分解物としてPが最大36.6%TAR認められた。このほかに、分解物Tが最大2.3%TAR、Uが最大3.4%TAR

認められた。

暗対象区において照射 8 日後に、未変化のカルボスルファンは、リン酸緩衝液では 46.3%TAR～57.0%TAR、蒸留水では 73.4%TAR～81.7%TAR 認められ、カルボスルファンの分解速度は光照射区に比べて緩やかであった。

緩衝液及び蒸留水中におけるカルボスルファンの推定半減期は、[phe-¹⁴C]カルボスルファン処理区では 1.33 日及び 4 日以内、[dib-¹⁴C]カルボスルファン処理区では 1.44 日及び 8 日以内と、それぞれ算出された。（参照 2、8、16）

（3）水中光分解試験②（滅菌自然水）

pH 5.7 の滅菌自然水（池水、ドイツ）に、[phe-¹⁴C]カルボスルファンを 0.378 mg/L の用量で添加し、25.1±0.1°C で 15 日間人工太陽光 [光強度：46.3 W/m²、波長範囲：300～400 nm、東京（北緯 35 度）春季太陽光 89.3 日間に相当] を照射して、水中光分解試験が実施された。また、暗対象区が設定された。

光照射区において、照射 1 日後に、未変化のカルボスルファンは 8.5%TAR となり、主要分解物として B が最大 79.0%TAR 認められた。このほかに、分解物 C が最大 6.8%TAR、E が最大 1.7%TAR 認められた。¹⁴CO₂ は試験終了時に最大 23.5%TAR 認められた。

暗対象区において、試験終了時に未変化のカルボスルファンは 1.5%TAR となり、主要分解物として B が照射 12 日後に最大 93.2%TAR 認められた。このほかに、分解物 C 及び E が最大 1.5%TAR 及び 2.2%TAR 認められた。カルボスルファンの分解速度は光照射区に比べて暗対象区で緩やかであった。

滅菌自然水中におけるカルボスルファンの推定半減期は 0.5 日、北緯 35 度春季太陽光換算で 3.2 日と算出された。（参照 2、8）

5. 土壌残留試験

火山灰土・埴土（茨城）、洪積土・埴壤土（愛知）、洪積土・砂土（千葉）及び火山灰土・埴壤土（茨城）を用いて、カルボスルファン及び代謝物 B を分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及びほ場）が実施された。

結果は表 27 に示されている。（参照 2、8）

表 27 土壤残留試験成績

試験		濃度 ^a	土壤	推定半減期(日)	
				カルボスルファン	カルボスルファン + B
容器内 試験	水田 状態	2 mg/kg 乾土	火山灰土・埴土	約 0~1	約 28~42
			洪積土・埴壤土	約 0~1	約 14~28
	畑地 状態	10 mg/kg 乾土	洪積土・砂土	約 3~7	約 14~21
			火山灰土・埴壤土	約 3~7	約 29~59
ほ場 試験	水田	2 kg ai/ha	火山灰土・埴土	0~3	36~54
			洪積土・埴壤土	3~7	3~7
	畑地	10 kg ai/ha	洪積土・砂土	約 0~29	約 0~29
			火山灰土・埴壤土	約 11~18	約 76~109

^a : 容器内試験では原体、ほ場試験では 5%粒剤が用いられた。

6. 作物等残留試験

(1) 作物残留試験

水稻、野菜等を用いて、カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙 3 に示されている。

カルボスルファン及び代謝物 D は、いずれの試料においても定量限界未満であった。代謝物 B 及び C の最大残留値は、いずれも散布 147 日後に収穫した稻わらにおける 0.03 及び 0.46 mg/kg であり、可食部においては、代謝物 B はいずれの試料においても定量限界未満であり、代謝物 C は処理 254 日後に収穫したさとうきび(茎部)における 0.021 mg/kg であった。

カルボスルファン並びに代謝物 B 及び C の含量の最大残留値は、処理 147 日後に収穫した稻わらにおける 0.47 mg/kg (代謝物 B 換算値は 0.27 mg/kg) であり、可食部においては処理 254 日後に収穫したさとうきび(茎部)における 0.033 mg/kg (代謝物 B 換算値は 0.019 mg/kg) であった。(参照 2、8)

(2) 畜産物残留試験

① ウシ

泌乳牛 [ホルスタイン種、一群雌 3 頭 (50 mg/kg 飼料投与群のみ 4 頭)] にカルボスルファンを 1、3、10 及び 50 mg/kg 飼料の用量⁵で 28 日間混餌投与し、カルボスルファン並びに代謝物 B、C、D、E、F、G 及び P を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。10 mg/kg 飼料投与群のうち 1 頭については投与期間終了後に 3 日間、50 mg/kg 飼料投与群のうち 2 頭については投与期間終了後に最長 6 日間の休薬期間が、それぞれ設けられた。

結果は別紙 4 に示されている。

⁵ 本試験における用量は、作物残留試験から得られた飼料用作物の残留濃度から算出された乳牛における予想飼料最大負荷量と比較して高かった。

カルボスルファンについて、乳汁ではいずれの試料においても定量限界 (0.025 µg/g) 未満であった。組織における最大残留値は、50 mg/kg 飼料投与群の脂肪における 0.076 µg/g であり、腎臓、肝臓及び筋肉ではいずれの投与群においても検出限界 (0.010 µg/g) 未満であった。

カーバメート代謝物 (B、C 及び D) について、代謝物 B 及び D はいずれの試料においても定量限界 (乳汁 : 0.025 µg/g、組織及びクリーム : 0.050 µg/g) 未満であり、代謝物 C の最大残留値は 50 mg/kg 飼料投与群の腎臓における 0.133 µg/g であった。

フェノール代謝物 (E、F 及び G) について、代謝物 E、F 及び G の最大残留値は、いずれも 50 mg/kg 飼料投与群の腎臓における 0.400、0.173 及び 0.074 µg/g であった。

カルボスルファン並びに代謝物 B、C、D、E、F 及び G について、休薬 3 日及び 6 日の乳汁ではいずれも検出限界未満であった。

代謝物 P について、最大残留値は 50 mg/kg 飼料投与群の腎臓における 0.890 µg/g であったが、対照群の乳汁及び組織中においても最大 0.050 及び 0.048 µg/g 認められ、1、3 及び 10 mg/kg 飼料投与群での平均残留濃度について、投与量との相関性は低いと考えられた。また、休薬 6 日の乳汁及び組織中に最大 0.015 及び 0.024 µg/g 認められた。これらのことから、代謝物 P はカルボスルファンの代謝により生ずるほか、自然界にも存在する化合物であると考えられた⁶。 (参照 8、12、16、20)

② ニワトリ

産卵鶏 (白色レグホン種、一群 20 羽) にカルボスルファンを 0.15、0.45 及び 1.50 mg/kg 飼料相当の用量⁷で 28 日間カプセル経口投与し、カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。各投与群について、投与期間終了後に最長 7 日間の休薬期間が設けられた。

1.50 mg/kg 飼料相当投与群の卵並びに肝臓、筋肉及び脂肪において、カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D はいずれも検出限界 (0.005 µg/g) 未満であった。なお、1.50 mg/kg 飼料相当投与群の結果に基づき、0.15 及び 0.45 mg/kg 飼料相当投与群並びに休薬期間における試料分析は実施されなかった。 (参照 8、13、14)

⁶ 海外で実施された複数の作物残留試験及び畜産物残留試験における対照試料においても代謝物 P が認められている。また、生鮮野菜等の食品中から代謝物 P が認められたとの報告 (B. Pfundstein et al. Mean Daily Intake of Primary and Secondary Amines from Foods and Beverages in West Germany in 1989-1990, Food Chemical Toxicology 1991; 29(11): 733-739) がある。これらのことから、代謝物 P は、植物又は動物体内に生体成分として存在するアミノ酸等の窒素化合物の代謝分解の過程で生成される可能性が考えられた。

⁷ 本試験における用量は、作物残留試験から得られた飼料用作物の残留濃度から算出された産卵鶏における予想飼料最大負荷量と比較して高かった。

(3) 魚介類における最大推定残留値

カルボスルファン及び代謝物 B の公共用水域における水産動植物被害予測濃度（水産 PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。

カルボスルファンの水産 PEC は 0.016 µg/L、BCF は 355（魚種：ブルーギル、補正值⁸⁾）、魚介類における最大推定残留値は 0.0284 mg/kg であった。代謝物 B の水産 PEC は 0.063 µg/L、BCF は 8.3（計算値）、魚介類における最大推定残留値は 0.00262 mg/kg であった。カルボスルファン及び代謝物 B（カルボスルファン換算値⁹⁾ の合量の魚介類における最大推定残留値は 0.0329 mg/kg であった。（参照 2、3、8）

7. 一般薬理試験

カルボスルファンのラット、マウス及びウサギを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表 28 に示されている。（参照 2、8）

表 28 一般薬理試験結果概要

試験の種類	動物種	動物数 ／群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
一般状態 (Irwin 法)	dd マウス	雄 3 雌 3	0、30、100、 150 (皮下) ^a	—	30	150 mg/kg 体重以上で 角膜反射低下、中枢興奮、流涎及び眼球突出 100 mg/kg 体重以上で 異常歩調、立毛及び排尿 30 mg/kg 体重以上で 自発運動低下、認知力低下、反応性低下、振戦(30 及び 100 mg/kg 体重のみ)、痙攣、よろめき歩行、握力低下、耳介反射低下、体温低下及び呼吸数減少(30 及び 100 mg/kg 体重のみ) 30 mg/kg 体重以上で死亡例

⁸ カルボスルファンの分解を考慮するため、試験水及び魚体中におけるカルボスルファン存在比に基づき算出された。

⁹ 換算係数は 1.72。

試験の種類		動物種	動物数 ／群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
中枢神経系	自発運動量 (回転かご法)	dd マウス	雄 7	0、3、10 (皮下) ^a	3	10	10 mg/kg 体重で顕著な自発運動量減少
	筋弛緩作用 (懸垂法及び斜面法)	dd マウス	雄 10	0、3、10 (皮下) ^a	—	3	10 mg/kg 体重で弛緩作用あり(懸垂法: 5/10 例、斜面法: 1/10 例) 3 mg/kg 体重以上で弛緩作用あり(懸垂法: 2/10 例)
	抗痙攣作用	dd マウス	雄 10	0、30、100、150 (皮下) ^a	150	—	影響なし
	体温	ウサギ ^c	雄 3	0、3、10 (筋肉内) ^a	—	3	10 mg/kg 体重で体温低下及び全身症状(軟便、縮瞳、呼吸切迫等)(2例)、体温上昇(1 例) 3 mg/kg 体重で軽微な体温上昇傾向(1 例)
	自発性脳波	ウサギ ^c	詳細不明	0、1、5 (静脈内、麻酔下) ^b	5	—	影響なし
循環器系	血圧、呼吸及び心電図	ウサギ ^c	雌雄 ^e	0、0.5、1、2 (静脈内、麻酔下) ^b	—	0.5	0.5 及び 1 mg/kg 体重で一過性の血圧下降及び呼吸不整 1 mg/kg 体重以上で死亡例
腎機能	尿量及び尿中電解質	Wistar ラット	雄 5	0、3、10 (筋肉内)	—	3	10 mg/kg 体重でナトリウム排泄増加及び pH 軽度上昇 3 mg/kg 体重でナトリウム排泄増加及びカリウム排泄減少傾向
消化器系	摘出腸管 (Magnus 法)	ウサギ ^c	詳細不明	3.5×10^{-5} 、 7×10^{-5} mol/L (<i>in vitro</i>) ^b	3.5×10^{-5} mol/L	7×10^{-5} mol/L	7×10^{-5} mol/L で軽度の緊張上昇及び腸管の緊縮
	小腸輸送能	dd マウス	雄 7	0、100、150 (皮下) ^a	—	100	150 mg/kg 体重で輸送能抑制 100 mg/kg 体重で輸送能抑制傾向

試験の種類		動物種	動物数 ／群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
肝機能	AST、ALT、 ALP、TP 及びChE	ウサギ ^c	雄 3	3、10 (筋肉内) ^a	—	3	10 mg/kg 体重で AST 及び ALT 増加、ALP 及び TP 減少傾向、一過性の ChE 活性低下(20%以上) 3 mg/kg 体重で ALT 増加、ALP 及び TP 減少傾向
	AST、ALT 及び ChE	ウサギ ^c	2 ^d	10 (筋肉内) ^a	—	10	一過性の AST 及び ALT 増加。ChE に影響なし
血液系	溶血 (Parpart 法)	ウサギ ^c	3 ^d	0、3、10 (筋肉内) ^a	—	3	3 mg/kg 体重以上で僅かな脆弱性亢進傾向
	血液凝固 (Lee & White 法)	ウサギ ^c	3 ^d	0、3、10 (筋肉内) ^a	—	3	3 mg/kg 体重以上で凝固時間が 1 分～2 分短縮

— : 最大無作用量又は最小作用量は設定されなかった。

^a : 溶媒として Tween 80 が用いられた。

^b : 溶媒としてエタノール：水 (2 : 1) が用いられた。

^c : 系統不明

^d : 性別不明

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

カルボスルファン(原体)のラット、マウス、ウサギ及びニワトリを用いた急性毒性試験が実施された。

結果は表29に示されている。(参照2、5、8、15、18)

表29 急性毒性試験結果概要(原体)

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	SD ラット 雄9匹、雌6匹 ^a	180	101	投与量；雄：57、180、570 mg/kg 体重、雌：57、180 mg/kg 体重 雄： 570 mg/kg 体重：腹臥位 180 mg/kg 体重以上：自発運動低下、振戦、流涙及び円背位 57 mg/kg 体重以上：糞量減少、立毛(57 mg/kg 体重のみ) 雌： 180 mg/kg 体重：円背位 57 mg/kg 体重以上：糞量減少、自発運動能低下、振戦及び流涙 雌雄：180 mg/kg 体重以上で死亡例
	SD ラット 雌雄各10匹 ^b	101	103	投与量；雌雄：64、73、92、110、129、156、184 mg/kg 体重 雌雄： 156 mg/kg 体重以上：血涙及び眼球突出、 73 mg/kg 体重以上：間代性痙攣(投与5分後以降) 64 mg/kg 体重以上：自発運動低下、うずくまり姿勢、腹臥位、振戦、背部筋攣縮、流涙、呼吸の律動性の乱れ及び呼吸促進(投与5分後以降) 雌雄：73 mg/kg 体重以上で死亡例

投与 経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
	SD ラット 雌雄各 10 匹 ^b	250	185	<p>投与量；雌雄：68.8、103、154、231、348、520 mg/kg 体重</p> <p>雄： 520 mg/kg 体重：呼吸困難、拳尾反応、頸部肥大及び鼻出血 348 mg/kg 体重以上：自発運動低下 231 mg/kg 体重：ペニス脱 68.8 mg/kg 体重以上：立毛、流涙、流涎、血涙、振戦、筋振戦、縮瞳、散瞳、眼球突出、下痢及び多尿</p> <p>雌： 520 mg/kg 体重：頸部肥大 348 mg/kg 体重：血尿及び眼瞼下垂 154 mg/kg 体重以上：拳尾反応、散瞳(231 mg/kg 体重まで)及び自発運動低下 68.8 mg/kg 体重以上：立毛、流涙、流涎、血涙、振戦、筋振戦、縮瞳、眼球突出、下痢(68.8 mg/kg 体重のみ)及び多尿</p> <p>雄：154 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：68.8 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^{b, c}	180	182	<p>投与量；雌雄：120、144、173、207、249、299 mg/kg 体重</p> <p>雌雄： 249 mg/kg 体重以上：眼球突出 173 mg/kg 体重以上：流涎 144 mg/kg 体重以上：間代性痙攣 120 mg/kg 体重以上：自発運動低下及びうずくまり姿勢、振戦、流涙、呼吸の律動性の乱れ及び呼吸促進</p> <p>雌雄：144 mg/kg 体重以上で死亡例</p>

投与 経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
	ICR マウス ^{b、c} 雌雄各 10 匹	124	123	投与量；雌雄：50.0、65.8、87.1、115、152、 200 mg/kg 体重 雄： 200 mg/kg 体重：運動失調 152 mg/kg 体重以上：筋振戦及び自発運動低下 50.0 mg/kg 体重以上：下痢、振戦、多尿、流涎 及び流涙 雌： 200 mg/kg 体重：眼瞼下垂 152 mg/kg 体重以上：運動失調 87.1 mg/kg 体重：筋振戦 50.0 mg/kg 体重以上：下痢、振戦、多尿、流涙 及び自発運動低下 雌雄：87.1 mg/kg 体重以上で死亡例
	ウサギ (系統、性別及び 匹数不明)	42.0	45.8	詳細不明
	ウサギ (系統、性別及び 匹数不明)	36.7	52.7	詳細不明
	白色レグホン種 ニワトリ ^c 雌 8 羽		376	投与量：200、390、762、1,486、2,900 mg/kg 体重 観察された症状等について詳細不明
経皮	SD ラット 雌雄各 10 匹	4,010	4,320	自発運動低下、うずくまり姿勢、腹臥位、振戦、 背部筋攣縮、流涎、流涙、よろめき歩行及び間代性痙攣 雌雄：2,387 mg/kg 体重以上で死亡例
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^c	3,410	2,780	自発運動低下、うずくまり姿勢、振戦、流涙、流涎、 腹臥位、よろめき歩行、背部筋攣縮及び間代性痙攣 雄：2,600 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,538 mg/kg 体重以上で死亡例
	NZW ウサギ 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	筋振戦、糞量減少、自発運動低下及び縮瞳 死亡例なし
腹腔内	SD ラット 雌雄各 10 匹	243	225	自発運動低下、うずくまり姿勢、腹臥位、振戦、 背部筋攣縮、流涎、流涙、間代性痙攣、呼吸の律動性の乱れ及び呼吸促進 雌雄：184 mg/kg 体重以上で死亡例

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^c	191	189	自発運動低下、うずくまり姿勢、振戦、流涙、流涎、腹臥位、呼吸促進、呼吸困難、間代性痙攣、拳尾反応及び眼球突出 雌雄 : 180 mg/kg 体重以上で死亡例
皮下	SD ラット 雌雄各 10 匹	788	744	自発運動低下、うずくまり姿勢、振戦、腹臥位、背部筋攣縮、流涎、流涙、間代性痙攣、呼吸の律動性の乱れ及び呼吸促進 雌雄 : 441 mg/kg 体重以上で死亡例
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^c	364	339	自発運動低下、うずくまり姿勢、振戦、流涙、呼吸促進、呼吸困難、間代性痙攣、拳尾反応及び眼球突出 雌雄 : 300 mg/kg 体重以上で死亡例
吸入	SD ラット 雌雄各 10 匹 ^d	LC ₅₀ (mg/L)		筋振戦、四肢端及び口吻周囲赤色分泌物、口吻周囲の泡沢、強直性痙攣、流涎、流涙、眼周囲の赤色褐色、眼破裂、被毛湿润等 雄 : 0.99 mg/L 以上で死亡例 雌 : 0.35 mg/L 以上で死亡例
		1.53	0.61	

/ : 該当なし

a : 上げ下げ法による評価 (雄 : 57 mg/kg 体重 : 3 匹、180 mg/kg 体重 : 4 匹、570 mg/kg 体重 : 2 匹、雌 : 57 mg/kg 体重 : 3 匹、180 mg/kg 体重 : 3 匹)

b : 固定用量法による評価

c : 溶媒としてコーン油が用いられた。

d : 1 時間暴露 (ミスト)

代謝物 P のラットを用いた急性経口毒性試験が実施された¹⁰。

結果は表 30 に示されている。 (参照 2、8)

表 30 急性経口毒性試験結果概要 (代謝物)

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
P ^a	SD ラット 雌雄各 10 匹	226	201	運動失調、虚脱、横臥位、間代性痙攣、振戦、自発運動低下及び流涙 雄 : 200 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 120 mg/kg 体重以上で死亡例

a : 溶媒としてコーン油が用いられた。

¹⁰ カルボスルファン農薬抄録 (参照 2、8) 等に記載されている「代謝物 B (カルボフラン)、C、D、E、F 及び G の急性経口毒性試験成績」については、カルボフラン評価書 (参照 21) に記載した。

(2) 急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 27 匹）を用いた単回強制経口（原体：0、0.5、5 及び 30 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）投与による急性神経毒性試験が実施された。各投与群 5 匹において、投与前並びに投与 4 時間後、7 日及び 15 日後に赤血球並びに脳（海馬、嗅脳、中脳、小脳、脳幹及び大脳皮質）ChE 活性が、それぞれ測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 31 に示されている。

いずれの投与群においても、脳重量及び神経病理組織学的検査に検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、5 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 0.5 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 2、4、5、8、15）

表 31 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
30 mg/kg 体重	<ul style="list-style-type: none">・腹部及び外陰部黄色汚染(投与 1～2 日後)・体重増加抑制(投与後 7 日)・振戦、歩行異常、テイルピンチ反応低下及び体温低下(投与 4 時間後)・歩行量及び自発運動量低下(投与 4 時間後)	<ul style="list-style-type: none">・腹部及び外陰部黄色汚染(投与 1～2 日後)・振戦、歩行異常及び体温低下(投与 4 時間後)・歩行量及び自発運動量低下(投与 4 時間後)
5 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none">・赤血球及び脳^aChE 活性阻害(20%以上、投与 4 時間後)	<ul style="list-style-type: none">・赤血球及び脳^bChE 活性阻害(20%以上、投与 4 時間後)
0.5 mg/kg 体重	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 中脳、小脳、脳幹及び大脳皮質については、5 mg/kg 体重以上で認められた。海馬及び嗅脳については、

5 mg/kg 体重投与群では統計学的有意差はないが、20%以上の活性阻害が認められた。

^b : 海馬、嗅脳、中脳、小脳、脳幹及び大脳皮質

(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）

白色レグホン種ニワトリ（雌、投与群 40 羽、溶媒及び陽性対照群各 10 羽）を用いた強制経口（原体：0 及び 500 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）投与による急性遅発性神経毒性試験が実施された。保護剤として硫酸アトロピンが 25 mg/kg 体重でカルボスルファン投与 15 分前に投与された。陽性対照として TOCP (750 mg/kg 体重) が単回経口投与された。

投与群において、死亡（4 例、投与後 5 日）及び摂餌量減少（投与後 15 日）が認められた。投与 7 日～21 日後における神経障害観察において神経毒性症状は認められず、神経病理組織学的検査において検体投与の影響は認められなかった。陽性対照群では、投与 13 日以降に軽度の運動失調及び運動麻痺並びに脊髄軸索膨化が認められた。

本試験において、急性遅発性神経毒性は認められなかった。（参照 2、5、8、18）

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、眼刺激性試験では、投与 1 時間後に結膜浮腫、発赤及び分泌物が認められたが、投与 3 時間後にはいずれも認められなかった。皮膚刺激性試験では、軽度の刺激性が認められた。

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Buehler 法) が実施され、軽度の皮膚感作性が認められた。(参照 2、8、15、18)

<ChE 活性阻害に関する評価について>

本剤の赤血球及び脳 ChE 活性阻害について、ChE 活性阻害の程度とコリン作動性所見の発現との相関性が不明確な場合があることを踏まえ、食品安全委員会農薬専門調査会は、ChE 活性阻害の程度及び統計学的有意差のほか、コリン作動性所見の有無及び ChE 活性測定 (試料採取) 時期を考慮して評価を行った。

10. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) ①

SD ラット (一群雌雄各 16 匹) を用いた混餌 (原体 : 0、10、20、100、500 及び 1,000 ppm : 平均検体摂取量は表 32 参照) 投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。一群雌雄各 6 匹については、投与期間終了後に 1 か月間の回復期間が設けられた。各投与群において、投与期間及び回復期間終了時¹¹に赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 32 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) ①の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	20 ppm	100 ppm	500 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.8	1.5	7.8	39.4	81.8
	雌	0.9	1.7	8.4	43.9	91.5

各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。

いずれの投与群においても、雌雄の脳 ChE 活性及び雌の赤血球 ChE 活性に検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、500 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 100 ppm (雄 : 7.8 mg/kg 体重/日、雌 : 8.4 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、8)

¹¹ 試料採取時期について詳細不明。

表 33 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見^a

投与群	雄	雌
1,000 ppm	・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上、投与 90 日)	・摂餌量減少(投与 3～21 日) [§]
500 ppm 以上	・被毛光沢欠如、立毛、粗毛及び自発運動低下(投与 7 日以降) [§] ・体重增加抑制(投与 3 日以降) ・摂餌量減少(投与 3～21 日) [§] ・Glu 及び TP 減少	・被毛光沢欠如、立毛、粗毛及び自発運動低下(投与 7 日以降) [§] ・体重增加抑制(投与 3 日以降) ・Glu 及び TP 減少
100 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

[§]：統計検定は実施されていないが、検体投与の影響と考えられた。

^a：1,000 ppm 投与群の雄及び 500 ppm 以上投与群の雌において、回復期間終了時においても体重增加抑制が認められた。その他の所見について、回復期間終了時に検体投与の影響は認められなかった。

(2) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②

SD ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌（原体：0、10、20 及び 500 ppm：平均検体摂取量は表 34）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。各投与群雌雄各 10 匹において、投与 30 日、60 日及び 90 日（いずれも午前に採血）に赤血球 ChE 活性が、試験終了時（午前に試料採取）に脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

表 34 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②の平均検体摂取量

投与群	10 ppm	20 ppm	500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.7	1.5
	雌	0.9	46.0

各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。

本試験において、500 ppm 投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 20 ppm（雄：1.5 mg/kg 体重/日、雌：1.8 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、5、8、15、18）

表 35 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
500 ppm	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、投与 90 日)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、投与 90 日)
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(3) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（主群：一群雌雄各 20 匹、投与 5 週及び 9 週と殺群：一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌（原体：0、9、20、100、500 及び 1,120 ppm：平均検体摂取量は表 36 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。主群では一群雌雄各 10 匹、中間と殺群では全動物において、試験終了時（最終投与翌日）に赤血球

及び脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

表 36 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		9 ppm	20 ppm	100 ppm	500 ppm	1,120 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.16	2.76	12.8	65.9	140
	雌	1.52	3.48	16.9	80.8	176

各投与群で認められた毒性所見は表 37 に示されている。

いずれの投与群においても、雌雄の脳 ChE 活性及び雌の赤血球 ChE 活性に検体投与の影響は認められなかった¹²。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雄及び 500 ppm 以上投与群の雌で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雄で 20 ppm (2.76 mg/kg 体重/日)、雌で 100 ppm (16.9 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 2、8）

表 37 90 日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,120 ppm	・ALP 及び Chol 増加 ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上、投与 13 週)	・Chol 及び AST 増加
500 ppm 以上	・自発運動低下及び腹臥位(試験期間中)	・自発運動低下及び腹臥位(試験期間中) ・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 0～5 週) [§] ・ALP 増加
100 ppm 以上	・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 0～5 週以降)	100 ppm 以下 毒性所見なし
20 ppm 以下	毒性所見なし	

[§]：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。

（4）6か月間亜急性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 6 匹）を用いた混餌（原体：0、50、500 及び 2,000/1,000¹³ ppm：平均検体摂取量は表 38 参照）投与による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。各投与群において、投与 1 か月、3 か月及び 6 か月¹⁴に赤血球 ChE 活性が、試験終了時¹⁵に脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

¹² カルボフラン及びカルボスルファンを用いたラットにおける ChE 活性阻害の可逆性を考慮すると、本試験における ChE 活性測定結果は、過小評価となっている可能性が考えられた。

¹³ 投与 1 日後に 2,000 ppm 投与群の雌 1 例が死亡したことから、投与 3 日以降は投与量が 1,000 ppm に変更された。

¹⁴ 採血時期について詳細不明。

¹⁵ 試料採取前の絶食期間は設定されていない。

表 38 6か月間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	500 ppm	2,000/1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.7	17.0	31.2
	雌	2.0	16.9	31.7

各投与群で認められた毒性所見は表 39 に示されている。

本試験において、500 ppm 以上投与群の雄で唾液過多及び赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）、2,000/1,000 ppm 投与群の雌で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雄で 50 ppm（1.7 mg/kg 体重/日）、雌で 500 ppm（16.9 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、5、8、15、18）

表 39 6か月間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000/1,000 ppm	・ Alb 減少 ・ 脳 ChE 活性阻害(20%以上)	・ 死亡(1例、投与 1日) ・ 体重増加抑制(投与 1週以降) ・ Glob 減少 ・ 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球：投与 3か月)
500 ppm 以上	・ 唾液過多(発現時期不明) ・ 赤血球 ChE 活性阻害(20%以上、投与 6か月 ^a)	500 ppm 以下 毒性所見なし
50 ppm	毒性所見なし	

^a: 500 ppm 投与群においては、統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。2,000/1,000 ppm 投与群では投与 1か月及び 6か月後に認められた。

（5）14週間亜急性毒性試験（イヌ）<参考資料¹⁶>

ビーグル犬（一群雌雄各 1匹）を用いた混餌又はカプセル経口投与による 14 週間亜急性毒性試験が実施された。試験期間中の投与方法及び投与量は表 40 に示されている。各投与群において、投与 4 週、8 週、11 週、12 週及び 14 週に赤血球 ChE 活性（投与 1 時間後に採血）が、試験終了時（最終投与当日）に脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

表 40 試験期間中の投与方法及び投与量

投与週 (投与方法)	投与 1～5 週 (混餌投与)	投与 7～11 週 (混餌投与)	投与 13～14 週 (カプセル経口投与)
投与群①	0 ppm	0 ppm	0 mg/kg 体重/日
投与群②	50 ppm	1,000 ppm	25 mg/kg 体重/日
投与群③	250 ppm	2,000 ppm	50 mg/kg 体重/日
投与群④	500 ppm	500 ppm	12.5 mg/kg 体重/日

注) 投与 6 週及び 12 週に検体投与は行われなかった。

¹⁶ 供試動物数が少なく、試験期間中に投与方法及び投与量が変更されていることから、参考資料とした。

混餌投与時では、1,000 及び 2,000 ppm 投与群（投与 7～11 週）に軽微な振戦が認められたが、いずれの投与群においても赤血球 ChE 活性に対する検体投与の影響は認められなかった。

カプセル経口投与時（投与 13～14 週）では、いずれの投与群においても軽微～中等度の振戦及び運動失調が認められたほか、50 mg/kg 体重/日投与群において軽微な瞳孔縮小、25 mg/kg 体重/日以上投与群において体重減少/増加抑制が認められた。また、いずれの投与群においても赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められ、50 mg/kg 体重/日投与群の雄及び 25 mg/kg 体重/日投与群の雌で脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた。（参照 2、8）

（6）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、20、1,000 及び 2,000 ppm：平均検体摂取量は表 41 参照）投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されていない。

表 41 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		20 ppm	1,000 ppm	2,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.2	64.8	131
	雌	1.4	78.9	152

各投与群で認められた毒性所見は表 42 に示されている。

神経病理組織学的検査¹⁷において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、1,000 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 20 ppm（雄：1.2 mg/kg 体重/日、雌：1.4 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、4、5、8、15）

¹⁷ 2,000 ppm 投与群で検体投与による影響が認められなかつたことから、20 及び 1,000 ppm 投与群では神経病理組織学的検査は行われていない。

表 42 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 振戦(投与 4～19 日)、眼球突出(投与 7 日及び 8 日)、脱水症状(投与 6～10 日) 及び色素性鼻漏(投与 11～15 日) 排尿量減少(投与 13 週)、着地開脚幅減少(投与 4 週、8 週及び 13 週)及び後肢握力減少(投与 8 週) 	<ul style="list-style-type: none"> 下痢(投与 2 日)、発育不全(投与 4～14 日)、眼球突出(投与 7 日以降)、脱水症状(投与 4～8 日)及び外陰部着染(投与 12～72 日) 軽度歩行障害(投与 4 週)
1,000 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 紅涙(投与 16 日)^a 及び糞便量減少(投与 3 日及び 4 日)^b 体重增加抑制(投与 1 週以降) 摂餌量減少(投与 1 週以降) 	<ul style="list-style-type: none"> 振戦(投与 6～12 日)^c、紅涙(投与 33～51 日)^d、色素性鼻漏(投与 6 日、33 日及び 34 日)^e、糞便量減少(投与 2 日、3 日及び 34 日)^f 及びケージパンの赤褐色汚染(投与 9 日)^g 体重增加抑制(投与 1 週以降) 摂餌量減少(投与後 2 週) 自発運動量減少(投与 4 週)^h
20 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 2,000 ppm 投与群では投与 44～48 日。 ^b : 2,000 ppm 投与群では投与 2～4 日。

^c : 2,000 ppm 投与群では投与 2～49 日。 ^d : 2,000 ppm 投与群では投与 5～82 日。

^e : 2,000 ppm 投与群では投与 5～29 日。 ^f : 2,000 ppm 投与群では投与 2～5 日。

^g : 2,000 ppm 投与群では投与 9 日及び 10 日。 ^h : 2,000 ppm 投与群では投与 4 週及び 13 週。

(7) 3 週間亜急性吸入毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた吸入（原体：0、0.00015、0.00065 及び 0.00534 mg/L、6 時間/日、5 日/週、全身暴露）暴露による 3 週間亜急性吸入毒性試験が実施された。各暴露群において、試験終了時（最終暴露約 3 時間後）に赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

各暴露群で認められた毒性所見は表 43 に示されている。

いずれの暴露群においても、赤血球 ChE 活性に検体投与の影響は認められなかった¹⁸。

本試験において、0.00534 mg/L 投与群の雌雄で脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 0.00065 mg/L であると考えられた。

（参照 4、5）

¹⁸ JMPR では、3 週間亜急性吸入試験（ラット）[10. (7)] 並びに 21 日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）①及び②[10. (8) 及び (9)] における ChE 活性阻害について、試料採取時の赤血球及び脳 ChE 活性阻害の回復を考慮して、過小評価となっている可能性があると評価している。

表 43 3週間亜急性吸入毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

暴露群	雄	雌
0.00534 mg/L	・線維束性収縮、活動性低下、不規則呼吸、努力呼吸、流涎、流涙、乾燥鼻汁、生殖器周辺の汚れ及び軟便 ・脳 ChE 活性阻害(20%以上)	・線維束性収縮、活動性低下、不規則呼吸、努力呼吸、流涎、流涙、乾燥鼻汁、生殖器周辺の汚れ及び軟便 ・脳 ChE 活性阻害(20%以上)
0.00065 mg/L 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(8) 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）①

NZW ウサギ（一群雌雄各 6 匹）を用いた経皮（原体 : 0、50、200 及び 800 mg/kg 体重/日、6 時間/日）投与による 21 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。各投与群において、投与 10 日及び 21 日（投与中に採血）に赤血球 ChE 活性が、試験終了時（投与終了 2 時間以内）に脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 44 に示されている。

本試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で軟便等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。（参照 4）

表 44 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）で認められた毒性所見

暴露群	雄	雌
800 mg/kg 体重/日	・死亡(1 例) ^a ・四肢緊張低下	・死亡(2 例) ^a ・四肢緊張低下及び鼻汁 ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上、投与 10 日及び 21 日)
200 mg/kg 体重/日 以上	・下痢 ・赤血球 ^b 及び脳 ^{§1} ChE 活性阻害(20%以上)	・下痢
50 mg/kg 体重/日	・軟便 ・紅斑及び浮腫	・軟便 ・紅斑及び浮腫 ・脳 ChE 活性阻害(20%以上) ^{§2}

^{§1} : 200 mg/kg 体重/日投与群では統計学的有意差は認められないが、検体投与の影響と考えられた。

^{§2} : 50 mg/kg 体重/日投与群では統計学的有意差は認められないが、検体投与の影響と考えられた。

^a : 1 例（性別不明）について、死因は気管支肺炎であると考えられた。他 2 例について、死因は明らかとならなかつた。

^b : 投与 21 日。800 mg/kg 体重/日投与群での阻害率は 16%（統計学的有意差なし）であった。

(9) 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）②

NZW ウサギ（一群雄各 6 匹）を用いた経皮（原体 : 0、5、50 及び 100 mg/kg 体重/日、6 時間/日）投与による 21 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。各投与群において、投与 10 日及び 21 日（投与中に採血）に赤血球 ChE 活性が、試験終了時（投与終了 2 時間以内）に脳 ChE 活性が、それぞれ測定された。

いずれの投与群においても、20%以上の赤血球 ChE 活性阻害は認められなかつた。

本試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群で脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、全身性の毒性に関する無毒性量は 5 mg/kg 体重/日であると考えられた。いずれの検体投与群においても、紅斑及び浮腫が認められたことから、皮膚の局所作用に対する無毒性量は 5 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。（参照 4、5）

1.1. 慢性毒性試験及び発がん性試験¹⁹

（1）2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

SD ラット [主群：一群雌雄各 60 匹、中間（投与 6 か月、12 か月及び 18 か月）と殺群：一群雌雄各 10 匹] を用いた混餌（原体：0、10、20、500 及び 2,500 ppm：平均検体摂取量は表 45 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。各投与群雌雄各 10 匹において、試験終了時に赤血球及び脳 ChE 活性が測定された²⁰。

表 45 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	20 ppm	500 ppm	2,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.5	1.0	26.8	153
	雌	0.6	1.2	34.7	213

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 46 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、500 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20% 以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 20 ppm（雄：1.0 mg/kg 体重 / 日、雌：1.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、4、5、8、15）

¹⁹ 本剤の毒性プロファイル及び感受性について、イヌ及びげっ歯類で顕著な差は認められず、ラット及びマウスを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 [11. (1) 及び (2)] の結果、ChE 活性阻害の程度に投与期間の長短の影響は認められなかった。このことから、イヌを用いた慢性毒性試験は提出されていないが、食品安全委員会農薬専門調査会は、カルボスルファンのイヌにおける慢性毒性は 6 か月間亜急性毒性試験 [10. (4)] の結果から評価可能であり、「農薬の食品健康影響評価におけるイヌを用いた 1 年間反復経口投与毒性試験の取扱いについて」（平成 29 年 12 月 21 日 農薬専門調査会決定）における、イヌ慢性毒性試験が必要であると考えられる場合には該当しないと判断した。

²⁰ 試料採取前に絶食期間は設定されていない。

表 46-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見
(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
2,500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・WBC 及び Seg 増加 ・角膜混濁[§](投与 1 週以降)、眼球白色化[§](投与 57 週以降)、呼吸困難[§](投与 76 週以降)及び振戦[§](投与 1 週以降) 	<ul style="list-style-type: none"> ・WBC 及び Seg 増加 ・網膜変性症 ・角膜混濁[§](投与 2 週以降)、眼球白色化[§](投与 8 週以降)、呼吸困難[§](投与 76 週以降)及び振戦[§](投与 1 週以降)
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、投与 6、12、18 及び 24 か月) ・虹彩組織欠損 ・限局性虹彩萎縮 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週)^a ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球：投与 6、12、18 及び 24 か月、脳^b：投与 12、18 及び 24 か月) ・虹彩組織欠損 ・限局性虹彩萎縮
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

[§] : 眼における所見は一般状態観察で認められた。いずれも統計検定は実施されていないが、検体投与の影響と考えられた。

^a : 2,500 ppm 投与群では投与後 2 週に認められた。

^b : 500 ppm 投与群の投与 6 か月では、統計学的有意差はないが、20%以上の活性阻害が認められた。

表 46-2 6か月及び 12か月と殺群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
2,500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・角膜混濁[§](投与 1 週以降)及び振戦[§](投与 1 週以降) 	<ul style="list-style-type: none"> ・角膜混濁[§](投与 2 週以降)、眼球白色化[§](投与 8 週以降)及び振戦[§](投与 1 週以降)
500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降) ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、投与 6 及び 12 か月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週)^a ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球：投与 6 及び 12 か月、脳^a：投与 12 か月)
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

[§] : 眼における所見は一般状態観察で認められた。いずれも統計検定は実施されていないが、検体投与の影響と考えられた。

^a : 2,500 ppm 投与群では投与後 2 週に認められた。

^b : 500 ppm 投与群の投与 6 か月では、統計学的有意差はないが、20%以上の活性阻害が認められた。

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）

ICR マウス [主群：一群雌雄各 70 匹、中間（投与 6 か月、12 か月及び 18 か月）と殺群：一群雌雄各 10 匹] を用いた混餌（原体：0、10、20、500 及び 2,500 ppm：平均検体摂取量は表 47 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。各投与群において、試験終了時に赤血球及び脳 ChE 活性が測定された²¹。

²¹ 試料採取前に絶食期間は設定されていない。

表 47 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	20 ppm	500 ppm	2,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.3	2.5	61.5	320
	雌	1.5	3.1	71.9	337

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 48 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、500 ppm 以上投与群で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 20 ppm（雄：2.5 mg/kg 体重/日、雌：3.1 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、4、5、8、15、19）

表 48-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）で認められた毒性所見
(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
2,500 ppm	・摂餌量減少(投与 1 週以降)	・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降)
500 ppm 以上	・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球 ^a ：投与 12 及び 18 か月、脳：投与 6、12、18 及び 24 か月)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球 ^a ：投与 12 及び 18 か月、脳：投与 6、12、18 及び 24 か月)
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 2,500 ppm 投与群では、投与 6、12、18 及び 24 か月において認められた。また、500 ppm 投与群の雄において、投与 24 か月に統計学的有意差はないが 20%以上の活性阻害が認められた。

表 48-2 6か月及び 12 か月と殺群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
2,500 ppm	・摂餌量減少(投与 1 週以降)	・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量減少(投与 1 週以降)
500 ppm 以上	・体重增加抑制(投与 1 週以降) ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球 ^a ：投与 12 か月、脳：投与 6 及び 12 か月)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上、赤血球 ^a ：投与 12 か月、脳：投与 6 及び 12 か月)
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 2,500 ppm 投与群では投与 6 及び 12 か月において認められた。

1 2. 生殖発生毒性試験²²

(1) 3世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雄 15 匹、雌 30 匹）を用いた混餌（原体：0、10、20 及び 250 ppm：平均検体摂取量は表 49 参照）投与による 3 世代繁殖試験が実施された。

²² 生殖発生毒性試験において ChE 活性は測定されていない。

表 49 3世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			10 ppm	20 ppm	250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	0.72	1.39	18.3
		雌	0.82	1.69	22.8
	F ₁ 世代	雄	0.82	1.58	22.2
		雌	0.92	1.86	27.5
	F ₂ 世代	雄	0.83	1.80	23.8
		雌	0.97	2.00	27.4

各投与群で認められた毒性所見は表 50 に示されている。

本試験において、250 ppm 投与群の親動物の雌雄及び児動物で体重増加抑制等が認められ、同投与群で産児数減少及び生後 4 日生存率低下が認められたことから、無毒性量は親動物、児動物及び繁殖能とも 20 ppm (P 雄 : 1.39 mg/kg 体重/日、P 雌 : 1.69 mg/kg 体重/日、F₁ 雄 : 1.58 mg/kg 体重/日、F₁ 雌 : 1.86 mg/kg 体重/日、F₂ 雄 : 1.80 mg/kg 体重/日、F₂ 雌 : 2.00 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参考 2、4、5、8、15）

表 50 3世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親：P、児：F _{1a} 、F _{1b}		親：F ₁ 、児：F _{2a} 、F _{2b}		親：F ₂ 、児：F _{3a} 、F _{3b}	
		雄	雌	雄	雌	雄	雌
親動物	250 ppm	・体重増加抑制 (投与 1 週) ・摂餌量減少 (投与 1 週)	・体重増加抑制 (投与 1 週) ・摂餌量減少 (投与 1 週)	・体重増加抑制	・体重増加抑制	・体重増加抑制	・体重増加抑制
	20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	250 ppm	・産児数減少 ^{§1} ・生後 4 日生存率低下 ^{§2} ・体重増加抑制 ^a		・産児数減少 ^{§1} ・生後 4 日生存率低下 ^{§3} ・体重増加抑制 ^a		・生後 4 日生存率低下 ^{§3} ・体重増加抑制 ^a	
	20 ppm 以下	毒性所見なし		毒性所見なし		毒性所見なし	

^{§1} : F₁ 及び F₂ 世代のいずれも、第 1 産児では異常は認められなかったが、第 2 産児において統計学的有意差が認められ、検体投与の影響と考えられた。

^{§2} : 第 2 産児では異常は認められなかったが、第 1 産児において統計学的有意差が認められ、検体投与の影響と考えられた。

^{§3} : F₂ 及び F₃ 世代のいずれも、第 1 及び第 2 産児について統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。

^a : 各世代において、第 1 及び第 2 産児のいずれも統計学的有意差が認められた。

（2）発生毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～19 日に強制経口（原体 : 0、2、10 及び 20 mg/kg 体重/日、溶媒 : コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

母動物では、20 mg/kg 体重/日投与群で振戦、10 mg/kg 体重/日以上投与群で体

重減少（妊娠 6～9 日）/増加抑制（妊娠 9 日以降²³）が認められ、胎児では 10 mg/kg 体重/日以上投与群で低体重が認められた。

本試験における無毒性量は、母動物及び胎児とも 2 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、4、5、8、15）

（3）発生毒性試験（ウサギ）

NZW ウサギ（一群雌 16 囗）の妊娠 6～28 日に強制経口（原体：0、2、5 及び 10 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

母動物では、10 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制（妊娠 6～12 日及び 18～24 日）が認められ、胎児ではいずれの投与群においても毒性影響は認められなかった。

本試験における無毒性量は、母動物で 5 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、4、5、8、15）

1 3. 遺伝毒性試験

カルボスルファン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験、ラットを用いた *in vivo* 染色体異常試験並びにマウスを用いた小核試験及び優性致死試験が実施された。

結果は表 51 に示されているとおり全て陰性であったことから、カルボスルファンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、4、8、15）

²³ 20 mg/kg 体重/日投与群では有意な低値が認められた。10 mg/kg 体重/日投与群においては、統計学的有意差はないが、低値傾向が認められた。

表 51 遺伝毒性試験結果概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験	<i>Bacillus subtilis</i> (H17、M45 株)	0.197~19.8 µg/ディスク 陰性
	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17、M45 株)	(ストリーク法) 0.2~2,000 µg/ディスク (胞子寒天法) 3~3,000 µg/ディスク 陰性
	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17、M45 株)	0.5~2,000 µg/ウェル(+/-S9) 陰性
	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537、TA1538 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2 <i>hcr</i> 株)	(プレート法) 10~5,000 µg/プレート(+/-S9) 陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537、TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>hcr</i> 株)	(プレート法及びプレインキュ ベーション法 ^a) 1~5,000 µg/プレート(+/-S9) 陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537、TA1538 株) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (D4 株)	(プレート法) 0.009~9.5 µg/プレート(+/-S9) 陰性
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (G-46 株)	(プレインキュベーション法) 1~5,000 µg/プレート(-S9) 陰性
	遺伝子突然変異試験 (マウスリンゴーマ TK 試験)	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y <i>TK^{+/+}</i>)	0.0024~0.032 µg/mL(-S9) 0.0055~0.074 µg/mL(+S9) 陰性
宿主 経由	復帰突然変異試験	ICR マウス (一群雄 6 匹) <i>S. typhimurium</i> (G-46 株)	75 及び 150 mg/kg 体重/日 (24 時間間隔で 2 回経口投与) 陰性
<i>in vivo</i>	染色体異常試験	SD ラット(骨髄細胞) (一群雄 10 匹)	①5、12 及び 30 mg/kg 体重 (単回経口投与、投与 6 時間、 12 時間及び 48 時間後に標本 作製) ②5、12 及び 30 mg/kg 体重/日 (5 日間反復経口投与、最終投 与 6 時間後に標本作製) 陰性
	小核試験	ICR マウス(骨髄細胞) (一群雄 5 匹)	40、75 及び 150 mg/kg 体重/日 (24 時間間隔で 2 回経口投与、 最終投与 6 時間後に標本作製) 陰性
	優性致死試験	マウス(系統不明)	7、20 及び 60 mg/kg 体重/日 (5 日間反復経口投与) 陰性

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

^a : プレインキュベーション法については、TA98 及び TA100 株のみ。

代謝物 P (動物、植物、土壤及び水系由来) の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された²⁴。

結果は表 52 に示されているとおり、いずれも陰性であった。 (参照 2、8)

表 52 遺伝毒性試験結果概要 (代謝物)

被験物質	試験		対象	処理濃度・投与量	結果
P	<i>in vitro</i> 復帰突然変異試験		<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100 株)	31.3～2,500 µg/プレート (+/-S9)	陰性
			<i>S. typhimurium</i> (G-46 株)	1～5,000 µg/プレート (-S9)	陰性
	宿主 経由	復帰突然変異試験	ICR マウス (一群雄 6 匹) <i>S. typhimurium</i> (G-46 株)	62.5、125 及び 250 mg/kg 体重/日 (24 時間間隔で 2 回経口投与)	陰性

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

²⁴ カルボスルファン農薬抄録 (参照 2、8) 等に記載されている「代謝物 B (カルボフラン)、C 及び E の遺伝毒性試験成績」については、カルボフラン評価書 (参照 21) に記載した。

III. 食品健康影響評価

参考に挙げた資料を用いて、農薬「カルボスルファン」の食品健康影響評価を実施した。

¹⁴C で標識したカルボスルファンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与後 96 時間及び 168 時間の吸収率は、少なくとも 64.4% 及び 74.0% と算出された。排泄は比較的速やかであり、投与後 48 時間で 80.2%TAR 以上が尿、糞及び呼気中に排泄され、[phe-¹⁴C] 及び [dib-¹⁴C] カルボスルファン投与群では主に尿中に、[car-¹⁴C] カルボスルファン投与群では主に尿及び呼気 (¹⁴CO₂) 中に排泄された。残留放射能濃度は、血液、肝臓、腎臓、肺、心臓及び脾臓で比較的高く認められた。尿中では未変化のカルボスルファンは認められず、主要代謝物として C、E、F 及び G (いずれもグルクロン酸又は硫酸抱合体を含む)、P、W 等が認められた。糞中の主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、代謝物 B (カルボフラン)、C、K、P、R 等が認められた。

¹⁴C で標識したカルボスルファンの畜産動物 (ヤギ及びニワトリ) を用いた体内運命試験の結果、ヤギの肝臓及び腎臓並びにニワトリの脂肪で未変化のカルボスルファンが僅かに認められたほか、主要代謝物としてヤギでは代謝物 C、F 及び G (いずれも抱合体を含む) 並びに X、Z2 及び Z3、ニワトリでは C、F 及び P が、それぞれ 10%TRR を超えて認められた。

¹⁴C で標識したカルボスルファンを用いた植物体内運命試験の結果、可食部及び家畜の飼料となりうる部位における主要成分として、未変化のカルボスルファンのほか、B、C、E、F 及び G (いずれも抱合体を含む) 並びに P 及び T が 10%TRR を超えて認められた。

カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物とした作物残留試験の結果、カルボスルファン及び代謝物 D は、いずれの試料においても定量限界未満であった。代謝物 B 及び C の最大残留値は、いずれも稻わらにおける 0.03 及び 0.46 mg/kg であり、可食部においては、代謝物 B はいずれの試料においても定量限界未満、代謝物 C の最大残留値はさとうきび (茎部) における 0.021 mg/kg であった。カルボスルファン並びに代謝物 B 及び C の含量の最大残留値は、稻わらにおける 0.47 mg/kg であり、可食部においては、さとうきび (茎部) における 0.033 mg/kg であった。

カルボスルファン並びに代謝物 B、C、D、E、F、G 及び P を分析対象化合物としたウシを用いた畜産物残留試験の結果、カルボスルファンの最大残留値は 0.076 µg/g (脂肪)、代謝物 C、E、F、G 及び P の最大残留値は 0.133、0.400、0.173、0.074 及び 0.890 µg/g (いずれも腎臓) であった。代謝物 B 及び D はいずれの試料においても定量限界未満であった。カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物としたニワトリを用いた畜産物残留試験の結果、カルボスルファン並びに代謝物 B、C 及び D はいずれの試料においても検出限界未満であった。

カルボスルファン及び代謝物 B の魚介類における最大推定残留値は 0.0284 及び 0.00262 mg/kg であった。カルボスルファン及び代謝物 B (カルボスルファン換算値)

の含量の魚介類における最大推定残留値は 0.0329 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、カルボスルファン投与による影響は、主に赤血球及び脳 ChE 活性阻害、体重（増加抑制）並びに眼（虹彩萎縮、網膜変性等：ラット）に認められた。発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

ラットを用いた 3 世代繁殖試験において、産児数減少及び生後 4 日生存率低下が認められた。

植物体内運命試験及び畜産動物を用いた体内運命試験の結果、10%TRR を超える代謝物として、植物では B、C、E、F 及び G（いずれも抱合体を含む）並びに P 及び T、動物では C、F 及び G（いずれも抱合体を含む）並びに P、X、Z2 及び Z3 が認められた。

代謝物 B、C、E、F、G 及び P はラットにおいても認められ、代謝物 T、X、Z2 及び Z3 はラットで認められていない。代謝物 B の毒性は親化合物より強く（参照 21）、代謝物 C について急性経口毒性は親化合物より強く（LD₅₀ : 8.3~21.9 mg/kg 体重、参考 21）、カーバメート構造を有することから ChE 活性阻害作用があると考えられた。また、作物残留試験における代謝物 B 及び C の残留値は親化合物より高く認められる場合があった。代謝物 E、F 及び G の急性経口毒性は親化合物に比べて弱く（LD₅₀ : いずれも 800 mg/kg 体重超、参考 21）、代謝物 T はてんさい（根）でのみ認められ、植物体内運命試験における残留量は僅か（0.05 mg/kg）であった。代謝物 X、Z2 及び Z3 は代謝物 P の酸化等により生ずる代謝物であり、代謝物 P の急性経口毒性は親化合物と同程度であったが、ウシを用いた畜産物残留試験の結果から、代謝物 P は自然界中にも存在する化合物であると考えられた。以上のことから、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をカルボスルファン並びに代謝物 B（カルボフラン）及び C（いずれも抱合体を含む）、魚介類中の暴露評価対象物質をカルボスルファン及び代謝物 B（カルボフラン）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 53、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等は表 54 に示されている。

本剤はカーバメート系化合物であり、毒性試験の結果から動物種を問わず ChE 活性阻害が認められた。カーバメート系化合物の ChE 活性阻害作用は比較的短時間での可逆性を有すること、また、動物体内運命試験の結果から、排泄は速やかで体内への蓄積性は認められなかつたことを踏まえ、食品を通じた長期間の暴露による食品健康影響に当たっては、ChE 活性を一時的に阻害する単回暴露の反復により評価することは可能であると考えられ、食品安全委員会農薬専門調査会は、単回経口投与による試験結果を食品健康影響評価に用いることは妥当であると判断した。

各試験で得られた無毒性量又は最小毒性量のうち最小値は、単回経口投与により実施されたラットを用いた急性神経毒性試験の無毒性量 0.5 mg/kg 体重であった。ChE 活性阻害の程度に投与期間の長短の影響は認められなかつたことから、短期試験であることによる追加の安全係数は不要と考えられた。

以上のことから、食品安全委員会農薬専門調査会は、ラットを用いた急性神経毒性

試験の無毒性量 0.5 mg/kg 体重を根拠として、安全係数 100 で除した 0.005 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と、0.005 mg/kg 体重を急性参考用量（ARfD）と設定した。

カルボスルファン

ADI	0.005 mg/kg 体重/日
ARfD	0.005 mg/kg 体重
(ADI 及び ARfD 設定根拠資料)	急性神経毒性試験
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	0.5 mg/kg 体重
(安全係数)	100

また、カルボスルファンより最小の毒性量が低い代謝物 B（カルボフラン）については、ラットを用いた ChE 活性阻害試験の総合評価における最小毒性量 0.03 mg/kg 体重を根拠として、安全係数 200（種差：10、個体差：10、最小毒性量を用いたことによる追加係数：2）で除した 0.00015 mg/kg 体重/日及び 0.00015 mg/kg 体重を ADI 及び ARfD と設定している（参照 21）。

代謝物 B（カルボフラン）

ADI	0.00015 mg/kg 体重/日
ARfD	0.00015 mg/kg 体重
(ADI 及び ARfD 設定根拠資料)	ChE 活性阻害試験の総合評価
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(最小毒性量)	0.03 mg/kg 体重
(安全係数)	200(種差：10、個体差：10、追加の安全係数：2)

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

<参考>

<JMPR>

カルボスルファン（2003年）

ADI	0.01 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

※眼の病理組織学的変化について、ChE 活性阻害によるものと断定できなかったことから、安全係数は 100 とされた。

ARfD	0.02 mg/kg 体重
(ADI 設定根拠資料)	急性神経毒性試験
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	0.5 mg/kg 体重
(安全係数)	25

※カルボスルファン投与による毒性影響は C_{max} に依存すると考えられたことから、種差及び個体差に対する安全係数（種差；トキシコキネティクス：4、トキシコダイナミクス：2.5、個体差：トキシコキネティクス及びトキシコダイナミクスとも 3.16）のうち、トキシコキネティクスに係る係数をそれぞれ 1/2 に減じて、安全係数は 25 とされた。

代謝物 B（カルボフラン）（2008年）

ADI 及び ARfD	0.001 mg/kg 体重/日
(ADI 及び ARfD 設定根拠資料)	ChE 活性阻害の用量反応検討試験の総合評価
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	0.03 mg/kg 体重
(安全係数)	25

<EFSA>

カルボスルファン（2009年）

ADI 及び ARfD	0.005 mg/kg 体重/日
(設定根拠資料)	急性神経毒性試験
(動物種)	ラット

(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	0.5 mg/kg 体重
(安全係数)	100

※脳 AChE 活性阻害は、カルボスルファン投与による最も感受性の高いエンドポイントであると判断され、ラットを用いた急性神経毒性試験が ADI 及び ARfD 設定根拠資料とされた。

代謝物 B (カルボフラン) (2009 年)

ADI 及び ARfD	0.00015 mg/kg 体重/日
(ADI 及び ARfD 設定根拠資料)	ChE 活性阻害の用量反応検討試験④
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(最小毒性量)	0.03 mg/kg 体重
(安全係数)	200(種差 : 10、個体差 : 10、追加の安全係数 : 2)

(参照 : 4、5、15、21)

表 53 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾			
			JMPR	EFSA	食品安全委員会 農薬専門調査会	参考 (農薬抄録)
ラット	急性神経毒性試験	0、0.5、5、30	0.5 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	0.5 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	雌雄：0.5 雌雄：赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	雌雄：0.5 雌雄：赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)
	90 日間 亜急性 毒性試験 ①	0、10、20、100、 500、1,000 ppm 雄：0、0.8、1.5、7.8、 39.4、81.8 雌：0、0.9、1.7、8.4、 43.9、91.5			雄：7.8 雌：8.4 雌雄：体重增加抑制等	雄：7.8 雌：8.4 雌雄：体重增加抑制等
	90 日間 亜急性 毒性試験 ②	0、10、20、500 ppm 雄：0、0.7、1.5、38.0 雌：0、0.9、1.8、46.0	1(20 ppm) 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	2(20 ppm) 死亡並びに赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	雄：1.5 雌：1.8 雌雄：赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)等	雄：1.5 雌：1.8 雌雄：赤血球及び脳 ChE 活性阻害等
	90 日間 亜急性 神経毒性 試験	0、20、1,000、2,000 ppm 雄：0、1.2、64.8、 131 雌：0、1.4、78.9、 152	1.2 臨床症状(FOB)、体重増加抑制及び摂餌量減少	1.2 神経毒性に係る臨床症状、体重増加抑制及び摂餌量減少	雄：1.2 雌：1.4 雌雄：体重增加抑制等	雄：1.2 雌：1.4 雌雄：体重增加抑制、摂餌量減少及び自発運動量減少
	2 年間 慢性毒性/ 発がん性併合試験	0、10、20、500、 2,500 ppm 雄：0、0.5、1.0、26.8、 153 雌：0、0.6、1.2、34.7、 213	1 眼の病理組織学的変化、臨床症状、赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) (発がん性は認められない)	1 限局性虹彩萎縮、網膜変性症、並びに赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) (発がん性は認められない)	雄：1.0 雌：1.2 雌雄：赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)等 (発がん性は認められない)	雄：1.0 雌：1.2 雌雄：体重增加抑制、血漿及び赤血球 ChE 活性阻害 (発がん性は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾			
			JMPR	EFSA	食品安全委員会 農薬専門調査会	参考 (農薬抄録)
ラット	3 世代繁殖試験	0、10、20、250 ppm P 雄 : 0、0.72、1.39、18.3 P 雌 : 0、0.82、1.69、22.8 F ₁ 雄 : 0、0.82、1.58、22.2 F ₁ 雌 : 0、0.92、1.86、27.5 F ₂ 雄 : 0、0.83、1.80、23.8 F ₂ 雌 : 0、0.97、2.00、27.4	親動物及び児動物 : 1.3(20 ppm) 繁殖能 : 16.7 (250 ppm) 親動物 : 体重増加抑制 児動物 : 低体重、体重増加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物、児動物及び繁殖能 : 1.2(20 ppm) 母動物 : 体重増加抑制及び摂餌量減少 児動物 : 産児数減少、生存率低下、低体重及び体重増加抑制 親動物及び児動物 : 体重増加抑制等 繁殖能 : 産児数減少及び生後 4 日生存率低下	親動物、児動物及び繁殖能 P 雄 : 1.39 P 雌 : 1.69 F ₁ 雄 : 1.58 F ₁ 雌 : 1.86 F ₂ 雄 : 1.80 F ₂ 雌 : 2.00	雄 : 1.39~1.80 雌 : 1.69~2.00 親動物及び児動物 : 体重増加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)
		0、2、10、20	母動物 : 2 胎児 : 2 母動物 : 一般状態の変化及び体重増加抑制 胎児 : 低体重 (催奇形性は認められない)	母動物 : 2 胎児 : 2 母動物 : 体重増加抑制 胎児 : 不完全骨化	母動物 : 2 胎児 : 2 母動物 : 体重増加抑制 胎児 : 低体重 (催奇形性は認められない)	母動物 : 2 胎児 : 2 母動物 : 体重増加抑制等 胎児 : 低体重 (催奇形性は認められない)
マウス	90 日間 亜急性 毒性試験	0、9、20、100、500、1,120 ppm 雄 : 0、1.16、2.76、12.8、65.9、140 雌 : 0、1.52、3.48、16.9、80.8、176			雄 : 2.76 雌 : 16.9 雌雄 : 体重増加抑制等	雄 : 2.76 雌 : 3.48 雌雄 : 体重増加抑制等
		0、10、20、500、2,500 ppm 雄 : 0、1.3、2.5、61.5、320 雌 : 0、1.5、3.1、71.9、337	2.5 体重増加抑制、赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)、脾絶対及び比重量減少 (発がん性は認められない)	2.5 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) (発がん性は認められない)	雄 : 2.5 雌 : 3.1 雌雄 : 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)等 (発がん性は認められない)	雄 : 2.5 雌 : 3.1 雌雄 : 赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (発がん性は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾			
			JMPR	EFSA	食品安全委員会 農薬専門調査会	参考 (農薬抄録)
ウサギ	発生毒性試験	0、2、5、10	母動物：10 胎児：10 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：5 胎児：10 母動物：体重増加抑制及び死亡 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：5 胎児：10 母動物：体重増加抑制 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：5 胎児：10 母動物：体重増加抑制 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
イヌ	6か月間 亜急性 毒性試験	0、50、500、1,000 ppm 雄：0、1.7、17.0、 31.2 雌：0、2.0、16.9、 31.7	1.3(50 ppm) 血液生化学的パラメータの変化、摂餌量減少及び体重増加抑制	1.6(50 ppm) 赤血球パラメータの変化及び脾相対重量減少	雄：1.7 雌：16.9 雄：唾液過多及び赤血球 ChE 活性阻害(20%以上) 雌：赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)等	雄：1.7 雌：2.0 雌雄：血漿 ChE 活性阻害等
ADI			NOAEL：1 SF：100 ADI：0.01	NOAEL：0.5 SF：100 ADI：0.005	NOAEL：0.5 SF：100 ADI：0.005	NOAEL：0.5 SF：100 ADI：0.005
ADI 設定根拠資料			ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験	ラット急性神経毒性試験	ラット急性神経毒性試験	ラット急性神経毒性試験

ADI：許容一日摂取量、NOAEL：無毒性量、SF：安全係数

／：該当なし

¹⁾：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。

表 54 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重)	無毒性量及び急性参考用量設定に関する エンドポイント ¹⁾ (mg/kg 体重)
ラット	急性毒性試験	雄: 57、180、570 雌: 57、180	雌雄: — 雄: 粪量減少、立毛 雌: 粪量減少、自発運動低下、振戦等
	急性毒性試験	雌雄: 64、73、92、 110、129、156、 184	雌雄: — 雌雄: 自発運動低下、振戦、流涎等
	急性毒性試験	雌雄: 68.8、103、 154、231、348、 520	雌雄: — 雌雄: 立毛、流涙、流涎、振戦、縮瞳等
	急性神経毒性試験	雌雄: 0、0.5、5、 30	雌雄: 0.5 雌雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)
マウス	急性毒性試験	雌雄: 120、144、 173、207、249、 299	雌雄: — 雌雄: 自発運動低下、振戦、流涙等
	急性毒性試験	雌雄: 50.0、65.8、 87.1、115、152、 200	雌雄: — 雌雄: 下痢、振戦、流涙等
ARfD		NOAEL: 0.5 SF: 100 ARfD: 0.005	
ARfD 設定根拠資料		ラット急性神経毒性試験	

ARfD: 急性参考用量、NOAEL: 無毒性量、SF: 安全係数

—: 無毒性量は設定できなかった。

¹⁾: 最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙1：代謝物/分解物略称>

記号	名称(略称)	化学名
B	カルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl carbamate
C	3-ヒドロキシ-カルボフラン	2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl carbamate
D	3-ケト-カルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-yl carbamate
E	7-フェノール	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol
F	3-ヒドロキシ-7-フェノール	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-3,7-diol
G	3-ケト-7-フェノール	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-ol
H	Nヒドロキシメチルカルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl hydroxymethylcarbamate
I	3-ヒドロキシ-Nヒドロキシメチルカルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl-hydroxymethylcarbamate
J	3-ケト-Nヒドロキシメチルカルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-yl hydroxymethylcarbamate
K	カルボスルファン-スルfonyl	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminosulfonyl)methylcarbamate
L	デスマチル-カルボフラン	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl carbamate
M	3-ケト-カルボスルファン	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate
N	3-ヒドロキシ-カルボスルファン	2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate
O	3-ケト-カルボスルファン-スルfonyl	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-yl (dibutylaminosulfonyl)methylcarbamate
P	ジブチルアミン(DBA)	dibutylamine
Q	ジスルフィド体	di(2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy)carbonyl(methyl)amino)disulfide
R	ジブチルメチルアミノスルホニルアミン	dibutyl((methylamino)sulfonyl)amine
S	3-ケト-デスマチル-カルボフラン	2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran-7-yl carbamate
T	Nホルミルジブチルアミン	N-formyl-N,N-dibutylamine
U	N-アセチルジブチルアミン	N-acetyl-N,N-dibutylamine
V	5-ヒドロキシ-カルボフラン	2,3-dihydro-5-hydroxy-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl carbamate
W	ヒドロキシジブチルアミン誘導体(OH-DBA)	4-(n-butylamino)-1-butanol
X	4-(nブチル)アミノブタン酸(COOH-DBA)	4-(nbutyl)-aminobutanoic acid
Y	フェノール抱合体	—
Z1	nブチルアミン	n-butylamine
Z2	4-アミノ-1-ブタノール	4-amino-1-butanol
Z3	1-アミノ-2-ブタノール	1-amino-2-butanol

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
AChE	アセチルコリンエステラーゼ
ai	有効成分量 (active ingredient)
Alb	アルブミン
ALP	アルカリホスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
BCF	生物濃縮係数
ChE	コリンエステラーゼ
Chol	コレステロール
EFSA	欧州食品安全機関
Glob	グロブリン
Glu	グルコース (血糖)
JMPR	FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
PEC	環境中予測濃度
Seg	分葉核好中球数
TAR	総投与 (処理) 放射能
TOCP	リン酸トリ- σ -クレジル
TP	総蛋白質
TRR	総残留放射能
WBC	白血球数

<別紙3：作物残留試験成績>

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D		合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		
公的分析機関														
水稻 (露地) (玄米) 1980年	2	5 g ai/ 育苗箱 G	1	125	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.046	<0.027
		育苗箱 G	1	147	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.046	<0.027
		10 g ai/ 育苗箱 G	1	125 ^a	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.046	<0.027
		育苗箱 G	1	147	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.046	<0.027
	2	社内分析機関												
		5 g ai/ 育苗箱 G	1	125	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
		育苗箱 G	1	147	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
		10 g ai/ 育苗箱 G	1	125 ^a	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
水稻 (露地) (稻わら) 1980年	2	公的分析機関												
		5 g ai/ 育苗箱 G	1	125	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	0.11	0.10	斜線	斜線	0.13	0.08
		育苗箱 G	1	147	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.32	0.29	斜線	斜線	0.32	0.19
		10 g ai/ 育苗箱 G	1	125 ^a	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	0.19	0.19	斜線	斜線	0.22	0.13
	2	社内分析機関												
		5 g ai/ 育苗箱 G	1	125	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	0.05	0.03	斜線	斜線	0.06	<0.03
		育苗箱 G	1	147	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.46	0.43	斜線	斜線	0.47	0.27
		10 g ai/ 育苗箱 G	1	125 ^a	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	0.16	0.14	斜線	斜線	0.17	0.10
		育苗箱 G	1	147	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	斜線	斜線	<0.05	<0.03

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
水稻 (露地) (玄米) 1988年	3	2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	111	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	123	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		3 g ai/ 育苗箱 G a	1	132	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	111	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	123	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
水稻 (露地) (稻わら) 1988年	3	公的分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	111	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.024	0.024	<0.005	<0.005	0.038	0.022		
			1	123	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.022	0.022	<0.005	<0.005	0.036	0.021		
		3 g ai/ 育苗箱 G a	1	111	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.035	0.035	<0.005	<0.005	0.049	0.028		
			1	132	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.019	<0.005	<0.005	0.033	0.019		
		社内分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	111	<0.01	<0.01	<0.017	<0.017	0.048	0.032	<0.01	<0.01	0.059	0.034		
			1	123	<0.01	<0.01	<0.017	<0.017	0.016	0.016	<0.01	<0.01	0.043	0.025		
水稻 (露地) (玄米) 1999年	2	公的分析機関														
		2 g ai/ 育苗箱 MC	1	122	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
			1	123	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
		2 g ai/ 育苗箱 MC	1	122	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
			1	123	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
水稻 (露地) (稻わら) 1999年	2	公的分析機関														
		2 g ai/ 育苗箱 MC	1	122	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	/\	/\	<0.10	<0.06	
			1	123	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	/\	/\	<0.10	<0.06	
		社内分析機関														
		2 g ai/ 育苗箱 MC	1	122	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	/\	/\	<0.10	<0.06	
			1	123	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	/\	/\	<0.10	<0.06	
	4	公的分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	107	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	128	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
		3.5 g ai/ 育苗箱 G	1	133	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	130	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	113	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	134	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
		社内分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 G	1	107	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	128	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
		3.5 g ai/ 育苗箱 G	1	133	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	130	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	113	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	
			1	134	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	/\	/\	/\	<0.0022	<0.0013	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
水稻 (露地) (稻わら) 2009年	2	公的分析機関														
		2.1 g ai/ 育苗箱 ^G	1	107	<0.0005	<00005	0.0014	0.0014	0.0501	0.0482	斜線	斜線	0.0501	0.0292		
			1	128	<0.0005	<00005	0.0010	0.0010	0.0296	0.0291	斜線	斜線	0.0306	0.0179		
	4	3.5 g ai/ 育苗箱 ^G	1	133	<0.0005	<00005	<0.0009	<0.0009	0.0115	0.0112	斜線	斜線	0.0126	0.0073		
			1	130	<0.0005	<00005	0.0015	0.0015	0.0245	0.0240	斜線	斜線	0.0260	0.0152		
			1	113	<0.0005	<00005	0.0103	0.0101	0.0110	0.0106	斜線	斜線	0.0212	0.0676		
			1	134	<0.0005	<00005	<0.0009	<0.0009	0.0178	0.0176	斜線	斜線	0.0190	0.0110		
水稻 (露地) (玄米) 2015年	2	社内分析機関														
		3.5 g ai/ 育苗箱 ^G	1	115	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	斜線	斜線	<0.0022	<0.0013		
			1	121	<0.0005	<0.0005	<0.0009	<0.0009	<0.0008	<0.0008	斜線	斜線	<0.0022	<0.0013		
水稻 (露地) (稻わら) 2015年	2	社内分析機関														
		3.5 g ai/ 育苗箱 ^G	1	115	<0.0005	<0.0005	0.0012	0.0012	0.0294	0.0289	斜線	斜線	0.0306	0.0178		
			1	121	<0.0005	<0.0005	0.0022	0.0021	0.0083	0.0082	斜線	斜線	0.0108	0.0062		
ばれいしょ ^S (露地) (塊茎) 1991年	2	公的分析機関														
		1,800 ^G	1	92	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	91	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			2	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			2	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
		1,800 ^G	1	92	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	91	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			2	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			2	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
かんしょ [§] (露地) (塊根) 1982年	2	3,000 ^G	1	106	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.077	0.075	斜線	斜線	0.089	0.052		
		4,500 ^G	1	106	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.179	0.176	斜線	斜線	0.190	0.110		
		3,000 ^G	1	104	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.054	0.054	斜線	斜線	0.068	0.039		
		4,500 ^G	1	104	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.067	0.067	斜線	斜線	0.081	0.047		
		4,500 ^G	2	60	0.007	0.006	0.026	0.024	0.597	0.595	斜線	斜線	0.625	0.363		
		+3,000 ^G	2	60	0.007	0.007	0.014	0.014	0.166	0.162	斜線	斜線	0.183	0.106		
		社内分析機関														
		1,800 ^G	1	106	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.178	0.150	斜線	斜線	0.164	0.095		
		2,700 ^G	1	106	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.302	0.272	斜線	斜線	0.286	0.166		
		1,800 ^G	1	104	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.009	0.072	斜線	斜線	0.086	0.050		
かんしょ [§] (露地) (塊根) 1989年	2	2,700 ^G	1	104	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.072	0.061	斜線	斜線	0.075	0.044		
		4,500 ^G	2	60	0.005	0.005	0.026	0.024	0.539	0.522	斜線	斜線	0.551	0.320		
		+3,000 ^G	2	60	0.005	0.005	0.009	0.009	0.155	0.150	斜線	斜線	0.164	0.095		
		公的分析機関														
		2,700 ^G	1	149	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	124	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
かんしょ [§] (露地) (塊根) 1992年	2	社内分析機関														
		2,700 ^G	1	149	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	124	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.011	0.010	<0.005	<0.005	0.024	0.014		
			公的分析機関													
			2	45	0.007	0.006	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.023	0.013		
			3	45	0.014	0.014	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.031	0.018		
			3	45	0.021	0.020	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.037	0.021		
			4	45	0.023	0.020	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.037	0.021		
			2	45	0.005	0.005	<0.009	<0.009	0.038	0.037	<0.005	<0.005	0.051	0.030		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
					3	45	0.005	0.005	<0.009	<0.009	0.040	0.038	<0.005	<0.005	0.052	0.030
					3	45	0.049	0.048	<0.009	<0.009	0.027	0.026	<0.005	<0.005	0.083	0.048
					4	45	0.006	0.006	<0.009	<0.009	0.026	0.024	<0.005	<0.005	0.039	0.023
社内分析機関																
さとうきび (露地) (茎部) 1981年	2	2,700 G	2	45	0.014	0.013	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.030	0.017		
			3	45	0.029	0.028	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.045	0.026		
			3	45	0.022	0.020	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.037	0.021		
			4	45	0.058	0.056	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.073	0.042		
			2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.019	<0.005	<0.005	0.033	0.019		
			3	45	0.007	0.007	<0.009	<0.009	0.032	0.032	<0.005	<0.005	0.048	0.028		
			3	45	0.015	0.014	<0.009	<0.009	0.013	0.013	<0.005	<0.005	0.036	0.021		
			4	45	0.029	0.028	<0.009	<0.009	0.042	0.040	<0.005	<0.005	0.077	0.045		
公的分析機関																
さとうきび (露地) (茎部) 1981年	2	4,500 G	1	306	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	/ /		0.022	0.013		
			2	254	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.019	0.016	/ /		0.030	0.017		
			3 ^a	223	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.024	0.022	/ /		0.036	0.021		
			1	336	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	/ /		0.022	0.013		
			2	277	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	/ /		0.022	0.013		
			3 ^a	218	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	/ /		0.022	0.013		
社内分析機関																
さとうきび (露地) (茎部) 1981年	2	4,500 G	1	306	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013		
			2	254	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.019	/ /		0.033	0.019		
			3 ^a	223	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.024	0.021	/ /		0.035	0.020		
			1	336	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013		
			2	277	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013		
			3 ^a	218	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D							
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
さとうきび (露地) (茎部) 1988年	2	公的分析機関																
		2,700 ^G	1	216	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	258	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		社内分析機関																
		2,700 ^G	1	216	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	258	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		公的分析機関																
		4,500 ^G + 1,280 ^G	2	110	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
			2	140	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
			2	170	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
			2	101	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
			2	131	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
			2	150	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/ /		<0.05	<0.03				
だいこん ^S (露地) (根) 1982年	2	公的分析機関																
		1,500 ^G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.016	<0.016	/ /		<0.030	<0.017				
			1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.016	<0.016	/ /		<0.030	<0.017				
			1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.016	<0.016	/ /		<0.030	<0.017				
			1	82	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.016	<0.016	/ /		<0.030	<0.017				
		社内分析機関																
		1,500 ^G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013				
			1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013				
			1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013				
			1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/ /		<0.022	<0.013				

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
だいこん [§] (露地) (葉) 1982年	2	1,500 G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.016	<0.016	斜線	斜線	<0.030	<0.017		
		3,000 G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.016	0.016	斜線	斜線	0.030	0.017		
		1,500 G	1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.096	0.096	斜線	斜線	0.110	0.064		
		3,000 G	1	82	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.384	0.368	斜線	斜線	0.387	0.224		
	2	社内分析機関														
		1,500 G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		3,000 G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		1,500 G	1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.085	0.083	斜線	斜線	0.097	0.056		
		3,000 G	1	82	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.250	0.238	斜線	斜線	0.252	0.146		
だいこん [§] (露地) (根) 1988年	2	公的分析機関														
		1,500 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		3,000 G	1	53	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.027	0.016		
		1,500 G	1	60	<0.005	<0.005	0.014	0.014	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.027	0.016		
	2	社内分析機関														
		1,500 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		3,000 G	1	53	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.023	0.013		
		1,500 G	1	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
だいこん [§] (露地) (葉) 1988年	2	公的分析機関														
		1,500 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.080	0.078	<0.005	<0.005	0.092	0.053		
		3,000 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.222	0.218	<0.005	<0.005	0.232	0.135		
		1,500 G	1	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.568	0.541	<0.005	<0.005	0.555	0.322		
		3,000 G	1	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.219	0.211	<0.005	<0.005	0.225	0.131		
社内分析機関																

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)				
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D									
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値						
					1,500 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.064	0.061	<0.005	<0.005	0.075	0.044			
だいこん [§] (露地) (根) 1988年	2	1,800 G	1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013	合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)				
					0.095	0.094	0.019	0.017	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.119	0.069						
			1	55	<0.005	<0.005	0.019	0.017	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
					<0.005	<0.005	0.019	0.017	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.030	0.017						
だいこん [§] (露地) (葉) 1988年	2	1,800 G	公的分析機関																	
			1	53	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.088	0.082	<0.005	<0.005	0.096	0.056	合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)				
					<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.144	0.138	<0.005	<0.005	0.152	0.088						
			1	55	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.237	0.230	<0.005	<0.005	0.244	0.142						
					<0.005	<0.005	0.027	0.026	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.040	0.0						
だいこん [§] (露地) (根) 1990年度	3	公的分析機関																		
		1,800 G	1	64	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013	合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)				
					<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
			1	43	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
		1,800 G	社内分析機関																	
			1	64	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
					<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
			1	43	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						
			1	62	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013						

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D							
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																		
だいこん [§] (露地) (葉) 1990 年度	3	1,800 G	1	64	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	43	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	62	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.013	0.013	<0.005	<0.005	0.027	0.016				
	1,800 G	社内分析機関																
		1	64	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013					
		1	43	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013					
		1	62	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.011	0.010	<0.005	<0.005	0.024	0.014					
公的分析機関																		
はくさい [§] (露地) (茎葉) 1991 年度	2	0.06gai/株 G	1	63	0.005	0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013				
			1	63	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	60	<0.005	<0.005	0.045	0.045	0.024	0.024	<0.005	<0.005	0.074	0.043				
			1	60	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.027	0.016				
	0.06gai/株 G	社内分析機関																
		1	63	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013					
		1	63	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013					
		1	60	<0.005	<0.005	0.022	0.022	0.056	0.051	<0.005	<0.005	0.078	0.045					
		1	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013					
公的分析機関																		
キャベツ [§] (露地) (茎葉) 1988 年度	2	1,800 G	1	57	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.018	0.016	<0.005	<0.005	0.030	0.017				
			1	60	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.037	0.035	<0.005	<0.005	0.049	0.0284				
	1,800 G	社内分析機関																
		1	57	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013					
		1	60	<0.005	<0.005	0.010	0.010	0.016	0.016	<0.005	<0.005	0.031	0.018					

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D							
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																		
キャベツ [§] (露地) (茎葉) 1990 年度	2	0.06gai/株 ^G	2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	45	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.146	0.142	<0.005	<0.005	0.161	0.093				
			2	60	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.078	0.077	<0.005	<0.005	0.096	0.056				
	2	0.06gai/株 ^G	社内分析機関															
			2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	45	<0.005	<0.005	0.034	0.031	0.155	0.149	<0.005	<0.005	0.185	0.107				
キャベツ [§] (露地) (葉球) 1991 年	2	0.06gai/株 ^G 植穴又は株元 +葉面散布	公的分析機関															
			2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	45	0.020	0.017	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.034	<0.020				
	2	0.06gai/株 ^G 植穴又は株元 +葉面散布	社内分析機関															
			2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	60	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			2	45	0.144	0.138	0.012	0.012	0.010	0.010	<0.005	<0.005	0.160	0.093				
キャベツ [§] (露地) (葉球) 1999 年	2	公的分析機関																
		400 MC ×2 0.06gai/株 ^G ×2	4	3	0.671	0.668	0.141	0.141	0.144	0.141			0.950	0.551				
			4	7	0.119	0.118	0.043	0.041	0.075	0.074			0.233	0.135				
			4	14	0.023	0.022	0.015	0.015	0.045	0.045			0.082	0.048				
			4	3	0.453	0.440	0.041	0.041	0.261	0.250			0.731	0.424				
			4	7	0.209	0.208	0.024	0.024	0.187	0.182			0.414	0.240				

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
					4	14	0.062	0.058	0.009	0.009	0.072	0.070	/			
社内分析機関																
ブロッコリー [§] (露地) (花蕾・茎) 1992年	2	0.06gai/株 ^G	400 MC ×2	4	3	0.081	0.076	0.055	0.055	0.045	0.042	/	/	0.173	0.100	
				4	7	0.018	0.017	0.024	0.022	0.011	0.011	/	/	0.050	0.029	
				4	14	0.005	0.005	0.012	0.012	0.024	0.022	/	/	0.039	0.023	
				4	3	0.005	0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/	/	0.022	0.013	
				4	7	0.014	0.012	0.009	0.009	<0.008	<0.008	/	/	0.029	0.017	
				4	14	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.011	0.011	/	/	0.025	0.015	
公的分析機関																
たまねぎ [§] (露地) (鱗茎) 2004年	2	0.06gai/株 ^G		1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013	
				1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013	
				1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013	
				1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013	
社内分析機関																
たまねぎ [§] (露地) (鱗茎) 2004年	2	300 MC		1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013	
				2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03	
				2	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03	
				2	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03	
				2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03	
				2	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03	
社内分析機関																

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D		合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		
					2	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.05
ねぎ [§] (根深ねぎ) (露地) (茎葉) 1983年	2	200 MC	2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
		300 MC	2	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05	<0.03
			2	14	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
ねぎ [§] (根深ねぎ) (露地) (茎葉) 1989年度	2	3,000 G	3	195	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
			2	146	<0.005	<0.005	0.069	0.065	0.040	0.035	斜線	斜線	0.105	0.061
			3	74	<0.005	<0.005	0.062	0.058	0.050	0.050	斜線	斜線	0.113	0.066
			3	195	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
		3,000 G×2 1,500G×1	3	74	<0.005	<0.005	0.079	0.076	0.054	0.051	斜線	斜線	0.132	0.077
			2	211	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
			3	195	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
			2	146	<0.005	<0.005	0.052	0.050	0.013	0.013	斜線	斜線	0.068	0.039
			3	74	<0.005	<0.005	0.079	0.079	0.019	0.019	斜線	斜線	0.103	0.060
			3	195	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013
		3,000 G×2 1,500G×1	3	74	<0.005	<0.005	0.127	0.120	0.034	0.032	斜線	斜線	0.157	0.091
			2	14	0.007	0.006	0.031	0.031	0.013	0.011	<0.005	<0.005	0.048	0.028
			2	30	<0.005	<0.005	0.069	0.069	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.082	0.048
			2	45	<0.005	<0.005	0.034	0.034	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.047	0.027
		1,800 G	3	14	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013
			3	30	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
					3	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005		
ねぎ [§] (根深ねぎ) (露地) (茎葉) 2000 年	2	1,800 G	2	14	<0.005	<0.005	0.547	0.544	0.386	0.371	0.089	0.077	0.920	0.534		
			2	30	<0.005	<0.005	0.669	0.664	0.568	0.565	0.092	0.092	1.23	0.716		
			2	45	<0.005	<0.005	0.212	0.206	0.242	0.240	0.027	0.026	0.451	0.262		
			3	14	0.013	0.013	0.850	0.838	0.411	0.403	0.098	0.092	1.25	0.727		
			3	30	<0.005	<0.005	0.671	0.660	0.421	0.403	0.059	0.056	1.07	0.619		
			3	45	<0.005	<0.005	0.525	0.506	0.454	0.429	0.050	0.046	0.940	0.545		
			社内分析機関													
		1,800 G	2	14	0.012	0.012	0.052	0.052	0.011	0.010	<0.005	<0.005	0.074	0.043		
			2	30	<0.005	<0.005	0.065	0.064	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.077	0.045		
			2	45	<0.005	<0.005	0.005	0.048	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.061	0.035		
			3	14	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013		
			3	30	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013		
			3	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.022	0.013		
			2	14	<0.005	<0.005	0.487	0.485	0.269	0.267	0.060	0.060	0.757	0.439		
			2	30	<0.005	<0.005	0.406	0.404	0.418	0.410	0.052	0.051	0.819	0.475		
			2	45	<0.005	<0.005	0.155	0.151	0.139	0.138	0.025	0.024	0.294	0.171		
			3	14	<0.005	<0.005	0.406	0.378	0.414	0.400	0.065	0.065	0.783	0.454		
			3	30	<0.005	<0.005	0.258	0.255	0.237	0.230	0.049	0.048	0.490	0.284		
			3	45	<0.005	<0.005	0.224	0.224	0.221	0.218	0.041	0.040	0.447	0.259		
ねぎ [§] (根深ねぎ) (露地) (茎葉) 2000 年	2	社内分析機関														
		1,800 G + 500 MC	2	14	0.008	0.008	0.021	0.021	0.016	0.016	/ /		0.045	0.026		
			2	30	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	/ /		0.022	0.013		
			2	45	<0.005	<0.005	0.012	0.012	0.008	0.008	/ /		0.025	0.015		
			2	14	0.011	0.010	0.038	0.038	0.008	0.008	/ /		0.056	0.032		
			2	30	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	/ /		0.022	0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
					2	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008				
ねぎ [§] (葉ねぎ) (露地) (茎葉) 1992年	2	社内分析機関														
		1,800 ^G	2	30	0.005	0.005	0.372	0.370	0.498	0.496	0.055	0.054	0.871	0.505		
			2	45	<0.005	<0.005	0.182	0.181	0.222	0.221	0.018	0.018	0.407	0.236		
			2	60	<0.005	<0.005	0.096	0.096	0.269	0.256	0.010	0.010	0.357	0.207		
			2	30	<0.005	<0.005	0.392	0.392	0.133	0.131	0.032	0.032	0.528	0.306		
			2	45	<0.005	<0.005	0.244	0.243	0.194	0.184	0.007	0.007	0.432	0.251		
			2	60	<0.005	<0.005	0.127	0.126	0.027	0.026	0.005	0.005	0.157	0.091		
ねぎ [§] (葉ねぎ) (露地) (茎葉) 2000年	2	公的分析機関														
		1,800 ^G + 500 ^{MC}	2	14	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
			2	30	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.019	/		0.033	0.019		
			2	45	<0.005	<0.005	0.014	0.014	<0.008	<0.008	/		0.027	0.016		
			2	14	0.037	0.036	0.040	0.038	<0.008	<0.008	/		0.082	0.048		
			2	30	0.008	0.008	0.024	0.024	0.016	0.016	/		0.048	0.028		
			2	45	0.094	0.092	0.015	0.014	0.019	0.019	/		0.125	0.078		
		社内分析機関														
		1,800 ^G + 500 ^{MC}	2	14	0.005	0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	/		0.022	0.013		
			2	30	<0.005	<0.005	0.009	0.009	<0.008	<0.008	/		0.022	0.013		
			2	45	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.008	<0.008	/		0.023	0.013		
			2	14	0.033	0.032	0.034	0.034	0.011	0.010	/		0.076	0.044		
			2	30	0.007	0.007	0.055	0.052	0.016	0.016	/		0.075	0.044		
			2	45	0.019	0.018	0.036	0.034	0.021	0.021	/		0.073	0.042		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
ピーマン (施設) (果実) 1982年	2	0.1gai/株 ^G	1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		0.1gai/株 ^G	1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
		0.1gai/株 ^G	1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
			1	68	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
			1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
	2	0.05gai/株 ^G	1	61	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
			1	68	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
			1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
		0.1gai/株 ^G	1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
			1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	斜線	斜線	<0.022	<0.013		
ピーマン (施設) (果実) 1989年	2	公的分析機関														
		0.09gai/株 ^G	1	50	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	33	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
		0.09gai/株 ^G	1	50	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	33	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
なす ^s (施設) (果実) 1988年	2	社内分析機関														
		0.1gai/株 ^G	1	49	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		0.03gai/株 ^G	1	49	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		0.1gai/株 ^G	1	51	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		0.03gai/株 ^G	1	51	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
なす [§] (施設) (果実) 1990 年	2	0.09gai/株 ^G	1	42	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
社内分析機関																
なす [§] (施設) (果実) 1990 年	2	0.09gai/株 ^G	1	42	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
公的分析機関																
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	56	<0.005	<0.005	0.071	0.071	0.008	0.008			0.084	0.049		
			1	56	<0.005	<0.005	0.062	0.062	0.008	0.008			0.075	0.044		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	40	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
			1	40	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			0.092	<0.013		
社内分析機関																
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	56	<0.005	<0.005	0.076	0.076	<0.008	<0.008			0.089	0.052		
			1	63	<0.005	<0.005	0.079	0.079	<0.008	<0.008			0.092	0.053		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	70	<0.005	<0.005	0.058	0.055	<0.008	<0.008			0.068	0.039		
			1	56	<0.005	<0.005	0.058	0.057	<0.008	<0.008			0.070	0.041		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.05gai/株 ^G	1	63	<0.005	<0.005	0.062	0.058	<0.008	<0.008			0.071	0.041		
			1	70	<0.005	<0.005	0.053	0.052	<0.008	<0.008			0.065	0.038		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	40	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
			1	47	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.1gai/株 ^G	1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
			1	40	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
きゅうり [§] (施設) (果実) 1982 年	2	0.05gai/株 ^G	1	47	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		
			1	54	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008			<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
きゅうり [§] (施設) (果実) 1984、1985 年	2	20,000 ^G	1	41	<0.005	<0.005	0.222	0.213	0.026	0.026	<0.005	<0.005	0.244	0.142		
			1	58	<0.005	<0.005	0.131	0.124	0.032	0.032	0.024	0.024	0.161	0.093		
		15,000 ^G	1	41	<0.005	<0.005	0.224	0.217	0.013	0.011	<0.005	<0.005	0.233	0.135		
			1	59	<0.005	<0.005	0.148	0.141	0.040	0.038	0.029	0.028	0.184	0.107		
	2	社内分析機関														
		20,000 ^G	1	41	<0.005	<0.005	0.236	0.224	0.018	0.016	<0.005	<0.005	0.245	0.142		
			1	58	<0.005	<0.005	0.157	0.155	0.034	0.032	0.022	0.019	0.192	0.111		
		15,000 ^G	1	41	<0.005	<0.005	0.229	0.220	0.016	0.013	<0.005	<0.005	0.238	0.138		
			1	59	<0.005	<0.005	0.143	0.141	0.024	0.024	0.020	0.018	0.170	0.099		
公的分析機関																
きゅうり [§] (施設) (果実) 1988年	2	0.06gai/株 ^G	1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	35	<0.005	<0.005	0.189	0.187	0.045	0.042	0.023	0.022	0.234	0.136		
		社内分析機関														
		0.06gai/株 ^G	1	37	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	35	<0.005	<0.005	0.237	0.224	0.027	0.027	0.010	0.010	0.256	0.148		
公的分析機関																
すいか [§] (施設) (果肉) 1981、1982年	2	0.1gai/株 ^G	1	66	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	66	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.1gai/株 ^G	1	89	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	89	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
	2	社内分析機関														
		0.1gai/株 ^G	1	66	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	66	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.1gai/株 ^G	1	89	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		
		0.05gai/株 ^G	1	89	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	/		<0.022	<0.013		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D							
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																		
すいか [§] (施設) (果肉) 1992年	2	0.06gai/株 ^G	1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
	2	0.06gai/株 ^G	社内分析機関															
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
			1	65	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
メロン [§] (施設) (果肉) 1988年	2	社内分析機関																
		0.03gai/鉢 ^G	1	87	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		0.1gai/株 ^G	1	87	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.013	0.013	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		0.03gai/鉢 ^G	1	75	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
	2	0.1gai/株 ^G	1	74	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		公的分析機関																
		0.06gai/株 ^G	1	78	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		0.06gai/株 ^G	1	84	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.051	0.048	<0.005	<0.005	0.062	0.036				
メロン [§] (施設) (果肉) 1989年	2	0.09gai/株 ^G	1	78	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.018	<0.005	<0.005	0.032	0.019				
		0.09gai/株 ^G	1	84	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.074	0.069	<0.005	<0.005	0.083	0.048				
		社内分析機関																
		0.06gai/株 ^G	1	78	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
	2	0.06gai/株 ^G	1	84	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.021	0.019	<0.005	<0.005	0.033	0.019				
		0.09gai/株 ^G	1	78	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013				
		0.09gai/株 ^G	1	84	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	0.088	0.086	<0.005	<0.005	0.100	0.058				

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
メロン [§] (施設) (果肉) 1992 年	2	社内分析機関														
		0.06gai/株 ^G	1	71	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	71	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	71	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	71	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
とうがん [§] (露地) (果実) 1984 年	2	公的分析機関														
		0.1gai/穴 ^G	1	68	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			1	75	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			1	82	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			1	80	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			1	87	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			1	94	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
		0.1gai/穴 ^G + 3,000 ^G	2	35	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			2	42	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			2	49	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			2	46	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			2	53	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			2	60	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
		0.1gai/穴 ^G + 3,000 ^G × 2	3	7	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			3	14	<0.008	<0.008	0.072	0.065	<0.032	<0.032	斜線	斜線	0.105	0.061		
			3	21	<0.008	<0.008	0.019	0.017	<0.032	<0.032	斜線	斜線	0.057	0.033		
			3	19	<0.008	<0.008	0.022	0.021	<0.032	<0.032	斜線	斜線	0.061	0.035		
			3	26	<0.008	<0.008	<0.014	<0.014	<0.032	<0.032	斜線	斜線	<0.054	<0.031		
			3	33	<0.008	<0.008	0.019	0.017	<0.032	<0.032	斜線	斜線	0.057	0.033		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
公的分析機関																
とうがん [§] (露地) (果実) 1992年	2	0.06gai/株 ^G	1	81	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
社内分析機関																
いちご [§] (施設) (果実) 1982年	2	0.06gai/株 ^G	1	81	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	45	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
公的分析機関																
いちご [§] (施設) (果実) 1982年	2	10,000 ^G	1	181	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.022		<0.013			
			1	145	<0.005	<0.005	0.162	0.158	0.141	0.139	0.302		0.175			
			2	145	<0.005	<0.005	0.170	0.162	0.162	0.160	0.327		0.190			
			1	243-253	<0.005	<0.005	<0.034	<0.034	0.021	0.019	0.058		0.034			
			1	185-195	<0.005	<0.005	0.206	0.206	0.549	0.522	0.733		0.425			
			2	185-195	<0.005	<0.005	0.327	0.310	0.682	0.630	0.945		0.548			
社内分析機関																
いちご [§] (施設) (果実) 1982年	2	10,000 ^G	1	181	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.022		<0.013			
			1	243-253	<0.005	<0.005	<0.034	<0.034	<0.008	<0.008	<0.047		<0.027			
			10,000 ^G	1	181	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.022		<0.013		
				1	145	<0.005	<0.005	0.175	0.172	0.077	0.067	0.244		0.142		
				2	145	<0.005	<0.005	0.139	0.138	0.086	0.077	0.220		0.128		
				1	243-253	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.011	0.010	0.024		0.014		
				1	185-195	<0.005	<0.005	0.255	0.248	0.318	0.286	0.539		0.313		
				2	185-195	<0.005	<0.005	0.399	0.396	0.390	0.352	0.753		0.437		
社内分析機関																
いちご [§] (施設) (果実) 1982年	2	10,000 ^G + 10,000 ^{EC}	1	181	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.022		<0.013			
			1	243-253	<0.005	<0.005	<0.034	<0.034	<0.008	<0.008	<0.022		<0.013			

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								合量値 (代謝物 D を 除く)	代謝物 B 換算合量値 (代謝物 D を 除く)		
					カルボスルファン		代謝物 B ¹⁾		代謝物 C ¹⁾		代謝物 D					
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値				
いちご [§] (施設) (果実) 1984年	1	公的分析機関														
		10,000 G	2	178	<0.005	<0.005	0.100	0.100	0.064	0.062	<0.005	<0.005	0.167	0.097		
		社内分析機関														
いちご [§] (施設) (果実) 1988年	2	公的分析機関														
		6,000 G	1	124	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	93	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		社内分析機関														
いちご [§] (施設) (果実) 1991年	2	6,000 G	1	124	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
			1	93	<0.005	<0.005	<0.009	<0.009	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	<0.022	<0.013		
		公的分析機関														
		9,000 G	1	98	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.026	0.026	<0.005	<0.005	0.045	0.026		
			1	83	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.023	0.013		
		社内分析機関														
		9,000 G	1	98	<0.005	<0.005	0.017	0.017	0.026	0.026	<0.005	<0.005	0.048	0.028		
			1	83	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.008	<0.008	<0.005	<0.005	0.023	0.013		

注) ・全てのデータが定量限界又は検出限界未満の場合は、定量限界又は検出限界値の平均に<を付して記載した。

・農薬の使用量、使用回数又は使用時期が登録された使用方法から逸脱している場合は、該当箇所に^aを付した。

・適用作物が登録された使用方法から逸脱している場合は、該当箇所に[§]を付した。

G : 粒剤、MC : マイクロカプセル剤、EC : 乳剤

¹⁾ : 代謝物 B 及び C の残留値は、カルボスルファン換算値（換算係数は；代謝物 B : 1.72、代謝物 C : 1.60）。

<別紙4：畜産物残留試験成績（ウシ）>

乳汁及び組織中のカルボスルファン残留値 ($\mu\text{g/g}$)

試料	採取時期	1 mg/kg 飼料	3 mg/kg 飼料	10 mg/kg 飼料	50 mg/kg 飼料
乳汁	0	NA	NA	ND	ND
	1	NA	NA	ND	ND
	2	NA	NA	ND	ND
	4	NA	NA	ND	ND
	7	ND	ND	ND	ND (0.005)
	14	NA	NA	ND	0.007 (0.012)
	21	NA	NA	ND	0.006 (0.011)
	27	NA	NA	ND	ND (0.005)
	30 ^a	NA	NA	ND	ND
	33 ^b	NA	NA	NA	ND
スキムミルク	21	NA	NA	ND	ND
ミルククリーム	21	NA	NA	ND	0.028 (0.045)
腎臓	と殺時	NA	NA	ND	ND
	休薬3日	NA	NA	ND	ND
	休薬6日	NA	NA	NA	ND
肝臓	と殺時	NA	NA	ND	ND
	休薬3日	NA	NA	ND	ND
	休薬6日	NA	NA	NA	ND
筋肉	と殺時	NA	NA	ND	ND
	休薬3日	NA	NA	ND	ND
	休薬6日	NA	NA	NA	ND
脂肪	と殺時	NA	NA	ND	ND
	休薬3日	NA	NA	ND	ND
	休薬6日	NA	NA	NA	ND

注) ・数値は平均値。下段()内の数値は個体別最大値。

・定量限界は、いずれの試料についても $0.025 \mu\text{g/g}$ 。

ND : 検出限界 (乳汁 : $0.005 \mu\text{g/g}$ 、組織及びクリーム : $0.010 \mu\text{g/g}$) 未満

NA : 分析されず又は試料なし

^a : 10 及び 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 3 日の 1 頭の値

^b : 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 6 日の 1 頭の値

乳汁及び組織中のカーバメート代謝物 (B、C 及び D) 残留値 ($\mu\text{g/g}$)

投与群		1 mg/kg 飼料	3 mg/kg 飼料	10 mg/kg 飼料			50 mg/kg 飼料		
試料	採取時期	カーバメート	カーバメート	B	C	D	B	C	D
乳汁	経過日数	0	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND
		1	NA	NA	ND	ND	ND	0.022	ND
		2	NA	NA	ND	ND	ND	0.030	ND
		4	NA	NA	ND	0.007	ND	0.006	0.021
		7	ND ^c	ND ^c	ND	ND	ND	0.008	0.024
		14	NA	NA	ND	ND	ND	0.020	0.011
		21	NA	NA	ND	ND	ND	0.017	ND
		27	NA	NA	ND	ND	ND	0.013	ND
		30 ^a	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND
		33 ^b	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND
スキム ミルク	21	NA	NA	ND	ND	ND	0.020	ND	
ミルク クリーム	21	NA	NA	ND	ND	ND	0.016	ND	ND
腎臓	と殺時	NA	NA	ND	ND	ND	ND	0.133	ND
	休薬 3 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
肝臓	と殺時	NA	NA	ND	ND	ND	ND	0.060	0.023
	休薬 3 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
	休薬 6 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
筋肉	と殺時	NA	NA	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
	休薬 3 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
脂肪	と殺時	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 3 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注) ・数値は個体別最大値。

・代謝物 B の値は、カルボフラン当量に換算したカルボスルファン残留値を除した補正值。

・定量限界は、乳汁 : 0.025 $\mu\text{g/g}$ 、組織及びクリーム : 0.050 $\mu\text{g/g}$ 。

ND : 検出限界 (乳汁 : 0.005 $\mu\text{g/g}$ 、組織及びクリーム : 0.010 $\mu\text{g/g}$) 未満

NA : 分析されず又は試料なし

a : 10 及び 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 3 日の 1 頭の値

b : 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 6 日の 1 頭の値

c : 代謝物 B、C 及び D とも検出限界未満であった。

乳汁及び組織中のフェノール代謝物（E、F 及び G）残留値（ $\mu\text{g/g}$ ）

投与群		1 mg/kg 飼料			3 mg/kg 飼料			10 mg/kg 飼料			50 mg/kg 飼料		
試料	採取時期	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
乳汁	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.006	0.015	0.038
	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.005	0.026	0.042
	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.005	0.016	0.026
	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.025	
	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.008	0.013	0.042
	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.007	0.013	0.027
	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.007	0.011	0.032
	30 ^a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	33 ^b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND
スキム ミルク	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.008	0.014	0.039
ミルク クリーム	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	0.020	ND	0.017
腎臓	と殺時	ND	ND	ND	0.035	ND	ND	0.057	0.012	ND	0.400	0.173	0.074
	休薬 3 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	0.012	ND	ND
肝臓	と殺時	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	0.034	ND
	休薬 3 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
	休薬 6 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND
筋肉	と殺時	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	0.012	ND
	休薬 3 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND
脂肪	と殺時	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	0.014	0.011
	休薬 3 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	休薬 6 日	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND

注) ・数値は個体別最大値。

・定量限界は、乳汁： 0.025 $\mu\text{g/g}$ 、組織及びクリーム： 0.050 $\mu\text{g/g}$ 。

ND：検出限界（乳汁： 0.005 $\mu\text{g/g}$ 、組織及びクリーム： 0.010 $\mu\text{g/g}$ ）未満

NA：分析されず

^a : 10 及び 50 mg/kg 飼料投与群の休薬期間 3 日の 1 頭の値

^b : 50 mg/kg 飼料投与群の休薬期間 6 日の 1 頭の値

乳汁及び組織中の代謝物P 残留値 (μg/g)

試料	採取時期	対照群	1 mg/kg 飼料	3 mg/kg 飼料	10 mg/kg 飼料	50 mg/kg 飼料
乳汁	経過日数	0	0.010 (0.020)	NA	NA	0.021 (0.028) ND (0.009)
		1	0.024 (0.032)	NA	NA	0.037 (0.045) 0.029 (0.036)
		2	0.009 (0.012)	NA	NA	0.016 (0.023) 0.057 (0.079)
		4	0.028 (0.050)	NA	NA	0.030 (0.032) 0.011 (0.020)
		7	0.009 (0.018)	0.017 (0.023)	0.021 (0.025)	0.007 (0.010) 0.077 (0.119)
		14	0.017 (0.034)	NA	NA	0.009 (0.012) 0.073 (0.105)
		21	NA	NA	NA	NA
		27	0.025 (0.037)	NA	NA	0.042 (0.054) 0.060 (0.071)
		30 ^a	NA	NA	NA	NA (0.007) 0.017 (0.025)
		33 ^b	NA	NA	NA	NA (0.015)
腎臓	と殺時	0.017 (0.034)	0.011 (0.023)	ND	0.079 (0.106)	0.590 (0.890)
	休薬3日	NA	NA	NA	0.022	0.026
	休薬6日	NA	NA	NA	NA	0.022
肝臓	と殺時	0.022 (0.048)	ND	ND	0.042 (0.045)	0.222 (0.294)
	休薬3日	NA	NA	NA	0.029	0.036
	休薬6日	NA	NA	NA	NA	0.024
筋肉	と殺時	0.025 (0.031)	0.027 (0.047)	0.034 (0.048)	0.042 (0.070)	0.048 (0.058)
	休薬3日	NA	NA	NA	0.025	0.023
	休薬6日	NA	NA	NA	NA	0.019
脂肪	と殺時	0.017 (0.027)	NA	NA	0.015 (0.016)	0.036 (0.047)
	休薬3日	NA	NA	NA	ND	0.015
	休薬6日	NA	NA	NA	NA	ND

注) 数値は平均値。下段()内の数値は個体別最大値。

ND : 検出限界 (乳汁 : 0.005 μg/g、その他 : 0.0010 μg/g) 未満

NA : 分析されず又は試料なし

^a : 10 及び 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 3 日の 1 頭の値

^b : 50 mg/kg 飼料投与群における休薬期間 6 日の 1 頭の値

<参考>

1. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付、厚生労働省告示第 499 号）
2. 農薬抄録 カルボスルファン（殺虫剤）（平成 22 年 8 月 31 日改訂）：エフエムシー・ケミカルズ株式会社、未公表
3. カルボスルファンの魚介類における最大推定残留値に係る資料
4. JMPR①：“Carbosulfan”, Pesticide residues in food-2003 evaluation. Part II. Toxicological. nos. 1010 on INCHEM (2003)
5. EFSA : Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbosulfan. EFSA Journal 2009; 7 (10) : 1354 (2009)
6. 食品健康影響評価について(平成 23 年 2 月 8 日付け厚生労働省発食安 0208 第 6 号)
7. カルボフラン（カルボスルファンの代謝物）の追加資料要求事項に対する回答書：エフエムシー・ケミカルズ株式会社、未公表
8. 農薬抄録 カルボスルファン（殺虫剤）（平成 30 年 4 月 18 日改訂）：エフエムシー・ケミカルズ株式会社、一部公表
9. Nature of the Residue in Livestock: Metabolism of Carbosulfan in Lactating Goats (GLP) : FMC Corporation (米国)、1996 年、未公表
10. ADC Project. No.592 ¹⁴C-FMC 35001 Poultry Metabolism study : Analytical Development Corporation (米国)、1981 年、未公表
11. Metabolism of [¹⁴C]Carbofuran in Laying Hens (GLP) : XenoBiotic Laboratories, Inc. (米国)、1994 年、未公表
12. Magnitude of the Residue of Carbosulfan and its Major Metabolites in Meat, Meat By-Products and Milk Following Oral Administration to Cows (GLP) : FMC Corporation (米国)、1995 年、未公表
13. Determination of Carbosulfan and Its Cholinesterase-Inhibiting Metabolites in Eggs From a Poultry and Egg Residue Study With Carbosulfan Technical and Dibutylamine Technical in White Leghorn Chickens : FMC Corporation (米国)、1983 年、未公表
14. Determination of Carbosulfan and Its Cholinesterase-Inhibiting Metabolites in tissues From a Poultry and Egg Residue Study With Carbosulfan Technical and Dibutylamine Technical in White Leghorn Chickens : FMC Corporation (米国)、1983 年、未公表
15. JMPR② : Pesticide Residues in Food - 2003, Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues (2003)
16. JMPR③：“Carbosulfan”, Pesticide residues in food-1997 evaluations. Part I. Residues.203-249 (1997)
17. JMPR④：“Carbosulfan”, Pesticide residues in food-2003 evaluations. Part I.

Residues.133-167 (2003)

18. JMPR⑤：“Carbosulfan”, Pesticide residues in food-1984 evaluation. Part II. Toxicological. nos. 693 on INCHEM (1984)
19. JMPR⑥：“Carbosulfan”, Pesticide residues in food-1986 evaluation. Part II. Toxicological. nos. 736 on INCHEM (1986)
20. 食品健康影響評価に係る提出資料について（令和元年8月14日）：エフエムシーケミカルズ株式会社、未公表
21. 農薬評価書（案）カルボフラン（2019年12月）：第768回食品安全委員会資料、公表