

(案)

農薬・動物用医薬品評価書

フェニトロチオン

2013年10月

食品安全委員会農薬専門調査会
食品安全委員会動物用医薬品専門調査会

目 次

	頁
○審議の経緯.....	4
○食品安全委員会委員名簿.....	5
○食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	5
○食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員名簿.....	8
○要 約.....	9
 I. 評価対象農薬・動物用医薬品の概要.....	10
1. 用途.....	10
2. 有効成分の一般名.....	10
3. 化学名.....	10
4. 分子式.....	10
5. 分子量.....	10
6. 構造式.....	10
7. 開発の経緯.....	10
 II. 安全性に係る試験の概要.....	11
1. 動物体体内運命試験.....	11
(1) ラット	11
(2) その他の動物	15
2. 植物体体内運命試験.....	19
(1) 水稻	19
(2) トマト	20
(3) ぶどう	21
3. 土壤中運命試験.....	22
(1) 土壤中運命試験	22
(2) 土壤表面における光分解	24
(3) 土壤吸脱着試験	25
4. 水中運命試験.....	25
(1) 加水分解試験①	25
(2) 加水分解試験②	25
(3) 水中光分解試験①	26
(4) 水中光分解試験②	27
5. 土壤残留試験.....	28
6. 作物等残留試験.....	29
(1) 作物残留試験	29
(2) 乳汁移行試験	29

(3) 畜産物残留試験	29
(4) 魚介類における最大推定残留量	33
(5) 推定摂取量	34
7. 一般薬理試験	34
8. 急性毒性試験	38
(1) 急性毒性試験	38
(2) 急性神経毒性試験（ラット）	40
(3) 急性遅発性神経毒性試験（鶏）①	41
(4) 急性遅発性神経毒性試験（鶏）②	41
9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚・吸入に対する感作性試験	42
(1) 眼・皮膚に対する刺激性試験（ウサギ）及び皮膚感作性試験（モルモット）	42
(2) 吸入による感作性試験（モルモット）	42
10. 亜急性毒性試験	42
(1) 6か月間亜急性毒性試験（ラット）	42
(2) 30日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料>	43
(3) 90日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料>	43
(4) 6か月間亜急性毒性試験（ウサギ）	44
(5) 22又は23日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）	44
(6) 28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）	44
(7) 28日間亜急性吸入毒性試験（マウス）	45
(8) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）	45
(9) 28日間亜急性遅発性神経毒性試験（鶏）	46
(10) 6か月間亜急性毒性試験（代謝物B、ラット）	46
(11) 6か月間亜急性毒性試験（代謝物G、ラット）	47
11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	47
(1) 92週間慢性毒性試験（ラット）<参考資料>	47
(2) 2年間慢性毒性試験（イヌ）	47
(3) 1年間慢性毒性試験（イヌ）①	48
(4) 1年間慢性毒性試験（イヌ）②<参考資料>	49
(5) 2年間慢性毒性試験（サル）	49
(6) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	49
(7) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）	50
(8) 18か月間発がん性試験（マウス）	51
12. 生殖発生毒性試験	52
(1) 2世代繁殖試験（ラット）	52
(2) 1世代繁殖試験（ラット）	53
(3) 3世代繁殖試験（ラット）<参考資料>	53
(4) 発生毒性試験（ラット）①	54

（5）発生毒性試験（ラット）②	55
（6）発生毒性試験（マウス）<参考資料>	55
（7）発生毒性試験（ウサギ）①	55
（8）発生毒性試験（ウサギ）②<参考資料>	55
13. 遺伝毒性試験	56
14. その他の試験	59
（1）急性眼毒性試験（ラット）	59
（2）90日間亜急性眼毒性試験（ラット）	59
（3）亜急性暴露試験（ヒト）	60
（4）酵素に対する影響①	60
（5）酵素に対する影響②	60
III. 食品健康影響評価	61
・別紙1：代謝物/分解物略称	69
・別紙2：検査値等略称	71
・別紙3：作物残留試験成績	72
・別紙4：推定摂取量	96
・参照	98

＜審議の経緯＞

－清涼飲料水関連－

- 1961年 12月 26日 初回農薬登録
- 2003年 7月 1日 厚生労働大臣から清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第 0701015号）
- 2003年 7月 3日 関係書類の接受（参照 1）
- 2003年 7月 18日 第3回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2003年 10月 8日 追加資料受理（参照 2）
(フェニトロチオンを含む要請対象 93 農薬を特定)
- 2003年 10月 27日 第1回農薬専門調査会
- 2004年 1月 28日 第6回農薬専門調査会
- 2005年 1月 12日 第22回農薬専門調査会
- 2013年 4月 9日 厚生労働大臣から清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について取り下げ（厚生労働省発食安 0409 第1号）、関係書類の接受（参照 86）
- 2013年 4月 15日 第471回食品安全委員会（取り下げについて説明）

－魚介類及び飼料中の残留基準設定及びポジティブリスト制度関連－

- 2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照 3）
- 2009年 10月 2日 農林水産省から厚生労働省へ基準値設定依頼（魚介類）
- 2009年 10月 16日 関係書類の接受（参照 4）
- 2010年 9月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0924 第5号）
- 2010年 9月 27日 関係書類の接受（参照 5～78）
- 2010年 9月 30日 第349回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2011年 11月 4日 第12回農薬専門調査会評価第四部会
- 2012年 2月 22日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0222 第1号）
- 2012年 2月 24日 関係書類の接受（参照 79～81、89～92）
- 2012年 3月 1日 第421回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2012年 3月 22日 農林水産大臣から飼料中の残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（23 消安第 6357 号）
- 2012年 3月 26日 関係書類の接受（参照 82～85）
- 2012年 3月 29日 第425回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2013年 5月 15日 追加資料受理（参照 87、88）
- 2013年 6月 13日 第27回農薬専門調査会評価第四部会
- 2013年 7月 25日 第95回農薬専門調査会幹事会

2013年 9月 4日 第156回動物用医薬品専門調査会

2013年 10月 21日 第491回食品安全委員会（報告）

＜食品安全委員会委員名簿＞

(2006年6月30日まで)	(2006年12月20日まで)	(2009年6月30日まで)
寺田雅昭（委員長）	寺田雅昭（委員長）	見上彪（委員長）
寺尾允男（委員長代理）	見上彪（委員長代理）	小泉直子（委員長代理*）
小泉直子	小泉直子	長尾拓
坂本元子	長尾拓	野村一正
中村靖彦	野村一正	畠江敬子
本間清一	畠江敬子	廣瀬雅雄**
見上彪	本間清一	本間清一

* : 2007年2月1日から

** : 2007年4月1日から

(2011年1月6日まで)

小泉直子（委員長）
見上彪（委員長代理*）
長尾拓
野村一正
畠江敬子
廣瀬雅雄
村田容常

* : 2009年7月9日から

(2012年6月30日まで)

小泉直子（委員長）
熊谷進（委員長代理*）
長尾拓
野村一正
畠江敬子
廣瀬雅雄
村田容常

* : 2011年1月13日から

(2012年7月1日から)

熊谷進（委員長）
佐藤洋（委員長代理）
山添康（委員長代理）
三森国敏（委員長代理）
石井克枝
上安平冽子
村田容常

＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞

(2006年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）
廣瀬雅雄（座長代理）
石井康雄
江馬眞
太田敏博

小澤正吾
高木篤也
武田明治
津田修治*
津田洋幸

出川雅邦
長尾哲二
林真
平塚明
吉田緑

* : 2005年10月1日から

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）
廣瀬雅雄（座長代理）
赤池昭紀
石井康雄
泉啓介

三枝順三
佐々木有
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人

根岸友恵
林真
平塚明
藤本成明
細川正清

上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 真	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤省吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	西川秋佳**
林 真 (座長代理*)	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友恵
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 慶介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司
江馬 真	津田洋幸	柳井徳磨
大澤貫寿	出川雅邦	山崎浩史
太田敏博	長尾哲二	山手丈至
大谷 浩	中澤憲一	與語靖洋
小澤正吾	納屋聖人	吉田 緑
小林裕子	成瀬一郎***	若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清
赤池昭紀	玉井郁巳	堀本政夫
石井康雄	田村廣人	松本清司
泉 啓介	津田修治	本間正充
今井田克己	津田洋幸	柳井徳磨
上路雅子	長尾哲二	山崎浩史
臼井健二	中澤憲一*	山手丈至
太田敏博	永田 清	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	義澤克彦**
小澤正吾	西川秋佳	吉田 緑
川合是彰	布柴達男	若栗 忍
小林裕子	根岸友恵	

三枝順三***

根本信雄

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2012年3月31日まで)

納屋聖人 (座長)

佐々木有

平塚 明

林 真 (座長代理)

代田眞理子

福井義浩

相磯成敏

高木篤也

藤本成明

赤池昭紀

玉井郁巳

細川正清

浅野 哲**

田村廣人

堀本政夫

石井康雄

津田修治

本間正充

泉 啓介

津田洋幸

増村健一**

上路雅子

長尾哲二

松本清司

臼井健二

永田 清

柳井徳磨

太田敏博

長野嘉介*

山崎浩史

小澤正吾

西川秋佳

山手丈至

川合是彰

布柴達男

與語靖洋

川口博明

根岸友恵

義澤克彦

桑形麻樹子***

根本信雄

吉田 緑

小林裕子

八田稔久

若栗 忍

三枝順三

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月23日から

(2012年4月1日から)

・幹事会

納屋聖人 (座長)

三枝順三

松本清司

西川秋佳 (座長代理)

永田 清

吉田 緑

赤池昭紀

長野嘉介

上路雅子

本間正充

・評価第一部会

上路雅子 (座長)

津田修治

山崎浩史

赤池昭紀 (座長代理)

福井義浩

義澤克彦

相磯成敏

堀本政夫

若栗 忍

・評価第二部会

吉田 緑 (座長)

桑形麻樹子

藤本成明

松本清司 (座長代理)

腰岡政二

細川正清

泉 啓介

根岸友恵

本間正充

・評価第三部会

三枝順三 (座長)

小野 敦

永田 清

納屋聖人 (座長代理)

佐々木有

八田稔久

浅野 哲

田村廣人

増村健一

・評価第四部会

西川秋佳 (座長)	代田眞理子	森田 健
長野嘉介 (座長代理)	玉井郁巳	山手丈至
川口博明	根本信雄	與語靖洋

＜第 27 回農薬専門調査会評価第四部会専門参考人名簿＞
中塚 敏夫

＜第 95 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿＞
小澤 正吾 林 真

＜食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員名簿＞

(2013 年 9 月 30 日まで)

山手丈至 (座長*)	天間恭介	松尾三郎
小川久美子 (座長代理*)	頭金正博	山口成夫
石川さと子	能美健彦	山崎浩史
石川 整	福所秋雄	吉田敏則**
寺本昭二	舞田正志	渡邊敏明

*: 2012 年 8 月 22 日から

**: 2012 年 10 月 1 日から

(2013 年 10 月 1 日から)

青木博史	須永藤子	宮田昌明
青山博昭	辻 尚利	山崎浩史
石川さと子	寺岡宏樹	山手丈至
石川 整	能美健彦	吉田和生
小川久美子	舞田正志	吉田敏則
川治聰子	松尾三郎	渡邊敏明

要 約

殺虫剤「フェニトロチオン」（CAS No. 122-14-5）について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、マウス、ウサギ、モルモット、イヌ、山羊、ヒト、鶏及びうずら）、植物体内運命（水稻、ぶどう等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット及びウサギ）、亜急性神経毒性（ラット及び鶏）、慢性毒性（イヌ及びサル）、慢性毒性/発がん性併合（ラット及びマウス）、発がん性（マウス）、繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。

各種毒性試験結果からフェニトロチオン投与による影響として、主に ChE 活性阻害が認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遅発性神経毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をフェニトロチオン（親化合物のみ）と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.49 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0049 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。

I. 評価対象農薬・動物用医薬品の概要

1. 用途

殺虫剤

2. 有効成分の一般名

和名：フェニトロチオン

英名：fenitrothion (ISO名)

3. 化学名

IUPAC

和名：*O,O*-ジメチル *O*-4-ニトロ-*m*-トルイル ホスホロチオエート

英名：*O,O*-dimethyl *O*-4-nitro-*m*-tolyl phosphorothioate

CAS (No. 122-14-5)

和名：*O,O*-ジメチル *O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)ホスホロチオエート

英名：*O,O*-dimethyl *O*-(3-methyl-4-nitrophenyl)phosphorothioate


4. 分子式

C₉H₁₂NO₅PS

5. 分子量

277.24

6. 構造式



7. 開発の経緯

フェニトロチオンは、住友化学（株）によって開発された有機リン系化合物に属する殺虫剤である。作用機構は昆虫内に入った後、酵素の働きでオクソソニン体となり、コリンエステラーゼと結合することで酵素活性を低下させ、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫効果を示すものと考えられている。国内では1961年に初回農薬登録されている。また、動物用医薬品としては、国内で牛等の外部寄生虫の駆除を目的とした噴霧投与剤が承認されている。（参照93）

今回、魚介類及び飼料中の基準値設定要請がなされている。また、ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準が設定されている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験 [II.1~4] は、フェニトロチオンのリン原子を ^{32}P で標識したもの（以下「[mep- ^{32}P]フェニトロチオン」という。）、フェニトロチオンのメチル基の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[met- ^{14}C]フェニトロチオン」という。）、フェニトロチオンのフェニル基の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「[phe- ^{14}C]フェニトロチオン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からフェニトロチオンに換算した値 (mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$) を示した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット

① 吸収

a. 血中濃度推移

ラット（系統不明：一群雄 3 匹）に [mep- ^{32}P]フェニトロチオン、又は Wistar ラット（一群雌雄各 7 匹）に [met- ^{14}C]フェニトロチオンを、それぞれ 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。

血中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

血中の放射能はいずれも 1~3 時間後に最大になり、以後速やかに減少した。

（参照 5、6、7、88）

表 1 血中薬物動態学的パラメータ

標識体	[mep- ^{32}P]フェニトロチオン	[met- ^{14}C]フェニトロチオン	
投与量 (mg/kg 体重)	15	15	
性別	雄	雄	雌
T _{max} (hr)	1	3	1
C _{max} ($\mu\text{g/g}$)	15.5	0.026	0.093
T _{1/2} (hr)	10.6 ¹⁾	4.7 ²⁾	4.94 ²⁾
AUC ³⁾	365	1.15	0.855

1) : 投与後 24 時間後から投与後 48 時間後のデータに基づいて算出

2) : T_{max} から投与後 24 時間までのデータに基づいて算出

3) : AUC の単位は [mep- ^{32}P]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr · $\mu\text{g/g}$ 」、[met- ^{14}C]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr · $\mu\text{g/mL}$ 」

b. 吸収率

尿及び糞中排泄試験 [1. (1)④] で得られた投与後 168 時間の尿における残存放射能から、フェニトロチオンの経口投与後の吸収率は少なくとも低用量雄で 92.6%、雌で 90.2%、高用量雄で 86.0%、雌で 91.8% と算出された。（参照 5、7、8、88）

② 分布

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に [phe-¹⁴C] フェニトロチオンを 1.5 mg/kg 体重（以下 [1.] において「低用量」という。）若しくは 150 mg/kg 体重（以下 [1.] において「高用量」という。）で単回経口投与し、又は非標識体を低用量で 1 日 1 回 14 日間反復投与後に [phe-¹⁴C] フェニトロチオンを低用量で単回経口投与して、経時的に臓器及び組織中放射能濃度を測定して体内分布が検討された。また、ラット（系統不明、雄）に [mep-³²P] フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回静脈内投与又は Wistar ラット（一群雄 1 匹 10 匹）に [met-¹⁴C] フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して同様に体内分布が検討された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。

吸収されたフェニトロチオンは各組織に分布するが、各組織、血中からの消失は速やかで、[met-¹⁴C] フェニトロチオン 15 mg/kg 体重投与群では投与 24 時間後に全身オートラジオグラフィーで ¹⁴C は検出されなくなり、血中濃度は 96 時間で検出限界 (0.001 µg/g) 以下になった。また、[phe-¹⁴C] フェニトロチオン高用量投与群でも 168 時間後には残存する ¹⁴C は僅か 0.1%TAR であり、蓄積傾向を示す組織はみられなかった。

[phe-¹⁴C] フェニトロチオン反復投与群 168 時間後の分布組織は低用量投与群とほぼ同じで、蓄積量は低用量投与群より少なかった。（参照 5、7~9、88）

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (µg/g)

標識体	投与量 (mg/kg 体重) 投与法	性別	T _{max} 付近 ^a	投与 168 時間後 ^b
[phe- ¹⁴ C] フ ェニトロチ オノン	1.5 単回 経口	雄		肝臓(0.0155)、全血(0.0061)、皮膚 及び被毛(0.0024)、カーカス ¹ (0.0022)、腎臓(0.0019)、肺 (0.0018)、脾臓(0.0014)
		雌		肝臓(0.0058)、全血(0.0036)、皮膚 及び被毛(0.0023)、カーカス (0.0021)、卵巣(0.0021)、腎臓 (0.0019)、肺(0.0017)
	150 単回 経口	雄		白色脂肪；皮下(0.730)、副腎 (0.630)、胰臓(0.460)、肝臓(0.450)、 カーカス(0.450)、全血(0.400)、褐色 脂肪(0.390)、白色脂肪；腹部 (0.370)

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ）。

標識体	投与量 (mg/kg 体重) 投与法	性別	T _{max} 付近 ^a	投与 168 時間後 ^b
[mep- ³² P]フェニトロチオニトロ	1.5 反復 経口	雌		子宮(0.890)、カーカス(0.440)、臍臍(0.360)、脾臍(0.300)、全血(0.200)、肝臍(0.170)、頸下腺(0.140)、皮膚及び被毛(0.130)、腎臍(0.100)
		雄		肝臍(0.0033)、カーカス(0.0014)、全血(0.0011)
		雌		皮膚及び被毛(0.0023)、カーカス(0.0017)、肝臍(0.0014)、全血(0.0009)
[mep- ³² P]フェニトロチオニトロ	15 単回 静注	雄	腎臍(23.6)、肝臍(20.6)、脳(20.4)、肺(18.7)、心臍(18.5)、血液(9.5)、筋肉(9.2)、脾臍(7.8)	
[met- ¹⁴ C]フェニトロチオニトロ	15 単回 経口	雄	腎臍(11.7)、胃及び腸(5.44)、消化管内容物(3.58)、肝臍(2.64)、血液(2.15)	肝臍(0.085)、腎臍(0.072)、胃及び腸(0.068)、脂肪(0.066)、臍臍(0.041)、下垂体(0.040)、甲状腺(0.035)、血液(0.028)

a : [mep-³²P]フェニトロチオニトロ投与群では 2.5 分後、[met-¹⁴C]フェニトロチオニトロ投与群では投与 1 時間後

b : [met-¹⁴C]フェニトロチオニトロ投与群では投与 24 時間後

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [1. (1)④] で得られた尿及び糞を試料として、また別途 Wistar ラット (匹数不明、雌雄) に [met-¹⁴C]フェニトロチオニトロを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、代謝物同定・定量試験が実施された。さらにラット (系統不明、雄) に [mep-³²P]フェニトロチオニトロを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、代謝物同定試験が実施された。

尿及び糞中代謝物は表 3 に示されている。

尿中に未変化のフェニトロチオニトロは認められなかった。[phe-¹⁴C]フェニトロチオニトロ低用量投与群及び反復投与群の尿中における主要代謝物はリン酸基が加水分解して生成する Gb 及び Ga であり、投与量の半分以上 (G を含めて 54~66%TAR) を占めた。高用量投与群の主要代謝物は脱メチル体 E 及び F であり (合わせて 43~58%TAR) 、Ga 及び Gb がこれに続いた。[met-¹⁴C]フェニトロチオニトロ投与でも Gb が主要代謝物であったが、Ga は少なかった。糞中への排泄量が少ないと認められ、低用量投与群では未変化のフェニトロチオニトロ、代謝物とともに認められた。

められなかつたが、高用量投与群では僅かに未変化のフェニトロチオンが認められた。フェニル基側の主要代謝物は尿・糞間、雌雄間及び標識体間ではほとんど違いが認められなかつた。

[mep-³²P]フェニトロチオン投与群で認められた代謝物はフェニトロチオン及びフェニトロチオンのオクソン体 B の P-O-アリール結合の開裂で得られたリン酸エステルである R 及び S であった。

ラットにおける主要代謝経路は、①フェニトロチオンの酸化的脱硫黄化 (P=S から P=O への酸化) によるオクソン体 B の生成②フェニトロチオン又は B の O-脱メチル化反応③P-O-アリール結合の開裂反応とそれに続く硫酸抱合化及びグルクロン酸抱合化であった。 (参照 5、6~8、88)

表 3 尿及び糞における代謝物 (%TAR)

標識体	投与回数	投与量 (mg/kg 体重)	性別	試料採取時間 (0-48h)	フェニトロチオン	代謝物
[phe- ¹⁴ C] フェニトロチオン	単回経口	1.5	雄	尿	ND	Gb(48.6)、Ga(13.8)、F(7.1)、G(3.2)、E(1.9)
				糞	ND	ND
			雌	尿	ND	Gb(41.7)、Ga(12.6)、F(9.0)、G(4.9)、E(2.7)
				糞	ND	ND
		150	雄	尿	ND	E(31.3)、Gb(21.1)、F(12.0)、G(5.1)、Ga(4.6)
				糞	1.7	G(0.5)
			雌	尿	ND	E(46.7)、Gb(15.3)、F(11.5)、Ga(4.3)、G(4.1)
				糞	0.4	G(0.9)
	反復経口	1.5	雄	尿	ND	Gb(56.6)、Ga(9.0)、F(8.9)、G(3.8)、E(1.5)
				糞	ND	ND
		1.5	雌	尿	ND	Gb(43.8)、Ga(14.7)、F(14.1)、G(4.2)、E(3.9)
				糞	ND	ND
[mep- ³² P] フェニトロチオン	単回経口	15	雄	尿	ND	S(44.7)、R(16.4)
[met- ¹⁴ C] フェニトロチオン	単回経口	15	雄*	尿	ND	Gb(35.3)、F(26.4)、G(8.2)、E(7.1)、Ga(5.7)、N(5.5)、Ma(3.5)、I(2.4)
				糞	13.2 (<1%TAR)	G(70.3)、E(13.2)、F(6.0)
		雌*	尿	ND	Gb(27.6)、E(25.8)、F(15.4)、G(14.6)、Ga(5.3)、N(2.5)、Ma(1.9)	

ND : 検出されず、* : 尿中又は糞中放射能に対する割合 (%TRR) の値

④ 排泄

SD ラット (一群雌雄各 5 匹) に、[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを低用量若しくは高用量で単回経口投与し、又は非標識体を低用量で 14 日間反復経口投与後に [phe-¹⁴C]フェニトロチオンを低用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

経口投与したフェニトロチオンは投与後 168 時間に両用量とも 95%TAR 以上が尿糞中に排泄され、主に尿中に排泄された。また低用量単回及び反復経口投与ではその大半 (94%TAR 以上) が投与後 24 時間で速やかに排泄された。反復投与では若干尿中排泄が増えたが、雌雄及び投与量の違いによる尿・糞中排泄の割合の変化は認められなかった。 (参照 5、7、88)

表 4 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与量	単回経口				反復経口	
	1.5 mg/kg 体重		150 mg/kg 体重		1.5 mg/kg 体重/日	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	92.6	90.2	86.0	91.8	96.5	101
糞	6.8	7.2	8.6	5.6	3.0	1.9
総回収率	99.4	97.4	94.6	97.4	99.5	103

(2) その他の動物

① 吸収

a. 血中濃度推移

モルモット (系統不明: 一群雄 3 匹) に [mep-³²P]フェニトロチオンを 500 mg/kg 体重で単回経口投与して、又は ICR マウス (一群雄 10 匹)、日本白色ウサギ (一群雌雄各 5 匹) 及びビーグル犬 (一群雄 3 匹) に [met-¹⁴C]フェニトロチオンをそれぞれ 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。

血中薬物動態学的パラメータは表 5 に示されている。

いずれも動物種、投与量及び標識体の種類にかかわらず血中の放射能は速やかに減少した。 (参照 5~7、73、88)

表 5 血中薬物動態学的パラメータ

標識体	[mep- ³² P]	[met- ¹⁴ C]		
	フェニトロチオン	フェニトロチオン		
動物種	モルモット	マウス	ウサギ	イヌ
投与量 (mg/kg 体重)	500	15	15	15
性別	雄	雄	雄	雌
T _{max} (hr)	3	1	1	3
C _{max} (μg/g)	339	0.016	0.030	0.027
T _{1/2} (hr) ¹⁾	5.4 ²⁾	6.19	1.47	6.46
AUC ³⁾	7,000	0.143	0.118	0.207
				1.09

1) : T_{max} から投与後 9 時間 (ウサギ雄)、24 時間 (マウス、ウサギ雌、イヌ) までのデータに基づいて算出

2) : 投与後 24 時間後から投与後 48 時間後のデータに基づいて算出

3) : AUC の単位は[mep-³²P]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr · μg/g」、[met-¹⁴C]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr · μg/mL」

b. 吸收率

尿及び糞中排泄試験 [1. (2)③] で得られた尿における残存放射能から、フェニトロチオンの経口投与後の吸収率は少なくともマウスで 55%、モルモットで 85%、ウサギで 86%、イヌで 88%、ヒトで 76%と算出された。(参照 5、9、10、73、88)

② 代謝

Swiss マウス、モルモット、ウサギ及びビーグル犬の尿及び糞中排泄試験 [1. (2)③] で得られた尿を試料として、また血中濃度推移試験 [1. (2)①a.] で [met-¹⁴C] フェニトロチオンを投与した ICR マウスの尿を 5 日間採取して、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿中代謝物は表 6 に示されている。

尿中に未変化のフェニトロチオン及びフェニトロチオンのオクソノン体 B はほとんど認められなかった。尿中における主要代謝物は動物種の違いにかかわらずほぼ同じであり、主要代謝物はリン酸基が加水分解して生成する Gb 及び Ga 並びにリン酸基側の代謝物として S 及び R であった。

主要代謝経路はラットと同様であると考えられた。(参照 5~7、10、88)

表 6 投与後 48 時間^{a)}の尿中における代謝物 (%TRR)

標識体	[mep- ³² P] フェニトロチオン		[met- ¹⁴ C] フェニトロチオン				
	マウス	モルモット ^{b)}	マウス	ウサギ	イヌ		
動物種	マウス	モルモット ^{b)}	マウス	ウサギ	イヌ		
投与量 (mg/kg 体重)	17	500	15	15	15		
性別	雄	雄	雄	雌	雄	雌	雄
B	1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	ND	ND	ND	ND	3.7	0.5	ND
E	20.1	15.8	17.8	10.5	5.8	4.3	51.2
F	28.4	3.8	25.6	20.3	2.1	2.7	5.7
G	-	-	20.4	11.1	11.2	3.6	15.6
Ga	-	-	7.5	7.5	13.1	23.1	3.0
Gb	-	-	21.0	43.4	39.2	48.1	17.5
I	-	-	ND	ND	0.5	ND	1.0
R	20.3	19.5	-	-	-	-	-
S	21.4	21.2	-	-	-	-	-

a) : [mep-³²P]フェニトロチオン投与のマウスでは 24 時間、b) : %TAR、ND : 検出されず
- : 標識体なし

③ 尿及び糞中排泄

a. マウス

Swiss マウス（雄、匹数不明）に、[mep-³²P]フェニトロチオンを 3、17、200 及び 850 mg/kg 体重でそれぞれ単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

3、17 及び 200 mg/kg 体重投与群では投与量の 75%TAR 以上が 24 時間以内に尿中に排泄され、850 mg/kg 体重投与群では、投与量の 55%TAR が 24 時間以内に尿中に排泄された。全ての投与群において、投与 72 時間後までに、90%以上が尿及び糞中に排泄された。（参照 5、10、88）

b. モルモット、ウサギ、イヌ、ヒト

モルモット（系統不明：一群雄 10 匹）に[mep-³²P]フェニトロチオンを 500 mg/kg 体重で単回経口投与して、又は日本白色ウサギ（一群雌雄各 5 匹）及びビーグル犬（一群雄 3 匹）に[met-¹⁴C]フェニトロチオンをそれぞれ 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。また、ヒト（男性 8 名、女性 4 名、平均年齢 33 歳；23～50 歳）に非標識フェニトロチオンを 0.18 mg/kg 体重/日及び 0.36 mg/kg 体重/日で 12 時間おきに 4 日間²反復カプセル経口投与して、尿中排泄試験が実施された。

モルモットでは投与後 96 時間までに 85%TAR が尿中に排泄され、投与放射能は主に尿中に排泄された。投与後 7 日目までにほぼ 100%TAR が排泄された。

² 4 日目に投与されたのは 1 日分の半量であり、0.09 mg/kg 体重及び 0.18 mg/kg 体重である。

ウサギでは投与後 72 時間までに雄で 94%TAR、雌で 86%TAR が尿中に排泄され、投与放射能は主に尿中に排泄された。

イヌでは投与後 96 時間以内に 88%TAR が尿中に排泄され、投与放射能は主に尿中に排泄された。

ヒトでの最終投与後 24 時間の尿中排泄率は、0.18 mg/kg 体重/日投与群で投与量の 97%、0.36 mg/kg 体重/日投与群で投与量の 76% であった。尿中主要代謝物は G であった。（参照 5~7、73、88）

④ 山羊

日本ザーネン種泌乳山羊（一群雌 6 匹）に [phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 0.5 mg/kg 体重/日で 7 日間反復経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

最終投与 7 日後には、尿中に総投与量の 50%、糞中に 44% 及び乳汁中に 0.1% 排泄された。

乳汁中では、投与 2 日後に 0.011 μg/g で定常状態となり、5 日後に最大値 0.012 μg/g となり、最終投与 7 日後までに 0.003 μg/g に減少した。

最終投与 1 日後の組織中残留放射能濃度は肝臓で最も高く 0.85~1.5 μg/g であり、腎臓、筋肉及び脂肪では 0.002~0.031 μg/g と低かった。最終投与 18 日後の残留放射能は、肝臓で 0.10 μg/g、ほかの臓器及び組織で 0.001~0.004 μg/g であった。

主要代謝物として C が尿中に 20.0%TAR 及び糞中に 31.1%TAR、K が尿中に 11.3%TAR、糞中に 2.1%TAR、Ca が尿中に 6.8%TAR 認められた。乳汁中には Ca が最も多く 0.004 μg/g 認められ、未変化のフェニトロチオン、代謝物 B 及び G は認められなかった。

山羊における主要代謝経路は、①ニトロ基の還元と得られたアミノ基の抱合化、②酸化的脱硫黄化（P=S から P=O への酸化）及び O 脱メチル化であると推測された。（参照 5、82、88）

⑤ 鶏及びうずら

白色レグホン種鶏（一群雌 6 羽）に [phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 2 mg/kg 体重/日で 7 日間カプセル経口投与し、又は日本うずら（一群 15 羽）に 5 mg/kg 体重で単回経口投与し、動物体内運命試験が実施された。

鶏では、最終投与 1 日後の肝臓、腎臓及び脂肪中の残留放射能は、それぞれ 0.098、0.10 及び 0.016 μg/g であり、筋肉では検出されなかった。

最終投与 6 時間後に 94%TAR 排泄物中に排泄され、5 日後には 100%TAR 排泄された。卵中の残留放射能は 0.2%TAR 未満であった。卵中の残留放射能は 7 日間の投与期間中には定常状態とならず、卵白では、最終投与 1 日後に 0.02 μg/g となり、卵黄では最終投与日に 0.1 μg/g となった。

排泄物中の主要代謝物は G 及び Gb で 51%TRR、H 及びその抱合体が合わせ

て 17.7%TRR、E が 12%TRR であった。そのほかに I、P 及び F が認められたが、いずれも 10%TRR 未満であった。

卵中の主要代謝物は G 及び Gb であり、卵白中でそれぞれ 4 及び 6%TRR、卵黄中で 18 及び 34%TRR 認められた。卵中には、そのほかに E 及び F が認められたが、いずれも 10%TRR 未満であった。

うずらでは、投与 1 日後の最大残留濃度は肝臓及び腎臓に認められ、それぞれ 0.016 $\mu\text{g/g}$ であり、筋肉及び脂肪には検出されなかった。

投与後 6 時間に内に 93%TAR 排泄物に排泄され、5 日後には 102%TAR 排泄された。卵中の残留放射能は 0.2%TAR 未満であった。

排泄物中の主要代謝物は G 及び Gb で 71%TRR であった。そのほかに H 及びその抱合体が合わせて 12.5%TRR、E が 6.5%TRR 認められた。鶏及びうずらにおける主要代謝経路は P-O-アリール結合の加水分解及び *m*-メチル基の酸化であると考えられた。これらの代謝物は硫酸抱合されると考えられた。（参照 82）

2. 植物体体内運命試験

（1）水稻

3 葉期にポットに移植した水稻（品種：日本晴）に [phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 750 g ai/ha の用量で収穫前 81 日（移植 2 か月後）、28 日、21 日及び 14 日にそれぞれ 1 回、計 4 回茎葉散布処理し、最終処理 14 日後に稻試料を採取して、植物体内運命試験が実施された。

各試料中の残留放射能分布は表 7 に、主要残留代謝物は表 8 に示されている。

散布処理した放射能の大部分はわら及びもみ殻（外皮）に留まり、玄米への移行は僅かであった。更に、玄米中の残留放射能の大部分は糠に存在し、白米中の残留放射能はごく僅かであった。

主要代謝物は、G 及びそのβ-グルコース抱合体 Gc であった。未変化のフェニトロチオンはもみ、もみ殻及びわらに 10%TRR 程度で認められたがその濃度は低く（最高値 1.38 mg/kg）、白米中では 0.003 mg/kg（2.8%TRR）と僅かであった。結合残留物（非抽出画分）を加水分解した結果、もみ及びもみ殻では G がそれぞれ 6 及び 10%TRR 認められたが、その他の代謝物（B、D）及び未変化のフェニトロチオンは全て 2.5%TRR 以下であった。（参照 5、11、88）

表 7 もみ画分及び藁の放射能残留量の分布

試料	表面洗浄液 ^a		抽出画分 ^b		非抽出画分		合計
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	
もみ	0.129	5.5	1.57	67.7	0.624	26.8	2.33
もみ殻	0.714	7.1	5.90	58.4	3.48	34.5	10.1
玄米	-	-	0.541	88.9	0.068	11.1	0.608
白米	-	-	0.094	85.0	0.017	15.0	0.110
糠	-	-	3.35	88.9	0.418	11.1	3.77
わら	0.752	9.6	5.76	73.1	1.36	17.3	7.87

a : アセトニトリルで洗浄

b : アセトニトリル水溶液で抽出、表面洗浄後のもみを玄米ともみ殻に分け、玄米の一部を白米と糠に分けた。

- : 試験を実施せず

表 8 イネのもみ及びわらにおける主要残留代謝物

代謝物			もみ				わら	
			もみ殻	玄米	白米	糠		
抽出画分	フェニトロチオン	mg/kg	0.302	1.38	0.027	0.003	0.107	0.78
		%TRR	13.0	13.7	4.5	2.8	2.8	9.9
	B	mg/kg	0.146	0.845	0.009	ND	0.042	0.268
		%TRR	6.3	8.4	1.5	ND	1.1	3.4
	D	mg/kg	0.026	0.128	ND	ND	ND	ND
		%TRR	1.1	1.3	ND	ND	ND	ND
	G	mg/kg	0.192	1.08	0.061	0.017	0.264	0.649
		%TRR	8.3	10.7	10.0	15.7	7.0	8.2
	Gc ^a	mg/kg	0.822	2.23	0.412	0.072	2.76	3.26
		%TRR	35.3	22.1	67.8	65.4	73.4	41.5
非抽出画分	抽出画分合計	mg/kg	1.70	6.61	0.54	0.094	3.35	6.51
		%TRR	73.2	65.5	88.9	85.0	88.9	82.7
非抽出画分	G ^b	mg/kg	0.146	1.04	<0.01	ND	<0.08	<0.16
		%TRR	6.3	10.3	<2	ND	<2	<2
	その他	mg/kg	0.478	2.44	>0.058	0.017	>0.338	>1.2
		%TRR	20.5	24.2	>9.1	15.0	>9.1	>15.3

a : 大部分は Gc であるが他の抱合体を含む

b : 非抽出残渣を加水分解して得られたもの

ND : 検出されず

(2) トマト

トマト (品種 : shirley) に、[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 750 g ai/ha (標準量) 又は 2,250 g ai/ha (過剰量) の用量で収穫前 29 日及び 14 日にそれぞれ 1 回、計 2 回茎葉散布処理し、最終処理 15 日後に果実及び葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

トマト果実及び葉における残留放射能濃度は表 9 に、主要代謝物は表 10 に示

されている。

フェニトロチオンは表面にほとんど残留せず内部に移行した。表面残留物の大部分は未変化のフェニトロチオンであった。フェニトロチオンはトマト成熟果実中で速やかに代謝され、大部分が G 及び G のβ-グルコース抱合体 Gc や更に糖鎖の伸長した代謝物へと変化した。G をアグリコンとする代謝物の総量は未同定化合物を合わせると 45.7%TRR であった。（参照 5、12、88）

表 9 トマト果実及び葉における残留放射能濃度

処理量	試料	成熟果実		未成熟果実		葉	
		mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
750 g ai/ha	表面洗浄液 ^a	0.0054	2.58	0.0037	1.27	ND	ND
	アセトン／水 抽出液	0.126	60.2	0.183	62.7	1.22	64.4
	抽出残渣	0.0778	37.3	0.105	36.0	0.659	35.2
	総計	0.209	100	0.291	100	1.88	100
2,250 g ai/ha	表面洗浄液 ^a	0.0178	5.11	-	-	ND	ND
	アセトン／水 抽出液	0.214	61.4	-	-	7.02	70.2
	抽出残渣	0.117	33.5	-	-	2.98	29.8
	総計	0.349	100	-	-	10.0	100

a : メタノールで洗浄、ND : 検出されず、- : 試験を実施せず

表 10 トマト成熟果実における主要残留代謝物

代謝物	表面洗浄液 ^a		アセトン／水 抽出液		残渣		合計	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
フェニトロ チオン	0.0045	2.17	0.014	6.67	0.0090	4.33	0.0275	13.2
Gc	0.0006	0.27	0.0147	7.02	ND	ND	0.0152	7.29
Gc*	ND	ND	0.0499	23.9	ND	ND	0.0498	23.9
G	ND	ND	0.0131	6.24	0.0016	0.75	0.0146	6.99
G 誘導体 ^b	ND	ND	0.0157	7.49	ND	ND	0.0157	7.49
抽出残渣	-	-	-	-	0.0366	17.5	0.0366	17.5

a : メタノールで洗浄、Gc* : Gc 上のグルコースが更に他の糖類で伸長されたもの。

b : 加水分解すると G になる未同定代謝物の混合物、ND : 検出されず、- : 試験を実施せず

(3) ぶどう

ぶどう（品種：Thompson Seedless）に、[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 817 g ai/ha（標準量）の用量で収穫前 63 日、49 日及び 35 日にそれぞれ 1 回、計 3 回散布処理し、最終処理後 35 日目に全てのぶどうの房を採取して、植物体内運動試験が実施された。

ぶどう果実における残留放射能濃度は表 11 に、代謝物は表 12 に示されている。

ぶどう表面洗浄液中には 10 種の未同定代謝物が認められたが、いずれも

1.2%TRR 未満であった。ぶどう抽出物液中に未変化のフェニトロチオンは認められず、主要代謝物は G の β -グリコシド : Gc 及び Gc の抱合体 (25.9%TRR) であり、その他に脱メチル体 E が認められた。 (参照 5、13、88)

表 11 ぶどう果実における残留放射能濃度

試料	表面洗浄液 ^a		溶媒抽出液 ^b		抽出残渣		総計	
残留放射能濃度	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
	0.029	4.02	0.628	87.1	0.064	8.88	0.721	100

a : 50%アセトニトリル水溶液で洗浄、 b : アセトニトリル及びメタノールで抽出

表 12 ぶどう果実における主要残留代謝物

代謝物	表面洗浄液		溶媒抽出液	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
E	ND	ND	0.052	7.21
G	ND	ND	0.007	0.97
Gc	ND	ND	0.151	20.9
Gc 以外の G の抱合体	ND	ND	0.356	49.4

ND : 検出されず

フェニトロチオンの植物における主要代謝経路は、リン酸エステル結合の加水分解によるフェノール体 G の生成である。G の多くはグルコース等による抱合化を受け、より極性の高い代謝物になる。また、代謝物の一部は植物構成体と結合して結合残留物を形成すると推定された。

3. 土壤中運命試験

(1) 土壤中運命試験

① 好気的湛水土壤

砂壤土 (栃木) に [phe-¹⁴C] フェニトロチオンを 0.78 mg/kg 乾土となるように処理し、1 cm 程度の湛水状態で好気的条件下、25±2°C 暗所でインキュベートし、処理 0.5、1、2、4、9、14 及び 28 日後に採取して土壤中運命試験が実施された。

湛水土壤における分解物分布は表 13 に示されている。

フェニトロチオンは湛水土壤中において経時的に減少し、処理 28 日後には 46.4%TAR が ¹⁴CO₂ として排出された。

主要分解経路はリン酸エステル結合の加水分解によるフェノール体 G の生成であった。更に CO₂ への分解、土壤への吸着も認められた。そのほか、P-O-メチル結合の開裂による少量の E が水層で認められた。

半減期は水層で 2 日、土壤層で 1 日、系全体で 8 日と算出された。 (参照 5、14、88)

表 13 湿水土壌における分解物分布 (%TAR)

処理後日数 (日)		0	0.5	1	2	4	9	14	28
フェニトロ チオン	水層	91.5	28.1	10.4	6.00	1.56	0.55	0.16	ND
	土壌	0.59	52.4	56.4	43.2	33.0	20.2	13.3	6.54
B	水層	0.63	0.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	土壌	ND	ND	ND	ND	0.38 ^a	0.39 ^a	0.16 ^a	0.33 ^a
E	水層	ND	2.16	2.46	3.14	2.28	0.85	0.37 ^a	ND
	土壌	ND	0.63	1.01	1.41	1.04	1.19	0.42	0.34
G	水層	0.76	1.93	1.82	3.55	1.61	0.27	0.27	0.17
	土壌	ND	7.20	16.9	27.2	27.8	24.1	13.4	9.49
¹⁴ CO ₂		NA	NA	NA	NA	3.77	19.5	29.9	46.4
その他の揮発性物質		NA	NA	NA	NA	0.14	0.16	0.17	0.18
土壌残渣		0.14	2.55	4.48	7.85	19.1	27.0	33.6	32.2

NA : 適用なし、ND : 検出せず、^a : 二連のうちのいずれかが ND であった時のもう一方の分析値

② 好気的土壌

2種類の砂壌土及び埴壌土(英國)に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 0.75 mg/kg 乾土となるように処理し、最大容水量の 45%の水を加え好気的条件下、20±1 °C の暗所でインキュベートし、処理 1、3、7、14、29、59 及び 90 日後に採取して土壌中運命試験が実施された。

好気的土壌における代謝分解物分布は表 14 に示されている。

好気的条件下でフェニトロチオンは経時的に減少し、処理後 90 日には全ての群において 1%TAR 以下まで減少した。51~69%TAR が ¹⁴CO₂ として排出され、23~43%TAR が土壌結合残留物へ変化した。

フェニトロチオンの主要分解物はリン酸エステル結合の加水分解によるフェノール体 G であり、処理 1 日後に系全体で 17~45%TAR に達した後、速やかに減少し、処理後 90 日には 1%TAR 未満となった。他に 2種類の微量な代謝分解物として J 及び未知極性化合物が検出されたがその生成量は 3%TAR 以下であった。

フェニトロチオンの半減期は 1~33 時間と算出された。(参照 5、15、88)

表 14 好気的土壤における分解物分布 (%TAR)

経過日数 (日)			0	1	3	7	14	29	59	90
砂壤土 1	抽出物 ^a	フェニトロ チオン	95.8	20.9	4.9	2.9	1.5	1.2	0.8	0.7
		G	ND	44.5	23.9	3.9	1.9	1.1	0.8	0.6
		J	ND	ND	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0
	¹⁴ CO ₂		NA	4.6	19.2	34.5	40.1	43.2	47.9	50.7
	抽出残渣		3.7	20.8	40.3	54.4	46.6	45.6	44.7	42.8
	総残留放射能		100.2	91.8	91.1	98.2	92.2	92.8	95.4	95.8
砂壤土 2	抽出物 ^a	フェニトロ チオン	96.4	67.5	14.5	5.4	2.3	1.5	1.2	0.7
		G	ND	16.8	15.6	2.9	1.1	0.7	0.3	0.2
		J	ND	ND	0.4	0.3	0.1	0.1	ND	ND
	¹⁴ CO ₂		NA	3.1	31.7	48.5	57.2	62.7	63.5	69.3
	抽出残渣		2.3	9.3	27.9	36.7	26.5	26.9	25.8	23.3
	総残留放射能		99.7	98.4	93.7	96.9	90.2	94.0	92.0	95.0
埴壤土 1	抽出物 ^a	フェニトロ チオン	91.4	35.1	6.2	2.4	1.6	1.2	0.7	0.6
		G	ND	34.7	15.3	4.0	2.1	1.1	0.7	0.4
		J	ND	ND	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	ND
	¹⁴ CO ₂		NA	0.0	29.2	43.7	47.7	53.1	56.9	58.9
	抽出残渣		7.0	18.9	40.9	42.9	38.9	36.0	37.0	35.0
	総残留放射能		99.3	89.5	92.9	94.6	91.4	92.5	96.3	95.6
埴壤土 2	抽出物 ^a	フェニトロ チオン	96.3	34.3	7.2	3.4	1.8	1.4	0.9	0.7
		G	ND	43.9	25.5	6.0	2.3	1.3	0.5	0.4
		J	ND	ND	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1
	¹⁴ CO ₂		NA	2.0	16.8	37.6	43.0	48.2	52.7	53.9
	抽出残渣		2.8	14.1	36.4	43.2	40.2	41.3	40.7	38.1
	総残留放射能		99.3	95.7	88.6	93.0	90.5	94.5	96.7	94.8

NA : 適用なし、ND : 検出せず、a : 抽出物とは酢酸エチル抽出より得られた放射能量

(2) 土壤表面における光分解

シルト質壤土(栃木及び滋賀)の土壤薄層プレート表面に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを10 μg/cm²となるように塗布し、自然太陽光下に12日間(8時間/日)光照射し、土壤表面光分解試験が実施された。

フェニトロチオンは速やかに分解し、半減期は約1日であった。光照射による主要分解物はGで、処理12日後に20.4~23.1%TAR認められた。ほかにはBが処理12日後に0.7~2.9%TAR認められた。(参照5、18、88)

(3) 土壤吸脱着試験

フェニトロチオンを用いて、4種類の国内土壤〔壤土（北海道）、軽埴土（高知及び和歌山）、砂土（宮崎）〕における土壤吸脱着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 9~36、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 816~1,940、脱着係数 K_{des} は 10~45、有機炭素含有率により補正した脱着係数 K_{oc} は 1,040~2,180 であった。（参照 5、16、88）

4. 水中運命試験

(1) 加水分解試験①

pH 5（酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液）、pH 7（ホウ酸緩衝液）及び pH 9（ホウ酸緩衝液）の各種滅菌緩衝液に [$phe^{-14}C$] フェニトロチオンを 1 mg/L となるように添加した後、25±1 °C、暗所で 30 日間インキュベートして加水分解試験が実施された。

各緩衝液中における分解物は表 15 に示されている。

フェニトロチオンは pH 5~9 の範囲において、水中で徐々に加水分解した。フェニトロチオンの加水分解物として、pH 5 及び 7 では脱メチル体 E が、pH 9 ではフェノール体 G が主に認められたことから、pH 5 及び 7 では P-O-メチル結合、pH 9 ではリン酸エステル結合の加水分解が起こると推測された。

フェニトロチオンの半減期は pH 5 では 191~200 日、pH 7 で 180~186 日、pH 9 では 100~101 日と推定された。（参照 5、17、88）

表 15 各緩衝液中における分解物 (%TAR)

分解物	処理後経過日数 (日)	0	3	5	7	14	21	30
フェニトロチオン	pH 5	100	99.5	97.4	96.8	94.1	92.9	89.9
	pH 7	100	98.6	97.4	95.8	93.6	92.2	88.8
	pH 9	100	98.0	96.7	94.3	89.3	87.4	81.0
E	pH 5	<0.1	0.6	1.4	0.7	4.6	5.7	10.1
	pH 7	0.2	0.9	1.2	1.6	2.1	3.7	6.8
	pH 9	0.1	0.3	0.5	0.5	4.4	4.3	5.2
G	pH 5	0.2	0.8	0.6	1.5	1.1	0.9	1.2
	pH 7	0.1	0.2	0.4	0.5	1.0	1.1	1.5
	pH 9	0.3	2.0	3.2	4.9	7.4	10.9	14.8

(2) 加水分解試験②

pH 2.0（塩酸緩衝液）、pH 5.1（酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液）、pH 6.3 及び 7.1（リン酸緩衝液）、pH 8.1、9.0、10.1、10.8 及び 11.5（ホウ酸緩衝液）の各種滅菌緩衝液並びに滅菌河川水（pH 7.1）並びに滅菌海水（pH 7.8）に [$phe^{-14}C$] フェニトロチオンを 1 mg/L となるように添加した後、暗所で 15、30 又は 45°C

条件下インキュベートして加水分解試験が実施された。

各緩衝液中での半減期は表 16 に示されている

分解速度は pH 及び温度に依存し、高くなるにつれて速度は速くなつた。主要分解物は pH 8 以下においては脱メチル体 E、pH 10 以上ではリン酸エステル結合の加水分解により生成した G であった。

また、河川水及び海水中におけるフェニトロチオンの加水分解速度及び経路は、同じ pH の緩衝液中と同様であった。(参照 5、18、88)

表 16 加水分解試験における半減期

試験水 (pH)	半減期 (日)		
	15°C	30°C	45°C
2.0	620	67	8.6
5.0	620	62	7.3
6.3	500	57	8.0
7.1	530	57	7.3
8.1	470	42	6.7
9.0	210	18	3.8
10.1	47	4.7	0.82
10.8	8.2	1.1	0.18
11.5	1.0	0.2	-
河川水	500	62	7.3
海水	450	38	6.7

- : 分解が速く算出不可

(3) 水中光分解試験①

滅菌河川水(兵庫、pH 7.4)、滅菌海水(兵庫、pH 7.8)、滅菌蒸留水(pH 5.9)及び滅菌緩衝液[pH 3(グリシン・塩酸緩衝液)、7(リン酸緩衝液)、9(ホウ酸緩衝液)]に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 1 mg/L(蒸留水のみ)又は 10 mg/L なるように添加した後、自然太陽光(平均 442 W/m²)下 32 日間(8 時間/日)光照射して水中光分解試験が実施された。

光分解における分解物は表 17 に示されている。

各供試水中において光照射区ではフェニトロチオンは半減期 2 日未満で速やかに分解した。暗対照区では分解は遅く、pH 9 緩衝液中における半減期は 24 日、他の供試水中においては 32 日以上であった。

蒸留水及び pH 3 の緩衝液中における主要分解物は、メチル基の酸化により生成した O で、処理 2 日後に 4.1~11.5%TAR 認められた。一方、pH 7 及び 9 の緩衝液、河川水及び海水中においては、O と O のアミノ体が縮合した Q が主に認められ、処理 2 日後には 5.2~19.0%TAR 認められた。そのほか、複数の微量分解物が検出されたが、同定された光分解物はいずれも 4%TAR 未満であり、未

同定の各分解物は 2%TAR 未満であった。いずれの分解物も最終的に $^{14}\text{CO}_2$ 及び フミン酸性物質や高極性分解物からなると考えられる非抽出残渣に分解した。

推定半減期は蒸留水で 0.6~1.0 日、東京（春）自然太陽光換算で 0.7~1.1 日 であった。（参照 5、18、88）

表 17 光分解における分解物 (%TAR)

供試水	蒸留水		pH3		pH7		pH9		河川水		海水	
照射日数 (日)	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32
フェニトロチオン	22.6	0.8	43.0	1.8	20.5	0.9	17.7	0.2	28.4	0.3	16.6	0.2
B	3.3	0.6	0.8	0.4	1.0	0.4	1.1	0.4	1.2	0.1	1.7	0.2
G	2.1	0.7	1.6	1.5	1.4	0.1	2.8	0.2	2.4	0.2	1.7	0.2
E	1.7	0.4	1.9	<0.1	1.0	0.2	1.1	<0.1	2.3	0.2	1.5	0.1
O	11.5	2.6	4.1	2.8	7.3	5.4	1.8	2.6	3.3	4.6	3.9	3.6
P	0.8	1.4	2.1	0.6	0.1	0.3	0.7	1.0	0.7	<0.1	<0.1	0.4
Q	0.8	0.3	0.2	0.3	10.6	3.9	19.0	0.5	5.2	0.5	8.9	0.3
非抽出物	18.7	37.6	12.9	45.3	9.5	29.3	6.9	51.4	8.9	44.2	10.0	32.9
$^{14}\text{CO}_2$	0.3	39.4	1.2	30.2	5.0	40.4	<0.1	21.5	<0.1	30.3	<0.1	45.0

注：フェニトロチオン 10 mg/L 添加

（4）水中光分解試験②

pH 5 の滅菌緩衝液（酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液）に、[phe- ^{14}C]フェニトロチオンを 1.0 mg/L となるように添加した後、 $25 \pm 1^\circ\text{C}$ で 30 日間キセノンランプ（光強度：30 W/m²、波長：290 nm 以下フィルターでカット）を照射して水中光分解試験が実施された。光分解における分解物は表 18 に示されている。

光照射区において、フェニトロチオンは 14 日間で 5.9%TAR、30 日間で 0.3%TAR まで減少した。一方、暗対照区での分解は遅く、30 日後に 79.0%TAR が残存していた。

主要分解物はアリールメチル基がカルボキシル基に酸化された O であった。O は、日数の経過とともに増加して 14 日間で 10.2%TAR 生成したが、30 日後には検出されなかった。このほかに微量分解物として同定された B、D、E、F、G 及び P はいずれも 1.2%TAR 以下であり、未同定分解物についても個々に 10%TAR を超えるものは認められなかった。認められた光分解物はいずれも水中で不安定であり、30 日後には処理放射能の 41.6%TAR が $^{14}\text{CO}_2$ に分解された。

フェニトロチオンの推定半減期は 3.5 日、自然光換算で約 2 日であった。（参照 5、19、88）

表 18 光分解における分解物 (%TAR)

	照射日数 (日)	0	2	4	7	14	30
光照射区	フェニトロチオン	100	87.6	69.7	40.3	5.9	0.3
	O	ND	0.7	1.8	4.5	10.2	ND
	非抽出物	<0.1	1.1	3.0	7.2	16.9	31.8
	¹⁴ CO ₂	NA	0.1	0.4	1.6	9.8	41.6
	その他	0.5 ^a	9.4 ^a	23.2 ^a	37.8 ^a	44.2 ^a	21.9
暗対照区	フェニトロチオン	100	98.6	97.4	97.2	92.8	79.0
	E	ND	0.1 ^a	0.3	0.5	1.2 ^a	5.8
	G	0.1 ^a	0.1	0.1	0.3	0.9	3.8
	¹⁴ CO ₂	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	その他	0.4 ^a	<0.6 ^a	<1.1 ^a	<1.2 ^a	<2.0 ^a	6.6 ^a

NA : 適用なし、ND : 検出せず、a : 二連のうちのいずれかが ND であった時のもう一方の分析値

5. 土壌残留試験

沖積・埴壌土（滋賀）、火山灰・埴壌土（栃木）、火山灰・壌土（茨城）、沖積・埴壌土（高知）、火山灰・軽埴土（詳細不明）、洪積・壌質砂土（詳細不明）、沖積・壌土（滋賀）、沖積・砂壌土（鳥取）、洪積・壌土（京都）及び沖積・埴土（徳島）を用いて、フェニトロチオン及び分解物 G を分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及びほ場）が実施された。推定半減期は表 19 に示されている。（参照 5、20、88）

表 19 土壌残留試験成績

試験	濃度* (処理回数)	土壌	推定半減期 (日)	
			フェニトロチ オン	フェニトロチオン+ G
容器内 試験	4 mg/kg (1回)	沖積・埴壌土	8	
		火山灰・埴壌土	8	
	0.75 mg/kg ^{MC} (1回)	火山灰・壌土	57	
		沖積・埴壌土	22	
	4 mg/kg (1回)	沖積・埴壌土	10	
		火山灰・埴壌土	6	
ほ場試験	15 mg/kg (1回)	火山灰・軽埴土	2	4
		洪積・壌質砂土	2	4
	1,200 g ai/ha ^{MG} (3回)	沖積・壌土	<7	
		沖積・砂壌土	<3	
	750 g ai/ha ^{MC}	火山灰・壌土	156	
		沖積・埴壌土	9	

		(6回)			
畑地	750～1,500 g ai/ha ^{EC} (6回)	洪積・壤土	10		
		沖積・埴土	5		
	15,000 g ai/ha ^{EC} (6回)	火山灰・軽埴土	1	1	
		洪積・壤質砂土	1	1	

* : 剤型は無印は原体、MC : 20%マイクロカプセル剤、MG : 3%微粒剤、EC : 50%乳剤

6. 作物等残留試験

(1) 作物残留試験

穀物、野菜、果実、茶等を用い、フェニトロチオンを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙3に示されている。フェニトロチオンの最大残留値は、散布14日後に収穫した温州みかん（果皮）で認められた19.2 mg/kgであった。（参照5、21、88）

(2) 乳汁移行試験

① 乳牛①

ジャージー種乳牛（一群雌2頭）にフェニトロチオンを強制経口（原体：0、1及び3 mg/kg 体重/日相当）投与し、乳汁移行試験が実施された。乳汁試料は投与期間中5回（1、2、3、5及び7日後）、投与終了後4回（1、3、5及び7日後）採取された。

搾乳した試料中フェニトロチオンは、1 mg/kg 体重/日投与群で検出限界（0.001 μg/mL）未満、3 mg/kg 体重/日投与群で0.002 μg/mL以下であった。フェニトロチオンは、乳汁へ移行し蓄積することはないと考えられた。（参照5、22、88）

② 乳牛②

ホルスタイン種乳牛（一群雌3頭）にフェニトロチオンを8.5 mg/kg 飼料の用量で28日間混餌投与し、28日後から7日間休薬して、畜産物残留試験が実施された。乳汁は投与開始前1日、開始後1、2、3、5、7、14、21及び28日並びに休薬開始1、2、3及び7日に採取された。

乳汁中には試験期間中及び休薬期間中のいずれにおいてもフェニトロチオンは検出されなかった。（参照84）

(3) 畜産物残留試験

① 牛①

牧草地にフェニトロチオンを0.125又は0.375 kg ai/haの用量で散布し、散布直後に牛（品種不明、一群10頭）を放牧し、畜産物残留試験が実施された。散

布 1、3、7 及び 10 日後に各 2 頭がと殺され、胸筋及び大網脂肪が採取された。

0.125 kg ai/ha 敷布区において、フェニトロチオン散布 1 日後の筋肉中に 0.007 ~0.011 µg/g、脂肪中に <0.001~0.002 µg/g 認められたが、散布 7 日後には、いずれも 0.001 µg/g 未満となった。

0.375 kg ai/ha 敷布区においては、フェニトロチオン散布 1 日後の筋肉中に 0.009~0.014 µg/g、脂肪中に 0.003~0.014 µg/g 認められた。散布 7 日後には筋肉中で 0.001 µg/g 未満、脂肪中で 0.001~0.005 µg/g 未満となった。（参照 82）

② 牛②

試験期間を通してフェニトロチオンが 0.375 kg ai/ha の用量で散布された牧草地に子牛（品種不明、30 頭）を放牧して畜産物残留試験が実施された。牧草中のフェニトロチオンの初期残留量は 11.8 mg/kg であった。試験 1 日目における肉及び脂肪中の残留量は 0.01 µg/g であった。未変化のフェニトロチオンが 3 日目の脂肪中に 0.004~0.007 µg/g 認められたが、肉中には認められなかった。（参照 91）

③ 牛③（噴霧投与）

ホルスタイン種牛（雄 3 頭）にフェニトロチオン製剤（10%乳剤）を 12.5~14.0 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 60 日後の各組織（肝臓、腎臓、小腸、筋肉、皮膚及び脂肪）中のフェニトロチオン及び代謝物 B（オクソソルビド）³が GC-MS により測定された。

フェニトロチオンの残留量は皮膚で検出限界（0.16 ng/g）以上定量限界（0.30 ng/g）未満（0.16~0.27 ng/g）であった。小腸では 3 例中の 2 例にそれぞれ 0.29 及び 0.32 ng/g 認められたが、その他の組織では検出限界（0.15~0.16 ng/g）未満であった。代謝物 B の残留量は各組織中で検出限界（脂肪：1.3 ng/g、その他の組織：0.31~0.32 ng/g）未満であった。（参照 94）

④ 泌乳牛①

フェニトロチオンを 0、1.1、2.2 及び 3.4 kg ai/ha の用量で処理し、76 日間熟成したトウモロコシサイレージを、ジャージー種乳牛（一群雌 4 頭）に 56 日間給餌して畜産物残留試験が実施された。1 日 2 回乳汁が採取され、4 週間ごとに 1 日 2 回尿及び糞が採取された。

フェニトロチオン並びに代謝物 B、C 及び G 合計の平均検体摂取量⁴は 1.1、2.2 及び 3.4 kg ai/ha 処理区でそれぞれ 0.21、0.41 及び 0.66 mg/kg 体重/日であった。

乳汁中には 3.4 kg ai/ha 処理区において C のみが 0.001~0.005 µg/g 認められ、

³ 代謝物 B は活性化体であることから測定された。（以下 [II. 6. (3)⑧及び⑩]において同じ。）

⁴ フェニトロチオン換算値

ほかの処理区においては 0.001 $\mu\text{g/g}$ 未満であった。尿及び糞中への総排泄量は、それぞれ 0.53~5.1 $\mu\text{g/g}$ 及び 0.037~0.18 $\mu\text{g/g}$ であった。尿及び糞中の主要代謝物は C で総残留量の 92~99%、そのほかに未変化のフェニトロチオンが 0.7~8.4%、G が 0.4~0.5%認められ、B は認められなかった。 (参照 82)

⑤ 泌乳牛②

泌乳牛(品種不明、一群雌 3 頭)にフェニトロチオンを 0、10、30 及び 100 mg/kg 飼料 (0、0.75、1.80 及び 9.6 mg/kg 体重/日) の用量で 28 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。1 日 2 回乳汁が採取され、-1、0、3、7、14、21 及び 28 日後の乳汁について検討された。

全ての投与群において、乳汁中のフェニトロチオン、B、C 及び *p*-ニトロクロゾール、クリーム中の B 及び *p*-ニトロクロゾールは定量限界 (0.01 $\mu\text{g/g}$) 未満であり、クリーム中でフェニトロチオン及び C がそれぞれ 0.01 及び 0.04 $\mu\text{g/g}$ 認められた。

肝臓、腎臓、筋肉 (心臓、後ろ半分の筋肉及び前半分の筋肉) 及び脂肪 (大網及び腎臓周囲) の検討では、9.6 mg/kg 体重/日投与群の 1 頭の腎臓に C が 0.11 $\mu\text{g/g}$ 認められたのみであった。 (参照 83)

⑥ 泌乳牛③

ジャージー種泌乳牛 (雌、動物数不明) にフェニトロチオンを 3 mg/kg 体重/日の用量で 7 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。

乳汁中に未変化のフェニトロチオンが 0.002 $\mu\text{g/mL}$ 、C が 0.003 $\mu\text{g/mL}$ 認められた。最終投与 2 日後にはフェニトロチオン及び代謝物は認められなかった。 (参照 91)

⑦ 泌乳牛④

ジャージー種泌乳牛 (雌、動物数不明) にフェニトロチオンを 0、25、50 及び 100 mg/kg 飼料の用量で 28 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。

未変化のフェニトロチオン、代謝物 B 及び G は乳汁、尿及び糞中に認められなかった。代謝物 C が乳汁中に 0.17 $\mu\text{g/mL}$ 、尿中に 35.6 $\mu\text{g/mL}$ 及び糞中に 1.8 $\mu\text{g/mL}$ 認められた。

フェニトロチオンの投与終了 7 日後には、フェニトロチオン及び代謝物は乳汁、尿及び糞中には認められなかった。 (参照 91)

⑧ 豚 (噴霧投与)

大ヨークシャー種豚 (雄 1 及び雌 2 頭) にフェニトロチオン製剤 (10%乳剤) を 1.57~1.93 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 20 日後の各組織 (肝臓、腎臓、小腸、筋肉、皮膚及び脂肪) 中のフェ

ニトロチオノン及び代謝物 B が GC-MS により測定された。

フェニトロチオノンの残留量は、皮膚及び脂肪でそれぞれ 2.5 ± 1.02 及び 1.4 ± 0.22 ng/g であったが、その他の組織では検出限界 (0.16 ng/g) 未満であった。代謝物 B の残留量は各組織中で検出限界 (脂肪 : 0.94 ng/g、その他の組織 : 0.32 ng/g) 未満であった。(参照 95)

⑨ 鶏①

産卵鶏及び肉用鶏 (品種、動物数不明) にフェニトロチオノンをそれぞれ 0、10、30 及び 100 mg/kg 飼料 (検体摂取量 : 0、0.72~2.63、2.18~8.44 及び 5.90~24.5 mg/kg 体重/日) の用量で 28 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。卵は 1 週間に 2 回採取され、半数の鶏が 14 日後に、残りの鶏は 28 日後と殺され、赤筋、白筋、肝臓及び脂肪が採取され、フェニトロチオノン、代謝物 B 及び *p*-ニトロクレゾールについて検討された。

組織中のフェニトロチオノン、代謝物 B 及び *p*-ニトロクレゾールの残留量は定量限界 (0.05 µg/g) 以下で、卵では残留は認められなかった。(参照 83)

⑩ 鶏② (噴霧投与)

白色レグホン種鶏 (雄 10 羽及び雌 11 羽) にフェニトロチオノン製剤 (10% 乳剤) を 56.8 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 14 日後の各組織 (肝臓、腎臓、心臓、筋肉、皮膚及び脂肪) 中のフェニトロチオノン及び代謝物 B が GC-MS により測定された。

フェニトロチオノンの残留量は、筋肉、皮膚及び脂肪でそれぞれ 1.02 ± 0.42 、 154.33 ± 82.45 及び 3.80 ± 1.42 ng/g であった。肝臓では、検出限界 (0.16 ng/g) 以上定量限界 (0.30 ng/g) 未満 (0.16~0.23 ng/g) であったが、その他の組織では検出限界 (心臓 : 0.16 ng/g、腎臓 : 0.31 ng/g) 未満であった。代謝物 B の残留量は各組織中で検出限界 (皮膚 : 0.64 ng/g、脂肪 : 1.0 ng/g、その他の組織 : 0.32 ng/g) 未満であった。(参照 96)

⑪ 肉用鶏 (噴霧投与)

肉用鶏 (キンバー、30 羽) にフェニトロチオノン製剤 (1% 乳剤) を 1 m^3 当たり 1 L の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 2 及び 7 日後の各組織 (肝臓、筋胃、筋肉及び皮膚) 中のフェニトロチオノンが測定された。

結果は表 20 に示されている。投与 2 日後の皮膚で最大の残留が認められた。肝臓及び筋肉では投与 7 日後に 0.01 µg/g 未満となった。(参照 89)

表 20 組織中残留量 (μg/g)

組織	投与後日数 (日)	
	2	7
肝臓	0.01	<0.01
筋胃	0.02	0.02
筋肉	0.05	<0.01
皮膚	1.21	0.03

⑫ 産卵鶏① (噴霧投与)

産卵鶏 (ハイスドルフネルソン 10 羽、ロックホーン 10 羽) をケージ (180×90×90 cm³) に入れ、フェニトロチオン製剤 (1%乳剤) を 1 週間間隔で 3 回噴霧投与 (1 L/回) し、畜産物残留試験が実施された。最終投与 5 日間毎の卵及び最終投与 14 日後の各組織 (肝臓、筋胃、筋肉及び皮膚) 中のフェニトロチオンが測定された。

結果は表 21 に示されている。筋胃で残留が認められたが、その他の組織及び卵ではいずれも 0.01 μg/g 未満であった。 (参照 89)

表 21 組織中残留量 (μg/g)

組織	残留量 (μg/g)
肝臓	<0.01
筋胃	0.03
筋肉 (ささみ)	<0.01
皮膚	<0.01
卵 (最終投与 5 日間)	<0.01
卵 (最終投与 6~10 日間)	<0.01

⑬ 産卵鶏② (噴霧投与) <参考資料⁵>

産卵鶏 (品種及び羽数不明) にフェニトロチオン製剤 (0.2%乳剤) を単回噴霧投与 (100 mL/羽) し、畜産物残留試験が実施された。投与 1、2、4、7、10、14 及び 21 日後の卵中の残留が測定された。

いずれの時点においても、残留は認められなかった (検出及び定量限界不明)。 (参照 89)

(4) 魚介類における最大推定残留量

フェニトロチオンの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃度 (水産 PEC) 及び生物濃縮係数 (BCF) を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。

⁵ 羽数、品種、検出又は定量限界が不明であることから、参考資料とした。

フェニトロチオンの水産 PEC は 1.6 $\mu\text{g}/\text{L}$ 、BCF は 30 (試験魚種: ブルーギル)、魚介類における最大推定残留値は 0.240 mg/kg であった。 (参照 4)

(5) 推定摂取量

別紙 3 の作物残留試験の分析値及び魚介類における最大推定残留値を用いてフェニトロチオンを暴露評価対象化合物とした際に食品中から摂取される推定摂取量が表 22 に示されている。

なお、本推定摂取量の算定は、登録に基づく使用方法から、フェニトロチオンが最大の残留を示す使用条件で、全ての適用作物に使用され、かつ、魚介類への残留が上記の推定残留値を示し、加工・調理による残留農薬の増減が全くないと仮定の下に行った。

表 22 食品中より摂取されるフェニトロチオンの推定摂取量

	国民平均 (体重: 53.3 kg)	小児 (1~6 歳) (体重: 15.4 kg)	妊婦 (体重: 55.6 kg)	高齢者 (65 歳以上) (体重: 54.2 kg)
推定摂取量 ($\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$)	70.1	40.2	62.4	66.2

7. 一般薬理試験

フェニトロチオンのラット、マウス、ウサギ、ネコ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 23 に示されている。 (参照 5、23、88)

表 23 一般薬理試験概要 (原体)

試験の種類	動物種 ^b	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体 重)	最小作用 量 (mg/kg 体 重)	結果の概要
一般症状	dd マウス	雌雄 8	800、936、 1,095、1,281、 1,499 (経口) ^a	—	800	自発運動の 減少、呼吸促 迫、呼吸困 難、流涎、振 戦、流涙、 936 mg/kg 体 重以上で死 亡例
			2,000、2,440、 2,977、3,632、 4,431、5,405 (皮下) ^a	—	2,000	自発運動の 減少、流涎、 挙尾、振戦、 跳躍、 2,440 mg/kg

試験の種類	動物種 ^b	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体 重)	最小作用 量 (mg/kg 体 重)	結果の概要
			500、550、605、 666、732 (腹腔内) ^a	—	500	体重以上で 死亡例 自発運動の 減少、挙尾、 跳躍、流涎、 流涙、呼吸困 難、チアノー ゼ、 550 mg/kg 体 重以上で死 亡例
角膜及び結膜 に対する作用	ウサギ	雄 匹数不明	0、0.1、1、10 (%) (点眼) ^a	1.0 (%)	10 (%)	10%液で催涙 及び結膜充 血
脳波	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、≤1、2 (静脈内) ^a	1	2	2 mg/kg で覚 醒波出現
血圧	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	1~3、5~10、 20 (静脈内) ^a	—	1	1~3 mg/kg 体重で軽度 血圧下降、5 mg/kg 体重以 上では用量 に相關した 血圧下降、10 mg/kg 体重以 上では二相 性変化
心電図	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、≤2 (静脈内) ^a	2	—	影響なし
脳局所血流	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、≤1、2 (静脈内) ^a	1	2	2 mg/kg 体 重で頸動脈血 流量、脳局所 血流増加
摘出心房	モルモ ット	雄 匹数不明	≤ 10 ⁻⁶ ~ 10 ⁻⁴ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁶ (M)	10 ⁻⁵ (M)	10 ⁻⁵ M 以 上で収縮及び 拍動数抑制
摘出乳頭筋	モルモ ット	雄 匹数不明	≤10 ⁻⁶ ~3.3× 10 ⁻⁴ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁶ (M)	10 ⁻⁵ (M)	10 ⁻⁵ M 以 上で収縮抑制

試験の種類	動物種 ^b	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体 重)	最小作用 量 (mg/kg 体 重)	結果の概要
摘出耳殻血管	ウサギ	雄 匹数不明	$10^{-5} \sim 10^{-2}$ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	内壁適 用 : 10^{-2} (M) 外壁適 用 : 10^{-3} (M)	—	影響なし
摘出腸管	ウサギ	雄 匹数不明	$\leq 5 \times 10^{-6} \sim$ 10^{-3} (M) (<i>in vitro</i>) ^a	5×10^{-6} (M)	10^{-5} (M)	10^{-5} M 以 上で腸管運動 を抑制 Ach 収縮を抑 制
摘出腸管	モルモ ット	性別匹数 不明	$\leq 5 \times 10^{-6} \sim$ 10^{-4} (M) (<i>in vitro</i>) ^a	5×10^{-6} (M)	10^{-5} (M)	10^{-5} M 以 上で His、Ba ²⁺ 収縮を抑制
神経筋接合部	SD ラッ ト	雄 匹数不明	$\leq 10^{-4}$ 、 $5 \times$ 10^{-4} (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10^{-4} (M)	5×10^{-4} (M)	5×10^{-4} M 以 上で神経刺 激収縮を抑 制

a : Sorpol 1,200 にて乳化して使用した。

b : ウサギ、ネコ、モルモットは系統不明。

— : 最小作用量は設定できなかった。

代謝物 B を用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 24 に示されている。(参照 5、23、88)

表 24 一般薬理試験概要 (代謝物 B)

試験の種類	動物種	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体 重)	最小作用 量 (mg/kg 体 重)	結果の概要
角膜及び結膜 に対する作用	ウサギ	雄 匹数不明	0、0.1、1、10 (%) (点眼) ^a	— (%)	0.1 (%)	10%液で催涙 及び結膜充 血、1%以上で 角膜及び結膜 反射抑制、 0.1%液で縮瞳
脳波	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、 ≤ 1 、2 (静脈内) ^a	1	2	2 mg/kg 体 重で覚醒波出現

試験の種類	動物種	動物数 /群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体 重)	最小作用 量 (mg/kg 体 重)	結果の概要
血圧	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0.1~0.3、0.5、 1、5 (静脈内) ^a	0.3	0.5	0.5 mg/kg 体 重以上で血圧 下降
心電図	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、≤2 (静脈内) ^a	2	—	影響なし
脳局所血流	ネコ ウサギ	雌雄 匹数不明	0、≤1、2 (静脈内) ^a	1	2	2 mg/kg 体重 で頸動脈血流 量、脳局所血 流増加
摘出心房	モルモ ット	雄 匹数不明	≤ 10 ⁻⁶ ~ 10 ⁻³ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁶ (M)	10 ⁻⁵ (M)	10 ⁻⁵ M 以上で 収縮及び拍動 数抑制
摘出乳頭筋	モルモ ット	雄 匹数不明	≤10 ⁻⁶ ~10 ⁻³ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁶ (M)	10 ⁻⁵ (M)	10 ⁻⁵ M 以上で 収縮抑制
摘出耳殻血管	ウサギ	雄 匹数不明	10 ⁻⁵ ~10 ⁻² (M) (<i>in vitro</i>) ^a	内壁適 用 : 10 ⁻² (M) 外壁適 用 : 10 ⁻³ (M)	—	影響なし
摘出腸管	ウサギ	雄 匹数不明	≤10 ⁻⁷ ~10 ⁻³ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁷ (M)	5×10 ⁻⁷ (M)	5×10 ⁻⁷ M 以 上で振幅増 大、 5×10 ⁻⁶ M 以 上で腸管収縮 を惹起 Ach 収縮を増 強
摘出腸管	モルモ ット	性別匹数 不明	10 ⁻⁴ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁴ (M)	—	影響なし
神経筋接合部	SD ラ ット	雄 匹数不明	≤10 ⁻⁶ ~10 ⁻⁴ (M) (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻⁶ (M)	5×10 ⁻⁶ (M)	5×10 ⁻⁶ M 以 上で神経刺激 収縮を増強、 10 ⁻⁴ M で一過 性の増強後、 抑制

a : Sorpol 1,200 にて乳化して使用した。

b : ウサギ、ネコ、モルモットは系統不明。

— : 最小作用量は設定できなかった。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

フェニトロチオン原体のラット、マウス及びイヌを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 25 に示されている。(参照 5、24~32、88)

表 25 急性毒性試験概要 (原体)

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	SD ラット ^a 雌雄各 8 匹	330	800	攣縮、振戦、運動失調、眼球突出、血涙、流涎、尿失禁 雄 : 200 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 392 mg/kg 体重以上で死亡例
	SD ラット ^b 雌雄各 10 匹	660	1,050	自発運動減少、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛及び流涙 雄 : 346 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	Wistar ラット ^b 雌雄各 10 匹	415	860	自発運動減少、流涙、血涙、流涎、攣縮、尿失禁、呼吸困難、立毛、間代性痙攣 雄 : 333 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 666 mg/kg 体重以上で死亡例
	SD ラット 雌雄各 10 匹	1,700	1,720	攣縮、縮瞳、自発運動減少、失調性歩行、四肢の麻痺、呼吸不規則、呼吸困難、流涙、流涎、尿失禁及び眼球突出 雌雄 : 1,400 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス ^a 雌雄各 8 匹	1,030	1,040	自発運動減少、呼吸深大、呼吸困難、四肢又は全身性の運動失調、流涎、流涙、軽度の振戦、間代性痙攣 雌雄 : 700 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス ^b 雌雄各 10 匹	1,400	1,270	自発運動減少、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛及び流涙 雌雄 : 1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	ビーグル犬 ^a 雌雄各 2 匹	>300	>300	呼吸促迫及び不規則、意気消沈、自発運動減少、流涎、歩行失調、下痢、後肢麻痺、振戦、赤血球 ChE 阻害 (20% 以上) 過敏、恶心、筋萎縮、全身性の間代性及び強直性痙攣、脱力、前後肢麻痺 (雌 1 例) 死亡例なし
経皮	SD ラット 雌雄各 8 匹	890	1,200	攣縮、呼吸促迫、反射亢進、眼球突出、尿失禁、興奮 雌雄 : 625 mg/kg 体重以上で死亡例

	SD ラット ^b 雌雄各 10 匹	2,700	約 5,000	自発運動減少、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛、流涙 雌雄 : 1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	Wistar ラット ^b 雌雄各 10 匹	1,260	1,910	眼瞼への血痕、呼吸微弱、間代性痙攣、体温降下 雄 : 523 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 1,481 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	>2,500	>2,500	症状及び死亡例なし
	dd マウス ^b 雌雄各 8 匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし
腹腔内 ^a	SD ラット 雌雄各 8 匹	148	461	攣縮、振戦、運動失調、血涙、流涎、眼球突出、尿失禁 雄 : 102 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 280 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	464	530	呼吸促進、攣縮、振戦、挙尾、流涙、流涎、一過性の呼吸深大 雌雄 : 385 mg/kg 体重以上で死亡例
皮下 ^a	SD ラット 雌雄各 8 匹	840	1,300	攣縮、振戦、運動失調、血涙、流涎、眼球突出、尿失禁、反射亢進 雄 : 250 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 715 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	1,350	1,530	自発運動減少、呼吸深大、四肢の運動失調、流涙、攣縮、流涎、振戦、眼脂分泌、 雄 : 750 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 1,130 mg/kg 体重以上で死亡例
吸入 ^b	SD ラット 雌雄各 8 匹	LC ₅₀ (mg/L)		立毛、流涎、尿失禁、流涙、振戦、攣縮、眼球突出、呼吸速迫及び呼吸困難、体重減少 雄 : 0.186 mg/L で死亡例
	SD ラット 雌雄各 10 匹	>0.186	>0.186	呼吸不規則、呼吸深大、鼻汁、攣縮、間欠性振戦、自発運動減少、流涙、流涎、尿失禁 雄のみ : 興奮、強直性痙攣、歩行失調、軟便 雄 : 2.21 mg/L で死亡例

a : 10%Tween80 水溶液投与 b : コーン油溶解投与

フェニトロチオンの代謝物を用いた急性毒性試験が実施された。結果は表 26 に示されている。 (参照 5、33、34、88)

表 26 急性毒性試験概要（代謝物）

被験物質	投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
B	経口 ^a	ラット（系統不明） 雄（匹数不明）	24		呼吸困難、攣縮、間代性痙攣、流涎、血涙、眼球突出、モルモットにおける症状はやや軽度
		マウス（系統不明） 雌雄（匹数不明）	90	90	
		モルモット（系統不明） 雄（匹数不明）	221		
	静脈内	ラット（系統不明） 雄（匹数不明）	3.3		呼吸困難、攣縮、間代性痙攣、流涎、血涙、眼球突出、モルモットにおける症状はやや軽度 中毒症状発現は、経口投与に比べ速やか
		モルモット（系統不明） 雄（匹数不明）	32		
G	経口 ^b	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	2,300	1,200	雄：呼吸深大、呼吸不規則又は促迫、歩行失調、運動失調 雌：呼吸深大、呼吸不規則、運動失調、自発運動減少、立毛 雌雄：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
		dd マウス 雄各 8 匹	250		呼吸深大、歩行失調、運動失調、軽度の振戦 雌雄：140 mg/kg 体重以上で死亡例
	腹腔内 ^b	dd マウス 雄各 10 匹	136		呼吸促進、振戦、跳躍運動 雌雄：100 mg/kg 体重以上で死亡例

a : 蒸留水に乳化して投与 b : アラビアゴム懸濁

(2) 急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた単回強制経口（原体：0、12.5（雄のみ）、50、200 及び 800（雌のみ）mg/kg 体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。

結果は表 27 に示されている。

本試験において、50 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で振戦等の神経行動学的症状が認められたので、急性神経毒性に対する無毒性量は雄で 12.5 mg/kg 体重、雌で 50 mg/kg 体重未満であると考えられた。（参照 5、35、88）

表 27 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
800 mg/kg 体重		・腹臥位、耳介反射低下、前肢握力低下
200 mg/kg 体重以上	・体重増加抑制 ・排便及び排尿減少、赤色流涎、伸筋伸展減少、後肢握力低下	・縮瞳、流涎、赤色流涎、痛覚反応低下（つま先及び尾）、視覚位置反応低下、受動姿勢延長、空中正向反射消失、後肢握力低下
50 mg/kg 体重以上	・腹臥位、振戦、立ち上がり減少、歩行不能、運動量減少、覚醒減少、縮瞳、流涎、痛覚反応低下（つま先及び尾）、受動姿勢延長、空中正向反射消失、前肢握力低下、体温低下	・振戦、立ち上がり減少、歩行失調、歩行不能、運動量減少、覚醒減少、体温低下
12.5 mg/kg 体重	毒性所見なし	

/ : 適用なし

（3）急性遅発性神経毒性試験（鶏）①

白色レグホン種鶏（投与群：雌 16 羽、陽性対照群：雌 6 羽）を用いた反復強制経口（3 週間間隔で 2 回、0 及び 500 mg/kg 体重、溶媒：Sorpol 355 水溶液）投与による急性遅発性神経毒性試験が実施された。

投与群では、1 回目の投与 1~2 日後に 5 例が死亡した。投与後、自発運動減少、運動失調、呼吸不規則等の急性中毒症状が発現したが、遅発性神経毒性を示す症状は認められず、神経病理組織学的検査においても検体投与の影響は認められなかったことから、本剤は急性遅発性神経毒性を誘発しないと考えられた。（参照 5、36、88）

（4）急性遅発性神経毒性試験（鶏）②

白色レグホン種鶏（投与群及び陽性対照群：雌 16 羽、溶媒対照群：雌 10 羽）を用いた反復強制経口（3 週間間隔で 2 回、0 及び 500 mg/kg 体重）投与による急性遅発性神経毒性試験が実施された。

投与群では、各投与後に 3 例ずつ計 6 例が死亡した。投与後、自発運動減少、運動失調、呼吸不規則等の急性中毒症状が発現したが、遅発性神経毒性を示す症状は認められず、神経病理組織学的検査においても、検体投与の影響は認められなかったことから、本剤は急性遅発性神経毒性を誘発しないと考えられた。（参照 5、37、88）

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚・吸入に対する感作性試験

(1) 眼・皮膚に対する刺激性試験（ウサギ）及び皮膚感作性試験（モルモット）

フェニトロチオン原体の NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、軽度の眼刺激性が認められたが、皮膚刺激性は認められなかった。（参照 5、38、88）

フェニトロチオン原体の日本白色ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、眼及び皮膚に対して刺激性を示さなかった。（参照 5、39、88）

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Landsteiner&Draize 法）が実施され、皮膚感作性は陰性であると判断された。（参照 5、40、88）

(2) 吸入による感作性試験（モルモット）

Hartley モルモットを用いた吸入による感作性試験が実施された。試験期間を通じて、呼吸困難などの中毒症状は観察されなかった。フェニトロチオンは顕著な ChE 活性阻害を来す気中濃度において、吸入によるアレルギー性喘息惹起作用を有しないと考えられた。（参照 5、41、88）

10. 亜急性毒性試験

(1) 6か月間亜急性毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（原体：0、10、30 及び 150 ppm：平均検体摂取量は表 28 参照）投与による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。

表 28 6 か月間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群 (ppm)	10	30	150
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 0.59	1.83	9.16
	雌 0.64	2.00	11.2

各投与群で認められた毒性所見は表 29 に示されている。

本試験において 150 ppm 投与群の雄及び 30 ppm 以上投与群の雌で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雄で 30 ppm（1.83 mg/kg 体重/日）、雌で 10 ppm（0.64 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、42、88）

表 29 6か月間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
150 ppm	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）	・体重増加抑制
30 ppm 以上	30 ppm 以下 毒性所見なし	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）
10 ppm		毒性所見なし

（2）30日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料⁶>

SD ラット（一群雄 36 匹）を用いた強制経口（原体：0、2.5、5、10 及び 20 mg/kg 体重/日）投与による 30 日間亜急性毒性試験が実施された。投与 8、15、22 及び 30 日並びに投与終了 8、15、29、57 及び 85 日後に各 4 匹がと殺された。

各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。（参照 78）

表 30 30日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄
20 mg/kg 体重/日	・死亡（8 例） ・流涎、立毛、下痢、色素涙、興奮性、運動失調、筋攣縮、全身性振戦及び痙攣 ・体重増加抑制
5 mg/kg 体重/日以上	・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） ・腎カルボキシルエステラーゼ低下（20%以上）
2.5 mg/kg 体重/日以上	・脳 ChE 活性阻害（20%以上）（30%、30 日目） ・肝カルボキシルエステラーゼ低下（50%以上）

（3）90日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料⁷>

Wistar ラット（一群雄 16～17 匹）を用いた混餌（原体：0、32、63、125、250 及び 500 ppm）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 31 に示されている。（参照 78）

⁶ 投与期間中（8、15、22 及び 30 日）に各群 4 匹ずつと殺して試験が実施されており、一般的なプロトコールと異なること、雄のみの試験であることから参考資料とした。

⁷ 投与期間中の 1 か月ごとに各群 4 匹ずつと殺して試験が実施されており、一般的なプロトコールと異なること、雄のみの試験であることから参考資料とした。

表 31 90 日間投亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄
500 ppm	<ul style="list-style-type: none">・1 例死亡・運動失調及び立毛・角膜混濁、角膜及び結膜出血・体重増加抑制、摂餌量低下・脳 ChE 活性阻害（20%以上）
250 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none">・筋攣縮及び流涙
32 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none">・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）

（4）6 か月間亜急性毒性試験（ウサギ）

日本白色在来種ウサギ（一群雄 12 匹）を用いた混餌（原体：0、3 及び 10 mg/kg 体重/日相当）投与による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。

3 mg/kg 体重/日以上投与群で、赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められるとともに、10 mg/kg 体重/日投与群において脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた。これ以外の項目に検体投与による影響は認められなかった。

本試験における無毒性量は 3 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。（参照 5、43、88）

（5）22 又は 23 日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）

NZW ウサギ（一群雌雄各 5 匹）を用いた経皮（原体：0、10、50、250 及び 500 mg/kg 体重/日）投与による 22 又は 23 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。500 mg/kg 体重/日投与群の経皮投与期間は 9 日間とされた。

500 mg/kg 体重/日投与群では嗜眠、軟便、下痢及び肛門性器部分の汚れが認められ、全身状態の悪化が認められたので投与開始 10 日後までに全ての動物がと殺された。

250 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE の活性阻害（20%以上）が認められたので、本試験の無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日と考えられた。（参照 89）

（6）28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 16 匹）を用いた吸入（原体：0、0.015 及び 0.062 mg/L、1 日 2 時間暴露・毎週 6 日間暴露）暴露及び SD ラット（一群雌雄各 24 匹）を用いた吸入（原体 0、0.002、0.007 mg/L、溶媒：ケロシン-キシレン、1 日 2 時間・毎週 5 日間暴露）暴露による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 32 に示されている。

本試験において、0.062 mg/L 暴露群の雄及び 0.015 mg/L 以上暴露群の雌で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたので、無毒性量は雄で 0.015 mg/L（0.72 mg/kg 体重/日）、雌で 0.007 mg/L（0.336 mg/kg 体重/日）であると考え

られた。（参照 5、44、88）

表 32 28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
0.062 mg/L 毎週 6 日間暴露	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	
0.015 mg/L 以上 毎週 6 日間暴露	毒性所見なし	・赤血球 ChE 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) ・卵巣絶対及び比重量 ⁸ 減少
0.007 mg/L 以下 毎週 5 日間暴露	毒性所見なし	

（7）28 日間亜急性吸入毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 15 匹）を用いた吸入（原体：0、0.015 及び 0.062 mg/L、1 日 2 時間・毎週 6 日間暴露）暴露及び ICR マウス（一群雌雄各 94 匹）を用いた（原体 0、0.002、0.007 mg/L、1 日 2 時間・毎週 5 日間暴露）暴露による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。

本試験において、0.015 mg/L 以上暴露群の雄で A/G 比低下が、0.062 mg/L 暴露群の雌で脳 ChE 活性阻害が認められたので、無毒性量は雄で 0.007 mg/L、雌で 0.015 mg/L であると考えられた。（参照 5、44、88）

表 33 28 日間亜急性吸入毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
0.062 mg/L 毎週 6 日間暴露	・脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	・脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
0.015 mg/L 以上 毎週 6 日間暴露	・A/G 比低下	毒性所見なし
0.007 mg/L 以下 毎週 5 日間暴露	毒性所見なし	

（8）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（主群：一群雌雄各 12 匹、衛星群：一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（原体：0、6、20、60 及び 200 ppm：検体摂取量は表 34 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

⁸ 体重比重量のことを比重量という（以下同じ）。

表 34 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の検体摂取量

投与量 (ppm)	6	20	60	200
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 0.30~0.58	1.00~1.97	3.05~5.88	10.6~18.5
	雌 0.38~0.59	1.27~1.99	3.96~5.96	14.9~20.7

各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。

肉眼的病理学及び神経病理学的検査結果並びにグリア線維性酸性蛋白質量に対する影響は認められなかった。

本試験において 60 ppm 投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)等が認められたので、亜急性神経毒性に対する無毒性量は雌雄とも 20 ppm (雄: 1.00~1.97 mg/kg 体重/日、雌: 1.27~1.99 mg/kg 体重/日) であると考えられた。

(参照 5、45、88)

表 35 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・体重増加抑制 ・摂餌量低下	・前後肢握力の低下 ・摂餌量低下
60 ppm 以上	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	・体重増加抑制 ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
20 ppm 以下	毒性所見なし	

(9) 28 日間亜急性遅発性神経毒性試験（鶏）

白色レグホン種鶏（一群雌 8 羽）を用いた強制経口（原体: 0、16.7 及び 33.4 mg/kg 体重/日）投与による 28 日間亜急性遅発性神経毒性試験が実施された。

16.7 mg/kg 体重/日以上投与群で体重減少及び自発運動減少が、33.4 mg/kg 体重/日投与群で振戦、歩行性運動失調、食欲減退等が観察されたが、いずれも 1 ~2 週間後には消失した。高用量群の 1 羽が 5 日目に死亡した。

本試験における一般毒性に対する無毒性量は、16.7 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。亜急性遅発性神経毒性は認められなかった。（参照 5、36、88）

(10) 6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（代謝物 B: 0、5、15 及び 50 ppm : 平均検体摂取量は表 36 参照）投与による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。

表 36 6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	5	15	50
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 0.31	0.91	2.99
	雌 0.34	0.99	3.66

各投与群で認められた毒性所見は表 37 に示されている。

本試験において 50 ppm 投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上) 等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 15 ppm (雄 : 0.91 mg/kg 体重/日、雌 : 0.99 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参照 5、42、88)

表 37 6か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
50 ppm	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
15 ppm 以下	毒性所見なし	

(11) 6か月間亜急性毒性試験（代謝物 G、ラット）

Wistar ラット (一群雌雄各 15 匹) を用いた混餌 (代謝物 G : 0、150、500 及び 1,500 ppm : 平均検体摂取量は表 38 参照) 投与による 6か月間亜急性毒性試験が実施された。

表 38 6か月間亜急性毒性試験（代謝物 G、ラット）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	150	500	1,500
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 9.23	30.7	94.7
	雌 10.1	32.8	101

本試験において投与による影響は認められなかったので、無毒性量は本試験の最高用量 1,500 ppm (雄 : 94.7 mg/kg 体重/日、雌 : 101 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参照 5、42、88)

1.1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 92週間慢性毒性試験（ラット）<参考資料⁹>

ラットの亜急性毒性試験 [10. (1)]において、最低濃度の 10 ppm で雌の血漿 ChE 活性に阻害がみられたので、最大無作用量を求めるため、Wistar ラット (一群雌雄各 15 匹) を用いた混餌 (原体 : 0、2.5、5 及び 10 ppm) 投与による 92 週間慢性毒性試験が実施された。

赤血球 ChE 活性には最高濃度の 10 ppm においても著明な阻害はみられなかった。脳 ChE 活性は全ての投与群で阻害は認められなかった。 (参照 5、42、88)

(2) 2年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬 (一群雌雄各 6 匹) を用いた混餌 (原体 : 0、30、100 及び 200 ppm :

⁹ 試験の詳細が不明であることから参考資料とした。

平均検体摂取量は表 39 参照) 投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。

表 39 2 年間慢性毒性試験 (イヌ) の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	30	100	200
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.98	3.34
	雌	1.08	3.60

各投与群で認められた毒性所見は表 40 に示されている。

各投与群で精巣における限局性又はび漫性の変性像が 2~3 例に見られたが、精巣の変性を示唆する変化は、ほぼ同月齢のビーグル犬において自然発生病変として報告¹⁰ (精細管の萎縮 3/10 例) されており、また、本試験における発生頻度は低く用量相関性がないことから、検体の投与に関連するものとは考えられなかった。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上) が認められたので、無毒性量は雌雄とも 30 ppm (雄 : 0.98 mg/kg 体重/日、雌 : 1.08 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参照 5、46、88)

表 40 2 年間慢性毒性試験 (イヌ) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	
100 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)
30 ppm	毒性所見なし	

(3) 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) ①

ビーグル犬 (一群雌雄各 6 囗) を用いた混餌 (原体 : 0、5、10 及び 50 ppm : 平均検体摂取量は表 41 参照) 投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

表 41 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	5	10	50
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.17	0.33
	雌	0.15	0.29

50 ppm 投与群の雄で赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上) の有意な増加が認められたが、同じ動物の投与前値と比較した場合の ChE 活性阻害は 20%未満であり、有意差が認められたのは 8 週時の一時点のみであることから検体の影響とは考

¹⁰ Rehm, S. Spontaneous testicular lesions in purpose-bred beagle dogs. *Toxicol Pathol*, 28, 782-787, 2000

えられなかつた。

本試験においていずれの投与群にも検体投与の影響は認められなかつたので、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 50 ppm (雄: 1.57 mg 体重/日、雌: 1.59 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参照 5、47、87、88)

(4) 1年間慢性毒性試験 (イヌ) ②<参考資料¹¹>

ビーグル犬 (一群雌 2 匹) を用いたカプセル経口投与 (原体: 0 及び 2 mg/kg 体重/日) 投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

投与群において、眼分泌物の増加、流涎及び下痢が認められた。赤血球 ChE 活性には 2 週目頃から低下がみられ、2 か月目頃からほぼ安定した低値を示すようになった。全身及び眼に著明な変化は認められなかつた。 (参照 5、48、88)

(5) 2年間慢性毒性試験 (サル)

カニクイザル (一群雌雄各 7 匹) を用いた強制経口 (原体: 0、0.1、0.5 及び 2 mg/kg 体重/日) 投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。

雌において、2 mg/kg 体重/日投与群投与開始後 20 週から体重の 10% 以上の有意な低下が認められた。

2 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害 (20% 以上)、雌で脳 ChE 活性阻害 (20% 以上) が認められた。

2 mg/kg 体重/日投与群において三頭筋及び四頭筋の刺入時電位の持続時間及び強さの僅かな増加が認められた。

本試験において、2 mg/kg 体重/日投与群において赤血球 ChE 活性阻害 (20% 以上) 等が認められたので、無毒性量は 0.5 mg/kg 体重/日であると考えられた。 (参照 92)

(6) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット)

ラット (系統不明: 親世代の発育時から検体を混餌投与された第一世代を使用、一群雌雄各 50 匹) を用いた混餌 (原体: 0、10、30 及び 100 ppm: 平均検体摂取量は表 42 参照) 投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 42 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群 (ppm)	10	30	100
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.49	1.45
	雌	0.62	1.81

各投与群で認められた毒性所見は表 43 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかつた。

¹¹ 一群 2 匹という少數例の試験であることから参考資料とした。

本試験において 30 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害がみられたので、無毒性量は雌雄とも 10 ppm (雄: 0.49 mg/kg 体重/日、雌: 0.62 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照 5、49、88)

表 43-1 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	・体重増加抑制 ・摂餌量低下	
30 ppm 以上	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
10 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

表 43-2 1 年間慢性毒性試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	・体重増加抑制 ・摂餌量低下	
30 ppm 以上	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
10 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(7) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (マウス)

B6C3F₁ マウス (一群雌雄各 50 匹) を用いた混餌 (原体: 0、3、10、100 及び 1,000 ppm: 平均検体摂取量は表 44 参照) 投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 44 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (マウス) の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	3	10	100	1,000
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.376	1.45	12.6
	雌	0.454	1.51	13.1
				144

各投与群で認められた毒性所見は表 45 に示されている。

100 ppm 投与群雄で肝細胞腺腫の発生頻度の有意な高値 (対照群 16/50 例に対して 27/50 例) が認められたが、用量相関性がないことから、投与の影響とは考えられなかった。ほかに、検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 10 ppm (雄: 1.45 mg/kg 体重/日、雌: 1.51 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照 5、50、88)

表 45-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制 摂餌量、摂水量低下 AST、ALT 及び BUN 増加、Glu 低下 脳絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制 摂餌量、摂水量低下 AST 増加、Glu 及び Alb 低下 脳絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上） T.Chol 増加 	<ul style="list-style-type: none"> 赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上） T.Chol 増加
10 ppm 以下	毒性所見なし	

表 45-2 1年間慢性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制 摂餌量、摂水量低下 Glu 低下 脳絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制 摂餌量、摂水量低下 AST 増加、Glu 及び Alb 低下 脳絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上） T.Chol 増加 	<ul style="list-style-type: none"> 赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上） T.Chol 増加
10 ppm 以下	毒性所見なし	

（8）18か月間発がん性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌（原体：0、30、100 及び 200 ppm、試験開始から 2 週間は 0、10、30 及び 100 ppm：平均検体摂取量は表 46 参照）投与による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 46 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	30	100	200
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.10	10.8
	雌	3.69	12.0

各投与群で認められた毒性所見は表 47 に示されている。

検体投与により発生頻度増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において 100 ppm 以上投与群の雄及び 200 ppm 投与群の雌において心臓絶対及び比重量減少等が認められたので、無毒性量は雄で 30 ppm (3.10 mg/kg 体重/日)、雌で 100 ppm (12.0 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 5、51、88）

表 47 18か月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・副腎絶対及び比重量増加	・心臓絶対及び比重量減少 ・副腎絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	・心臓絶対及び比重量減少	100 ppm 以下 毒性所見なし
30 ppm	毒性所見なし	

12. 生殖発生毒性試験

(1) 2世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、10、40 及び 120 ppm：平均検体摂取量は表 48 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 48 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

性別		雄			雌		
投与群 (ppm)		10	40	120	10	40	120
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	0.7	2.7	8.0	0.7	3.1	9.6
	F ₁ 世代	0.7	2.8	8.8	0.8	3.3	11.1

各投与群で認められた毒性所見は表 49 に示されている。

本試験において、親動物では 120 ppm 投与群の雄及び 40 ppm 投与群の雌、児動物では 120 ppm 投与群で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は親動物の雄及び児動物で 40 ppm (P 雄 : 2.7 mg/kg 体重/日、F₁ 雄 : 2.8 mg/kg 体重/日)、親動物の雌で 10 ppm (P 雌 : 0.7 mg/kg 体重/日、F₁ 雌 : 0.8 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 5、52、88）

表 49 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	親 : P、児 : F ₁		親 : F ₁ 、児 : F ₂	
	雄	雌	雄	雌
親動物	120 ppm	・体重増加抑制 ・摂餌量低下	・体重増加抑制	・軟便又は液状便 ・振戦
	40 ppm 以上	40 ppm 以下 毒性所見なし	40 ppm 以下 毒性所見なし	・体重増加抑制 ・摂餌量低下
	10 ppm			・毒性所見なし
児動物	120 ppm	・体重増加抑制 ・死亡児数の増加 ・4 日生存率低下 ・離乳率の低下 ・一般状態の悪化（衰弱、削瘦、体温下降、振戦、哺乳しない、腹部の汚れ）	・体重増加抑制 ・死亡児数の増加 ・4 日生存率低下 ・離乳率の低下 ・一般状態の悪化（衰弱、体温下降、哺乳しない、蒼白化）	

40 ppm 以下	毒性所見なし
--------------	--------

(2) 1世代繁殖試験（ラット）

*In vitro*試験及び*in vivo*試験において抗アンドロゲン作用が報告されている¹²ことから、ラットのP世代交配前からF₁世代成熟までの間の生殖能及び出生児の生育に及ぼす影響について詳細に検索する目的で、SDラット（一群雌雄P世代：各12匹、F₁世代：各20匹）を用いた混餌（原体：0、10、20及び60 ppm平均検体摂取量は表50参照）投与による1世代繁殖試験が実施された。なお、F₁世代は離乳時から10週齢までの7週間飼育された。

表50 1世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

性別		雄			雌		
投与群 (ppm)		10	20	60	10	20	60
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P世代	0.64	1.28	3.81	0.71	1.38	4.26
	F ₁ 世代	0.87	1.75	5.57	0.87	1.82	5.58

抗アンドロゲン作用も含め、内分泌かく乱作用に感受性の高い指標に対しても影響は認められなかった。

本試験において、親動物の雄及び児動物では検体投与の影響が認められず、親動物の雌では60 ppm投与群で脳ChE活性阻害(20%以上)が認められたので、無毒性量は親動物の雄で本試験の最高用量である60 ppm(3.81 mg/kg 体重/日)、雌で20 ppm(1.38 mg/kg 体重/日)、児動物では本試験の最高用量60 ppm(F₁雄：5.57 mg/kg 体重/日、F₁雌：5.58 mg/kg 体重/日)であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照5、53、88)

(3) 3世代繁殖試験（ラット）<参考資料¹³>

SDラット(F₁離乳まで：一群雄各15匹、雌各30匹、F₁2回目交配以降：一群雄各10匹、雌各20匹)を用いた混餌(原体：F₁世代離乳まで：0、10、30及び150 ppm、以降：0、10、30及び100 ppm：平均検体摂取量は表51参照)投与による3世代繁殖試験が実施された。

¹² Tamura, H. et al., Androgen receptor antagonism by the organophosphate insecticide fenitrothion, *Toxicol. Sci.*, **60**, 56-62 (2001)ほか

¹³ 世代により用量設定が異なる試験であったことから参考資料とした。

表 51 3 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

性別		雄			雌		
投与群 (ppm)		10	30	150/100 ^a	10	30	150/100 ^a
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	0.622	1.79	9.63	0.740	2.24	13.5
	F ₁ 世代	0.665	2.02	6.85 ^a	0.760	2.28	8.51 ^a
	F ₂ 世代	0.774	2.20	7.74 ^a	0.879	2.52	9.05 ^a

^a : 100 ppm 投与群

各投与群で認められた毒性所見は表 52 に示されている。（参照 5、54、88）

表 52 3 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親 : P、児 : F ₁		親 : F ₁ 、児 : F ₂		親 : F ₂ 、児 : F ₃	
		雄	雌	雄	雌	雄	雌
親動物	150/100 ppm	・体重増加抑制	・体重増加抑制	・体重増加抑制 ^a	・体重増加抑制 ^a	100 ppm 以下 毒性所見なし	
	30 ppm 以下	毒性所見なし					
児動物	150/100 ppm	・低体重 ・離乳時生存率の低下		・低体重 ^a ・離乳時生存率の低下 ^a		・低体重 ^a ・離乳時生存率の低下 ^a	
	30 ppm 以下	毒性所見なし					

^a : 100 ppm 投与群

（4）発生毒性試験（ラット）①

SD ラット（一群雌帝王切開 18 匹、自然分娩 5-8 匹）の妊娠 9~14 日に強制経口（原体 : 0、2、7 及び 20 mg/kg 体重/日、溶媒 : コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 53 に示されている。

本試験において母動物では 20 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制等が認められ、胎児では有意差が認められる検体の投与の影響はなかったが、自然分娩させると出生時における雌雄体重が有意な低値を示したことから、無毒性量は母動物及び胎児とも 7 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められず、出生後の発育にも影響は認められなかった。（参照 5、55、88）

表 53 発生毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児	出生児
20 mg/kg 体重/日	・体重増加抑制 ・立毛、運動失調、尿失禁、振戦、眼球突出及び興奮	20 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし	・出生時における雌雄低体重
7 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし		毒性所見なし

(5) 発生毒性試験（ラット）②

SD ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、3、8 及び 25 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 54 に示されている。

本試験において母動物では 25 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制等が、胎児では検体投与の影響は認められなかつたので、無毒性量は母動物で 8 mg/kg 体重/日、胎児で本試験最高用量の 25 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかつた。（参照 5、56、88）

表 54 発生毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
25 mg/kg 体重/日	・体重増加抑制 ・振戦、粗毛、削瘦、鼻汁及び尿汚れ	25 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし
8 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	

(6) 発生毒性試験（マウス）<参考資料¹⁴>

ICR マウス（一群雌帝王切開 19～20 匹、自然分娩 6・7 匹）の妊娠 7～12 日に強制経口（原体：0、20、70 及び 200 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験においては検体投与の影響は認められなかつた。（参照 5、55、88）

(7) 発生毒性試験（ウサギ）①

NZW ウサギ（一群雌 16 匹）の妊娠 7～19 日に強制経口（原体：0、3、10 及び 30 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、30 mg/kg 体重/日投与群の母動物で死亡、流産が発生し、体重増加抑制等が認められ、胎児では検体投与の影響は認められなかつたので、無毒性量は母動物で 10 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量の 30 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかつた。（参照 5、57、88）

(8) 発生毒性試験（ウサギ）②<参考資料¹⁵>

NZW ウサギ（一群雌 17 匹、対照群 22 匹）の妊娠 6～18 日にカプセル経口（原体：0、0.3 及び 1.0 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

1.0 mg/kg 体重/日投与群の母動物 1 例で全胚の後期吸収が認められ、同投与群で流産 1 例が認められたが、いずれも検体投与との関連性は不明である。

1.0 mg/kg 体重/日投与群（32%）を除けば、胸骨の不完全骨化は対照群と差は

¹⁴ 投与期間が器官形成期に十分対応していないため、参考資料とした。

¹⁵ 2 用量で実施された試験のため参考資料とした。

認められなかつたが、胸骨の未骨化は用量相関的に増加する（対照群：2.7%、0.3 mg/kg 体重/日投与群：12.7%及び 1.0 mg/kg 体重/日投与群：26%）傾向が認められた。（参照 92）

13. 遺伝毒性試験

フェニトロチオン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、ラット肝細胞を用いた UDS 試験、マウス胚細胞を用いた姉妹染色分体交換試験、チャイニーズハムスター細胞（V79）を用いた遺伝子突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞（CHO）を用いた染色体異常試験、マウスを用いた復帰突然変異試験（宿主經由）、ラットにフェニトロチオンを投与しての *in vivo/in vitro* 肝 UDS 試験、ラット及びマウスの骨髄細胞を用いた染色体異常誘発性試験、マウスを用いた小核試験並びにラット及びマウスを用いた優性致死試験が実施された。

結果は表 55 に示されている。

試験の中には実施年代の古いものもあり、評価の難しいものも見られる。

一部の細菌を用いた復帰突然変異試験で、弱い陽性が TA100 株で認められているが、TA100 株がもつニトロレダクターゼに起因するものと推定される。このことは、微生物を用いた DNA 修復試験及びチャイニーズハムスター細胞を用いた遺伝子突然変異試験が陰性であったことによっても裏付けられている。

ラットの初代培養肝細胞を用いた *in vitro* UDS 試験において、細胞毒性が見られる用量で弱い陽性が報告されているが、ラットを用いた *in vivo/in vitro* 肝 UDS 試験で陰性であったことから、問題はないものと考えた。

染色体異常試験に関しては、ほ乳類培養細胞を用いた試験で陰性であり、*in vivo* 試験においても染色体異常誘発性は認められていない。更に、次世代への影響を見たラット及びマウスを用いた優性致死試験の結果も陰性であった。

以上を総合的に評価すると、フェニトロチオンには遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 5、58～70、88）

表 55 遺伝毒性試験概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i> 修復試験	<i>Escherichia coli</i> (W3623、W3623 _{polA} ⁻ 、 W3623 _{uvrA} ⁻ 、 W3623 _{recA} ⁻ 株) <i>Bacillus subtilis</i> (H17、M45 _{recA} ⁻ 株) <i>Salmonella</i> <i>typhimurium</i> (TA1978、 TA1538 _{uvrB} ⁻ 株)	100 μg～10 mg/ディスク	陰性

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
	DNA 修復試験	<i>B. subtilis</i> (H17、M45 株)	1~100 %	陰性
	復帰突然 変異試験	<i>B. subtilis</i> (W168 株) <i>E. coli</i> (W3623、W3102 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA1536、 TA1537 及び TA1538 株)	10 µg~10 mg/ゲイツ 10 µg~100 µg/mL 接触 処理 (17 時間)	陰性
	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537 及び TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2hcr 株)	10~5,000 µg/7° レート (+/-S 9)	(+/-S 9) とともに <i>S. typhimurium</i> (TA100) に 対して弱い陽性
	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA100nit)	①10~1,000 µg/7° レート (+/-S 9) ②100~2,000* µg/7° レー ト (+/-S 9)	陰性
	UDS 試験	初代培養肝細胞 (雄 SD ラット由来)	0.24~30 µg/mL	弱い陽性
	遺伝子突然変 異試験	チャイニーズハムスター 細胞 (V79) (<i>HGPRT</i> 遺伝子)	10、30、100、300 µmol/L (+/-S 9)	陰性
	染色体異常 試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来 (CHO-K1) 細胞	3~30 µg/mL (-S 9) 75~300 µg/mL (+S 9)	陰性
	姉妹染色分体 交換試験	ICR マウス (初代培養胚 細胞)	10 ⁻⁵ 、5×10 ⁻⁵ 、10 ⁻⁴ M (+/-S 9)	陰性
	宿主経 由試験	復帰突然変異 試験	ICR マウス <i>E. coli</i> (W3623、W3623 _{polA} ⁻ 、 W3623 _{uvrA} ⁻ 、 W3623 _{recA} ⁻ 株) (腹腔内挿入)	500 mg/kg 体重 (単回経 口及び筋注投与) 1,000 mg/kg 体重 (単回 筋注投与)
<i>in vivo/ in vitro</i>	UDS 試験	SD ラット (一群雄 3 匹) (分離肝細胞)	300 mg/kg 体重 (強制単 回経口投与)	陰性

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
in vivo	染色体異常誘発試験	SD ラット (一群雄 6 匹) (骨髄細胞) 100、200 及び 300 mg/kg 体重 (強制単回経口投与) 20、40 及び 80 mg/kg 体重 (5 日間強制経口投与)	陰性
	染色体異常誘発試験	ICR マウス (一群雄 6 匹) (骨髄細胞) 50、200 及び 850 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与)	陰性
	染色体異常誘発試験	ICR マウス (一群雄 6 匹) (骨髄細胞) 200、400 及び 800 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与)	陰性
	小核試験	ICR マウス (骨髄細胞) (一群雌雄各 6 匹) 200、400 及び 800 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与)	陰性
	優性致死試験	SD ラット (一群雄 11 匹) 2、7 及び 20 mg/kg 体重 / 日 (5 日間強制経口投与)	陰性
	優性致死試験	ICR マウス (一群雄 12 匹) 20 及び 200 mg/kg 体重 / 日 (5 日間強制経口投与)	陰性

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

* : フェニトロチオン標準品を使用。

主として動物、植物、土壤及び水中由来の代謝物である B 及び G について細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験が実施された。結果は表 56 に示されているとおり、いずれの試験においても陰性であった。(参照 5、58、88)

表 56 遺伝毒性試験概要 (代謝物)

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 B	DNA 修復試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3623 _{polA} ⁻ 、W3623 _{uvrA} ⁻ 、W3623 _{recA} ⁻ 株) <i>B. subtilis</i> (H17、M45 _{recA} ⁻ 株)	10 mg/テ ² イスク
	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3102 株)	100 µg /テ ² イスク
代謝物 G	DNA 修復試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3623 _{polA} ⁻ 、W3623 _{uvrA} ⁻ 、W3623 _{recA} ⁻ 株) <i>B. subtilis</i> (H17、M45 _{recA} ⁻ 株)	10 mg/テ ² イスク
	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3102 株)	100 µg /テ ² イスク 100 µg 接触処理 (17 時間)

14. その他の試験

(1) 急性眼毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた単回強制経口（原体：雄：0、20 及び 200 mg/kg 体重、雌：0、40 及び 400 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）投与による急性眼毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 57 に示されている。

200 mg/kg 群の雄で網膜電図の a 波頂点の増加が、400 mg/kg 群の雌で b 波の頂点潜時短縮が認められたが、いずれも対照群の変動範囲にあり検体投与と関係のない偶発的変化と考えられた。

著明な ChE 活性阻害及び毒性症状の現れる量を投与しても、網膜電図に検体投与の影響はなかったと考えられた。（参照 5、71、88）

表 57 急性眼毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
400 mg/kg 体重		<ul style="list-style-type: none"> 眼脂增加 流唾、衰弱及び流涙 体重增加抑制 赤血球 ChE 活性阻害（28 日目まで 20%以上）
200 mg/kg 体重	<ul style="list-style-type: none"> 死亡（1 例） 自発運動低下及び流唾 赤色眼脂[§] 体重增加抑制 赤血球 ChE 活性阻害（28 日目まで 20%以上） 	
40 mg/kg 体重以上		<ul style="list-style-type: none"> 筋肉線維性収縮 立毛
20 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none"> 筋肉線維性収縮 眼脂增加 	

(2) 90 日間亜急性眼毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、2.5、5、10 及び 30 ppm：平均検体摂取量は表 58 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 58 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与量 (ppm)	2.5	5	10	30
検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.140	0.282	0.570
	雌	0.169	0.331	0.648

検体投与の影響は網膜電図に比し ChE 活性においてより鋭敏に認められ、また、ChE 活性が明瞭に阻害される 30 ppm 投与群においても網膜電図及び電子顕

微鏡的観察に毒性学的影響はなかった。(参照 5、72、88)

(3) 亜急性暴露試験(ヒト)

ヒト(男性8名、女性4名、平均年齢33歳；23～50歳)に検体(0.18mg/kg体重/日)を4日間連続適用し、その後最低2週間、最大5か月間の間隔を設け、0.36mg/kg体重/日(高量試験)を同様に4日間連続適用して、血漿及び赤血球ChE活性への影響、薬物動態並びに尿中代謝物を検査し、併せて血液生化学的検査、血液学的検査及び臨床症状への影響を調査する亜急性暴露試験が実施された。

全ての被験者の血漿及び赤血球のChE活性に臨床的に問題になる阻害(各人の試験前値に比し25%以上)は認められなかった。

被験者1名が0.18mg/kg体重/日の適用期間中に発汗及び腹痛のコリン作動性症状を訴えたが、ChE活性は血漿及び赤血球とともにいずれの測定時にも異常はなかった。したがって、本酵素活性阻害を伴わない臨床症状の原因は不明であるが、本人が自覚しない程度の病的状態(風邪、軽度の感染等)、あるいは自分自身が適用することへの影響があった可能性もあり、検体適用の影響ではないと判断した。

検体は用いた用量において人に認めうる毒性をもたらさなかったと考えられた。(参照5、73、88)

(4) 酵素に対する影響①

ラットにフェニトロチオンを261mg/kg体重で投与すると、72時間以内に肝臓及び精巣のシトクロムP450活性の低下が生じ、結果として血清テストステロンの濃度が正常の25%に減少したが、5日後までに回復した。また、5.5mg/kg体重/日の用量で30日間処理した場合には、酵素活性に影響はなく、血清テストステロン濃度にも影響しなかった。(参照78)

(5) 酵素に対する影響②

Wistarラット(雄:匹数不明)にフェニトロチオンを0、7.25及び14.5mg/kg体重/日で28日間強制経口投与した結果、14.5mg/kg体重/日投与群では、7日後に血漿コルチコステロン及びグルコース濃度がそれぞれ2.5倍($p<0.01$)及び30%となり、2週間後までに副腎重量が1.35倍($p<0.05$)に増加した。しかし、これらの変化は一過性で、試験終了時には対照群と同程度に回復した。同様な変化が他の用量でも認められたが、統計学的に有意な変化は認められなかった。

(参照78)

III. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬及び動物用医薬品「フェニトロチオン」の食品健康影響評価を実施した。

^{14}C で標識したフェニトロチオンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与されたフェニトロチオンの体内吸収率は少なくとも 86.0% と算出された。血中における $T_{1/2}$ は 4.7~11 時間であり、その後血中濃度は速やかに減少し、投与後 168 時間に 95%TAR 以上が尿糞中に排泄され、蓄積傾向はみられなかった。投与放射能は主に尿中に排泄された。臓器及び組織中残留放射能濃度は、 T_{max} 付近では肝臓、腎臓及び消化管で高かったが速やかに減少し、特定の臓器及び組織への残留傾向は認められなかった。尿中の主要代謝物は低用量投与群では Gb であり、Ga、そして遊離の G がこれに続いた。高用量投与群では脱メチル体 E が多く、続いて Gb であった。

山羊の糞尿中における主要代謝物は C で、ほかに K 及び Ca が認められた。乳汁中に Ca が認められたが、残留量は僅か ($0.004 \mu\text{g/g}$) であった。鶏の主要代謝物として G、Gb 及び E が認められ、卵における主要代謝物は G 及び Gb であった。うずらの主要代謝物として G 及び Gb が認められた。

植物体内運命試験の結果、いずれの植物においても残留放射能の主要成分は代謝物 G、Gc 及び G のその他の抱合体 (43.1~81.1%TRR) であり、未変化のフェニトロチオンは僅かで、速やかに代謝されると考えられた。

フェニトロチオンを分析対象化合物として作物残留試験が実施され、最大残留値は、温州みかん（果皮）の 19.2 mg/kg であった。

畜産物残留試験において、経口投与では、畜産動物（牛及び鶏）の各臓器、乳汁及び卵中の残留量は僅かであり、乳汁中に未変化のフェニトロチオンに加えて、代謝物 C（最大 $0.17 \mu\text{g/mL}$ ）が認められた。噴霧投与（牛、豚及び鶏）では、フェニトロチオンの残留は主に皮膚及び脂肪でみられ、鶏の皮膚中で最大の残留 ($1.21 \mu\text{g/g}$) が認められた。

魚介類におけるフェニトロチオンの最大推定残留値は 0.240 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、フェニトロチオン投与による影響として、主に ChE 活性阻害が認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遅発性神経毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

なお、ヒトに対する亜急性暴露試験において $0.18\sim0.36 \text{ mg/kg}$ 体重/日の経口摂取によって明確な毒性発現は認められなかった。

各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をフェニトロチオン（親化合物のみ）と設定した。

各評価機関の評価結果及び各試験における無毒性量等は表 59 に示されている。

食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.49 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した

0.0049 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量 (ADI) と設定した。

ADI	0.0049 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	0.49 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。

表 59 各評価機関の評価結果及び各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会	
ラット	6か月間 亜急性毒性試験	0、10、30、 150 ppm 雄: 0、0.59、 1.83、9.16 雌: 0、0.64、 2.00、11.2	0.6 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害		0.6 未満	雄: 1.83 雌: 0.64 雌雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)	雄: 1.83 雌: 0.64 雌雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)
	90日間 亜急性神経毒性試験	0、6、20、60、 200 ppm 雄: 0、0.30 ~0.58、1.00 ~1.97、3.05 ~5.88、10.6 ~18.5 雌: 0、0.38 ~0.59、1.27 ~1.99、3.96 ~5.96、14.9 ~20.7	1.32 体重増加抑制 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害	1.32		雄: 1.00~ 1.97 雌: 1.27~ 1.99 雌雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) (神経毒性は認められない)	NOAEL の記載なし 雌雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) (神経毒性は認められない)
	2年間 慢性毒性 / 発がん性併合試験	0、10、30、 100 ppm 雄: 0、0.49、 1.45、5.05 雌: 0、0.62、 1.81、6.46	0.5 (発がん性は認められない)	0.5 赤血球及び 脳 ChE 活性阻害		雄: 0.49 雌: 0.62 雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) 雌: 脳 ChE(20%活性阻害) (発がん性は認められない)	雄: 0.49 雌: 0.62 雄: 赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上) 雌: 脳 ChE 活性阻害(20%以上) (発がん性は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会	
2 世代繁殖試験	0、10、40、120 ppm P 雄: 0、0.7、2.7、8.0 P 雌: 0、0.7、3.1、9.6 F ₁ 雄: 0、0.7、2.8、8.8 F ₁ 雌: 0、0.8、3.3、11.1	親動物 : 0.65 児動物 : 3.1 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 : 0.7 児動物 : 3.1 親 : 体重増加抑制 児動物 : 体重增加抑制、胎児生存率低下 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 雄 : 0.65 雌 : 0.74 児動物 : 3.07 親 : 体重増加抑制 児動物 : 体重增加抑制、胎児生存率低下 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 0.7 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 0.8 児動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 3.1 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 3.3 親及び児動物 雌雄 : 体重增加抑制 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 0.7 F ₁ 雄 : 0.7 F ₁ 雌 : 0.8 児動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 3.1 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 3.3 親動物及び児動物 雌雄 : 体重增加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物及び児動物 P 雄 : 0.7 P 雌 : 0.7 F ₁ 雄 : 0.7 F ₁ 雌 : 0.8 児動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 3.1 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 3.3 親動物及び児動物 雌雄 : 体重增加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)
1 世代繁殖試験	0、10、20、60 ppm P 雄: 0、0.64、1.28、3.81 P 雌: 0、0.71、1.38、4.26 F ₁ 雄: 0、0.87、1.75、5.57 F ₁ 雌 : 0、0.87、1.82、5.58					親動物 : P 雄 : 3.81 P 雌 : 1.38 F ₁ 雄 : 5.57 F ₁ 雌 : 1.82 児動物 P 雄 : 3.81 P 雌 : 4.26 F ₁ 雄 : 5.57 F ₁ 雌 : 5.58 親動物 雄 : 毒性所見なし 雌 : 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等	親動物 : P 雄 : 1.28 P 雌 : 0.71 F ₁ 雄 : 1.75 F ₁ 雌 : 0.87 児動物 P 雄 : 3.81 P 雌 : 4.26 F ₁ 雄 : 5.57 F ₁ 雌 : 5.58 親動物 雌雄 : 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) 等 児動物: 毒性所見なし

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾			
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会
					児動物：毒性所見なし (繁殖能に対する影響は認められない)	(繁殖能に対する影響は認められない)
発生毒性試験①	0、2、7、20				母動物：7 胎児：7 母動物：体重增加抑制等 胎児：出生時の軽度な低体重 (催奇形性は認められない)	母動物：7 胎児：20 母動物：体重增加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
発生毒性試験②	0、3、8、25	母動物：8 胎児：25 (催奇形性は認められない)			母動物：8 胎児：25 母動物：体重增加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：8 胎児：25 母動物：体重增加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
マウス	2年間慢性毒	0、3、10、100、1,000 ppm	1.4		雄：1.45 雌：1.51	雄：1.44 雌：1.51

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会	
	性 / 発がん性併合試験	雄: 0、0.376、1.45、12.6、134 雌: 0、0.454、1.51、13.1、144	(発がん性は認められない)	(発がん性は認められない)	(発がん性は認められない)	雌雄: 赤血球 ChE 及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	雌雄: 赤血球 ChE 及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) (発がん性は認められない)
	18か月間発がん性試験	0、30、100、200 ppm 雄: 0、3.10、10.8、21.5 雌: 0、3.69、12.0、24.4				雄: 3.10 雌: 12.0 雌雄: 心臓絶対及び比重減少等 (発がん性は認められない)	雄: 21.5 雌: 24.4 雌雄: 毒性所見なし (発がん性は認められない)
ウサギ	6か月間亜急性毒性試験	0、3、10				雄: - 雄: 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上) 血液像、肝及び腎機能、脳は、外眼筋神経終板などに対して特記すべき変化なし	NOAEL の記載なし 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上) 血液像、肝及び腎機能、脳は、外眼筋神経終板などに対して特記すべき変化なし
	発生毒性試験	0、3、10、30	母動物: 10 胎児: 30	母動物: 10 胎児: 30 母動物: 流産 胎児: 毒性所見なし		母動物: 10 胎児: 30 母動物: 体重增加抑制等 胎児: 毒性所見なし	母動物: 10 胎児: 30 母動物: 振戦、流産等 胎児: 毒性所見なし

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会	
イヌ	2年間慢性毒性試験	0、30、100、200 ppm 雄: 0、0.98、3.34、6.97 雌: 0、1.08、3.60、7.40				(催奇形性は認められない)	(催奇形性は認められない)
	1年間慢性毒性試験 ①	0、5、10、50 ppm 雄: 0、0.17、0.33、1.57 雌: 0、0.15、0.29、1.59	1.6		0.2 血漿 ChE 活性阻害	雄: 0.98 雌: 1.08 雌雄: 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	雄: 0.98 雌: 1.08 雌雄: 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)
鶏	28日間亜急性遅発性神経毒性試験	0、16.7、33.4		(遅発性神経毒性は認められない)		雌: - 雌: 体重減少等 (遅発性神経毒性は認められない)	NOAEL の記載なし (遅発性神経毒性は認められない)
サル	2年間慢性毒性試験	0、0.1、0.5、2			0.5 雌雄: 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	0.5 雌雄: 赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)	
ADI		NOAEL : 0.6 SF : 100 ADI : 0.006	NOAEL : 0.5 SF : 100 ADI : 0.005	NOEL : 0.2 SF : 100 ADI : 0.002	NOAEL : 0.49 SF : 100 ADI : 0.0049	NOAEL : 0.5 SF : 100 ADI : 0.005	

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	EU	豪州 ²⁾	食品安全委員会農薬専門調査会及び動物用医薬品専門調査会	参考 (農薬抄録)
ADI 設定根拠資料		ラット overall NOAEL	2年間慢性 毒性/発が ん性併合試 験	イヌ 1年間 慢性毒性試 験	ラット 2年 間 慢性毒性/ 発がん性併 合試験	ラット 2年 間 慢性毒性/発 がん性併合 試験	

ADI : 一日摂取許容量 SF : 安全係数 NOAEL : 無毒性量 NOEL : 最大無作用量 - : 無毒性
量は設定できない / : 記載なし

1) : 無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。2) : 豪州では NOEL を記載

<別紙1：代謝物/分解物略称>

記号	略号	化学名
B	FNO (SMO) (MEP-オクソ ン) (II)	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphate
C	アミノ-MEP AM-FNT (III) 4-amino- fenitrothion	<i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O,O</i> -dimethylphosphoro-thioate <i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O,O</i> -dimethylthiophosphate <i>O,O</i> -dimethyl- <i>O</i> -(3-methyl-4-aminophenyl) phosphoro thioate
Ca	アミノ-MEP -N-硫酸 <i>N</i> -Sulfo aminofenitro- thion	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-sulfo aminophenyl)phosphorothioate
D	SM-FNT (SCH ₃ -SMT) (MEP-S-メ チル異性体) (IV)	<i>O,S</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphoro-thioate <i>O,S</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate
E	DM-FNT (DM-SMT) (デスマチル- MEP) (V)	<i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-phosphorothioate <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphate
F	DM-FNO (VI)	<i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-phosphate
G	NMC (3-メチル-4- -ニトロフェ ノール) (VII)	3-methyl-4-nitrophenol
Ga	NMC-glucuro nide (VIII)	1- <i>O</i> β-D-(glucuronosyl)-3-methyl-4-nitrophenol
Gb	NMC-sulfate (VIII)	3-methyl-4-nitrophenyl sulfate
Gc	NMC-β-Glc (VIII)	1- <i>O</i> β-D-(glucopyranosyl)-3-methyl-4-nitrophenol
H	HM-NMC (IX)	3-(hydroxymethyl)-4-nitrophenol 5-hydroxy-2-nitrobenzylalcohol

I	CA-NMC (X)	5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid
J	NMA	4-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene
K	DM-AA-FNO (XVII)	<i>O</i> -(4-acetylamino-3-methylphenyl) <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl phosphate
M	(XIV)	3-methyl-4-aminophenol
Ma	(XIVa)	3-methyl-4-aminophenyl sulfate
N	HM-AMC	4-acetylamino-3-hydroxymethylphenol
O	CA-FNT (3-カルボキシ-MEP) (XV)	5-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 5-[(dimethoxythiophosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
P	CA-FNO (COOH-SMO) (XVI)	5-[(dimethoxyphosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Q	CA-FNT dimer (カルボキシ-MEP 縮合物) (XXVIII)	5-(dimethoxyphosphorothioyl)oxy-2-{5-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-2-nitrobenzoylamino}benzoic acid 5-(dimethoxythiophosphoryl)oxy-2-{5-[(dimethoxythiophosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoylamino}benzoic acid
R	DMPTA	dimethyl phosphorothioic acid dimethyl hydrogen thiophosphate
S	DMPA	dimethyl phosphoric acid dimethyl hydrogen phosphate

＜別紙2：検査値等略称＞

略称	名称
水産 PEC	水産動植物被害予測濃度
ACh	アセチルコリン
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量
Alb	アルブミン
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
AUC	薬物血中濃度－時間曲線下面積
BCF	生物濃縮係数
BUN	血液尿素窒素
ChE	コリンエステラーゼ
C _{max}	最高濃度
GC-MS	ガスクロマトグラフィー質量分析
Glu	グルコース (血糖)
His	ヒスタミン
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
PHI	最終使用から収穫までの日数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与(処理)放射能
T.Chol	総コレステロール
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成

<別紙3：作物残留試験成績>

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 (露地) (玄米) 昭和48年度	750 ^{EC}	1	1	31	<0.002	<0.002	0.005	0.004
		1		28	0.003	0.003	0.002	0.002
		1		34	<0.002	<0.002	0.002	0.002
	空中散布	1		31			0.007	0.007
		1		42	<0.002	<0.002	0.005	0.004
		1		28	<0.002	<0.002	0.002	0.002
		1		34	<0.002	<0.002	0.002	0.002
		1						
水稻 (稻わら) 昭和48年度	750 ^{EC}	1	1	31	0.007	0.007	0.017	0.016
		1		28	0.019	0.018	0.043	0.040
		1		34	0.033	0.032	0.068	0.064
	空中散布	1		31			0.017	0.016
		1		42	0.073	0.068	0.060	0.058
		1		28	0.005	0.004	0.018	0.017
		1		28	0.049	0.046	0.087	0.086
		1						
水稻 (露地) (玄米) 昭和53年度	750 ^{EC}	1	1	53	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002
		1		37	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	750 ^{EC} 空中散布	1		47	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002
		1		37	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	500 ^{EC}	1		109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	500 ^{EC} 空中散布	1		109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
水稻 (稻わら) 昭和53年度	750 ^{EC}	1	1	53	0.01	0.01	0.004	0.004
		1		37	0.03	0.02	0.021	0.020
	750 ^{EC} 空中散布	1		47	<0.01	<0.01	0.007	0.007
		1		37	0.07	0.07	0.072	0.068
	500 ^{EC}	1		109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
	500 ^{EC} 空中散布	1		109	0.01	0.01	0.005	0.005
水稻 (露地) (玄米) 平成 4 年度	500 ^{MC} 空中散布	1	1	26	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
		1		46	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
	500 ^{MC}	1	1	41	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
		1		46	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
水稻 (露地) (稻わら) 平成 4 年度	500 ^{MC} 空中散布	1	1	26	<0.02	<0.02	0.18	0.18
		1		46	<0.02	<0.02	0.01	0.01
	500 ^{MC}	1	1	41	0.17	0.16	0.02	0.02
		1		46	0.04	0.04	0.07	0.06
水稻 (露地) (青刈り) 平成 4 年度	500 ^{MC} 空中散布	1	1	16			0.08	0.08
		1		22			0.03	0.02
	500 ^{MC}	1	1	16			0.02	0.02
		1		22			0.04	0.04
水稻 (露地) (玄米) 平成 5 年度	0.5% ^{EC} 種子浸漬	1	1	175			<0.01	<0.01
	0.05% ^{EC} 種子浸漬	1		190			<0.01	<0.01
水稻 (露地) (玄米) 平成 8 年度	0.05% ^{EC} 種子浸漬	1	1	177	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		146	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		179	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		146	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水稻 (露地) (玄米) 平成 9 年度	0.25 ml/箱	1	1	136	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
		1		124	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 (露地) (稻わら) 平成 9 年度	0.25 ml/箱	1		136	<0.02	<0.02	<0.05	<0.05
		1		124	<0.02	<0.02	<0.05	<0.05
水稻 (露地) (玄米) 平成 10 年度	500WP 空中散布	1	21	21			<0.005	<0.005
		1					0.046	0.046
	500EC	1		21			<0.005	<0.005
	750EC	1					0.049	0.048
小麦 (露地) (種子) 昭和 54 年度	500EC 空中散布	1		6	0.04	0.04	0.052	0.048
				10	0.06	0.06	0.060	0.059
				15	0.10	0.10	0.059	0.057
				20	0.04	0.04	0.043	0.043
				35	0.05	0.04	0.016	0.016
	500EC	1		7	0.04	0.04	0.029	0.029
				13	0.03	0.03	0.029	0.027
				18	0.02	0.02	0.011	0.011
				21	<0.01	<0.01	0.010	0.010
				38	0.02	0.02	0.010	0.010
	500EC	1		6	0.13	0.12	0.056	0.050
				10	0.03	0.03	0.028	0.028
				15	<0.01	<0.01	0.003	0.003
				20	<0.01	<0.01	0.003	0.003
	750EC	1		35	<0.01	<0.01	0.002	0.002
				7	0.02	0.02	0.016	0.016
				13	0.03	0.03	0.014	0.014
				18	0.04	0.04	0.006	0.006
				38	<0.01	<0.01	0.006	0.006
大麦 (露地) (種子) 平成 8 年度	500EC 空中散布	1	1	7			0.05	0.05
		1		7			0.43	0.42

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
とうもろこし (露地) (生食用子実) 昭和 57 年度	1,000~1,500 ^{EC}	2	4	7 14	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	
とうもろこし (露地) (乾燥子実) 昭和 57 年度	1,000 ^{EC}	1	4	7	0.005	0.005	<0.005	<0.005	
	1,500 ^{EC}	1		7	0.045	0.044	<0.005	<0.005	
とうもろこし (露地) (青刈り) 平成 3 年度	550~1,250 ^{EC}	1	4	7 14	/		0.43 0.15	0.42 0.15	
		1,250 ^{EC}		7 14	/		1.46 0.65	1.45 0.62	
	500 ^{EC}	1		28	0.33	0.32	0.15	0.15	
				42	0.02	0.02	<0.02	<0.02	
		2		56	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
				84	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
飼料用 とうもろこし (露地) (茎葉) 平 16 年度	500 ^{EC}	1	2	28	0.17	0.17	0.15	0.14	
				42	<0.02	<0.02	0.06	0.06	
				56	0.02	0.02	0.03	0.03	
				84	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
だいす (露地) (乾燥子実) 昭和 46 年度	714 ^{EC}	1	2	56	/		0.002	0.002	
			3	43	/		0.002	0.002	
		1	2	55	/		0.005	0.004	
			3	55	/		0.001	0.001	
だいす (露地) (乾燥子実) 昭和 55 年度	750 ^{EC} 空中散布	2	3	45	<0.005	<0.005	/		
	900 ^{EC}	2			<0.005	<0.005	/		
だいす (露地) (乾燥子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC}	2	4	21 31	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
だいす (露地) (乾燥子実) 平成 9 年度	500 ^{EC} 空中散布	2	4	21			<0.01	<0.01
いんげんまめ (露地) (乾燥子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC}	1	4	21	0.01	0.01	0.01	0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		21	0.02	0.02	0.02	0.02
あずき (露地) (乾燥子実) 昭和 59 年度	1,250 ^{EC}	1	4	21	0.069	0.068	0.046	0.044
				21	0.061	0.061	0.039	0.038
		1		21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
あずき (露地) (乾燥子実) 平成 15 年度	500 ^{EC}	2	4	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
えんどうまめ (施設) (乾燥子実) 平成 2,3 年度	1,000～1,250 ^{EC}	2	4	30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1		3			0.03	0.03
そらまめ (露地) (豆) 平成 19 年度	1,000 ^{EC}		3	7			0.03	0.03
				14			0.02	0.02
		1		3			0.01	0.01
らっかせい (露地) (乾燥子実) 平成 2 年度	1,000～1,250 ^{EC}	2	4	7			<0.01	<0.01
				14			<0.01	<0.01
		1		21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ばれいしょ (露地) (可食部) 昭和 48 年度	750 ^{EC}	1	3	3	<0.002	<0.002	0.002	0.002
			3	7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			14	14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			6	3	<0.002	<0.002	0.004	0.004
	500 ^{EC}	1	3	7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			14	14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			6	3	<0.002	<0.002	0.002	0.002
			14	7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			14	14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ばれいしょ (露地) (塊茎) 平成 15 年度	500 ^{EC}	2	6	3	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			6	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			14	14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
かんしょ (露地) (塊茎) 昭和 61 年度	600 ^{EC}	2	5	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			5	14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
かんしょ (露地) (塊茎) 平成 3 年度	1,000 ^{EC}	2	5	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			5	14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			5	21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
こんにやく (露地) (球茎) 昭和 58 年度	750～1,000 ^{EC}	1	2	34	<0.02	<0.02	/	
	1,100 ^{EC}	1		65	<0.02	<0.02	/	
こんにやく (露地) (球茎) 平成 3 年度	1,000 ^{EC}	2	3	14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			3	21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
さとうきび (露地) (茎) 昭和 47 年度	1,200 ^{MG}	1	2	101 ^a	0.001	0.001	0.001	0.001	
				151	0.011	0.011	0.011	0.011	
さとうきび (露地) (茎及び葉) 昭和 49 年度	1,000 ^{EC}	1	2	7 ^a			0.025	0.022	
				15 ^a			0.003	0.002	
		1		7 ^a			0.017	0.013	
				14 ^a			0.006	0.005	
さとうきび (露地) (茎) 昭和 49 年度	1,000 ^{EC}	1	4 ^a	36 ^a			0.041	0.036	
				98 ^a			0.057	0.052	
さとうきび (露地) (茎) 昭和 59 年度	1,500 ^{EC}	1	4 ^a	0.029	0.028	0.005	0.004		
				0.012	0.012	0.012	0.012		
さとうきび (露地) (茎及び葉) 平成 5 年度	1,200 ^{EC} 空中散布	1	1	30 ^a			0.008	0.008	
				60 ^a			<0.005	<0.005	
		1		30 ^a			0.010	0.009	
				60 ^a			<0.005	<0.005	
	750 ^{EC}	2		30 ^a			<0.005	<0.005	
				60 ^a			<0.005	<0.005	
さとうきび (露地) (茎) 平成 6 年度	1,000 ^{MC}	1	4 ^a	31 ^a			<0.005	<0.005	
				61 ^a			<0.005	<0.005	
		1		90 ^a	0.005	0.005	<0.005	<0.005	
				120	0.006	0.006	<0.005	<0.005	
ごぼう (露地) (根部) 昭和 59 年度	1,000 ^{EC}	1	14	88 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				119	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
たまねぎ (露地) (鱗茎) 平成 2 年度	857~1,071 ^{EC}	2	2	21 30	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
根深ねぎ (露地) (茎葉) 平成 2 年度	1,071 ^{EC}	2	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ねぎ (施設) (無袋) (茎葉) 2007 年	1,428 ^{EC}	1	2	21 30	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
らっきょう (露地) (鱗茎) 平成 17 年度	500~1,000 ^{EC}	2	2	14 21 30	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02
トマト (施設) (果実) 平成 4 年度	625~750 ^{EC}	1	2	14	0.03	0.03	0.03	0.02
		1			0.01	0.01	<0.01	<0.01
なす (露地) (可食部) 昭和 47 年度	1,000 ^{EC}	1	3	3 7 14	0.002 0.002 0.002	0.002 0.002 0.002	/	
	750~1,500 ^{EC}	1		3 7 14	0.002 <0.001 <0.001	0.002 <0.001 <0.001	/	
なす (施設) (果実) 昭和 60 年度	1,000 ^{EC}	1		3	0.042	0.040	0.062	0.062
		1	5	3	0.004	0.004	0.007	0.007
なす (施設) (果実) 平成元年度	1,000 ^{EC}	1			/		0.02	0.02
		1	5	3	/		0.01	0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
きゅうり (施設) (果実) 昭和 60 年度	1,000 ^{EC}	1	5	1	0.032	0.030	0.023	0.022
				3	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		1	5	1	0.058	0.058	0.059	0.059
				3	0.010	0.010	0.005	0.005
きゅうり (施設) (果実) 平成 2 年度	1,785 ^{EC}	1	3	1	0.02	0.02	0.03	0.03
				3	<0.01	<0.01	0.02	0.02
		1	5	1	0.02	0.02	0.03	0.02
				3	<0.01	<0.01	0.02	0.02
		1	3	1	0.04	0.04	0.04	0.04
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1	5	1	0.02	0.02	0.03	0.02
				3	<0.01	<0.01	0.02	0.02
かぼちゃ (施設) (果実) 平成 3 年度	1,428 ^{EC}	1	3	14	0.033	0.031	0.032	0.032
					0.009	0.009	0.011	0.010
		1						
しろうり (露地) (果実) 平成 3 年度	87~1,000 ^{EC}	1	5	3			<0.01	<0.01
				7			<0.01	<0.01
				14			<0.01	<0.01
しろうり (露地) (果実) 平成 4 年度	212~1,000 ^{EC}	1	5	1	0.02	0.02	0.02	0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		1	5	1	0.01	0.01	0.01	0.01
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
すいか (露地) (可食部) 昭和 51 年度	714~2,500 ^{EC}	2	6	3	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001
メロン (施設) (果実) 昭和 59 年度	1,000 ^{EC}	2	5	1	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
				3	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験圃場数	回数(回)	PHI(日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
ほうれんそう (施設) (茎葉) 平成元年度	750 ^{EC}	1	2	21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
	1,000 ^{EC}	1		21	0.006	0.006	0.02	0.02	
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
	375~500 ^{EC}	2		21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	
さやえんどう (施設) (さや) 平成 3 年度	1,000 ^{EC}	1	4	21	<0.01	<0.01	0.07	0.07	
				28	<0.01	<0.01	0.02	0.02	
	1,250 ^{EC}	1		21	<0.01	<0.01	0.02	0.02	
				30	<0.01	<0.01	0.01	0.01	
さやいんげん (露地) (子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC}	1	4	21	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
		1		21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
しいたけ (露地 又は施設) (乾燥子実) 昭和 57 年度	133~158 ^{EC} mL/m ² ほど木	1 露地	2 ^a	605	0.004	0.004	<0.005	<0.005	
				592	0.004	0.004	<0.005	<0.005	
		1 施設		3	0.031	0.030	0.04	0.04	
				7	0.016	0.016	0.02	0.02	
未成熟 そらまめ (露地) (子実) 平成 7 年度	1,500 ^{EC}	1	3	13	0.005	0.004	<0.01	<0.01	
				3	0.007	0.006	0.01	0.01	
				7	0.009	0.009	0.01	0.01	
		1		14	0.002	0.002	<0.01	<0.01	
				21	0.12	0.12	0.07	0.07	
				30	0.10	0.09	0.10	0.10	
えだまめ (露地) (子実： さやを含む) 平成 2 年度	1,250 ^{EC}	1	4	21	0.19	0.18	0.15	0.15	
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
		1		21	0.19	0.18	0.15	0.15	
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
たらのき (露地) (可食部) 平成 6 年度	9,000 ^{EC} 茎葉散布	2	2	227	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
モロヘイヤ (露地) (茎葉) 平成 7 年度	2,000 ^{EC} 茎葉散布	1	14 21	14 21	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
					<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
		1	14 21	226 139	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
					<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
うど (露地 又は施設) (茎) 平成 6 年度	1,000～2,125 ^{EC} 茎葉散布 株養成期：露地 収穫期： 施設	1	226 139	226 139	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
					<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
		1	60 300	60 300	0.01 <0.01	0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
					<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
オリーブ (露地) (果実) 平成 6 年度	20 mL ^{EC} /樹 樹幹散布	1	2 3	60 300	0.01 <0.01	0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
					<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
		1	2 3	60 300	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
					<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
オリーブ (露地) (無袋) (葉) 平成 16 年度	4,000 ^{EC} 樹幹散布	1	120	120	<0.02 0.04	<0.02 0.04		
					<0.02 0.04	<0.02 0.04		
わらび (露地又は 施設) (無袋) (茎葉) 平成 16 年度	1,000 ^{EC} 株養成期：露地 収穫期： 施設	1	2	83	<0.005	<0.005		
わらび (露地又は 施設) (無袋) (茎葉) 平成 17 年度	1,000 ^{EC} 株養成期：露地 収穫期： 施設	1	2	89	<0.005	<0.005		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
温州みかん (露地) (果肉) 昭和 49 年度	1,333 ^{EC} 空中散布	1	1	202	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003
	2,500 ^{EC}				<0.001	<0.001	<0.003	<0.003
温州みかん (露地) (果皮) 昭和 49 年度	1,333 ^{EC} 空中散布	1	1	202	<0.002	<0.002	0.004	0.004
	2,500 ^{EC}				<0.002	<0.002	0.004	0.004
温州みかん (露地) (果肉) 昭和 57 年度	9,009 ^{EC}	1	1	14 21 28			<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005
温州みかん (露地) (果皮) 昭和 57 年度	9,009 ^{EC}	1	1	14 21 28			3.73 2.53 2.46	3.56 2.50 2.44
温州みかん (露地) (果肉) 昭和 63 年度	3,000 ^{EC}	1	3	14 21			<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
				30 45			<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
温州みかん (露地) (果皮) 昭和 63 年度	3,000 ^{EC}	1	3	14 21 30 45			8.82 8.45 7.49 5.97	8.71 8.42 7.42 5.94
				14 21 30 45			19.2 17.5 16.1 12.7	18.8 17.3 16.0 12.6
温州みかん (露地) (無袋) (果肉)	2,000 ^{EC}	2	3	14 21 30 45	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
平成元年度			5	14 21 30 45	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
温州みかん (露地) (無袋) (果皮) 平成元年度	2,000 ^{EC}	1	3	14 21 30 45	7.42 4.94 7.09 5.78	7.24 4.78 7.08 5.68	5.56 6.32 6.12 5.05	5.46 6.03 5.92 4.79
				14 21 30 45	6.56 8.03 8.46 6.30	6.48 7.95 8.17 6.30	7.56 9.42 7.78 6.70	7.24 9.30 7.58 6.61
			3	14 21 30 45	4.99 4.03 5.14 4.35	4.76 3.92 4.90 4.21	5.02 4.54 4.76 4.82	4.98 4.40 4.71 4.68
				14 21 30 45	7.24 6.16 7.43 6.91	7.22 6.08 7.35 6.58	7.20 6.28 7.68 6.27	7.16 6.22 7.68 6.16
		1	5	14 21 30 45	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14 21 30 45	1.07 1.85	1.04 1.84	0.79 1.45	0.75 1.44
			2	14	0.57	0.54	0.56	0.56
				21	0.88	0.86	0.67	0.66
温州みかん (露地) (無袋) (果肉) 平成 6 年度	2,500 ^{EC} 空中散布	5	14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
温州みかん (露地) (無袋) (果皮) 平成 6 年度	2,500 ^{EC} 空中散布	1	5	14	1.07 1.85	1.04 1.84	0.79 1.45	0.75 1.44
なつみかん (露地) (無袋) (果実全体) 平成 6 年度	2,500 ^{EC}	1	3	21	0.57 0.88	0.54 0.86	0.56 0.67	0.56 0.66

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
いよかん (露地) (無袋) (果肉) 平成 6 年度	2,500 ^{EC} 空中散布	2	5	13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
いよかん (露地) (無袋) (果皮) 平成 6 年度	2,500 ^{EC} 空中散布	1 1	5	13	1.38 1.03	1.36 1.03	0.42 0.62	0.39 0.59
いよかん (露地) (無袋) (果実全体 : 計算値) 平成 6 年度	2,500 ^{EC} 空中散布	1 1	5	13	— —	0.50 0.41	— —	0.14 0.20
りんご (露地) (果実) 昭和 47 年度	2,500~3,000 ^{EC}	1 1	3	30 29	0.046 0.052	0.044 0.052		
りんご (露地) (果実) 昭和 51 年度	1,500 ^{EC} 少量散布	1 1	3	28 ^a	0.09 0.12	0.08 0.12	0.139 0.178	0.130 0.174
りんご (露地) (無袋) (果肉) 昭和 53 年度	200 ^{EC} 主幹部塗布	1	1	159			<0.002	<0.002
りんご (露地) (無袋) (果皮) 昭和 53 年度	200 ^{EC} 主幹部塗布	1	1	159			<0.002	<0.002

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					フェニトロチオン					
					公的分析機関		社内分析機関			
					最高値	平均値	最高値	平均値		
りんご (露地) (無袋) (果実) 平成 2 年度	2,000 ^{EC}	1	3	30	0.13	0.13	0.11	0.11		
			1		0.11	0.10	0.12	0.12		
りんご (露地) (無袋) (果実) 平成 4 年度	1,500 ^{EC}	1	3	30			0.11	0.11		
りんご (露地) (無袋) (果実) 平成 5 年度	2,000 ^{EC}	1	3	30			0.02	0.02		
		45				0.01	0.01			
	1,500 ^{EC}	1	3	30			<0.01	<0.01		
		45				<0.01	<0.01			
りんご (露地) (無袋) (果実) 平成 6 年度	2,000 ^{EC}	1	3	30			0.10	0.10		
		1					0.01	0.01		
りんご (露地) (無袋) (果実) 平成 7 年度	1,500～2,000 ^{EC} 茎葉散布	2	3	30			0.01	0.01		
		1		30			0.03	0.02		
		1		30			0.08	0.08		
		1		30			0.04	0.04		
日本なし (露地) (無袋) (果実) 昭和 62 年度	2,000 ^{EC}	1	6	21	0.045	0.042	0.048	0.048		
		30		0.017	0.016	0.016	0.016	0.016		
		1		21	0.152	0.148	0.119	0.118		
	2,000 ^{WP}	28		0.104	0.097	0.105	0.103			
		1		21	0.006	0.006	0.006	0.006		
		30		0.005	0.005	<0.005	<0.005			
		1		21	0.111	0.108	0.091	0.089		
		28		0.121	0.117	0.053	0.051			

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
日本なし (露地) (有袋) (果実) 平成 2 年度	2,000 ^{EC}	1	6	14	0.03	0.03	0.04	0.04
					0.08	0.08	0.10	0.10
		1		14				
日本なし (露地) (果実) 平成 5 年度	2,500 ^{EC}	1	6	21			0.12	0.11
				30			0.02	0.02
	2,000 ^{EC}	1		21			0.12	0.12
				30			0.05	0.05
日本なし (露地) (無袋) (果実) 平成 6 年度	2,000 ^{EC}	1	6	21			0.06	0.05
		1					0.05	0.05
日本なし (露地) (有袋) (果実) 平成 6 年度	2,000 ^{EC}	1	6	14			<0.01	<0.01
		1					0.03	0.02
							0.04	0.04
日本なし (露地) (無袋) (果実) 平成 7 年度	2,000 ^{EC} 茎葉散布	1	6	21			0.08	0.08
		1					0.06	0.06
							0.03	0.03
日本なし (露地) (有袋) (果実) 平成 7 年度	2,000 ^{EC} 茎葉散布	1	6	14			0.09	0.08
もも (露地) (無袋)	2,000 ^{EC}	1	3	3	0.073	0.070		
			7	7	0.032	0.030		
			14	14	0.005	0.005		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度 (果肉) 昭和 47 年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
もも (露地) (無袋) (果皮) 昭和 47 年度	2,500 ^{EC}	1	3	3	0.080	0.074		
			6	7	0.067	0.064		
			14	14	0.009	0.008		
			3	3	0.073	0.071		
			6	7	0.057	0.056		
	2,000 ^{EC}	1	14	14	0.011	0.010		
			3	3	0.071	0.070		
			6	7	0.054	0.053		
			14	14	0.015	0.014		
			3	3	2.24	2.24		
もも (果肉) 昭和 47 年度	2,500 ^{EC}	1	7	7	1.10	1.08		
			14	14	0.416	0.364		
			3	3	2.91	2.74		
			6	7	1.56	1.54		
	2,000 ^{EC}	1	14	14	0.580	0.540		
			3	3	5.59	5.52		
			6	7	6.15	6.02		
			14	14	2.09	1.98		
もも (露地) (無袋) (果肉) 昭和 47 年度	5,000 ^{EC}	1	3	3	6.11	5.93		
			6	7	5.66	5.58		
		1	14	14	1.89	1.84		
			1	85	0.0027	0.0020	<0.001	<0.001
			2	50	0.0032	0.0026	0.002	0.002
もも (露地) (無袋) (果肉) 昭和 50 年度	0.75% ^{EC} 樹幹塗布	2	1	119	<0.0008	<0.0008	<0.001	<0.001
			2	88	<0.0008	<0.0008	<0.001	<0.001
			30		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			45		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
もも (露地) (無袋) (果皮) 昭和 50 年度	0.75% ^{EC} 樹幹塗布	2	1	30 45	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	
もも (露地) (無袋) (果肉) 平成 10 年度	2,000 ^{EC}	1	6	3 7 13	0.04 0.04 0.03	0.04 0.04 0.03	0.10 0.03 <0.01	0.10 0.03 <0.01	
				3 7 14	0.03 0.01 <0.01	0.03 0.01 <0.01	0.01 0.01 <0.01	0.01 0.01 <0.01	
				3 7 14	0.04 0.04 0.04	0.04 0.04 0.04	0.04 0.02 <0.01	0.04 0.02 <0.01	
	1,500 ^{EC}	1		3 7 14	0.04 0.04 0.04	0.04 0.04 0.04	0.04 0.02 <0.01	0.04 0.02 <0.01	
				3 7 13	26.4 13.8 9.12	25.5 13.6 9.11	23.1 8.33 4.96	22.9 7.96 4.15	
				3 8 14	4.83 1.95 0.48	4.78 1.89 0.47	2.19 1.51 0.64	2.12 1.45 0.64	
もも (露地) (無袋) (果皮) 平成 10 年度	2,000 ^{EC}	1	6	3 7 14	10.9 12.7 7.49	10.6 12.1 7.32	6.34 2.25 6.36	6.28 2.06 6.30	
				3 7 14	0.07 0.06 0.03	0.07 0.06 0.03	/		
				3 7 14	16.2 15.9 8.51	15.7 15.5 8.32	/		
もも (露地) (有袋) (果肉) 平成 10 年度	2,000 ^{EC}	1	6	3 7 14	0.07 0.06 0.03	0.07 0.06 0.03	/		
もも (露地) (有袋) (果皮) 平成 10 年度	2,000 ^{EC}	1	6	3 7 14	16.2 15.9 8.51	15.7 15.5 8.32	/		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
あんず (露地) (無袋) (果肉) 平成 5 年度	7,500 ^{EC}	1	1	105	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	15 g/樹	1		118	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ネクタリン (露地) (無袋) (果肉) 平成 17 年度	2,400 ^{EC}	2	3	124			<0.01	<0.01	
				131			<0.01	<0.01	
うめ (露地) (核を除く 果実全体) 昭和 53 年度	0.15% ^{EC} 樹幹散布	1		138			<0.01	<0.01	
	0.3% ^{EC} 樹幹散布			79			<0.004	<0.004	
	0.5% ^{EC} 樹幹散布						<0.004	<0.004	
うめ (露地) (果肉) 昭和 61 年度	12,500 ^{EC} 樹幹散布	1	1	99	0.024	0.023	0.006	0.006	
	5,000 ^{EC} 樹幹散布	1		95	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
うめ (露地) (果肉) 昭和 62 年度	4,000 ^{EC}	1	2	21	0.044	0.044	0.059	0.058	
				30	0.014	0.013	0.023	0.020	
				45	0.064	0.064	0.008	0.007	
	4,000 ^{EC}	1	2	21	0.115	0.112	0.080	0.078	
				30	0.008	0.008	<0.005	<0.005	
				45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
うめ (露地) (果実) 平成 3 年度	3,000 ^{EC}	1	2	13	0.014	0.014	0.046	0.044	
				21	0.006	0.006	0.007	0.006	
	2,000 ^{EC}	1	2	14	0.022	0.021	0.031	0.031	
				21	<0.005	<0.005	0.007	0.006	
うめ (露地) (果実) 平成 20 年度	6~10 ^{EC} g/樹	2	2	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				97	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験圃場数	回数(回)	PHI(日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
とうとう (露地) (果肉) 昭和 61 年度	2,000 ^{EC}	1	1	68	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
	2,800 ^{EC}	1		80	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
とうとう (施設) (果実) 平成 2 年度	1,500 ^{EC}	1	2	21 30	0.02 <0.01	0.02 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
	2,000 ^{EC}	1		21 30	0.02 <0.01	0.02 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01
いちご (露地) (果実) 平成 4 年度	750 ^{EC}	1	2	7	0.06	0.06	0.08	0.08
	375 ^{EC}	1			0.03	0.02	0.03	0.03
大粒種ぶどう (露地) (可食部) 昭和 53 年度	20 ^{EC} g/樹 樹幹塗布	2	1	82 又 は 103	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
大粒種ぶどう (施設) (無袋) (果実) 平成元年度	1,500 ^{EC}	1	2	21 30			0.046 0.024	0.043 0.022
		1					0.007 <0.005	0.006 <0.005
大粒種ぶどう (施設) (果実) 平成元年度	1,500 ^{EC}	1	2	21 30	0.07 0.05	0.06 0.04	0.05 0.04	0.05 0.04
		1			0.02 0.06	0.02 0.06	0.02 0.03	0.02 0.03
大粒種ぶどう (施設) (無袋) (果実) 平成 18 年度	3,000~9,000 ^{EC} 2 回まで主枝散 布 3 回目から 2.5~4 g ^{EC} /樹 樹幹散布	2	4	21 30 45	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
小粒種ぶどう (果実) 昭和 47、48 年度	4,170 ^{EC}	1	1	113	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	6,250 ^{EC}		2					
	5,000 ^{EC}	1	1	149		<0.002	<0.002	<0.002
			2	137				
小粒種ぶどう (施設) (無袋) (果実) 平成 5 年度	1,500 ^{EC}	2	4	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
小粒種ぶどう (施設) (無袋) (果実) 平成 16 年度	2 g ^{EC} /樹 樹幹塗布	2	2	21 28	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
小粒種ぶどう (施設) (無袋) (果実) 平成 18 年度	9,000~15,000 ^{EC} 2 回まで主枝散 布 3 回目から 0.7~2 g ^{EC} /樹 樹幹散布	2	4	21 30 45	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
かき (露地) (可食部) 昭和 47 年度	1,250 ^{EC}	1	3	46	0.003	0.003	<0.01	
かき (露地) (無袋) (果実) 平成元年度	2,000 ^{WP}	1	3	45	0.010	0.009	0.03	0.03
		1			0.043	0.041	0.03	0.03
かき (露地) (無袋) (果実) 平成 11 年度	1,500 ^{EC}	1	3	41	0.05	0.05	<0.01	
		1		42	0.03	0.03	<0.01	
		1		42	0.06	0.06	<0.01	
		1		42	0.01	0.01	<0.01	
		1		43	0.04	0.04	<0.01	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
	1,570 ^{EC}	1		42	<0.01	<0.01			
かき (露地) (無袋) (果実) 平成 19 年度	2,500 ^{EC}	1	3	42	0.03	0.02	0.01	0.01	
					0.01	0.01	<0.01	<0.01	
		1		56	0.10	0.10	0.10	0.10	
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
パイナップル (露地) (可食部) 昭和 48 年度	1,000 ^{EC}	1	1	2	52			0.003	0.003
				4	31			0.005	0.005
			1	2	80			<0.002	<0.002
				4	62			<0.002	<0.002
いちじく (果実) 昭和 53 年度	8~10 g ^{EC} /樹 樹幹塗布	1	1	30				<0.004	<0.004
			1	7	-			0.015	0.015
				14	0.004			0.004	0.004
				21	<0.002			<0.002	<0.002
			3	7	0.007			0.006	0.006
				14	0.003			0.003	0.003
				21	<0.002			<0.002	<0.002
			5	7	0.019			0.018	0.018
				14	0.005			0.004	0.004
				21	<0.002			<0.002	<0.002
			1	7	0.105			0.100	0.100
				14	0.014			0.014	0.014
				21	0.011			0.010	0.010
			3	7	0.046			0.022	0.022
				14	0.037			0.034	0.034
				21	0.012			0.011	0.011
			5	7	0.002			0.002	0.002
				14	0.041			0.040	0.040

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
いちじく (施設) (果実) 平成 7 年度	7 g ^{EC} /樹	1	7 14 21 144 151 159	7 14 21 144 151 159	0.008 0.012 0.003 0.009 0.003 0.004	0.008 0.012 0.003 0.008 0.003 0.004	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
					0.013 0.012 0.007 0.005 0.008 0.005	0.013 0.012 0.006 0.005 0.008 0.004	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
					7 14 21 144 151 159	0.013 0.012 0.007 0.005 0.008 0.005	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
		1	7 14 21 144 151 159	7 14 21 144 151 159	<0.02 <0.02 <0.02	<0.02 <0.02 <0.02	0.04 0.01 0.02	0.04 0.01 0.02
					7 14 21 144 151 159	<0.02 <0.02 <0.02	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
					7 14 21 144 151 159	<0.02 <0.02 <0.02	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ぎんなん (露地) (種実) 平成 15 年度	5 g ^{EC} /樹 樹幹散布	2	3	60 74 88	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	/	/
くり (露地) (可食部) 昭和 47 年度	1% ^{EC} 樹幹塗布	1	1	139	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004
				153	/	/	<0.004	<0.004
くり (露地) (果実) 昭和 49 年度	1,800 ^{MG}	1	2	14	0.002	0.002	<0.001	<0.001
			4		0.006	0.006	0.001	0.001
		1	2	14	0.002	0.002	<0.001	<0.001
			4		<0.002	<0.002	0.001	0.001
茶 (露地)	35,000 ^{EC} 土壤処理	1	1	92	/	/	<0.005	<0.005

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試 験 圃 場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
(製茶) 昭和 63 年度	44,500 ^{EC} 土壤処理	1		195			<0.005	<0.005
茶 (露地) (浸出液) 昭和 63 年度	44,500 ^{EC} 土壤処理	1	1	195	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		1		92	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
茶 (露地) (あら茶) 平成 9 年度	1,430 ^{EC}	1	1	21	0.01	0.01	0.02	0.02
		30		0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
茶 (露地) (あら茶) 平成 19 年度	17,500 ^{EC}	2	1	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) ・試験には EC : 乳剤、MC : マイクロカプセル剤、MG : 微粒剤、WP : 水和剤を用いた。

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

・農薬の使用回数及び使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している場合は、
回数又は PHI に a を付した。

＜別紙4：推定摂取量＞

作物名等	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：53.3 kg)		小児(1～6歳) (体重：15.8 kg)		妊婦 (体重：55.6 kg)		高齢者 (65歳以上) (体重：54.2 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
米	0.087	185.1	16.10	97.7	8.50	139.7	12.15	188.8	16.43
小麦	0.13	116.8	15.18	82.3	10.70	123.4	16.04	83.4	10.84
大麦	0.43	5.9	2.54	0.1	0.04	0.3	0.13	3.6	1.55
とうもろこし	0.045	2.5	0.11	4.3	0.19	2.7	0.12	0.8	0.04
だいす	0.005	56.1	0.28	33.7	0.17	45.5	0.23	58.8	0.29
あづき	0.069	1.4	0.10	0.5	0.03	0.1	0.01	2.7	0.19
そらまめ	0.03	0.2	0.01	0.1	0.00	0.1	0.00	0.4	0.01
その他の豆類	0.04	0.1	0.00	0.1	0.00	0.1	0.00	0.1	0.00
ばれいしょ	0.004	36.6	0.15	21.3	0.09	39.8	0.16	27	0.11
さとうきび	0.011	13.4	0.15	11.3	0.12	10.3	0.11	12.1	0.13
ごぼう	0.007	4.5	0.03	1.6	0.01	2.4	0.02	5.2	0.04
トマト	0.03	24.3	0.73	16.9	0.51	24.5	0.74	18.9	0.57
なす	0.062	4	0.25	0.9	0.06	3.3	0.20	5.7	0.35
きゅうり	0.059	16.3	0.96	8.2	0.48	10.1	0.60	16.6	0.98
かぼちゃ	0.033	9.4	0.31	5.8	0.19	6.9	0.23	11.5	0.38
しろうり	0.02	0.3	0.01	0.1	0.00	0.1	0.00	0.8	0.02
ほうれんそ	0.02	18.7	0.37	10.1	0.20	17.4	0.35	21.7	0.43
さやえんどう	0.07	0.6	0.04	0.2	0.01	0.7	0.05	0.6	0.04
さやいんげん	0.01	1.9	0.02	1.2	0.01	1.8	0.02	1.8	0.02
えだまめ	0.19	0.1	0.02	0.1	0.02	0.1	0.02	0.1	0.02
なつみかん	0.88	0.1	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09
その他のかんきつ	0.5	0.4	0.20	0.1	0.05	0.1	0.05	0.6	0.30
りんご	0.13	35.3	4.59	36.2	4.71	30	3.90	35.6	4.63
日本なし	0.152	5.1	0.78	4.4	0.67	5.3	0.81	5.1	0.78
もも	0.08	0.5	0.04	0.7	0.06	4	0.32	0.1	0.01
うめ	0.046	1.1	0.05	0.3	0.01	1.4	0.06	1.6	0.07
とうとう	0.02	0.1	0.00	0.1	0.00	0.1	0.00	0.1	0.00
いちご	0.03	0.3	0.01	0.4	0.01	0.1	0.00	0.1	0.00

ぶどう	0.07	5.8	0.41	4.4	0.31	1.6	0.11	3.8	0.27
かき	0.06	31.4	1.88	8	0.48	21.5	1.29	49.6	2.98
パイナップル	0.005	0.8	0.00	1	0.01	0.1	0.00	0.5	0.00
その他の果実	0.04	3.9	0.16	5.9	0.24	1.4	0.06	1.7	0.07
くり	0.006	0.7	0.00	1.3	0.01	0.1	0.00	0.8	0.00
茶	0.02	3	0.06	1.4	0.03	3.5	0.07	4.3	0.09
その他のスパイス	19.2	0.1	0.94	0.1	0.94	0.1	0.94	0.1	0.94
魚介類	0.24	94.1	22.6	42.8	10.3	94.1	22.6	94.1	22.6
合計			70.1		40.2		62.4		66.2

- ・定量限界未満であった作物は、摂取量の計算に含めていない。
- ・「ff」：平成10～12年の国民栄養調査（参照75～77）の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）
- ・妊婦及び高齢者の魚介類のffは国民平均のffを用いた。
- ・「摂取量」：残留値から求めたフェニトロチオンの推定摂取量（μg/人/日）
- ・その他の豆類は未成熟そらまめの値、その他のかんきつはいよかんの値、他の果実はいちじくの値、他のスパイスはみかんの皮の値を使用。

<参考>

1. 諮問書（平成 15 年 7 月 1 日付け厚生労働省発食安第 0701015 号）
2. 7 月 1 日に厚生労働省より意見の聴取要請のあった、清涼飲料水の規格基準の改正について：第 1 回食品安全委員会農薬専門調査会資料 6 及び参考資料 1~6
3. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付け平成 17 年厚生労働省告示第 499 号）
4. フェニトロチオンの魚介類における最大推定残留値に係る資料
5. 農薬抄録 MEP（殺虫剤）（平成 21 年 7 月 17 日改訂）：住友化学株式会社、一部公表
6. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartI. Metabolic fate of ^{32}P labeled Sumithion and Methyl Parathion in guinea pig and white rat.：住友化学工業株式会社、1963 年、公表、*Agr. Biol. Chem.*, **27**, 381-389 (1963).
7. Comparative metabolism of *m*-methyl- ^{14}C -Sumithion in several species of mammals *in vivo*.：住友化学工業、1976 年、公表、*J.Pesticide Sci.*, **1**, 9-21 (1976)
8. Metabolism of Fenitrothion in rats. (GLP 対応)：住友化学工業株式会社、1990 年、未公表
9. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartIII. Activation and degradation of Sumithion and Methyl Parathion in Mammals *in vivo*.：住友化学工業株式会社、1964 年、公表、*Agr. Biol. Chem.*, **28**, 411-421 (1964).
10. The selectivity of Sumithion compared with Methyl Parathion. Metabolism in the white mouse.：Department of Entomology, University of California、1967 年、公表、*J. Agr. food Chem.*, **15**, 242-249 (1967).
11. Metabolism of $[^{14}\text{C}]$ Fenitrothion in rice. (GLP 対応)：Ricerca Biosciences 社、2004 年、未公表
12. (^{14}C) -Fenitrothion : Metabolism in Tomato. (GLP 対応) : Covance Laboratories Ltd. 社、2002 年、未公表
13. A metabolism study with [phenyl- ^{14}C] Fenitrothion on grapes. (GLP 対応) : PTRL-West, Inc. 社、2002 年、未公表
14. Aerobic Aquatic Soil Metabolism of $[^{14}\text{C}]$ Fenitrothion (GLP 対応) : Ricerca Biosciences, LLC 社、2003 年、未公表
15. (^{14}C) -Fenitrothion : Soil metabolism and degradation (GLP 対応) : Covance Laboratories Ltd. 社、2001 年、未公表
16. Soil adsorption/desorption of $[^{14}\text{C}]$ Fenitrothion by the batch equilibrium method (GLP 対応) : PTRL-West, Inc. 社、2002 年、未公表
17. Hydrolysis of Fenitrothion in water as a function of pH at 25 °C (GLP 対応) :

- 住友化学工業株式会社、1988年、未公表
- 18. Photodegradation of Fenitrothion in water and on soil surface, and its hydrolysis in water フェニトロチオンの加水分解: 住友化学工業株式会社、1985年、公表、*J. Pesticide Sci.*, **10**, 263-272 (1985).
 - 19. フェニトロチオンの水中光分解 (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1988年、未公表
 - 20. 土壌残留試験成績 : 住友化学工業株式会社
 - 21. 作物残留試験成績 : 住友化学工業株式会社
 - 22. 動植物組織中における残留殺虫剤の定量 4. 生ミルク中のスミチオン及びその2,3の代謝産物の残留量測定 : 住友化学工業株式会社、1967年、公表、防虫科学 **32**, 95-100 (1967)
 - 23. Sumithion の薬理作用について: Sumioxonとの比較 : 和歌山県立医科大学、1972年、未公表
 - 24. Toxicological study with Sumithion. : 住友化学工業株式会社、1972年、未公表
 - 25. スミチオン原体のラットにおける急性経口毒性試験 : 日本大学(株) アニマル・リサーチ、1983年、未公表
 - 26. Acute oral toxicity of Sumithion in rats. : 住友化学工業株式会社、1986年、未公表
 - 27. スミチオンのラットに対する急性毒性試験 : 住友化学工業株式会社、1977年、未公表
 - 28. スミチオンのマウスに対する急性毒性試験 : 住友化学工業株式会社、1977年、未公表
 - 29. イヌにおけるスミチオン®の急性毒性試験 : 住友化学工業株式会社、1971年、未公表
 - 30. スミチオン原体のラットにおける急性経皮毒性試験 : 日本大学(株) アニマル・リサーチ、1983年、未公表
 - 31. Acute inhalation toxicity study of Sumithion in rats. : 住友化学工業株式会社、1979年、未公表
 - 32. Acute inhalation toxicity of Sumithion in rats. : 住友化学工業株式会社、1986年、未公表
 - 33. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartII. Inhibition of mammalian cholinesterase *in vivo* following the administration of Sumithion and Methylparathion. : 住友化学工業株式会社、1963年、公表 *agr. Biol. Chem.*, **27**, 669-676 (1963).
 - 34. *p*-ニトロメタクレゾールのマウスならびにラットに対する急性毒性試験 : 住友化学工業株式会社、1974年、未公表
 - 35. An acute study of the potential effects of orally administered Fenitrothion on

- behavior and Neuromorphology in rats. (GLP 対応) : Bio-research Laboratories Ltd、1992 年、未公表
36. サリチオン、サイアノックス、シュアサイド、スミチオンおよびスミオキソンのニワトリにおける急性経口毒性ならびに遅延性神経毒性:住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
37. Delayed neurotoxicity study with Sumithion in hens.スミチオン:住友化学工業株式会社、1977 年、未公表
38. Primary eye and skin irritation test of Sumithion® technical in rabbits. : 住友化学工業株式会社、1981 年、未公表
39. スミチオンの毒性;兎の眼および皮膚に対する刺激作用:住友化学工業株式会社、1972 年、未公表
40. Sumithion の毒性;モルモットによる皮膚アレルギー試験:住友化学工業式会社、1972 年、未公表
41. Possible allergic asthma by inhalation of sumithion 22% emulsifiable concentrate in guinea pigs. : 住友化学工業株式会社、1977 年、未公表
42. Subchronic toxicity study of Sumithion, Sumioxon and *p*-nitro-cresol in rats and 92 week feeding study of Sumithion with special reference to change of cholinesterase activity. : 住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
43. スミチオンの家兎に対する 6 か月摂食実験について:住友化学工業株式会社、1974 年、未公表
44. Subacute inhalation toxicity of Sumithion in rats and mice. : 住友化学工業株式会社、奈良県立医科大学、1979 年、未公表
45. A 3-month dietary study of the potential effects of the Fenitrothion in behavior, neurochemistry and neuromorphology in rat. (GLP 対応) : Bio-research Laboratories Ltd、1993 年、未公表
46. Two-year chronic oral toxicity study with Sumithion technical grade in beagle dogs. : Industrial Bio-Test 研究所 (米) 、1973 年、未公表
47. One year dietary toxicity study in dogs. : International Research & Development 社 (米国) 、1984 年、未公表
48. ビーグル犬による有機燐慢性中毒:東京歯科大学、1972 年、公表、日本眼科学会雑誌 76 1143-1150 (1972)
49. Two-year dietary administration in the rat. : Hazleton 研究所 (米) 、1974 年、未公表
50. スミチオン原体のマウスを用いた発癌性並びに慢性毒性試験 (GLP 対応) : (株) 大雄会医科学研究所、1990 年、未公表
51. 78-Week Tumorigenic study in the ICR Swiss mouse Sumithion. : Hazleton 研究所 (米) 、1975 年、未公表

52. Reproductive effects of Sumithion administrated orally in feed to Crl;CD®(SD)BR rats for two generations. (GLP 対応) : Argus Research Laboratories, Inc.、1990 年、未公表
53. スミチオンのラットを用いた一世代繁殖毒性試験：(株)大雄会医科学研究所、2004 年、未公表
54. Three-generation reproduction study - rats Sumithion. : Hazleton Laboratories America, Inc.、1980 年、未公表
55. スミチオンの催奇形性に関する研究；マウス、ラットの胎仔および新生仔におよぼす影響：住友化学工業株式会社、1974 年、未公表
56. Teratology study in rats with Sumithion. (GLP 対応) : Hazleton Laboratories America, Inc.、1987 年、未公表
57. Teratology study in rabbits Fenitothion T.G. (Sumithion). (GLP 対応) : Hazleton Laboratories America, Inc.、1986 年、未公表
58. スミチオンの遺伝子におよぼす影響について一バクテリアを用いた検討：住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
59. スミチオンの細菌を用いた変異原性試験報告：残留農薬研究所、1979 年、未公表
60. Mutagenicity tests of Sumithion with nitro reductase-defective bacteria. : 住友化学工業株式会社、1983 年、未公表
61. *In vivo* unscheduled DNA synthesis (UDS) assay of Sumithion in rat hepatocytes. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1988 年、未公表
62. *In vitro* gene mutaion test of Sumithion in V79 chinese hamster cells in culture. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1987 年、未公表
63. *In vitro* chromosomal aberration test of Sumithion in chinese hamster ovary cells (CHO-K1) in culture. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1988 年、未公表
64. *In vivo /in vitro* unscheduled DNA synthesis (UDS) assay of Sumithion in rat hepatocytes. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1990 年、未公表
65. Effects of fenitrothion on sister chromatid exchange (SCE) inclutured mouce cells. : 住友化学工業株式会社、1980 年、未公表
66. ラット骨髄細胞を用いた Sumithion®の *in vivo* 染色体異常試験：住友化学工業株式会社、1982 年、未公表
67. Fenitrothion の *in vivo* におけるマウス骨髄細胞に対する染色体異常誘発性試験：住友化学工業株式会社、1980 年、未公表
68. マウス骨髄細胞を用いた Sumithion®の *in vivo* 染色体異常試験：住友化学工業株式会社、1982 年、未公表
69. マウスの骨髄細胞を用いた Sumithion®の小核試験：住友化学工業株式会社、1982 年、未公表

70. スミチオンのマウスおよびラットにおける優性致死試験:住友化学工業株式会社、1975年、未公表
71. Acute ocular toxicity study in rats. (GLP 対応) : (財) 残留農薬研究所、1989年、未公表
72. 13-Week subchronic ocular toxicity study in rats. (GLP 対応) : (財) 残留農薬研究所、1989年、未公表
73. Fenitrothion ingestion in humans : subacute effects : Monash Medical School, Monash University、1999年、未公表
74. 食品健康影響評価について（平成 22 年 9 月 24 日付け厚生労働省発食安 0924 第 5 号）
75. 国民栄養の現状－平成 10 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2000 年
76. 国民栄養の現状－平成 11 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2001 年
77. 国民栄養の現状－平成 12 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2002 年
78. JMPR①：“FENITROTHION” , Pesticide residues in food - 2000.(2000)
79. EFSA : Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenitrothion.(2006)
80. APVMA① : The NRA Review of FENITROTHION Interim Report、volume 1(1999)
81. 食品健康影響評価について（平成 24 年 2 月 22 日付け厚生労働省食安 0222 第 1 号）
82. JMPR②：“FENITROTHION”、Pesticide residues in food 2003 Evaluations, Part I Residues (2003)
83. JMPR③：“FENITROTHION”、Pesticide Residues in food 2004 Evaluations, Part I Residues(2004)
84. 平成 3 年度飼料安全性確認調査委託事業、I 農薬等の乳汁への残留性：社団法人 日本科学飼料協会、1992 年
85. 食品健康影響評価について（平成 24 年 3 月 22 日付け 23 消安 6357 号）
86. 食品健康影響評価について（平成 25 年 4 月 9 日付け厚生労働省発食安 0409 第 1 号）
87. フェニトロチオンの食品健康影響評価に係る追加資料の提出について：住友化学株式会社、2013 年、未公表
88. 農薬抄録 MEP (殺虫剤) (平成 23 年 9 月 6 日改訂) : 住友化学株式会社、一部公表
89. 平成 23 年度ポジティブリスト制度による暫定基準見直し成分に係る資料 (フェ

- ニトロチオン) : 住友ライフケ株式会社、2011年、未公表
90. JMPR④ : "FENITROTHION"、Pesticide Residues in food 2007、Report(2007)
91. APVMA② : NRA Review of Fenitrothion-Residues Assessment (1999)
92. APVMA ③ : NRA Review of Fenitrothion-Evaluation of the Mammalian Toxicology and Metabolism/Toxicokinetics (1999)
93. 農林水産省動物医薬品検査所ホームページ. 動物用医薬品等データベース
94. 牛におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表
95. 豚におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表
96. 鶏におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表